

ДУБРОВНИК

Ocyris aureolus (Pallas, 1773)

Һаҙ турғайы



Категория и статус. О — вероятно исчезнувшие; КР — находящиеся под критической угрозой исчезновения (CR); I приоритет природоохранных мер. Вид включён в Красные книги РФ (2), Пермского края (2), Свердловской (2), Челябинской (2), Оренбургской (4) областей, Удмуртской республики (1).

Краткое описание. Размах крыльев до 26 см, масса тела — до 29 г. Немного меньше обыкновенной овсянки [1]. Самец отличается от других овсянок наличием широкой коричневой перевязи между жёлтым горлом и грудью. Верх коричневый; лоб, бока головы и подклювья чёрные. На крыле две белые полосы — верхняя широкая, нижняя узкая. У самки окраска тусклее чем у самца, чёрного цвета на голове нет, отсутствует коричневое ожерелье на груди, нет белой широкой полосы по верху крыла.

Распространение. С 1985 по 2006 гг. на всём протяжении с севера на юг — от правобережья верховий р. Белая в окрестностях г. Агидель до широты г. Мелеуз, на северо-западе Предуралья в низовьях р. Белая в окрестностях г. Агидель [2]. Встречался в г. Уфе [3,13], Благовещенском [3], Ишимбайском [4], Дюртюлинском [5], Чишминском [6], Кугарчинском [7], Мелеузовском [8, 9], Хайбуллинском [10], Белорецком [11,12], Кармаскалинском [2], Дуванском [2], Абзелиловском [2], Краснокамском [2] р-нах.

Места обитания и биология. Населяет луга в речных поймах, травянистые не очень сырые болота или открытые берега озёр с кустарниками [1]. Самая ранняя зарегистрированная встреча — 16 апреля [11]. Гнездо строит на земле в естественной ямке, в кладке 3-6 яиц. Инкубационный период длится 11-13 дней. Птенцы находятся в гнезде 12-15 дней. Отлёт начинается в конце июля, начало августа [1]. Питание — растительная пища и насекомые.

Численность, лимитирующие факторы и угрозы. С 2004 по 2013 гг. зарегистрировано более 800 особей [14]. Последний раз зарегистрирован 11 июня 2011 г. в окрестностях с. Тугай Благовещенского района [3]. При ежегодном обследовании мест обитания нами больше не встречался [2,3]. Угрозу составляет использование химических средств в сельском и лесном хозяйстве, выпас скота в местах гнездования и нарушения естественных мест обитания. Лимитирующие факторы не выявлены.

Принятые и необходимые меры охраны. Ранее меры охраны не принимались. Необходимые: отказ от использования химических средств для борьбы с вредителями, в лесном и сельском хозяйстве. Разведение в условиях неволи с последующим выпуском в дикую природу.

Источники информации. 1. Рябицев, 2002. 2. Валуев, 2013а. 3. Зернов, 2016. 4. Кириков, 1952. 5. Баянов, Валуев, 2004. 6. Валуев, 2014б. 7. Нехорошков, 1987. 8. Торгашов, 2003. 9. Валуев, 2007а. 10. Валуев В., Валуев Д., 2004. 11. Валуев, 2009а. 12. Валуев В., Валуев К., 2011. 13. Сушкин, 1897. 14. Валуев, 2024.

Автор-составитель: Д.А. Зернов.
Фотография: В.А. Колбин.