МИНИСТЕРСТВО ПРОСВЕЩЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
БАШКИРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ ИМ. М. АКМУЛЛЫ

Каталог животных Башкортостана

Второе издание,
дополненное и переработанное

под редакцией В.Ф. Хабибуллина

Уфа 2026

УДК 591(470.57)
ББК 28.6(2Рос.Баш)
К 29

Рецензенты:
А.А. Кириллов, кандидат биологических наук, заведующий лабораторией зоологии и паразитологии ИЭВБ РАН - филиал СамНЦ РАН (г. Тольятти);
Ю.Е. Михайлов, доктор биологических наук, профессор кафедры экологии и природопользования ФГБОУ ВО Уральский государственный лесотехнический университет (УГЛТУ, г. Екатеринбург).

Авторы-составители:
Валуев В.А., Данукалова Г.А., Дедюхин С.В., Есюнин С.Л., Ефимик В.Е., Исмагилов Н.Н., Костин И.Н., Мигранов М.Г., Осипова Е.М., Фарзалиева Г.Ш., Хабибуллин В.Ф.

Каталог животных Башкортостана. Справочное издание / В.А. Валуев, Г.А. Данукалова, С.В. Дедюхин [и др.]; под редакцией В.Ф. Хабибуллина. – 2-е изд., доп. и переработ. Уфа: Издательство БГПУ, 2026. – 572 с. – ISBN 978-5-00251-115-0.

В книге приводятся списки всех видов животных, обнаруженных в настоящее время на территории Республики Башкортостан: 10935 видов из 203 отрядов и 1097 семейств. Обобщены литературные данные, коллекционные материалы, результаты собственных исследований. Для ряда видов приведены сведения о распространении, численности и экологии. Предназначена для зоологов, экологов, преподавателей, студентов, учителей, школьников, натуралистов.
.

УДК 591(470.57)
ББК 28.6(2Рос.Баш)

ISBN 978-5-00251-115-0

© Валуев В.А. и др., 2026
© БГПУ им М. Акмуллы, 2026

Введение

Фаунистические исследования отдельных регионов вносят вклад в познание глобального разнообразия, являются основой для зоогеографических, экологических исследований, природоохранных мероприятий и повышения экологической грамотности широких слоев населения.

Республика Башкортостан расположена в юго-восточной части Русской равнины (Предуралье) и на Южном Урале, на стыке Европы и Азии. Разнообразие природных условий создается чередованием лесной, лесостепной и степной природных зон, высотной поясностью в горах и антропогенно трансформированными территориями. Площадь республики 143600 квадратных километров.

Фауна Башкирии типична для западного сектора Палеарктики, ее видовой состав складывается в основном из европейских и евро-сибирских видов. Эндемики и реликты немногочисленны и приурочены в основном к верхним поясам горной части и своеобразным останцам-шиханам.

Первая обобщающая сводка по фауне республики была выполнена коллективом авторов в 1949 году в книге «Животный мир Башкирии: полезные и вредные животные» (под редакцией П. А. Положенцева и К.С. Никифорука). В 1977 году увидело свет второе издание этой книги, в 1995 – третье; со значительными изменениями и дополнениями в 2016 году – четвертое. Промежуточный итог был подведен в издании «Зоологические исследования в Башкирии» (Баянов, 1997). Полная инвентаризация фауны сделана в 2015 году – в Каталоге животных Башкортостана (Баянов и др., 2015). В этом издании разделы по коловраткам и ракообразным были подготовлены Р.З. Сабитовой; пауки – С.Л. Есюниным, чешуекрылые – Т.А. Трофимовой, моллюски – Е.М. Осиповой; простейшие и все червеобразные животные – М.Г. Баяновым, членистоногие и хордовые – М.Г. Баяновым и В.Ф. Хабибуллиным. Перечислено 8061 вид из 24 типов, 60 классов, 195 отрядов и 912 семейств. В издании зафиксирована неполнота наших знаний о ряде таксонов, оно послужило отправной точкой для дальнейших исследований, придало импульс к целенаправленному изучению региональной фауны.

Создание сводного каталога животных Башкортостана преследовало несколько целей: обобщить опубликованные данные и сделать их доступными как специалистам, так и широкому кругу читателей. Часть данных в полном виде никогда не публиковалась и утеряна (по-видимому, безвозвратно): списки трипсов, наездников-ихневмонид и браконид, коловраток, фитонематод, клещей и некоторых других; некоторые неопубликованные результаты исследований специалистов-зоологов региона были включены в первое издание каталога. Вклад в изучении фауны региона внесли как зоологи республики и различных регионов РФ, так и зарубежные исследователи. В списке литературы приведены основные работы по фауне региона.

Сведения о фауне диких животных пополнялись ежегодно – как на основании

анализа литературных источников, так и в результате полевых исследований, ревизии собранных материалов, привлечения данных наблюдений широкого круга натуралистов-любителей природы. Так, ценным источником информации послужила онлайн-платформа iNaturalist www.inaturalist.org. Сотни новых для каталога видов (преимущественно насекомых) были добавлены именно с этой платформы. Просмотрены коллекционные материалы беспозвоночных Башкирского государственного аграрного университета, Башкирского государственного педагогического университета им. М.Акмуллы, Института природы и человека Уфимского университета науки и технологий и его филиалов в Бирске и Стерлитамаке. С 2016 по 2025 опубликовано десять дополнений к каталогу под общим названием «Ведение каталога животных Башкортостана за …год» (Хабибуллин, 2016-2025).

В настоящем втором издании мы устранили множество мелких опечаток, неточностей; удалили ошибочно включенные таксоны, добавили более трех тысяч новых для региона видов. По возможности приведены ссылки на основные источники информации, включены даты и места обнаружения новых или редких видов, сведения о распространении, динамике численности, биотопической приуроченности, исторические сведения.

Систематика в основном приводится по сайту www.gbif.org. Составители отдельных разделов пользовались дополнительными источниками, приведенными в списке литературы. Детальность таксонов зависела от их объема: для единичных видов приведено семейство, для многочисленных семейств – подсемейства, трибы. Для удобства широкого круга читателей виды (для ряда таксонов – семейства и отряды) перечисляются в алфавитном порядке. Русские названия таксонов приводятся с заглавной буквы; названия хозяев паразитических видов – со строчной. Приведена сквозная нумерация видов (если подвидов более одного, нумеровался только один). Виды, обитание которых на территории Башкортостана сомнительно, указаны знаком «?» и не включены в общую нумерацию. Не включены в список залетные птицы, ряд инвазивных видов, разводимые в неволе животные.

Малакофауна Республики Башкортостан до сих пор остается недостаточно изученной группой, по сравнению с другими беспозвоночными. В данной работе приведены обобщённые данные по моллюскам, которые собирались разными исследователями начиная с 30-х годов прошлого столетия. Большой вклад в изучение фауны моллюсков, особенно, пресноводных гастропод и двустворчатых моллюсков, был сделан В.Г. Боевым. В результате его исследований были систематизированы и определены виды наземных и пресноводных моллюсков, выявлены и описаны биотопы их обитания, и места их находок на территории республики (Боев, 1984; Боев, Баянов, 1984, 1989; Боев, 1995). С 2000-х годов изучение фауны современных моллюсков продолжается, регистрируются новые виды, уточняются границы их распространения, более подробно изучаются биотопы моллюсков и условия их обитания (Хохуткин и др, 2003; Данукалова, Морозова, 2004; Моллюски Урала и прилегающих территорий…, 2009; Баянов и

др., 2015; Баянов и др., 2016; Осипова, Данукалова, 2023). Систематика моллюсков приводиться по базам: www.gbif.org, и www.molluscabase.org/index.php.

Список пауков основывается на обзоре пауков республики (Есюнин, 2015) с более поздними опубликованными (Валуев, 2015, 2022а, 2022б, 2022в, 2023; Есюнин, 2020; Есюнин, Валуев, 2020а, 2020б, 2020в; Козьминых, 2022; Власов, Есюнин, 2025; Михайлов и др., 2025; Хабибуллин, 2025б) и новыми оригинальными данными. Использованы три категории обилия: *единично* – вид представлен в сборах единичными экземплярами; *редко* – коллекции, собранные в данном типе сообществ, регулярно содержат данный вид в небольших, как правило единичных, экземплярах; *обычно* – вид регулярно отлавливается в данном биотопе в значительных количествах. Названия таксонов приводятся по (WSC, 2025).

Список многоножек основывается на опубликованными (цитируются только первые для данной территории указания) и новых оригинальных данных составителя. Список сенокосцев основывается на обзоре сенокосцев Урала (Farzalieva, Esyunin, 2020) с более поздними опубликованными (Есюнин, 2020; Валуев, 2022а, 2022б; Ефимик, Валуев, 2023б; Михайлов и др., 2025; Хабибуллин, 2025б) и новыми оригинальными данными.

В основу списка разноусых чешуекрылых положена сводка по фауне Lepidoptera Республики Башкортостан (Исмагилов, 2025а), дополненная сведениями по местонахождениям в границах административных районов и биотопической приуроченности. В случаях, когда точное местонахождение вида в пределах муниципальных районов или городских округов установить невозможно, приведена пометка «без местонахождений» с перечислением всех литературных источников, где данный вид указан для республики. Виды, характеризующиеся эвритопностью и не вызывающие сомнений в широком распространении, отмечены как встречающиеся «на всей территории». Сведения о биотопической приуроченности и трофической специализации приведены преимущественно на основе данных по Средней полосе России и Уралу, с привлечением личных наблюдений автора и, в отдельных случаях, европейских источников. Синонимия приведена для тех видовых названий, которые употребляются в региональной фаунистической литературе.

Работа С.В. Дедюхина и И.Н. Костина выполнена в рамках государственного задания Министерства науки и высшего образования РФ «Биоразнообразие природных экосистем Заволжско-Уральского региона: история его формирования, современная динамика и пути охраны» (FEWS-2024-0011).

Схема расположения природных зон (Предуралье, горно-лесной Южный Урал, степное Зауралье) и административных районов Башкортостана (из Красной книги РБ, 2025) приведена на рисунке. В работе приняты следующие сокращённые названия административных районов Башкортостана: Абзелиловский – Абзл; Альшеевский – Альш.; Архангельский – Архн; Аскинский – Аскн; Аургазинский – Аург; Бакалинский – Бакл; Балтачевский – Блтч;

Белокатайский – Блкт; Бижбулякский – Бжбл; Бирский – Брск; Благоварский – Блвр; Благовещенский – Блвщ; Бураевский – Бурв; Бурзянский – Брзн; Гафурийский – Гафр; Давлекановский – Давл; Дуванский – Дувн; Дюртюлинский – Дюрт; Ермекеевский – Ермк; Зианчуринский – Зиан; Зилаирский – Зилр; Иглинский – Иглн; Илишевский – Илиш; Ишимбайский – Ишмб; Калтасинский – Клтс; Кармаскалинский – Крмс; Кигинский – Кигн; Краснокамский – Кркм; Кугарчинский – Кгрч; Кушнаренковский – Кушн; Куюргазинский – Куюр; Мелеузовсий – Мелз; Мечетлинский – Мечт; Мишкинский – Мишк; Миякинский – Мияк; Нуримановский – Нурм; Салаватский – Слвт; Стерлибашевский – Стбш; Стерлитамакский – Стмк; Татышлинский – Татш; Туймазинский – Туйм; Уфимский – Уфмс; Учалинский – Учлн; Фёдоровский – Федр; Хайбуллинский – Хайб; Чекмагушевский – Чекм; Чишминский – Чишм; Шаранский – Шарн; Янаульский – Янул. Названия некоторых городов приведены полностью; Уфа, Салават, Стерлитамак, Нефтекамск, Октябрьский, Сибай, Агидель, Кумертау.

Башкирский государственный природный заповедник (БГПЗ), заповедник «Шульган-Таш» (ЗШТ), НП «Башкирия» – крупные сопредельные ООПТ, расположенные на западном макросклоне низкогорий Южного Урала (Мелеузовский, Кугарчинский и Бурзянский районы). Южно-уральский государственный природный заповедник (ЮУГПЗ) – в Белорецком районе. Природный парк «Аслы-Куль» расположен в Давлекановском районе. Включает эталонные сообщества заволжской лесостепи на увалах Белебеевской возвышенности, окружающих крупное солоноватое озеро Аслыкуль. Стерлитамакские шиханы – три известняковых, палеорифовых горы-останца на правобережье р. Белой близ г. Стерлитамак в Ишимбайском (Тратау, Куштау) и Стерлитамакском (Юрактау) районах.

В разделе по разноусым чешуекрылым приняты следующие группировки районов: Северо-западные (5 районов): Белокатайский, Мечетлинский, Кигинский, Салаватский, Дуванский. Северные (12 районов): Бирский, Мишкинский, Благовещенский, Нуримановский, Караидельский, Аскинский, Балтачевский, Татышлинский, Бураевский, Калтасинский, Краснокамский, Янаульский. Центральные (14 районов): Уфимский, Кушнаренковский, Чекмагушевский, Шаранский, Бакалинский, Ишимбайский, Стерлитамакский, Гафурийский, Аургазинский, Кармаскалинский, Архангельский, Иглинский, Илишевский, Дюртюлинский. Южные (16 районов): Зианчуринский, Кугарчинский, Куюргазинский, Федоровский, Мелеузовский, Стерлибашевский, Миякинский, Бижбулакский, Ермекеевский, Белебеевский, Альшеевский, Туймазинский, Буздякский, Благоварский, Чишминский, Давлекановский. Горно-лесные (3 района): Белорецкие, Бурзянский, Зилаирский. Юго-восточные (4 района): Хайбуллинский, Баймакский, Учалинский, Абзелиловский.

В настоящем издании перечислено 10935 видов из 203 отрядов и 1097 семейств. Существенно дополнены списки простейших – 312 видов (в предыдущем издании было 188) и членистоногих: Hemiptera 801 (было 525),

Жесткокрылые 2180 (1386), Чешуекрылые 2239 (1320), Перепончатокрылые 1089 (858) и Двукрылые 1144 (было 788).

Сведения об авторах:

Валуев Виктор Алексеевич (класс Птицы) – Институт экологический экспертизы и биоинформационных технологий, Уфа. valuyevva@mail.ru

Данукалова Гузель Анваровна (тип Моллюски) – Институт геологии УФИЦ РАН, Уфа. guzel59@mail.ru.

Дедюхин Сергей Викторович (отряд Жесткокрылые: семейства Зерновки, Листоеды, надсемейство Curculionoidea) – УдГУ, Ижевск. ded@udsu.ru

Есюнин Сергей Леонидович (отряды Сенокосцы и Пауки) – ПГНИУ, Пермь. esyunin@mail.ru

Ефимик Виктор Евгеньевич (отряды Сенокосцы и Пауки) – ПГНИУ, Пермь. efimik.viktor@mail.ru

Исмагилов Нияз Назипович (отряд Чешуекрылые: подотряд Zeugloptera, подотряд Glossata: инфраотряды Eriocraniomorpha, Hepialomorpha, Nepticulomorpha, Adelomorpha, Papilionomorpha – все серии кроме Papilionoformes) – Казань. niyazstatus1@yandex.ru

Костин Иван Николаевич (отряды Верблюдки и Сетчатокрылые) – УдГУ, Ижевск. kostin.udm@gmail.com

Мигранов Марат Галиханович (отряд Чешуекрылые: серия Papilionoformes инфраотряда Papilionomorpha) – Уфа. marat-migranov@yandex.ru

Осипова Евгения Михайловна (тип Моллюски) – Институт геологии УФИЦ РАН, Уфа. myrte@mail.ru.

Фарзалиева Гюлли Шамсаддин кызы (Многоножки) – ПГНИУ, Пермь. f-g-s-h@mail.ru

Хабибуллин Винер Фаритович (все остальные группы) – УУНиТ / БГПУ им. М.Акмуллы, Уфа. herpetology@mail.ru

Выражаем искреннюю признательность всем, кто содействовал созданию данного труда. Редактор благодарит свою семью за поддержку.

Замечания и предложения просьба присылать на электронную почту: herpetology@mail.ru Винеру Фаритовичу.

Винер Фаритович Хабибуллин



Административные районы Республики Башкортостан

48 Абзелиловский
35 Альшеевский
32 Архангельский
3 Аскинский
36 Аургазинский
52 Баймакский
20 Бакалинский
7 Балтачевский
34 Белебеевский
11 Белокатайский
38 Белорецкий
40 Бижбулякский
14 Бирский
25 Благоварский
16 Благовещенский
24 Буздякский
6 Бураевский
47 Бурзянский
37 Гафурийский
30 Давлекановский
9 Дуванский
13 Дюртюлинский
33 Ермекеевский
53 Зианчуринский
51 Зилаирский
28 Иглинский
12 Илишеевский
44 Ишимбайский
5 Калтасинский
8 Караидельский
31 Кармаскалинский
19 Кигинский
4 Краснокамский
50 Кугарчинский
22 Кушнаренковский
49 Куюргазинский
46 Мелеузовский
10 Мечетлинский
15 Мишкинский
41 Миякинский
17 Нуримановский
18 Салаватский
42 Стерлибашевский
43 Стерлитамакский
2 Татышлинский
29 Туймазинский
27 Уфимский
39 Учалинский
45 Федоровский
54 Хайбуллинский
21 Чекмагушевский
26 Чишминский
33 Шаранский
1 Янаульский

Рисунок. Схема природных зон и административных районов РБ.

Оглавление

Введение 3
Тип Euglenozoa 17
Класс Kinetoplastea 17
Отряд Parabodonida 17
Отряд Trypanosomatida 17
Тип Polymastigota – Многожгутиковые 17
Класс Diplomonadea 17
Отряд Diplomonadida 17
Класс Parabasalea – Парабазалии 17
Отряд Hypermastigina 17
Отряд Trichomonadida – Трхомонадиды 18
Тип Apicomplexa – Споровики 18
Класс Gregarinea – Грегарины 18
Отряд Schizogregarinida 18
Отряд Eugregarinida – Собственно грегарины 18
Класс Coccidea – Кокцидиеобразные 18
Подкласс Coccidia 18
Отряд Eimeriida 18
Подкласс Piroplasmia 19
Отряд Piroplasmida 19
Тип Ciliophora – Инфузории 19
Класс Colpodea 19
Отряд Bursariomorphida 19
Отряд Colpodida 19
Отряд Cyrtolophosidida 19
Класс Cyrtophoria 20
Отряд Cyrtophorida 20
Отряд Chlamydodontida 20
Отряд Dysteriida 20
Класс Gymnostomatea 20
Отряд Cyclotrichida 20
Отряд Haptorida 21
Отряд Pleurostomatida 21
Отряд Spathidiida 22
Класс Heterotrichea 22
Отряд Heterotrichida – Разноресничные 22
Класс Hypotrichea 23
Отряд Euplotida 23
Отряд Oxytrichida 23
Отряд Stichotrichida 23

Класс Karyorelictea 23
Отряд Loxodida 23
Класс Kinetofragminophora 23
Отряд Plagiopylida 23
Отряд Suctorida 24
Класс Litostomatea 24
Отряд Dileptida 24
Отряд Entodiniomorphida – Желудочно–кишечные инфузории 24
Отряд Oxytrichida 25
Класс Nassophorea 25
Отряд Nassulida 25
Класс Oligohymenophorea 25
Отряд Hymenostomatida 25
Отряд Peniculida 26
Отряд Peritrichida 26
Отряд Pleuronematida 27
Отряд Scuticociliatida 27
Класс Oligotrichea 27
Отряд Choreotrichida 27
Отряд Halteriida 28
Отряд Oligotrichida 28
Отряд Strombidiida 28
Отряд Tintinnida 28
Отряд Urostylida 28
Класс Prostomatea 29
Отряд Prorodontida 29
Отряд Prostomatida 29
Тип Opalinata – Опалинаты 29
Класс Opalinatea 29
Отряд Opalinida – Опалиниды 29
Тип Cercozoa 30
Класс Filosia 30
Отряд Aconchulinida 30
Тип Heliozoa – Солнечники 30
Отряд Actinophrida 30
Отряд Centrohelida 30
Отряд Desmothoracida 30
Тип Foraminifera 30
Отряд Allogromiida 30
Тип Lobosa 30
Класс Gymnamoeba 30
Отряд Amoebida – Амебы 30
Отряд Arcellinida – Раковинные амебы 31

Тип Cercozoa....32
Класс Sarcomonadea....32
Отряд Cercomonadida....32
Тип Porifera – Губки....32
Класс Demospongiae – Обыкновенные губки....32
Отряд Spongillida....32
Тип Cnidaria – Стрекающие....32
Класс Myxosporea....32
Отряд Bivalvulida....32
Класс Hydrozoa....33
Отряд Anthoathecata....33
Отряд Limnomedusae....33
Тип Bryozoa – Мшанки....33
Класс Phylactolaemata....33
Отряд Plumatellida....33
Тип Platyhelminthes – Плоские черви....33
Класс Turbellaria – Ресничные черви....33
Отряд Tricladida....33
Класс Monogenea – Моногенеи....34
Подкласс Monopisthocotylea....34
Отряд Dactylogyridea....34
Отряд Gyrodactylidea....34
Подкласс Polyopisthocotylea....35
Отряд Diclybothriidea....35
Отряд Mazocraeidea....35
Отряд Polystomatidea....35
Класс Trematoda – Трематоды (Сосальщики)....35
Подкласс Digenea....35
Отряд Plagiorchiida....35
Отряд Diplostomida....40
Класс Cestoda – Цестоды....42
Отряд Amphilinidea....42
Отряд Bothriocephalidea....42
Отряд Caryophyllidea....42
Отряд Cyclophyllidea – Цепни....43
Отряд Diphyllobothriidea – Лентецы....47
Отряд Onchoproteocephalidea....47
Тип Acanthocephales – Скребни....47
Класс Palaeacanthocephala....47
Отряд Echinorhynchida....47
Отряд Polymorphida....47
Класс Archiacanthocephala....48
Отряд Gigantorhynchida....48

Отряд Oligacanthorhynchida 48
Класс Eoacanthocephala 48
Отряд Neoechinorhynchida 48
Тип Gastrotricha – Брюхоресничные черви 48
Класс Chaetonotoidea 48
Отряд Chaetonotida 48
Тип Rotifera – Коловратки 48
Класс Eurotatoria 48
Подкласс Bdelloidea 48
Отряд Philodinida 48
Подкласс Monogononta 49
Отряд Floscullariacea 49
Отряд Ploima 49
Тип Annelida – Кольчатые черви 52
Класс Polychaeta – Многощетинковые черви 52
Отряд Naidomorpha 53
Класс Oligochaeta – Малощетинковые черви 53
Отряд Crassiclitellata 53
Отряд Enchytraeida 53
Отряд Lumbriculida 53
Отряд Tubificida 53
Класс Hirudinea – Пиявки 54
Отряд Arhynchobdellida – Челюстные пиявки 54
Отряд Rhynchobdellida – Хоботные пиявки 55
Тип Mollusca – Моллюски 55
Класс Gastropoda – Брюхоногие моллюски 55
Подкласс Caenogastropoda 55
Отряд Architaenioglossa 55
Отряд Littorinimorpha 55
Подкласс Heterobranchia 56
Отряд Hygrophila 56
Отряд Ellobiida 59
Отряд Stylommatophora 59
Класс Bivalvia – Двустворчатые моллюски 64
Подкласс Autobranchia 64
Отряд Unionida 64
Отряд Sphaeriida 65
Отряд Myida 65
Тип Nematoda – Круглые черви 66
Класс Chromadorea 66
Отряд Aphelenchida 66
Отряд Chromadorida 66
Отряд Monhysterida 66

Отряд Plectida 66
Отряд Rhabditida 67
Класс Enoplea 73
Отряд Dioctophymatida 73
Отряд Dorylaimida 74
Отряд Enoplida 74
Отряд Mermithida 74
Отряд Mononchida 75
Отряд Trichinellida 75
Отряд Triplonchida 75
Тип Nematomorpha – Волосатиковые 76
Класс Gordioida – Волосатики 76
Отряд Gordea 76
Тип Tardigrada – Тихоходки 76
Класс Eutardigrada 76
Отряд Parachela 76
Тип Arthropoda 76
Класс Arachnida – Паукообразные 76
Подкласс Dromopoda 76
Отряд Pseudoscorpiones – Ложноскорпионы 76
Отряд Opiliones Sundevall, 1833 – Сенокосцы (С.Л. Есюнин, В.Е. Ефимик) 76
Подкласс Micrura 77
Отряд Ixodida 77
Отряд Mesostigmata 78
Отряд Sarcoptiformes 79
Отряд Trombidiformes 85
Отряд Araneae Clerck, 1757 – Пауки (С.Л. Есюнин, В.Е. Ефимик) .87
Класс Chilopoda Latreille, 1817 115
Отряд Lithobiomorpha Pocock, 1895 115
Отряд Scutigeromorpha Pocock, 1895 115
Отряд Geophilomorpha Pocock, 1895 116
Класс Symphyla Ryder, 1880 116
Отряд Cephalostigmata Verhoeff, 1934 116
Класс Diplopoda de Blainville in Gervais, 1844 116
Отряд Polyzoniida Cook, 1895 116
Отряд Julida Brandt, 1833 116
Отряд Chordeumatida Pocock, 1894 116
Отряд Polydesmida Pocock, 1887 117
Класс Branchiopoda 117
Подкласс Sarsostraca 117
Отряд Anostraca 117
Подкласс Phyllopoda 117

Отряд Notostraca – Щитни 117
Отряд Diplostraca 117
Класс Copepoda – Веслоногие ракообразные 120
Отряд Calanoida – Каляниды 120
Отряд Cyclopoida – Циклопиды 120
Отряд Harpacticoida 121
Отряд Siphonostomatoida 121
Класс Maxillopoda 121
Отряд Arguloida 121
Отряд Cephalobaenida 121
Класс Ostracoda – Ракушковые 122
Отряд Podocopida – Ракушковые 122
Класс Malacostraca – Высшие ракообразные 122
Отряд Mysida – Мизиды 122
Отряд Isopoda – Равноногие 122
Отряд Amphipoda – Разноногие 123
Отряд Decapoda – Десятиногие 123
Класс Entognatha – Скрыточелюстные насекомые 123
Отряд Collembola – Ногохвостки, или Коллемболы 123
Отряд Diplura – Двухвостки 127
Класс Insecta – Насекомые 127
Отряд Zygentoma – Щетинохвостки 127
Отряд Blattodea – Тараканы 127
Отряд Mantodea– Богомолы 128
Отряд Orthoptera – Прямокрылые 128
Отряд Dermaptera – Уховертки, или кожистокрылые 131
Отряд Plecoptera – Веснянки 131
Отряд Psocodea – Сеноеды 132
Отряд Ephemeroptera – Поденки 133
Отряд Odonata – Стрекозы 134
Отряд Phthiraptera – Пухоеды и власоеды 137
Отряд Hemiptera – Полужесткокрылые 139
Отряд Thysanoptera – Трипсы, или Пузыреногие 162
Отряд Megaloptera – Вислокрылые (Большекрылые) 165
Отряд Raphidioptera – Верблюдки (Костин И.Н.) 166
Отряд Neuroptera – Сетчатокрылые (Костин И.Н.) 166
Отряд Mecoptera – Скорпионницы 167
Отряд Strepsiptera – Веерокрылые 167
Отряд Coleoptera – Жесткокрылые 167
Отряд Trichoptera – Ручейники 250
Отряд Lepidoptera – Чешуекрылые 253
Отряд Hymenoptera – Перепончатокрылые 395
Отряд Siphonaptera – Блохи 426

Отряд Diptera – Двукрылые 426
Тип Chordata – Хордовые 459
Класс Actinopterygii – Лучеперые рыбы 459
Подкласс Chondrostei – Хрящекостные рыбы....459
Отряд Acipenseriformes – Осетрообразные 459
Подкласс Neopterygii – Новоперые рыбы 459
Отряд Clupeiformes – Сельдеобразные 460
Отряд Cypriniformes – Карпообразные 460
Отряд Siluriformes – Сомообразные....460
Отряд Salmoniformes – Лососеобразные....460
Отряд Esociformes – Щукообразные 461
Отряд Gadiformes – Трескообразные 461
Отряд Gasterosteiformes – Колюшкообразные 461
Отряд Syngnathiformes – Иглообразные 461
Отряд Scorpaeniformes – Скорпенообразные 461
Отряд Perciformes – Окунеобразные 461
Класс Amphibia – Земноводные 462
Отряд Caudata – Хвостатые 462
Отряд Anura – Бесхвостые 462
Класс Reptilia – Пресмыкающиеся 462
Отряд Testudines – Черепахи 462
Отряд Squamata – Чешуйчатые....462
Класс Aves – Птицы (Валуев В.А.)....463
Отряд Gaviiformes – Гагарообразные 463
Отряд Podicipediformes – Поганкообразные 463
Отряд Pelecaniformes – Веслоногие 463
Отряд Ciconiiformes – Аистообразные....464
Отряд Phoenicopteriformes – Фламингообразные 464
Отряд Anseriformes – Гусеобразные 464
Отряд Falconiformes – Соколообразные 465
Отряд Galliformes – Курообразные 467
Отряд Gruiformes – Журавлеобразные....467
Отряд Charadriiformes – Ржанкообразные 468
Отряд Columbiformes – Голубеобразные....470
Отряд Cuculiformes – Кукушкообразные....470
Отряд Strigiformes – Совообразные 471
Отряд Caprimulgiformes – Козодоеобразные....471
Отряд Apodiformes – Стрижеобразные....471
Отряд Coraciiformes – Ракшеобразные 471
Отряд Upupiformes – Удодообразные....471
Отряд Picimorphes – Дятлообразные....471
Отряд Passeriformes – Воробьинообразные....472
Класс Mammalia – Млекопитающие....476

Подкласс Eutheria – Плацентарные звери 477
Отряд Insectivora – Насекомоядные 477
Отряд Chiroptera – Рукокрылые.....477
Отряд Lagomorpha – Зайцеобразные.....477
Отряд Rodentia – Грызуны 478
Отряд Carnivora – Хищные 479
Отряд Artiodactyla – Парнокопытные 479
Литература.....480
Указатель латинских названий родов 520

Царство Animalia – Животные
Подцарство Protozoa – Простейшие
Группа Excavata
Тип Euglenozoa
Класс Kinetoplastea
Отряд Parabodonida
Семейство Bodonidae – Бодониды
1. *Bodo caudatus* (Dujardin, 1841) – водоемы
2. *Bodo edax* (Klebs, 1893) – водоемы
3. *Bodo globosus* (Stein, 1878) – водоемы, аэротенки

Отряд Trypanosomatida
Семейство Trypanosomatidae
4. *Blastocrithidia culicis* (Novy, MacNeal & Torrey, 1907) – у комара
5. *Blastocrithidia pulicis* (Porter, 1911) – у блохи
6. *Crithidia fasciculata* Leger, 1902 – у малярийного комара
7. *Herpetomonas muscarum* Kent, 1881 – у комнатной мухи
8. *Phytomonas davidi* (Lafont, 1909) – млечный сок молочайных растений
9. *Trypanosoma equiperdum* (Doflien, 1901) – у лошади в половых органах и талерных бляшках
10. *Trypanosoma lewisi* (Kent, 1880) – кровеносные сосуды мыши
11. *Trypanosoma tincae* (Laveran & Mesnil, 1904) – кровеносные сосуды линя

Тип Polymastigota – Многожгутиковые
Класс Diplomonadea
Отряд Diplomonadida
Семейство Giardiidae – Лямблии
12. *Giardia intestinalis* Alexeieff, 1914 – Лямблия в кишечнике человека
13. *Giardia muris* (Grassi, 1879) – у мышевидных грызунов

Класс Parabasalea – Парабазалии
Отряд Hypermastigina
Семейство Lophomonadidae
14. *Lophomonas blattarum* Stein, 1860

Семейство Spirotrichosomatidae
15. *Macrospironympha xylopletha* Cleveland, Hall, Sanders & Collier, 1934

Семейство Trichonymphidae
16. *Trichonympha sp*.

Отряд Trichomonadida – Трхомонадиды

Семейство Trichomonadidae

17. *Pentatrichomonas hominis* Davaine, 1860
18. *Trichomonas gallinae* (Rivolta, 1878)
19. *Trichomonas vaginalis* (Donne, 1836) – Мочеполовая трихонома человека
20. *Tritrichomonas batrachorum* (Party, 1952) – у амфибий
21. *Tritrichomonas foetus* (Riedmuller, 1928) – Абортивная трихонома (в половых путях крупного рогатого скота)
22. *Tritrichomonas muris* (Wenrich, 1921) – у грызунов

Группа Alveolata

Тип Apicomplexa – Споровики

Класс Gregarinea – Грегарины

Отряд Schizogregarinida

Семейство Schizocystidae

23. *Schizocystis gregarinoides* Leger, 1900

Отряд Eugregarinida – Собственно грегарины

Семейство Actinocephalidae

24. *Corycella armata* Léger, 1892 – в кишечнике разных насекомых
25. *Hoplorhynchus oligacanthus* (von Siebold, 1839)

Семейство Aggregatidae

26. *Steinina ovalis* (von Stein, 1848) – в кишечнике жука-хрущака

Семейство Gregarinidae

27. *Gregarina blattarum* (Siebold, 1839) – в кишечнике черного таракана
28. *Gregarina cuneata* (von Stein, 1848) – в кишечнике жука-хрущака
29. *Gregarina polymorpha* (Dufour, 1828) – в кишечнике жука-хрущака
30. *Gregarina steini* (Berndt, 1902) – в кишечнике хрущака

Семейство Monocystidae

31. *Monocystis agilis* von Stein, 1848 – в полости тела и половых мешках дождевых червей

Семейство Stylocephalidae

32. *Stylocephalus longicollis* von Stein, 1848

Класс Coccidea – Кокцидиеобразные

Подкласс Coccidia

Отряд Eimeriida

Семейство Cryptosporidiidae

33. *Cryptosporidium muris* Tyzzer, 1907
34. *Cryptosporidium parvum* Tyzzer, 1912

Семейство Eimeriidae – Эймерии

35. *Eimeria acervulina* Tyzzer, 1929 – в стеках кишечника у куриных птиц

36. *Eimeria arloigni* (Marotel, 1905)
37. *Eimeria carpelli* Leger & Stankovitch, 1921
38. *Eimeria leporis* (Nieschulz, 1923) – в стенках кишечника у зайцев
39. *Eimeria magna* Perard, 1925
40. *Eimeria maxima* Tyzzer, 1929 – в стенках кишечника у куриных
41. *Eimeria ninakohlyakimovae* Yakimoff & Rastegaieva, 1930
42. *Eimeria perforans* (Leuckart, 1879) – в стенках кишечника кроликов
43. *Eimeria praecox* Johnson, 1930
44. *Eimeria stiedai* (Lindemann, 1895) – Кроличья кокцидия
45. *Eimeria tenella* (Railliet & Lucet, 1891) – Куриная кокцидия
46. *Eimeria zuernii* (Rivolta, 1878) – в стенках кишечниках крупного рогатого скота

Семейство Isosporidae

47. *Sarcocystis bertrami* Doflein, 1885 – в мышцах лошади
48. *Sarcocystis hirsuta* Moule, 1888 – в мышцах КРС
49. *Sarcocystis meischeriana* (Kuhn, 1865) – в мышцах свиней
50. *Sarcocystis tenella* (Raillliet, 1886) – в мышцах овец

Подкласс Piroplasmia

Отряд Piroplasmida

Семейство Babesiidae

51. *Babesia caballi* (Nuttall & Strickland, 1910) – в крови лошади, вызывал эпизоотии
52. *Babesia canis* (Piana & Galli-Valerio, 1895) – в кровяной системе собаки

Семейство Theileriidae

53. *Theileria equi* (Laveran, 1901)

Тип Ciliophora – Инфузории

Класс Colpodea

Отряд Bursariomorphida

Семейство Bursariidae

54. *Bursaria truncatella* (Müller, 1773) – Бурсария

Отряд Colpodida

Семейство Colpodidae

55. *Colpoda cucullus* (Müller, 1773) 753 – водоемы, почва
56. *Colpoda inflata* (Stokes, 1884) – аэротенки
57. *Colpoda maupasii* Enriques, 1908 – водоемы, почва
58. *Colpoda steinii* Maupas, 1883 – водоемы, почва

Отряд Cyrtolophosidida

Семейство Cyrtolophosididae

59. *Cyrtolophosis elongata* (Schewiakoff, 1892) – оз. Кандры-Куль (Современное состояние…, 2018).

60. *Cyrtolophosis mucicola* Stokes, 1885 – оз. Кандры-Куль (Быкова и др., 2014)
61. *Plesiocaryon elongatum* (Schewiakoff, 1892)

Класс Cyrtophoria

Отряд Cyrtophorida

Семейство Chilodonellidae

62. *Chilodonella cucullulus* (O. F. Muller, 1786) – Стерлитамак (Чаус, 2015)
63. *Chilodonella cyprini* (Moroff, 1902) – жабры гольяна, пескаря
64. *Chilodonella uncinata* (Ehrenberg, 1838) – аэротенки, Стерлитамак (Чаус, 2015)
65. *Trithigmostoma cucullulus* (Müller, 1786) – реки Белая, Большой Нугуш, Ашкадар, Зилаир, Инзер, Юрюзань, Большой Ик, Селеук (Чаус, 2018а)

Семейство Scaphidiodontidae

66. *Chilodontopsis depressus* (Perty, 1852) – оз. Кандры-Куль (Быкова и др., 2014)

Семейство Trochiliidae

67. *Trochilia minuta* (Roux, 1899) – оз. Кандры-Куль (Быкова и др., 2014)

Отряд Chlamydodontida

Семейство Chlamydodontidae

68. *Chlamydodon mnemosyne* Ehrenberg, 1837 – оз. Кандры-Куль (Быкова и др., 2014)

Семейство Chilodonellidae

69. *Odontochlamys alpestris* Foissner, 1981 – оз. Кандры-Куль (Быкова и др., 2014)
70. *Pseudochilodonopsis sp.* – оз. Кандры-Куль (Современное состояние…, 2018).
71. *Trithigmostoma cucullulus* (Müller, 1786) – оз. Кандры-Куль (Быкова и др., 2014)
72. *Trithigmostoma sp.* – оз. Кандры-Куль (Быкова и др., 2014)

Семейство Lynchellidae

73. *Chlamydonella* sp. (*alpestris* Foissner, 1979) – оз. Кандры-Куль (Быкова и др., 2014)

Отряд Dysteriida

Семейство Balanionidae

74. *Balanion planctoricum* (Foissner et al., 1994) – оз. Кандры-Куль (Быкова и др., 2014)

Семейство Hartmannulidae

75. *Dysteropsis minuta* (Roux, 1899) – оз. Кандры-Куль (Быкова и др., 2014)

Класс Gymnostomatea

Отряд Cyclotrichida

Семейство Mesodiniidae

76. *Askenasia acrostomia* Krainer et Foissner, 1990 – оз. Кандры-Куль (Быкова и др., 2014)
77. *Askenasia chlorelligera* Krainer et Foissner, 1990 – оз. Кандры-Куль (Быкова и др., 2014)

78. *Askenasia stellaris* (Leegaard, 1920) – оз. Кандры-Куль (Быкова и др., 2014)
79. *Askenasia volvox* (Eichwald, 1852) – оз. Кандры-Куль (Быкова и др., 2014)
80. *Mesodinium acarus* Stein, 1867– оз. Кандры-Куль (Быкова и др., 2014)
81. *Mesodinium pulex* (Claparède & Lachmann, 1859) – оз. Кандры-Куль (Современное состояние…, 2018).
82. *Rabdoaskenasia minima* Krainer & Foissner, 1990 – оз. Кандры-Куль (Современное состояние…, 2018).

Отряд Haptorida

Семейство Didiniidae

83. *Didinium chlorelligerum* Kahl, 1935 – оз. Кандры-Куль (Быкова и др., 2014)
84. *Didinium nasatum* (Müller, 1773) 570 – водоемы
85. *Monodinium chlorelligerum* Krainer, 1995 – оз. Кандры-Куль (Быкова и др., 2014)
86. *Monodinium perrieri* Delphy, 1925 – оз. Кандры-Куль (Современное состояние…, 2018).

Семейство Enchelyidae

87. *Acaryophrya sphaerica* (Gelei, 1934) – оз. Кандры-Куль (Быкова и др., 2014)
88. *Enchelys puppa* Muller, 1786 – оз. Кандры-Куль (Быкова и др., 2014)

Семейство Lagynophryidae

89. *Lagynophrya acuminata* Kahl, 1935 – оз. Кандры-Куль (Быкова и др., 2014)

Отряд Pleurostomatida

Семейство Amphileptidae

90. *Amphileptus pleurosigma* (Stokes, 1884) – оз. Кандры-Куль (Современное состояние…, 2018); оз. Аслы-Куль
91. *Amphileptus procerus* (Penard, 1922) – оз. Кандры-Куль (Быкова и др., 2014)
92. *Amphileptus sp.* – оз. Кандры-Куль (Быкова и др., 2014)
93. *Apoamphileptus claparedii* (Stein, 1867) – реки Белая, Большой Нугуш, Ашкадар, Зилаир, Инзер, Юрюзань, Большой Ик, Селеук (Чаус, 2018а)
94. *Opisthodon niemeccensis* Stein, 1859 – оз. Кандры-Куль (Быкова и др., 2014)

Семейство Litonotidae

95. *Litonotus alpestris* Foissner, 1978 – оз. Кандры-Куль (Быкова и др., 2014)
96. *Litonotus crystallinus* (Vuxanovici, 1960) – оз. Кандры-Куль (Быкова и др., 2014)
97. *Litonotus cygnus* (Muller, 1773) – оз. Кандры-Куль (Быкова и др., 2014)
98. *Litonotus fasciola* (Ehrenberg, 1838) – оз. Кандры-Куль (Современное состояние…, 2018).
99. *Litonotus lamella* (Muller, 1773) – аэротенки

Семейство Loxophyllidae

100. *Loxophyllum helus* (Stokes, 1884) – реки Белая, Большой Нугуш, Ашкадар, Зилаир, Инзер, Юрюзань, Большой Ик, Селеук (Чаус, 2018а)
101. *Loxophyllum meleagris* (Müller, 1773) – реки Белая, Большой Нугуш, Ашкадар, Зилаир, Инзер, Юрюзань, Большой Ик, Селеук (Чаус, 2018а)

Отряд Spathidiida

Семейство Actinobolinidae

102. *Actinobolina radians* Stein, 1867 – оз. Кандры-Куль (Быкова и др., 2014); реки Белая, Большой Нугуш, Ашкадар, Зилаир, Инзер, Юрюзань, Большой Ик, Селеук (Чаус, 2018а)
103. *Actinobolina smalli* Holt, Lynn & Corliss, 1973 – оз. Кандры-Куль (Быкова и др., 2014)
104. *Belonophrya pelagica* André, 1914 – оз. Кандры-Куль (Современное состояние…, 2018).

Семейство Apertospathulidae

105. *Rhinothrix porculus* (Penard, 1922) – Стерлитамак (Чаус, 2015)

Семейство Lacrymariidae

106. *Lacrymaria olor* (Muller, 1786) – оз. Кандры-Куль (Быкова и др., 2014)

Семейство Spathidiidae

107. *Spathidium viride* Penard, 1922 – оз. Кандры-Куль (Быкова и др., 2014)

Семейство Trachelophyllidae

108. *Chaenea minor* Kahl, 1926 – оз. Кандры-Куль (Быкова и др., 2014)
109. *Enchelyodon sp.* – оз. Кандры-Куль (Быкова и др., 2014)
110. *Phialina pupula* O.F.Müller, 1773 – оз. Кандры-Куль (Современное состояние…, 2018).

Класс Heterotrichea

Отряд Heterotrichida – Разноресничные

Семейство Balantidiidae – Балантидии

111. *Balantidium coli* (Malmsten, 1857) – Кишечная балантидия
112. *Balantidium elongatum* Stein, 1867 – в кишечнике лягушек
113. *Balantidium entozoon* (Ehrenberg, 1838) – в кишечнике жаб и лягушек

Семейство Nyctotheridae

114. *Nyctotheroides cordiformis* (Ehrenberg, 1838) – в теле у лягушек и жаб
115. *Nyctotheroides praenucleatum* (Kudo & Meglitsch, 1938) – в кишечнике таракана
116. *Nyctotherus hormeticae* (Carini, 1937) – в теле медведки

Семейство Spirostomidae

117. *Blepharisma undulans* Stein, 1867 – Стерлитамак (Чаус, 2015)
118. *Spirostomum ambiguum* (Müller, 1786)
119. *Spirostomum teres* Claparede & Lachmann, 1859– оз. Кандры-Куль (Быкова и др., 2014)

Семейство Stentoridae – Трубачи

120. *Stentor coeruleus* (Ehrenberg, 1830) – водоемы
121. *Stentor polymorphus* (Müller, 1773) – водоемы
122. *Stentor roeselii* Ehrenberg, 1835 – оз. Кандры-Куль (Быкова и др., 2014)

Класс Hypotrichea
Отряд Euplotida
Семейство Aspidiscidae
123. *Aspidisca cicada* (O.F.Muller, 1786) – оз. Кандры-Куль (Быкова и др., 2014)
124. *Aspidisca costata* Dujardin, 1842 – аэротенки
125. *Coccudina lynceus* (O.F.Muller, 1786) – оз. Кандры-Куль (Быкова и др., 2014)
Семейство Gastrocirrhidae
126. *Euplotopsis affinis* (Dujardin, 1841) – оз. Кандры-Куль (Быкова и др., 2014)
Отряд Oxytrichida
Семейство Oxytrichidae – Бегающие инфузории
127. *Gastrostyla steini* Engelmann, 1862 – Стерлитамак (Чаус, 2015)
128. *Oxytricha chlorelligera* Kahl, 1932 – оз. Кандры-Куль (Современное состояние…, 2018)
129. *Oxytricha setigera* Stokes, 1891 – оз. Кандры-Куль (Современное состояние…, 2018).
130. *Stylonychia mytilus* (Müller, 1773) – Стилонихия
131. *Stylonychia pustulata* (Muller, 1786) – аэротенки
132. *Tachysoma pellionella* (Stein, 1859) – оз. Кандры-Куль (Быкова и др., 2014)
Отряд Stichotrichida
Семейство Ampisiellidae
133. *Stenotricha sp.* – оз. Кандры-Куль (Быкова и др., 2014)
Семейство Spirofilidae
134. *Stichotricha auleata* Wrzesniowski, 1870 – оз. Кандры-Куль (Быкова и др., 2014)
135. *Stichotricha secunda* Perty, 1849 – оз. Кандры-Куль (Современное состояние…, 2018).
136. *Strongylidium crassum* Sterki, 1878 – оз. Кандры-Куль (Современное состояние…, 2018)
137. *Strongylidium lanceolatum* Kowal., 1882 – оз. Кандры-Куль (Современное состояние…, 2018).; оз. Аслы-Куль (Быкова, Андреева, 2020).
Класс Karyorelictea
Отряд Loxodida
Семейство Loxodidae
138. *Loxodes magnum* Stokes, 1887 – Стерлитамак (Чаус, 2015)
139. *Loxodes striatus* (Engelmann, 1862) – оз. Кандры-Куль (Быкова и др., 2014)
Класс Kinetofragminophora
Отряд Plagiopylida
Семейство Plagiopylidae

140. *Plagiopyla nasuta* Stein 1860 – оз. Кандры-Куль (Современное состояние…, 2018).

Отряд Suctorida

Семейство Acinetidae

141. *Acineta grandis* Kent, 1882
142. *Brachionus calyciflorus* Pallas, 1776 – Зилр (Чаус, 2023)
143. *Brachionus rubens* Ehrenberg, 1838 – реки Белая, Нугуш, Ашкадар, Селеук, Инзер, Юрюзань, Зилаир, Большой Ик (Чаус, 2017а)

Семейство Dendrosomatidae

144. *Staurophrya elegans* Zacharias, 1893
145. *Tokophrya infusionum* (Stein, 1859) – оз. Кандры-Куль (Быкова и др., 2014)
146. *Tokophrya mollis* (Butschli, 1889)
147. *Tokophrya quadripartita* (Claparede & Lachmann, 1859)

Семейство Heliophryidae

148. *Heliophrya rotunda* (Hentschel, 1916) – оз. Кандры-Куль (Быкова и др., 2014)

Семейство Podophryidae

149. *Podophrya carchesii* Claparede & Lachmann, 1858
150. *Podophrya fixa* (O. F. Muller, 1786) – аэротенки
151. *Podophrya maupasi* (Buetschli, 1889)
152. *Sphaerophrya magna* Maupas, 1881 – оз. Кандры-Куль (Быкова и др., 2014)
153. *Sphaerophrya stentoris* Maupas, 1881 – оз. Кандры-Куль (Быкова и др., 2014)

Семейство Trichophryidae

154. *Trichophrya piscium* Bütschli, 1889 – плотва, ерш, окунь оз.Банное 1976 (Дьяченко и др., 2006)

Семейство Urnulidae

155. *Metacineta cuspidata* (Kellicott, 1885) — оз. Кандры-Куль (Быкова и др., 2014)
156. *Metacineta longipes var septimfida* (Rieder, 1985) — оз. Кандры-Куль (Быкова и др., 2014)
157. *Metacineta micraster* (Penard, 1914) — оз. Кандры-Куль (Быкова и др., 2014)

Класс Litostomatea

Отряд Dileptida

Семейство Dileptidae

158. *Pseudomonilicaryon anser* (Müller, 1773) – реки Белая, Большой Нугуш, Ашкадар, Зилаир, Инзер, Юрюзань, Большой Ик, Селеук (Чаус, 2018а)
159. *Trachelius ovum* (Ehrenberg, 1831) – оз. Кандры-Куль (Быкова и др., 2014)

Отряд Entodiniomorphida – Желудочно–кишечные инфузории

Семейство Ophryoscolecidae – Инфузории преджелудков жвачных

160. *Anoplodinium denticulatum* Dogiel, 1927

161. *Entodinium longinucleatum* (Dogiel, 1925) – в желудке КРС
162. *Entodinium simplex* (Dogiel, 1925) – в желудке КРС
163. *Epidinium ecaudatum* Fiorentini, 1889 – Инфузория рубца коров

Отряд Oxytrichida

164. *Ophryoscolex caudatus* Eberlein, 1895

Класс Nassophorea

Отряд Nassulida

Семейство Microthoracidae

165. *Microthorax pusillus* Engelmann, 1862 – оз. Кандры-Куль (Быкова и др., 2014)

Семейство Nassulidae

166. *Nassula ornata* Ehrenberg, 1834 – реки Белая, Инзер, Большой Нугуш, Ашкадар, Зилаир, Юрюзань, Большой Ик, Селеук (Чаус, 2018а)

Семейство Pseudomicrothoracidae

167. *Pseudomicrothorax agilis* Mermod, 1914 – оз. Кандры-Куль (Быкова и др., 2014)

Класс Oligohymenophorea

Отряд Hymenostomatida

Семейство Cinetochilidae

168. *Cinetochilum margaritaceum* (Ehrenberg, 1831) – оз. Кандры-Куль (Быкова и др., 2014)
169. *Sathrophilus sp.* – оз. Кандры-Куль (Быкова и др., 2014)

Семейство Frontoniidae

170. *Disematostoma buetschlii* Lauteborn, 1894 – оз. Кандры-Куль (Современное состояние…, 2018).
171. *Frontonia acuminata* (Ehrenberg, 1834) – оз. Кандры-Куль (Современное состояние…, 2018); оз. Аслы-Куль (Быкова, Андреева, 2020).

Семейство Glaucomidae

172. *Glaucoma maupasi* Kahl, 1926 – оз. Кандры-Куль
173. *Glaucoma sp.* – оз. Кандры-Куль (Быкова и др., 2014)

Семейство Ichthyophthiriidae

174. *Ichthyophthirius multifiliis* Fouquet, 1876 – покровы тела рыб

Семейство Ophryoglenidae

175. *Ophryoglena sp.* – оз. Кандры-Куль (Быкова и др., 2014)

Семейство Tetrahymenidae

176. *Colpidium colpoda* (Losana, 1829)
177. *Lambornella stegomyiae* Keilin, 1921 – в теле обыкновенного комара

Семейство Urocentridae

178. *Urocentrum turbo* (Muller, 1786) – оз. Кандры-Куль (Быкова и др., 2014)

Семейство Uronematidae

179. *Uronema nigricans* (Muller, 1786) – аэротенки

Отряд Peniculida

Семейство Lembadionidae

180. *Lembadion lucens* (Maskell, 1887) – оз. Кандры-Куль (Быкова и др., 2014)

Семейство Parameciidae

181. *Paramecium aurelia* Ehrenberg, 1838 – водоемы
182. *Paramecium bursaria* Ehrenberg, 1831 – водоемы, аэротенки
183. *Paramecium caudatum* Ehrenberg, 1834 – Инфузория-туфелька
184. *Paramecium putrinum* Claparède & Lachmann, 1859) – в аэротенках

Отряд Peritrichida

Семейство Epistylididae

185. *Apiosoma companulata* (Timofeew, 1962) – ерш оз.Банное 1976 (Дьяченко и др., 2006)
186. *Apiosoma minimicronucleata* Banina, 1968 – ерш оз.Банное 1976 (Дьяченко и др., 2006)
187. *Apiosoma piscicola* Blanchard, 1885 – в теле карпа
188. *Epistylis plicatilis* Ehrenberg, 1831 – аэротенки
189. *Heteropolaria lwoffi* (Faure-Fremiet, 1943) – ерш, окунь оз.Банное 1976 (Дьяченко и др., 2006)

Семейство Operculariidae

190. *Opercularia coarctata* (Claparede & Lachmann, 1858) – аэротенки

Семейство Ophrydiidae

191. *Ophrydium versatile* Muller, 1786 – ЗШТ, р.Белая; восточная часть НП «Башкирия» (Бакалова, 2016)

Семейство Trichodinidae

192. *Trichodina domerguei* (Wallengren, 1897) – в теле линя
193. *Trichodina pediculus* Ehrenberg, 1831 – у карпа
194. *Trichodina percae* Kashkovsky & Lom, 1979 – окунь оз.Банное 1976, 2004 (Дьяченко и др., 2006)
195. *Trichodina rostrata* Kulemina, 1968 – плотва оз.Банное 1976 (Дьяченко и др., 2006)
196. *Trichodina urinaria* Dogiel, 1940 – окунь оз.Банное 1976 (Дьяченко и др., 2006)
197. *Trichodinella epizootica* (Raabe, 1950) – щука, ерш оз.Банное 1976 (Дьяченко и др., 2006)

Семейство Vaginicolidae

198. *Cothurnia annulata* Stokes, 1885 – оз. Кандры-Куль (Современное состояние…, 2018).
199. *Platycola decumbens* (Ehrenberg, 1830) – оз. Кандры-Куль (Быкова и др., 2014)
200. *Pyxicola carteri* Kent,1882 – оз. Кандры-Куль (Современное состояние…, 2018).
201. *Thuricola similis* (Bock, 1963) – в аэротенках
202. *Vaginicola crystallina* Ehrenberg, 1830 – оз. Кандры-Куль (Быкова и др., 2014)

Семейство Vorticellidae – Сувойки

203. *Carchesium polypinum* (Linnaeus, 1758) – аэротенки
204. *Epicarchesium pectinatum* (Zacharias 1897) – оз. Кандры-Куль (Современное состояние…, 2018); оз. Аслы-Куль (Быкова, Андреева, 2020)
205. *Haplocaulus sp.* – оз. Кандры-Куль (Быкова и др., 2014)
206. *Pelagovorticella mayeri* (Faure-Fremiet, 1923) – оз. Кандры-Куль (Быкова и др., 2014)
207. *Pelagovorticella natans* (Faure-Fremiet, 1924) – оз. Кандры-Куль (Быкова и др., 2014)
208. *Pseudohaplocaulus sp.* – оз. Кандры-Куль (Быкова и др., 2014)
209. *Pseudovorticella fasciculata* (Müller 1773) – оз. Кандры-Куль (Современное состояние…, 2018); оз. Аслы-Куль (Быкова, Андреева, 2020)
210. *Vorticella alba* Fromentel, 1876– аэротенки
211. *Vorticella campanula* Sramek-Husek, 1948 – аэротенки
212. *Vorticella chlorellata* Stiller, 1940 – оз. Кандры-Куль (Быкова и др., 2014)
213. *Vorticella convallaria* (Linnaeus, 1758) – аэротенки
214. *Vorticella nutans* Muller, 1773
215. *Vorticella microstoma* Ehrenberg, 1830 – Малоротая сувойка
216. *Vorticella striata* Dujardin, 1841 – в аэротенках

Семейство Zoothamniidae

217. *Zoothamnium arbuscula* (Ehrenberg, 1831)– аэротенки
218. *Zoothamnium carinogammari* Stiller, 1950 – в аэротенках

Отряд Pleuronematida

Семейство Pleuronematidae

219. *Pleuronema coronatum* Kent, 1881 – оз. Кандры-Куль (Быкова и др., 2014)

Отряд Scuticociliatida

Семейство Calyptotrichidae

220. *Calyptotricha pleuronemoides* Phillips, 1882 – оз. Кандры-Куль (Быкова и др., 2014)

Семейство Ctedectomatidae

221. *Ctedoctema acanthocryptum* Stokes, 1884 – оз. Кандры-Куль (Быкова и др., 2014)
222. *Cyclidium glaucoma* Muller, 1773 – оз. Кандры-Куль (Быкова и др., 2014)
223. *Protocyclidium citrullus* (Cohn, 1866) – оз. Кандры-Куль (Быкова и др., 2014)

Семейство Cyclidiidae

224. *Cristigera phoenix* Penard, 1922 – оз. Кандры-Куль (Быкова и др., 2014)

Семейство Histiobalantiidae

225. *Histiobalantium natans* Claparede & Lachmann, 1858 – оз. Кандры-Куль (Быкова и др., 2014)

Класс Oligotrichea

Отряд Choreotrichida

Семейство Strobilidiidae

226. *Rimostrombidium humile* (Penard, 1922) – оз. Кандры-Куль (Быкова и др., 2014)
227. *Rimostrombidium hyalinum* (Mirabdullaev, 1985) – оз. Кандры-Куль (Быкова и др., 2014)
228. *Rimostrombidium lacustris* (Foissner, Skogstad & Pratt, 1988) – оз. Кандры-Куль (Быкова и др., 2014)
229. *Strobilidium caudatum* (Fromentel, 1876) – оз. Кандры-Куль (Быкова и др., 2014)

Отряд Halteriida

Семейство Halteriidae

230. *Halteria grandinella* (Muller, 1773) – оз. Кандры-Куль (Быкова и др., 2014)
231. *Pelagohalteria viridis* (Fromentel, 1876) – оз. Кандры-Куль (Быкова и др., 2014)

Отряд Oligotrichida

Семейство Pelagostrombidiidae

232. *Pelagostrombidium fallax* (Zacharias, 1895) – оз. Кандры-Куль (Современное состояние…, 2018).
233. *Pelagostrombidium mirabile* (Penard, 1916) – оз. Кандры-Куль (Быкова и др., 2014)

Отряд Strombidiida

Семейство Strombidiidae

234. *Limnostrombidium viride* (Stein, 1867) – оз. Кандры-Куль (Быкова и др., 2014)
235. *Limnostrombidium pelagicum* (Kahl, 1932) – озеро Аслы-Куль (Быкова, Андреева, 2020).

Отряд Tintinnida

Семейство Codonellidae

236. *Codonella cratera* (Leidy, 1877) – оз. Кандры-Куль (Быкова и др., 2014)
237. *Tintinnopsis cylindrata* Kofoid &Campbell, 1929 – оз. Кандры-Куль (Быкова и др., 2014)

Семейство Tintinnidiidae

238. *Membranicola tamari* Foissner, Berger & Schaumburg, 1999 – оз. Кандры-Куль (Быкова и др., 2014)
239. *Tintinnidium fluviatile* (Stein, 1863) – оз. Кандры-Куль (Быкова и др., 2014)

Отряд Urostylida

Семейство Holostichidae

240. *Amphisia sp.* – оз. Кандры-Куль (Быкова и др., 2014)

Семейство Rigidothrichidae

241. *Uroleptus lamella* Ehrenberg, 1831 – Стерлитамак (Чаус, 2015)
242. *Uroleptus piscis* (Müller, 1773) – Стерлитамак (Чаус, 2015), оз. Кандры-Куль (Современное состояние…, 2018).

Семейство Urostylidae

243. *Paruroleptus sp.* – оз. Кандры-Куль (Быкова и др., 2014)

Класс Prostomatea

Отряд Prorodontida

Семейство Balanionidae

244. *Balanion planctonicum* (Foissner, Oleksiv & Müller, 1990) – оз. Кандры-Куль

Семейство Colepidae

245. *Coleps elongatus* Ehrenberg, 1833 – оз. Кандры-Куль (Быкова и др., 2014)
246. *Coleps hirtus* (Muller, 1786) – аэротенки
247. *Coleps viridis* Ehrenberg, 1838 – оз. Кандры-Куль (Быкова и др., 2014)

Семейство Lagynidae

248. *Lagynus elegans* (Engelmann, 1862) – реки Белая, Большой Нугуш, Ашкадар, Зилаир, Инзер, Юрюзань, Большой Ик, Селеук (Чаус, 2018а)

Семейство Prorodontidae

249. *Prorodon ovum* (Ehrenberg, 1931) – аэротенки
250. *Prorodon teres* (Ehrenberg, 1834) – реки Белая, Большой Нугуш, Ашкадар, Зилаир, Инзер, Юрюзань, Большой Ик, Селеук (Чаус, 2018а)

Отряд Prostomatida

Семейство Holophryidae

251. *Bursellopsis truncata* (Kahl, 1927) – реки Белая, Большой Нугуш, Ашкадар, Зилаир, Инзер, Юрюзань, Большой Ик, Селеук (Чаус, 2018а)
252. *Bursellopsis sp*. – оз. Кандры-Куль (Быкова и др., 2014)
253. *Crobylura pelagica* (Andre, 1914) – оз. Кандры-Куль, 2012 (Быкова и др., 2014)
254. *Holophrya ovum* Ehrenberg, 1831 – оз. Кандры-Куль (Быкова и др., 2014)
255. *Holophrya simplex* (Schewiakoff, 1833) – аэротенки

Семейство Metacystidae

256. *Metacystis* sp.– оз. Кандры-Куль (Быкова и др., 2014)

Семейство Urotrichidae

257. *Urotricha apsheronica* Alekperov, 1984 – оз. Кандры-Куль (Быкова и др., 2014)
258. *Urotricha furcata* Schewiakoff, 1892 – оз. Кандры-Куль (Быкова и др., 2014)
259. *Urotricha globosa* Schewiakoff, 1892 – оз. Кандры-Куль (Быкова и др., 2014)
260. *Urotricha sp.* – оз. Кандры-Куль (Быкова и др., 2014)

Тип Opalinata – Опалинаты

Класс Opalinatea

Отряд Opalinida – Опалиниды

Семейство Opalinidae

261. *Opalina elongata* Carini, 1937 – в кишечнике амфибий
262. *Opalina ranarum* Dujardin, 1841 – Лягушачья опалина

Группа Rhizaria

Тип Cercozoa
Класс Filosia
Отряд Aconchulinida
Семейство Euglyphidae
263. *Euglypha acanthophora* (Ehrenberg, 1841)

Тип Heliozoa – Солнечники
Отряд Actinophrida
Семейство Actinophryidae
264. *Actinophrys sol* (Muller, 1773) – в аэротенках
265. *Actinosphaerium eichhorni* (Ehrenberg, 1840) – водоемы
Отряд Centrohelida
Семейство Acanthocystidae
266. *Acanthocystis myriospina* (Penard, 1890)
267. *Acanthocystis olgahelistae* (Leonov, 2010)
268. *Acanthocystis pectinata* (Penard, 1889)
269. *Acanthocystis polymorpha* (Durrschmidt, 1985)
270. *Acanthocystis turfacea* (Carter, 1863)
Семейство Heterophryidae
271. *Raineriophrys erinaceoides* (Petersen & Hansen, 1960)
Семейство Raphidiophryidae
272. *Polyplacocystis ambigua* (Penard, 1904)
Отряд Desmothoracida
Семейство Clathrulinidae
273. *Clathrulina elegans* Cienkowski, 1867 – водоемы
274. *Hedriocystis reticulata* Penard, 1904

Тип Foraminifera
Отряд Allogromiida
Семейство Allogromiidae
275. *Lithocolla globosa* Schulze, 1874 – в аэротенках

Группа Amoebozoa

Тип Lobosa
Класс Gymnamoeba
Отряд Amoebida – Амебы
Семейство Amoebidae – Амебовые
276. *Amoeba albida* (Naegler, 1909) – водоемы, аэротенки
277. *Amoeba froschi* Naegler, 1909 – аэротенки

278. *Amoeba limax* (Penard, 1902) – водоемы, аэротенки
279. *Amoeba proteus* Leidy, 1878 – Обыкновенная амеба (водоемы, аэротенки)
280. *Amoeba radiosa* (Ehrenberg, 1932) – Амеба радиоза (аэротенки)
281. *Amoeba spinifera* (Naegler, 1909) – аэротенки
282. *Amoeba verrucosa* (Ehrenberg, 1838) – Амеба варрикоза (аэротенки)

Семейство Entamoebidae – Эндамебовые

283. *Endolimax nana* (Wenyon & O'Connor, 1917) – Карликовая амеба (в кишечнике человека)
284. *Entamoeba apis* (*Fantham & Porter*, 1911) – из пчелы
285. *Entamoeba blattae* (Butschi, 1878) – в задней кишке черного таракана
286. *Entamoeba coli* (Grassi, 1879) – Кишечная амеба (в кишечнике человека)
287. *Entamoeba gingvinalis* (Cross, 1849) – Ротовая амеба (в ротовой полости человека)
288. *Entamoeba histolytica* (Shaudinn, 1903) – Дизентерийная амеба (в кишечнике человека)
289. *Entamoeba ranarum* (Grassi, 1879) – в кишечном канале лягушек, жаб
290. *Iodamoeba buetschlii* (Prowazek, 1912) – в кишечнике человека

Семейство Hartmannellidae

291. *Cashia angelica* (Bovee, 1972) – аэротенки
292. *Hartmannella agricola* Goodey, 1916 – в почве

Семейство Paramoebidae

293. *Mastigamoeba invertens* Klebs, 1892
294. *Mastigamoeba limax* Moroff, 1904
295. *Mastigamoeba polymastix* Frenzel, 1897

Семейство Stenamoebidae

296. *Sappinia diploidea* (Hartmann et Naegler, 1908) – аэротенки Белорецка

Семейство Thecamoebidae

297. *Thecamoeba terricola* (Greeff, 1866) – аэротенки

Отряд Arcellinida – Раковинные амебы

Семейство Arcellidae

298. *Arcella dentata* (Ehrenberg, 1838) – водоемы, аэротенки
299. *Arcella discoides* (Ehrenberg, 1830) – аэротенки
300. *Arcella mitrata* (Leidy, 1879) – водоемы, аэротенки
301. *Arcella vulgaris* (Ehrenberg, 1832) – Обыкновенная арцелла (водоемы, аэротенки)

Семейство Centropyxidae

302. *Centropyxis aculeata* (Ehrenberg, 1832) – водоемы
303. *Centropyxis plagiostoma* (Bonnet & Thomas, 1955) – водоемы
304. *Centropyxis sylvatica* (Deflandre 1929) – водоемы

Семейство Difflugiidae

305. *Difflugia acuminata* (Ehrenberg, 1838) – водоемы
306. *Difflugia arceolata* (Ehrenberg, 1841) – водоемы

307. *Difflugia bursaria* (Ehrenberg) – водоемы
308. *Difflugia corona* (Wallich, 1864) – водоемы
309. *Difflugia globulosa* (Dujardin, 1837) – водоемы
310. *Difflugia pyriformes* (Perty, 1849)

Семейство Vahlkampfiidae

311. *Vahlkampfia limax* (Stěpǎnek, 1956) – аэротенки

Тип Cercozoa
Класс Sarcomonadea
Отряд Cercomonadida

Семейство Cercomonadidae

312. *Cercomonas radiatus* (Klebs, 1892)

Микроспоридий в настоящее время относят к грибам: *Nosema apis* Zander, 1909 – паразит пчел, *Nosema bombycis* Naegeli, 1857 – паразит шмелей, *Nosema ceranae* (Fries et al., 1996) – восточная часть НП «Башкирия», *Glugea luciopercae* (Dogiel & Bychowsky, 1939) – паразит рыб.

Группа Opisthoconta

Подцарство Metazoa – Многоклеточные
Тип Porifera – Губки
Класс Demospongiae – Обыкновенные губки
Отряд Spongillida

Семейство Spongillidae

313. *Ephydatia fluviatilis* (Linnaeus, 1759) – Речная губка
314. *Eunapius fragilis* (Leidy, 1851) – Ломкая губка
315. *Spongilla lacustris* (Linnaeus, 1758) – Озерная губка

Тип Cnidaria – Стрекающие
Подтип Myxozoa – Слизистые споровики
Класс Myxosporea
Отряд Bivalvulida

Семейство Chloromyxidae

316. *Chloromyxum truttae* Leger, 1906

Семейство Myxidiidae

317. *Myxidium lieberkuhni* Butschli, 1882 – в мочевом пузыре щуки
318. *Myxidium rhodei* Leger, 1905 – плотва оз. Банное 1976 (Дьяченко и др., 2006)

Семейство Myxobolidae

319. *Henneguya creplini* (Gurley, 1894) – ерш, окунь оз. Банное 1976, 2004 (Дьяченко и др., 2006)

320. *Henneguya psorospermica* Thelohan, 1895 – у щуки
321. *Myxobolus carassi* (Klokaceva, 1914) – паразит карасей
322. *Myxobolus cerebralis* (Hofer, 1903)
323. *Myxobolus dispar* Thelohan, 1895 – у ельца, пескаря, уклеи, гольца, хариуса
324. *Myxobolus dujardini* (Thelohan, 1899) – у ельца
325. *Myxobolus ellipsoides* Thelohan, 1892 – найден у линя
326. *Myxobolus mulleri* Butschli, 1882 – плотва оз. Банное 1976 (Дьяченко и др., 2006)
327. *Myxobolus obesus* Gurley, 1893 – плотва оз. Банное 1976 (Дьяченко и др., 2006)
328. *Myxobolus pseudodispar* Gorbunova, 1936 – плотва оз. Банное 1976 (Дьяченко и др., 2006)
329. *Myxobolus ranae* Guyenot & Naville, 1922
330. *Myxobolus talievi* Dogiel, 1957
331. *Thelohanellus pyriformes* (Thelohan, 1892) – у линя

Подтип Medusozoa

Класс Hydrozoa

Отряд Anthoathecata

Семейство Hydridae

332. *Hydra oligactis* Pallas, 1766 – Длинностебельчатая гидра
333. *Hydra viridissima* Pallas, 1766 – Зеленая гидра
334. *Hydra vulgaris* Pallas, 1766 – Обыкновенная гидра

Отряд Limnomedusae

Семейство Olindiidae

335. *Craspedacusta sp.* – пресноводная медуза – Ишмб

Lophophorata – Щупальцевые

Тип Bryozoa – Мшанки

Класс Phylactolaemata

Отряд Plumatellida

Семейство Plumatellidae

336. *Plumatella fungosa* (Pallas, 1768) – Клубчатая мшанка
337. *Plumatella repens* (Linnaeus, 1758) – Ползучая мшанка

Trochozoa – Трохофорные животные

Тип Platyhelminthes – Плоские черви

Подтип Archidermata

Класс Turbellaria – Ресничные черви

Отряд Tricladida

Семейство Dendrocoelidae

338. *Dendrocoelum lacteum* (Muller, 1774) – Молочная планария

Семейство Planariidae

339. *Planaria torva* (O.F. Muller, 1774)
340. *Polycelis nigra* (O.F. Muller, 1774) – Черная многоглазка

Подтип Neodermata

Класс Monogenea – Моногенеи

Подкласс Monopisthocotylea

Отряд Dactylogyridea

Семейство Dactylogyridae

341. *Dactylogyrus amphibothrium* Wagener, 1857 – ерш
342. *Dactylogyrus anchoratus* (Dujardin, 1845) – карп
343. *Dactylogyrus chondrostomi* Malevitskaja, 1941 – подуст
344. *Dactylogyrus cordus* Nybelin, 1936 – елец
345. *Dactylogyrus crucifer* Wagener, 1857 – плотва
346. *Dactylogyrus ctenopharyngodonis* Akhmerov, 1952 – белый амур
347. *Dactylogyrus difformis* Wagener, 1857 – красноперка
348. *Dactylogyrus extensus* Mueller & Van Cleave, 1932 – карп
349. *Dactylogyrus hypophthalmichthys* Akhmerov, 1952 – у рыб прудовых хозяйств (Список видов…, 1990)
350. *Dactylogyrus intermedius* Wegener, 1910 – карась
351. *Dactylogyrus lamellatus* Akhmerov, 1952 – белый амур
352. *Dactylogyrus macracanthus* Wegener, 1910 – линь
353. *Dactylogyrus nanus* Dogiel & Bychowsky, 1934 – плотва, голавль
354. *Dactylogyrus similis* Wagener, 1909 – плотва
355. *Dactylogyrus sphyrna* Linstow, 1878 – голавль, лещ, плотва
356. *Dactylogyrus tuba* Linstow, 1878 – язь, жерех
357. *Dactylogyrus vastator* Nybelin, 1924 – карп, карась
358. *Dactylogyrus wegeneri* Kulwiec, 1927 – карась
359. *Pseudacolpenteron pavlovskii* Bychowsky & Gusev, 1955 – у рыб прудовых хозяйств (Список видов…, 1990)

Семейство Tetraonchidae

360. *Tetraonchus borealis* (Olsson, 1893) – хариус (жабры)
361. *Tetraonchus monenteron* (Wagener, 1857) – щука (жабры)

Отряд Gyrodactylidea

Семейство Gyrodactylidae

362. *Gyrodactylus cernuae* Malmberg, 1957 – ерш оз. Банное 1976 (Дьяченко и др., 2006)
363. *Gyrodactylus cyprinid* Diarova, 1964 – у рыб прудовых хозяйств (Список видов…, 1990)
364. *Gyrodactylus elegans* von Nordmann, 1832 – линь, карп
365. *Gyrodactylus gobii* Schulman, 1953 – пескарь

366. *Gyrodactylus lucii* Kulakowskaja, 1952 – щука
367. *Gyrodactylus medius* Kathariner, 1895 – золотой карась
368. *Gyrodactylus parvus* Bychowsky, 1936 – пять видов карповых рыб
369. *Gyrodactylus vimbi* Shulman, 1954 – плотва оз. Банное 1976 (Дьяченко и др., 2006)

Подкласс Polyopisthocotylea
Отряд Diclybothriidea

Семейство Diclybothriidae

370. *Diclybothrium armatum* Leuckart, 1835 – стерлядь

Отряд Mazocraeidea

Семейство Diplozoidae

371. *Diplozoon paradoxum* von Nordmann, 1832 – лещ, густера
372. *Diplozoon sp.* – подуст
373. *Eudiplozoon nipponicum* (Goto, 1891) – карп, карась
374. *Paradiplozoon bliccae* (Reichenbach-Klinke, 1961) – густера
375. *Paradiplozoon homoion gracilis* (Reichenbach-Klinke, 1961) – пескарь, елец, гольян
376. *Paradiplozoon homoion homoion* (Bychowsky & Nagibina, 1959) – плотва, красноперка
377. *Paradiplozoon megan* (Bychowsky & Nagibina, 1959) – язь
378. *Paradiplozoon pavlovskii* (Bychowsky & Nagibina, 1959) – жерех

Отряд Polystomatidea

Семейство Polystomatidae

379. *Polystoma integerrimum* (Frölich, 1791) – травяная лягушка

Класс Trematoda – Трематоды (Сосальщики)
Подкласс Digenea
Отряд Plagiorchiida

Семейство Allocreadiidae

380. *Acrolichanus auriculatus* (Wedl, 1858) – стерлядь
381. *Allocreadium isoporum* (Looss, 1894) – елец, голавль, плотва, красноперка, карась, лещ, уклейка, пескарь
382. *Bunodera luciopercae* (Müller, 1776) – окунь, щука, судак, сиг-лудога, ерш, налим
383. *Crepidostomum farionis* (Muller, 1780) – хариус

Семейство Azygiidae

384. *Azygia lucii* (Müller, 1776) – щука
385. *Azygia robusta* Odhner, 1911 – щука

Семейство Bucephalidae

386. *Bucephalus polymorphus* von Baer, 1827 – щука, плотва, елец
387. *Rhipidocotyle campanula* (Dujardin, 1845) – щука (ad.), плотва. (larv.)

Семейство Cladorchiidae

388. *Amurotrema dombrowskajae* Achmerov, 1959 – белый амур

Семейство Cyclocoelidae

(большинство – приносные с мест зимовок)

389. *Cyclocoelum mutabile* (Zeder, 1800) – бекас, кряква, свистунок, лысуха
390. *Haematotrephus kossacki* (Witenberg, 1923) – большой веретенник, чибис
391. *Haematotrephus lanceolatum* (Wedl, 1858) – большой веретенник
392. *Harrahium tringae* (Brandes, 1892) – турухтан
393. *Uvitellina vanelli* (Rudolphi, 1819) – большой веретенник, чибис, травник, турухтан

Семейство Derogenidae

394. *Halipegus ovocaudatus* (Vulpian, 1858) – озерная лягушка

Семейство Dicrocoeliidae

395. *Brachydistomum ventricosum* (Rudolphi, 1802) – сизый голубь
396. *Dicrocoelium dendriticum* (Rudolphi, 1819) – лошадь, корова, овца, коза, свинья, лось, медведь, оба вида зайцев, лисица, собака, рыжеватый суслик, степной сурок, мыши, крыса

Семейство Diplodiscidae

397. *Diplodiscus subclavatus* (Goeze, 1782) – озерная, остромордая и прудовая лягушки

Семейство Echinochasmidae

398. *Echinochasmus amphibolus* Kotlan, 1922 – черношейная поганка
399. *Echinochasmus coaxatus* Dietz, 1909 – все виды поганок
400. *Echinochasmus dietzevi* Issaitschikov, 1927– малая чайка
401. *Echinochasmus mergi* (Cannon, 1939) – большая поганка
402. *Echinochasmus shigini* Bykhovskaja-Pavlovskaja, 1962 – большая поганка (приносной)
403. *Echinochasmus spinulosus* (Rudolphi, 1809) – большая поганка
404. *Stephanoprora pseudoechinata* (Olsson, 1876) – поганки, чайки и крачки

Семейство Echinostomatidae

405. *Echinoparyphium aconiatum* Dietz, 1909 – трескунок, красноголовый нырок, хохлатая чернеть, met. у стрекоз *Coenagrion pulchellum*
406. *Echinoparyphium cinctum* (Rudolphi, 1803) – дом. гусь, красношейная поганка
407. *Echinoparyphium clerci* Skrjabin, 1915 – чибис, веретенник, черная крачка, хохлатая чернеть
408. *Echinoparyphium paracinctum* Bykhovskaja-Pavlovskaja, 1953 – большой веретенник (приносной)
409. *Echinoparyphium recurvatum* (von Linstow, 1873) – курица, дом. и все дикие утки, лысуха, кулики, обыкн. чайка, дом. гусь; чесночница (met.) (Баянов, Петрова, 2000).
410. *Echinoparyphium schulzi* Mathevossian, 1938 – сизый голубь
411. *Echinostoma amurensis* (Petrochenko & Khrustaleva, 1963) – дом. гусь

412. *Echinostoma dietzi* Skrjabin, 1923 – дом. и серый гуси, лысуха
413. *Echinostoma miyagawai* Ishii, 1932 – курица
414. *Echinostoma nordiana* (Baschirova, 1941) – красноголовый нырок, широконоска, кряква, трескунок, гоголь, обыкн. чайка
415. *Echinostoma paraulum* Dietz, 1909 – дом. утка и гусь, шилохвость, чирок-трескунок, красноголовый нырок
416. *Echinostoma revolutum* (Fröhlich, 1802) – серый гусь, дом. гусь и утка, кряква, чирки, шилохвость, широконоска, красноголовый нырок, поганки черношейная и красношейная, курица (всего на Южном Урале 22 вида хозяев); чесночница (met.) (Баянов, Петрова, 2000).
417. *Echinostoma robustum* Yamaguti, 1935 – дом. утка и кряква
418. *Hypoderaeum conoideum* (Bloch, 1782) – дом. и дикие утки и гуси (16 видов)
419. *Hypoderaeum vigi* Baschkirova, 1941 – красноголовый нырок
420. *Longicollia echinata* Bykhovskaja-Pavlovskaja, 1953 – бекас
421. *Neopetasiger megacanthus* (Kotlan, 1922) – все четыре вида поганок (приносной вид)
422. *Neopetasiger neocomense* (Fuhrmann, 1927) – четыре вида поганок (приносной вид)
423. *Neopetasiger nitidus* (Linton, 1928) – большая и красношейная поганки (приносной вид)
424. *Petasiger skrjabini* Baschkirova, 1941 – красношейная поганка (приносной вид)

Семейство Encyclometridae

425. *Encyclometra colubrimurorum* (Rudolphi, 1819) – обыкн. уж, массово

Семейство Eucotylidae

(все виды приносные)

426. *Eucotyle cohni* Skrjabin, 1924 – красношейная, серощекая, черношейная поганки
427. *Eucotyle nephritica* (Creplin, 1846) – красношейная поганка
428. *Neoeucotyle zakharowi* (Skrjabin, 1920) – чирок-свистунок, хохлатая чернеть, красноголовый нырок
429. *Tanaisia fedtschenkoi* Skrjabin, 1924 – большой веретенник, чибис, малая, сизая и обыкн. чайки, речная и черная крачки

Семейство Fasciolidae

430. *Fasciola hepatica* Linnaeus, 1758 – овца, коза, корова, свинья, мыши, крыса
431. *Parafasciolopsis fasciolaemorpha* Ejsmont, 1932 – лось

Семейство Gorgoderidae

432. *Gorgodera cygnoides* (Zeder, 1800) – озерная, прудовая, остромордая лягушки, жерлянка
433. *Gorgodera loossi* Sinitzin, 1905 – озерная и прудовая лягушки
434. *Gorgoderina vitelliloba* (OLsson, 1876) – остромордая лягушка и жерлянка Учлн, Уфмс

435. *Phyllodistomum angulatum* Linstow, 1907 – ерш
436. *Phyllodistomum dogieli* Pigulewsky, 1953 – плотва, линь, пескарь, голавль
437. *Phyllodistomum elongatum* Nybelin, 1926 – карась, густера, лещ
438. *Phyllodistomum folium* (Olfers, 1816) – судак, хариус, золотой карась, елец
439. *Phyllodistomum pseudofolium* Nybelin, 1926 – пескарь, елец
440. *Phyllodistomatinae gen. sp.* – жерлянка, остромордая лягушка

Семейство Haematoloechidae

441. *Haematoloechus similis* (Looss, 1899) – озерная (Байм 2008-2012) (Зарипова, Файзулин, 2017) и прудовая лягушки; met. у личинок стрекоз *Cordulea aenea*
442. *Haematoloechus variegatus* (Rudolphi, 1819) – озерная (Байм 2008-2012) (Зарипова, Файзулин, 2017), прудовая и остромордая (Мелз 2016) лягушки, жерлянка
443. *Haematoloechus volgensis* (Sudarikov, 1950) – озерная и остромордая лягушки

Семейство Himasthlidae

444. *Aporchis massiliensis* Timon-David, 1955 – речная крачка (заносный вид)

Семейство Lecithodendriidae

445. *Brandesia turgida* (Brandes, 1888) – озерная и остромордая лягушки

Семейство Leptophallidae

446. *Leptophallus nigrovenosus* (Bellingham, 1844) – обыкн. уж
447. *Paralepoderma cloacicola* (Lühe, 1909) – обыкн. гадюка

Семейство Lissorchiidae

448. *Asymphylodora demeli* Markowski, 1935 – язь
449. *Asymphylodora kubanica* Issaitschikov, 1923 – у рыб прудовых хозяйств (Список видов…, 1990)
450. *Asymphylodora tincae* (Modeer, 1790) – линь, пескарь, елец, голавль, плотва, линь
451. *Parasymphylodora markewitschi* (Kulakowskaja, 1947) – у рыб прудовых хозяйств (Список видов…, 1990)

Семейство Notocotylidae

452. *Catatropis verrucosa* (Frölich, 1789) – дом. утка и гусь, кряква, серая утка, шилохвость
453. *Notocotylus attenuatus* (Rudolphi, 1809) – дом. и все виды диких уток, серый гусь, чибис
454. *Notocotylus imbricatus* (Looss, 1893) – серый гусь (приносной вид)
455. *Notocotylus linearis* (Rudolphi, 1819) – чибис (приносной вид)
456. *Notocotylus pacifer* (Noble, 1933) – лысуха (приносной вид)
457. *Notocotylus sp.* – водяная крыса (полевка)

Семейство Opecoelidae

458. *Sphaerostoma bramae* (Müller, 1776) – голавль, жерех, язь, лещ, плотва, густера, чехонь, красноперка, карась

Семейство Opisthorchiidae

459. *Apophallus muehlingi* (Jögerskiöld, 1899) – серебристая чайка

460. *Astiotrema monticelli* Stossich, 1904 – обыкн. уж
461. *Holometra exigua* (Mühling, 1898) – болотный лунь
462. *Metorchis xanthostomus* (Creplin, 1846) – красноголовый нырок, хохлатая чернеть, болотный лунь; верховка (met.)
463. *Opisthorchis dendriticus* Morgan, 1927 – болотный лунь
464. *Opisthorchis felineus* (Rivolta, 1884) – линь (met.), собака, кошка
465. *Opisthorchis geminus* (Looss, 1896) – болотный лунь
466. *Opisthorchis longissimus* (von Linstow, 1883) – дом. утка

Семейство Orchipedidae

467. *Orchipedum tracheicola* Braun, 1901 – шилохвость, свиязь, чирок-трескунок, гоголь, малая и обыкн. чайки, красношейная поганка

Семейство Paramphistomidae

468. *Paramphistomum cervi* (Zeder, 1790) – корова, овца, коза, лось

Семейство Philophthalmidae

469. *Parorchis gedoelsti* (Skrjabin, 1924) – мородунка

Семейство Plagiorchiidae

470. *Haplometra cylindracea* (Zeder, 1800) – озерная и остромордая лягушки
471. *Plagiorchis elegans* (Rudolphi, 1802) – чибис, веретенник, перевозчик, мородунка, турухтан, белохвостый песочник, чайки и крачки, лысуха, нырки, поганки, прыткая ящерица; met. у трех видов личинок стрекоз, ручейников, жуков и двукрылых
472. *Plagiorchis maculosus* (Rudolphi, 1802) – воробьинообразные птицы
473. *Plagiorchis nanus* (Rudolphi, 1802) – кулики, воробьинообразные
474. *Plagiorchidae gen. sp.* – обыкн. тритон

Семейство Pleurogenidae

475. *Pleurogenes claviger* (Rudolphi, 1819) – озерная и остромордая лягушки, у *Gammarus lacustris, Phryganea bipunctata* (met.)
476. *Pleurogenes intermedius* Issaitschikov, 1926 – остромордая, озерная лягушки, зеленая жаба; у *Gammarus lacustris, Erythromma najas* (met.)
477. *Pleurogenes medians* (Olsson, 1876) – озерная, прудовая, остромордая лягушки, жерлянка, чесночница
478. *Prosotocus confusus* (Looss, 1896) – озерная, остромордая лягушки, зеленая жаба, чесночница; met.: у стрекоз семейства коромысел

Семейство Prosthogonimidae

479. *Prosthogonimus ovatus* (Rudolphi, 1803) – кряква, красноголовый нырок, хохлатая чернеть, шилохвость, оба вида чирков, большой веретенник, травник, малая, сизая и обыкн. чайки, речная крачка, черношейная поганка, лысуха, кобчик, серая ворона, сорока, курица, глухарь; стрекозы *Anax imperator* (larv.)
480. *Prosthogonimus pellucidus* (von Linstow, 1873) – дом. утка и гусь, шилохвость, кряква, красноголовый нырок, хохлатая чернеть, широконоска, гоголь,

обыкн. сизая и малая чайки, лысуха, степной лунь, серая ворона; стрекозы *Cordulia aenea, Libellula quadrimaculata* (larv.)

481. *Prosthogonimus rarus* Braun, 1901 – кряква, чирки, широконоска, шилохвость, красноголовый нырок, дом. утка, серая утка, черношейная поганка, хохлатая чернеть; стрекоза *Coenagrion pulchellum* (larv.)
482. *Prosthogonimus skrjabini* Zakharov, 1920 – дом. утка

Семейство Psilostomidae

483. *Psilochasmus oxyurus* (Creplin, 1825) – чирки свистунок и трескунок, хохлатая чернеть, красноголовый нырок, шилохвость, дом. утка, кряква.
484. *Psilotrema oligoon* (von Linstow, 1887) – красноголовый нырок, хохлатая чернеть
485. *Psilotrema simillimum* (Mühling, 1898) – дом. гусь
486. *Psilotrema spiculigerum* (Muhling, 1898) – ондатра
487. *Sphaeridiotrema globulus* (Rudolphi, 1819) – свистунок, красноголовый нырок, хохлатая чернеть, гоголь, серощекая поганка

Семейство Renicolidae

488. *Renicola keimahuri* Yamaguti, 1939 – черношейная поганка, малая чайка
489. *Renicola lari* (Timon-David, 1933) – обыкн. чайка, речная крачка, веретенник
490. *Renicola mediovitellata* Bychovskaja-Pavlovskaja, 1950 – красноголовый нырок, хохлатая чернеть
491. *Renicola undecima* Sudarikov, 1947 – речная крачка

Семейство Telorchiidae

492. *Opisthioglyphe ranae* (Frohlich, 1791) – озерная, прудовая и остромордая лягушки, зеленая жаба, жерлянка, чесночница
493. *Opisthioglyphe rastellus* (Olsson, 1876) – остромордая лягушка – Мелз, чесночница
494. *Telorchis assula* (Dujardin, 1845) – обыкн. уж – обычен

Семейство Typhlocoelidae

495. *Neivaia cymbium* (Diesing, 1850) – дом. утка, кряква, чирки – трескунок и свистунок, шилохвость
496. *Tracheophilus sisowi* Skrjabin, 1913 – дом. утка, кряква, чирки – трескунок и свистунок, шилохвость
497. *Typhlocoelum cucumerinum* (Rudolphi, 1809) – дом. утка, чирок-трескунок

Отряд Diplostomida

Семейство Aporocotylidae

498. *Sanguinicola armatus* Plehn, 1905 – линь
499. *Sanguinicola volgensis* (Rasin, 1929) – щука оз. Банное 1976 (Дьяченко и др., 2006)

Семейство Cyathocotylidae

500. *Cyathocotyle opaca* (Wisniewski, 1934) – кряква, трескунок, красноголовый нырок, хохлатая чернеть; met.: *B.tentaculata*, *Erpobdella octoculata*, *E.testacea*, *H.sanguisuga*

501. *Cyathocotyle teganuma* Ishii, 1935 – черношейная (экспер.) и большая поганки; met.: серебряный карась
502. *Paracoenogonimus ovatus* Katsurada, 1914 – лещ

Семейство Diplostomidae

503. *Alaria alata* (Goeze, 1782) – лисица, собака; met.: остромордая лягушка, обыкн. уж
504. *Codonocephalus urniger* (Rudolphi, 1819) – озерная лягушка (met.)
505. *Diplostomum baeri* Dubois, 1937 – обыкн. чайка; met: окунь, налим, ерш
506. *Diplostomum commutatum* (Diesing, 1850) – малая, обыкн. и сизая чайки, речная и черноголовая крачки; met.: лещ, уклея, язь, плотва, окунь, ерш
507. *Diplostomum flexicaudum* (Cort & Brooks, 1929) – обыкн. и серебристая чайки
508. *Diplostomum gavium* (Guberlet, 1922) – большая и серощекая поганки; met.: окунь, ерш, щука
509. *Diplostomum helveticum* (Dubois, 1929) – малая, серебристая и обыкн. чайки, речная крачка; (met): голавль, язь, плотва, карась, красноперка, сиг-лудога, пелядь, рипус, щука, налим и др.
510. *Diplostomum paracaudum* (Iles, 1959) – обыкн. и серебристая чайки
511. *Diplostomum paraspathaceum* Shigin, 1965 – сиг оз.Банное 1976 (Дьяченко и др., 2006)
512. *Diplostomum phoxini* (Faust, 1919) – гольян (met.)
513. *Diplostomum spathaceum* (Rudolphi, 1819) – чайки малая, серебристая и обыкн., речная и черная крачки; met: сиг, лещ, густера, жерех, линь, пескарь, елец, голавль, гольян, плотва, голец, окунь, ерш и др.
514. *Hysteromorpha triloba* (Rudolphi, 1819) – met: линь
515. *Neodiplostomum canaliculatum* (Nicoll, 1914) – болотный лунь
516. *Neodiplostomum spathoides* Dubois, 1937 – болотный и луговой луни
517. *Posthodiplostomum brevicaudatum* (Nordmann, 1832) – голавль, елец, окунь
518. *Posthodiplostomum cuticola* (Nordmann, 1832) – серая цапля
519. *Tylodelphys clavata* (von Nordmann, 1832) – все четыре вида поганок; met.: щука, голавль, окунь, линь, плотва, густера, лещ, пескарь, карась, язь, пелядь, ерш
520. *Tylodelphys excavata* (Rudolphi, 1803) – озерная лягушка (met.) – спинно-мозговой канал

Семейство Leucochloridiidae

521. *Leucochloridium actitis* McIntosh, 1932 – веретенник, турухтан
522. *Leucochloridium holostomum* (Rudolphi, 1819) – коростель

Семейство Panopistidae

523. *Pseudoleucochloridium soricis* (Soltys, 1952)

Семейство Schistosomatidae

524. *Bilharziella polonica* (Kowalewski, 1895) – большая, красношейная, черношейная, серощекая поганки, чирки свистунок и трескунок, красноголовый нырок, хохлатая чернеть, обыкн. и серебристая чайки, черная крачка

525. *Dendritobilharzia pulverulenta* (Braun, 1901) – чирок-трескунок, красноголовый нырок, лысуха
526. *Gigantobilharzia acotylea* Odhner, 1910 – малая и обыкн. чайки, речная крачка, большая поганка
527. *Ornithobilharzia canaliculata* (Rudolphi, 1819) – обыкн. и серебристая чайки, речная крачка
528. *Trichobilharzia ocellata* (La Valette St.George, 1855) – большая и черношейная поганки, чирок-трескунок, обыкн. чайка; met.: *L.stagnalis*

Семейство Strigeidae

529. *Apatemon gracilis* (Rudolphi, 1819) – дом. утка и гусь, речные и нырковые утки, морянка, луток, гоголь; met: *Lymnaea stagnalis*, *L.palustris*, *L.ovata*, *Erpobdella octoculata*, *E.testacea*, *H.sanguisuga, G.complanata*, *H.stagnalis*
530. *Apharyngostrigea cornu* (Zeder, 1800) – серая цапля
531. *Cotylurus brevis* Dubois & Rausch, 1950 – *Lymnaea stagnalis*, *L.ovata*, *L.palustris*, *L.peregra*, *P.corneus*, *Ph.fontinalis*, *B tentaculata* (cerc.; met.)
532. *Cotylurus cornutus* (Rudolphi, 1808) – дом., речные и нырковые утки; met.: *Lymnaea ovata*, *Erpobdella octoculata*, *E.testacea*, *H.sanguisuga*, *G.complanata*
533. *Cotylurus strigeoides* Dubois, 1958 – красноголовый нырок
534. *Ichthyocotylurus pileatus* (Rudolphi, 1802) – пять видов чаек и крачек; met.: лещ, пескарь, окунь, ерш, судак, густера, сиг, уклейка
535. *Ichthyocotylurus platycephalus* (Creplin, 1825) – малая и обыкн. чайки; met.: окунь, ерш
536. *Ophiosoma patagiatum* (Creplin, 1846) – большая выпь (приносной)
537. *Parastrigea flexilis* (Dubois, 1934) – болотный лунь
538. *Parastrigea sp.* – шилоклювка (приносной)
539. *Pseudapatemon elassocotylus* (Dubois, 1934) – большой веретенник
540. *Strigea falconis* Szidat, 1928 – чайки, крачки, поганки, утки, лысуха – всего 8 видов; met – у прудовой лягушки
541. *Strigea sphaerula* (Rudolphi, 1803) – серая ворона; met.: обыкн. уж, озерная лягушка, жерлянка
542. *Strigea strigis* (Schrank, 1788) – озерная лягушка (met.)

Класс Cestoda – Цестоды

Отряд Amphilinidea

Семейство Amphilinidae

543. *Amphilina foliacea* (Rudolphi, 1819) – стерлядь

Отряд Bothriocephalidea

Семейство Triaenophoridae

544. *Triaenophorus crassus* Forel, 1868 – щука
545. *Triaenophorus nodulosus* (Pallas, 1781) – хариус, щука, окунь

Отряд Caryophyllidea

Семейство Caryophyllaeidae

546. *Caryophyllaeus fimbriceps* Annenkova-Chlopina, 1919 – карп
547. *Caryophyllaeus laticeps* (Pallas, 1781) – лещ, карась золотой, карп

Семейство Lytocestidae

548. *Caryophyllaeides fennica* (Schneider, 1902) – голавль, елец, лещ, густера, плотва, язь, пескарь, красноперка, речной гольян
549. *Khawia sinensis* Hsu, 1935 – карп

Отряд Cyclophyllidea – Цепни

Семейство Amabiliidae

550. *Joyeuxilepis decacantha* (Fuhrmann, 1913) – четыре вида поганок; стрекозы *A. imperator* (larv.)
551. *Tatria biremis* Kowalewski, 1905 – четыре вида поганок

Семейство Anoplocephalidae

552. *Anoplocephala magna* (Abildgaard, 1789) – лошадь
553. *Anoplocephala perfoliata* (Goeze, 1782) – лошадь
554. *Anoplocephaloides mamillana* (Mehlis, 1831) – лошадь
555. *Mosgovoyia pectinata* (Goeze, 1782) – заяц
556. *Moniezia benedeni* (Moniez, 1879) – корова, овца
557. *Moniezia expansa* (Rudolphi, 1805) – овца, корова
558. *Thysaniezia giardi* (Moniez, 1879) – корова, овца

Семейство Capingentidae

559. *Biacetabulum appendiculatum* (Szidat, 1972) – у рыб прудовых хозяйств (Список видов…, 1990)

Семейство Davaineidae

560. *Davainea andrei* Fuhrmann, 1933 – серая куропатка
561. *Davainea proglottina* (Davaine, 1860) – курица, тетерев
562. *Ophryocotyle proteus* Friis, 1870 – белохвостый песочник
563. *Paroniella urogalli* (Modeer, 1790) – глухарь
564. *Raillietina echinobothrida* (Megnin, 1881) – курица
565. *Raillietina frontina* (Dujardin, 1845) – большой дятел
566. *Raillietina tetragona* (Molin, 1858) – курица, цесарка, глухарь
567. *Raillietina sp.* – сизый голубь, обыкн. канюк
568. *Skrjabinia cesticillus* (Molin, 1858) – курица, глухарь
569. *Skrjabinia circumvallata* (Krabbe, 1869) – серая куропатка, тетерев
570. *Skrjabinia globocaudata* (Cohn, 1901) – серая куропатка

Семейство Dilepididae

571. *Anomotaenia citrus* (Krabbe, 1869) – кулики
572. *Anomotaenia clavigera* (Krabbe, 1869) – песочник, веретенник, бекас (приносной вид)
573. *Anomotaenia microrhyncha* (Krabbe, 1869) – кулики
574. *Anomotaenia stentorea* (Frölich, 1802) – чибис, веретенник
575. *Anomotaenia sp.* – чибис, веретенник, кругл. плавунчик
576. *Choanotaenia crassiscolex* (von Linstow, 1890) – обыкн. бурозубка

577. *Choanotaenia fortunata* (Meggitt, 1927) – обыкн. пустельга
578. *Choanotaenia infundibulum* (Bloch, 1779) – курица
579. *Dictymetra nymphaea* (Schrank, 1790) – веретенник
580. *Dilepidoidea gen. sp.* – larv.: у личинок стрекоз *Enallagma cyathigerum*
581. *Dilepis undula* (Schrank, 1788) – серая ворона, дрозд
582. *Dilepis sp.* – кряква, озерная чайка
583. *Himantaurus minuta* (Cohn, 1901) – травник
584. *Kowalewskiella cingulifera* (Krabbe, 1869) – 8 видов куликов
585. *Lateriporus clerci* (Johnston, 1912) – 6 видов чаек и крачек, три вида куликов; бокоплав
586. *Lateriporus teres* (Krabbe, 1869) – *Gammarus lacustris* (larv.)
587. *Monopylidium trigonocephalum* (Krabbe, 1869) – обыкн. каменка
588. *Neogryporhynchus cheilancristrotus* (Wedl, 1855) – линь, карп (larv.)
589. *Paricterotaenia dodecacantha* (Krabbe, 1869) – чайка малая (приносной)
590. *Paricterotaenia porosa* (Rudolphi, 1810) – чайка обыкн., чайки и крачки
591. *Sacciuterina paradoxa* (Rudolphi, 1802) – вальдшнеп, бекас, дупель, веретенник, круглоносый плавунчик

Семейство Dipylidiidae

592. *Dipylidium caninum* (Linnaeus, 1758) – собака, лисица, кошка

Семейство Hymenolepididae

593. *Aploparaksis filum* (Goeze, 1782) – хозяева 14 видов куликов
594. *Aploparaksis furcigera* (Rudolphi, 1819) – дом. и дикие утки, серый гусь
595. *Aploparaksis larina* Fuhrmann, 1921 – обыкн., малая и сизая чайки
596. *Aploparaksis parafilum* Gasowska, 1932 – фифи
597. *Aploparaksis pseudofilum* (Clerc, 1902) – бекас
598. *Cloacotaenia megalops* (Nitzsch, 1829) – 11 видов речных и нырковых уток
599. *Confluaria capillaris* (Rudolphi, 1810) – все 4 вида поганок
600. *Confluaria furcifera* (Krabbe, 1869) – все 4 вида поганок
601. *Confluaria podicipina* (Szymanski, 1905) – 4 вида поганок
602. *Dicranotaenia coronula* (Dujardin, 1845) – серый и белолобый гуси, казарка, дом. и девять видов диких уток, лысуха
603. *Diorchis acuminatus* (Clerc, 1902) – дом. и дикие утки
604. *Diorchis brevis* Rybicka, 1957 – лысуха
605. *Diorchis bulbodes* Mayhew, 1929 – дом. утка
606. *Diorchis inflata* (Rudolphi, 1819) – серый гусь, широконоска, лысуха
607. *Diorchis ransomi* Schultz, 1940 – дом., речные и нырковые утки, лысуха
608. *Diorchis sobolevi* Spasskaja, 1950 – лысуха
609. *Diorchis stefanskii* Czaplinski, 1956 – дом. гусь
610. *Diorchis wigginsi* Schultz, 1940 – дом. утка
611. *Diploposthe laevis* (Bloch, 1782) – дом. и 11 видов речных и нырковых уток, четыре вида поганок, лысуха
612. *Drepanidotaenia lanceolata* (Bloch, 1782) – лебедь-кликун, гуси и казарка, дом. утка и гусь, речные утки

613. *Echinocotyle anatina* (Krabbe, 1869) – дом. и пять видов речных и нырковых уток, лысуха
614. *Echinocotyle brachycephala* (Creplin, 1829) – турухтан
615. *Echinocotyle paradoxa* (Saakova, 1958) – большой веретенник
616. *Echinocotyle rosseteri* Blanchard, 1891 – чирок-трескунок
617. *Echinocotyle sp.* – шилохвость
618. *Echinolepis carioca* (Mogalhaes, 1898) – курица
619. *Fimbriaria fasciolaris* (Pallas, 1781) – дом. гусь и утка, восемь видов диких уток, черношейная поганка
620. *Flamingolepis liguloides* (Gervais, 1847) – серая ворона
621. *Gastrotaenia dogieli* (Gynezinskaja, 1944) – пять видов речных и нырковых уток; рачок
622. *Hamatolepis teresoides* (Fuhrmann, 1906) – широконоска, серая утка, хохлатая чернеть
623. *Hymenolepis baschkiriensis* (Clerc, 1903) – сизая чайка
624. *Hymenolepis diminuta* (Rudolphi, 1819) – человек
625. *Hymenolepis macracanthos* (von Linstow, 1877) – широконоска, шилохвость, хохлатая чернеть, красноголовый нырок
626. *Microsomacanthus abortiva* (Linstow, 1904) – шилохвость, чирок-трескунок (приносной вид)
627. *Microsomacanthus collaris* (Batsch, 1786) – гуси, дом. утка, на Ю.Урале 11 видов речных и нырковых уток, включая красноносого нырка, крохаля и др.
628. *Microsomacanthus compressa* (Linton, 1892) – дом. утка, хохлатая чернеть, др. утиные
629. *Microsomacanthus formosa* (Dubinina, 1953) – чирок-трескунок, хохлатая чернеть, красноголовый нырок (приносной)
630. *Microsomacanthus formosoides* Spaskaya & Spasskii, 1961– чирок-трескунок, хохлатая чернеть (приносной вид)
631. *Microsomacanthus microsoma* (Creplin, 1829) – *Gammarus lacustris* (larv.)
632. *Microsomacanthus paracompressa* (Czaplinski, 1956) – дом. утка, кряква
633. *Microsomacanthus paramicrosoma* (Gasowska, 1931*)* – бокоплав (larv.)
634. *Microsomacanthus parvula* (Kowalewski, 1904) – чирок-свистунок, кряква, нырковые утки; пиявки: *Erpobdella octoculata*, *E.testacea*, *Helobdella stagnalis*, *Haemopis sanguisuga*
635. *Monorcholepis dujardini* (Krabbe, 1869) – дрозды: рябинник, белобровик
636. *Neoskrjabinolepis schaldybini* Spasskii, 1947 – обыкн. бурозубка
637. *Passerilepis crenata* (Goeze, 1782) – серая ворона
638. *Passerilepis stylosa* (Rudolphi, 1809) – сорока
639. *Retinometra longicirrosa* (Fuhrmann, 1906) – шилохвость, свиязь, дом. гусь, утиные
640. *Retinometra skrjabini* (Mathevossian, 1945) – красноголовый нырок, хохлатая чернеть, малая, сизая, озерная чайки
641. *Rodentolepis nana* (von Siebold, 1852) – человек

642. *Sobolevicanthus dafilae* (Polk, 1942) – чирок-свистунок, широконоска
643. *Sobolevicanthus gracilis* (Zeder, 1803) – чирок-свистунок, широконоска, кряква, дом. утка, свиязь, красноголовый нырок, крохали
644. *Sobolevicanthus krabbeella* Hüges, 1940 – красноголовый нырок, морянка, чирок-свистунок, дом. гусь
645. *Tschertkovilepis przewalskii* (Skrjabin, 1914) – дом. гусь и утка
646. *Tschertkovilepis setigera* (Frölich, 1789) – дом. утка и гусь, свиязь, кряква, широконоска
647. *Wardium fusa* (Krabbe, 1869) – чайки и речная крачка
648. *Wardium spasskii* Shigin, 1961 – малая и обыкн. чайки

Семейство Mesocestoididae

649. *Mesocestoides alaudae* Stossich, 1896 – полевой жаворонок
650. *Mesocestoides lineatus* (Goeze, 1872) – лисица, собака

Семейство Nematotaeniidae

651. *Nematotaenia dispar* (Goeze, 1782) – зеленая жаба (Юмагулова, 2000)

Семейство Paruterinidae

652. *Anonchotaenia globata* (von Linstow, 1879) – луговой чекан
653. *Lyruterina nigropunctata* (Crety, 1890) – тетерев

Семейство Schistotaeniidae

654. *Schistotaenia macrorhyncha* (Rudolphi, 1810) – красношейная поганка (приносной)

Семейство Taeniidae

655. *Echinococcus granulosus* (Batsch, 1786) – собака, волк, лисица (ad.), человек, корова, овца, коза, лошадь, лось, свинья (larv.)
656. *Echinococcus multilocularis* (Leuckart, 1863) – лисица, собака (ad.), человек, обыкн. полевка
657. *Hydatigera taeniaeformis* (Batsch, 1786) – собака, кошка, белая мышь, лисица, серая крыса (larv.)
658. *Taenia crassiceps* (Zeder, 1800) – лисица (ad.), рыжеватый суслик, обыкн. и рыжая полевки, степной сурок (larvae)
659. *Taenia hydatigena* Pallas, 1766 – собака, лисица (ad.), корова, овца, коза, свинья (larv.)
660. *Taenia laticollis* Rudolphi, 1819 – рысь
661. *Taenia multiceps* Leske, 1780 (=*Multiceps multiceps* (Leske, 1780)) – собака, корова, овца, свинья
662. *Taenia ovis* (Cobbold, 1869) – собака (ad.), овца (larv.)
663. *Taenia pisiformis* (Bloch, 1780) – собака, лисица, рысь, заяц-русак, заяц-беляк, кролик
664. *Taenia polyacantha* Leuckart, 1856 – лисица (ad.), обыкн. полевка (larv.)
665. *Taenia saginata* Goeze, 1782 – человек (ad.), корова (larv.)
666. *Taenia serialis* (Gervais, 1847) – лисица, собака
667. *Taenia solium* Linnaeus, 1758 – человек (ad.), свинья (larv.)

Отряд Diphyllobothriidea – Лентецы

Семейство Diphyllobothriidae (=Ligulidae) – Ремнецы

668. *Diphyllobothrium latum* Linnaeus, 1758 – человек, щука, окунь, ерш
669. *Ligula colymbi* Zeder, 1803 (pler.) – щиповка
670. *Ligula interrupta* Rudolphi, 1810 – большая, красношейная и серощекая поганки, малая и обыкн. чайки, речная крачка, гоголь, серая утка, красноголовый нырок, лысуха (ad.), лещ, плотва, карась, красноперка, густера, пескарь, гольян (larv.)
671. *Ligula intestinalis* (Linnaeus, 1758) – большая, красношейная и серощекая поганки, малая и обыкн. чайки, речная крачка, гоголь, серая утка, красноголовый нырок, лысуха (ad.), лещ, плотва, красноперка, густера, пескарь, гольян (larv.)
672. *Schistocephalus solidus* (Muller, 1776) – серощекая поганка (приносный вид)

Отряд Onchoproteocephalidea

Семейство Proteocephalidae

673. *Proteocephalus esocis* Schneider, 1905 – щука
674. *Proteocephalus longicollis* (Zeder, 1800) – хариус, сиг оз. Банное 2004 (Дьяченко и др., 2006)
675. *Proteocephalus percae* (Muller, 1780) – окунь
676. *Proteocephalus thymalli* (Annenkova-Chlopina, 1923)
677. *Proteocephalus torulosus* (Batsch, 1786) – язь
678. *Proteocephalus sp.* – подкаменшик

Тип Acanthocephales – Скребни

Класс Palaeacanthocephala

Отряд Echinorhynchida

Семейство Echinorhynchidae

679. *Acanthocephalus clavula* (Dujardin, 1845) – ерш, окунь, налим, щука
680. *Acanthocephalus lucii* (Muller, 1776) – окунь

Семейство Pomphorhynchidae

681. *Pomphorhynchus laevis* (Zoega, 1776) – плотва оз. Банное (Дьяченко и др., 2006)

Отряд Polymorphida

Семейство Centrorhynchidae

682. *Sphaerirostris lancea* (Westrumb, 1821) – чибис

Семейство Plagiorhynchidae

683. *Plagiorhynchus cylindraceus* (Goeze, 1782) – дрозд-рябинник

Семейство Polymorphidae

684. *Arhythmorhynchus capellae* (Yamaguti, 1935) – мородунка
685. *Filicollis anatis* (Schrank, 1788) – лысуха

686. *Polymorphus magnus* Skrjabin, 1913 – дом. и дикие утки, лысуха, озерная и малая чайки, большой веретенник, мородунка, шилоклювка; у *Gammarus lacustris* (met.)
687. *Polymorphus marilis* Van Cleave, 1939 – хохлатая чернеть, веретенник, лысуха
688. *Polymorphus minutus* (Goeze, 1782) – дом. и дикие утки, лысуха, озерная и малая чайки, большой веретенник, мородунка, шилоклювка; у *Gammarus lacustris* (met.)
689. *Polymorphus sp.* – дикие утки, лысуха, озерная чайка

Класс Archiacanthocephala

Отряд Gigantorhynchida

Семейство Gigantorhynchidae

690. *Mediorhynchus micracanthus* (Rudolphi, 1819) – луговой чекан
691. *Mediorhynchus sp.* – перепел, черноголовая славка

Отряд Oligacanthorhynchida

Семейство Oligacanthorhynchidae

692. *Macracanthorhynchus catulinus* Kostylev, 1927 – лисица
693. *Macracanthorhynchus hirudinaceus* (Pallas, 1781) – свинья

Класс Eoacanthocephala

Отряд Neoechinorhynchida

Семейство Neoechinorhynchidae

694. *Neoechinorhynchus rutili* (Müller, 1780) – у 13 видов рыб

Тип Gastrotricha – Брюхоресничные черви

Класс Chaetonotoidea

Отряд Chaetonotida

Семейство Chaetonotidae

695. *Chaetonotus brevispinosus* Zelinka, 1889 – в аэротенках
696. *Chaetonotus maximus* Ehrenberg, 1838 – в аэротенках

Тип Rotifera – Коловратки

Класс Eurotatoria

Подкласс Bdelloidea

Отряд Philodinida

Семейство Philodinidae

697. *Dissotrocha aculeata* (Ehrenberg, 1832)
698. *Philodina acuticornis* Murray, 1902
699. *Philodina lepta* Wulfert, 1950
700. *Philodina roseola* Ehrenberg, 1832
701. *Philodina vorax* (Janson, 1893) – аэротенки Белорецка

702. *Rotaria neptunia* (Ehrenberg, 1832)
703. *Rotaria rotatoria* (Pallas, 1766)

Подкласс Monogononta
Надотряд Gnesiotrocha
Отряд Flosculariacea

Семейство Conochilidae

704. *Conochilus hippocrepis* (Schrank, 1803)
705. *Conochilus unicornis* Rousselet, 1892

Семейство Flosculariidae

706. *Floscularia ringens* (Linnaeus, 1758) – реки Белая, Нугуш, Ашкадар, Селеук, Инзер, Юрюзань, Зилаир, Большой Ик (Чаус, 2017а)
707. *Ptygura melicerta* Ehrenberg, 1832 – реки Белая, Нугуш, Ашкадар, Селеук, Инзер, Юрюзань, Зилаир, Большой Ик (Чаус, 2017а)

Семейство Hexarthridae

708. *Hexarthra mira* (Hudson, 1871)

Семейство Testudinellidae

709. *Pompholyx sulcata* Hudson, 1885
710. *Testudinella mucronata* (Gosse, 1886)
711. *Testudinella parva* (Ternetz, 1892)
712. *Testudinella patina intermedia* (Anderson, 1889)
Testudinella patina patina (Hermann, 1783)

Семейство Trochosphaeridae

713. *Filinia longiseta* (Ehrenberg, 1834)
714. *Filinia terminalis* (Plate, 1886)

Надотряд Pseudotrocha
Отряд Ploima

Семейство Asplanchnidae

715. *Asplanchna brightwellii* Gosse, 1850
716. *Asplanchna girodi* de Guerne, 1888 – реки Белая, Нугуш, Ашкадар, Селеук, Инзер, Юрюзань, Зилаир, Большой Ик (Чаус, 2017а)
717. *Asplanchna herricki* de Guerne, 1888 – реки Белая, Нугуш, Ашкадар, Селеук, Инзер, Юрюзань, Зилаир, Большой Ик (Чаус, 2017а)
718. *Asplanchna priodonta* Gosse, 1850
719. *Asplanchna sieboldii* (Leydig, 1854)

Семейство Brachionidae

720. *Brachionus angularis* Gosse, 1851
721. *Brachionus bennini* Leissling, 1924
722. *Brachionus calyciflorus amphiceros* (Ehrenberg, 1838)
Brachionus calyciflorus anuraeformis (Brehm, 1909)
Brachionus calyciflorus calyciflorus Pallas, 1776
Brachionus calyciflorus dorcas Gosse, 1851

Brachionus calyciflorus spinosus Wierzejski, 1891
723. *Brachionus diversicornis diversicornis* (Daday, 1883)
Brachionus diversicornis homoceros (Wierzejski, 1891)
724. *Brachionus leydigi tridentatus*, Zernov, 1901
725. *Brachionus nilsoni* Ahlstrom, 1940
726. *Brachionus plicatilis* (Müller, 1786)
727. *Brachionus quadridentatus* Hermann, 1783
Brachionus quadridentatus ancylongathus Schmarda, 1859
Brachionus quadridentatus brevispinus Ehrenberg, 1832
Brachionus quadridentatus cluniorbicularis (Skorikov, 1894)
Brachionus quadridentatus zernovi Voronkov, 1907
728. *Brachionus urceolaris urceolaris* Müller, 1773
729. *Kellicottia longispina* (Kellicott, 1879)
730. *Keratella cochlearis cochlearis* (Gosse, 1851)
Keratella cochlearis hispida (Lauterborn, 1898)
Keratella cochlearis macracantha (Lauterborn, 1898)
Keratella cochlearis tecta (Gosse, 1851)
731. *Keratella hiemalis* Carlin, 1943
732. *Keratella irregularis* (Lauterborn, 1898)
733. *Keratella quadrata quadrata* (O. F. Müller, 1786)
Keratella quadrata dispersa Carlin, 1898
Keratella quadrata frenzeli (Eckstein, 1895)
734. *Keratella serrulata curvicornis* (Rylov, 1926)
Keratella serrulata serrulata (Ehrenberg, 1838)
735. *Keratella testudo* (Ehrenberg, 1832) – Зилр (Чаус, 2023)
736. *Keratella valga* (Ehrenberg, 1834) – реки Белая, Нугуш, Ашкадар, Селеук, Инзер, Юрюзань, Зилаир, Большой Ик (Чаус, 2017а)
737. *Notholca acuminata acuminata* (Ehrenberg, 1832)
Notholca acuminata extensa Oloffson, 1918
738. *Notholca squamula* (O. F. Muller, 1786)
739. *Plationus patulus* (O. F. Muller, 1786)
740. *Platyias quadricornis* (Ehrenberg, 1832)

Семейство Epiphanidae

741. *Epiphanes senta* (Muller, 1773) – реки Белая, Нугуш, Ашкадар, Селеук, Инзер, Юрюзань, Зилаир, Большой Ик (Чаус, 2017а)

Семейство Euchlanidae

742. *Euchlanis deflexa* (Gosse, 1851)
743. *Euchlanis dilatata* Ehrenberg, 1832
Euchlanis dilatata lucksiana Hauer, 1930
744. *Euchlanis incisa* Carlin, 1939 – Зилр (Чаус, 2023)
745. *Euchlanis lyra* Hudson, 1886
746. *Euchlanis meneta* Myers, 1930
747. *Euchlanis triquetra* Ehrenberg, 1838 – Зилр (Чаус, 2023)

Семейство Gastropodidae

748. *Ascomorpha saltans* Bartsch, 1870
749. *Gastropus stylifer* (Imhof, 1891)

Семейство Lecanidae

750. *Lecane arcuata* (Bryce, 1891)
751. *Lecane bulla* (Gosse, 1851)
752. *Lecane closterocerca* (Schmarda, 1859)
753. *Lecane cornuta rotunda* (Fadeev, 1927)
754. *Lecane crenata* (Harring, 1913)
755. *Lecane flexilis* (Gosse, 1886)
756. *Lecane ludwigii* (Eckstein, 1883)
757. *Lecane luna* (Müller, 1776) – Зилр (Чаус, 2023)
758. *Lecane lunaris* (Ehrenberg, 1832)
759. *Lecane quadridentata* (Ehrenberg, 1832)
760. *Lecane scutata* (Harring & Myers, 1926)
761. *Lecane stenroosi* (Meissner, 1908)
762. *Lecane styrax* (Harring & Myers, 1926)
763. *Lecane ungulata* (Gosse, 1887)
764. *Lecane depressa* (Bryce, 1891)

Семейство Lepadellidae

765. *Colurella colurus colurus* (Ehrenberg, 1830)
766. *Lepadella acuminata* (Ehrenberg, 1834)
767. *Lepadella ovalis* (O. F. Müller, 1786)
768. *Lepadella patella* (O. F. Müller, 1786)
769. *Lepadella triptera* (Ehrenberg, 1830)

Семейство Mytilinidae

770. *Lophocharis oxysternon* (Gosse, 1851)
771. *Mytilina acanthophora* Hauer, 1938
772. *Mytilina bisulcata* (Lucks, 1912)
773. *Mytilina mucronata* (O. F. Müller, 1773)
774. *Mytilina trigona* (Gosse, 1851)
775. *Mytilina ventralis brevispina* (Ehrenberg, 1832)
Mytilina ventralis redunca (Ehrenberg, 1832)
Mytilina ventralis ventralis (Ehrenberg, 1832)

Семейство Notommatidae

776. *Cephalodella gibba* (Ehrenberg, 1832)
777. *Cephalodella physalis* Myers, 1924
778. *Notommata cyrtopus* Gosse, 1886

Семейство Scaridiidae

779. *Scaridium longicaudum* (Muller, 1786)

Семейство Synchaetidae

780. *Ploesoma hudsoni* (Imhof, 1891)

781. *Ploesoma triacanthum* (Bergendal, 1892)
782. *Ploesoma truncatum* (Levander, 1894)
783. *Polyarthra dolichoptera* Idelson, 1925
784. *Polyarthra euryptera* Wierzejski, 1891
785. *Polyarthra longiremis* Carlin, 1943
786. *Polyarthra luminosa* Kutikova, 1962
787. *Polyarthra major* Burckhardt, 1900
788. *Polyarthra minor* Voigt, 1904
789. *Polyarthra remata* Skorikov, 1896
790. *Synchaeta longipes* Gosse, 1887
791. *Synchaeta pectinata* Ehrenberg, 1832
792. *Synchaeta stylata* Wierzejski, 1893
793. *Synchaeta tremula* (O. F. Müller, 1786)

Семейство Trichocercidae

794. *Trichocerca (Diurella) bidens* (Lucks, 1912)
795. *Trichocerca (Diurella) brachyura* (Gosse, 1851)
796. *Trichocerca (Diurella) inermis* (Linder, 1904)
797. *Trichocerca (Diurella) intermedia* (Stenroos, 1898)
798. *Trichocerca (Diurella) porcellus* (Gosse, 1851)
799. *Trichocerca (Diurella) ruttneri* Donner, 1953
800. *Trichocerca (Diurella) similis* (Wierzejski, 1893)
801. *Trichocerca (Diurella) tenuior* (Gosse, 1886)
802. *Trichocerca (Trichocerca) bicristata* (Gosse, 1887)
803. *Trichocerca (Trichocerca) capucina* (Wierzejski & Zacharias, 1893) – Стерлитамак (Чаус, 2015)
804. *Trichocerca (Trichocerca) cylindrica* (Imhof, 1891)
805. *Trichocerca (Trichocerca) elongata* (Gosse, 1886)
806. *Trichocerca (Trichocerca) longiseta* (Schrank, 1802)
807. *Trichocerca (Trichocerca) pusilla* (Jennings, 1903) – Стерлитамак (Чаус, 2015)
808. *Trichocerca (Trichocerca) rattus carinata* (Ehrenberg, 1830)
Trichocerca (Trichocerca) rattus minor Fedeew, 1925
Trichocerca (Trichocerca) rattus rattus (O. F. Müller, 1776)
809. *Trichocerca (Trichocerca) rousseleti* (Voigt, 1902)
810. *Trichocerca (Trichocerca) stylata* (Gosse, 1851)

Семейство Trichotriidae

811. *Trichotria pocillum bergi* (Meissner, 1908)
Trichotria pocillum pocillum (O.F. Müller, 1776)
812. *Trichotria tetractis* (Ehrenberg, 1830)
813. *Trichotria truncata* (Whitelegge, 1889)

Тип Annelida – Кольчатые черви
Класс Polychaeta – Многощетинковые черви

Отряд Naidomorpha

Семейство Aeolosomatidae

814. *Aeolosoma hemprichii* Ehrenberg, 1828 – в аэротенках
815. *Aeolosoma niveum* Leydig, 1865 – в аэротенках
816. *Aeolosoma quaternarium* Ehrenberg, 1831
817. *Aeolosoma tenebrarum* Vejdovsky, 1880

Класс Oligochaeta – Малощетинковые черви

Отряд Crassiclitellata

Семейство Lumbricidae – Настоящие дождевые черви

818. *Aporrectodea caliginosa caliginosa* (Savigny, 1826) – Белорецк (Всеволодова-Перель, 1997).
819. *Aporrectodea rosea* (Savigny, 1826)
820. *Bimastus rubidus* (Savigny, 1826)
821. *Dendrobaena octaedra* (Savigny, 1826)
822. *Dendrobaena schmidti tellermanica* Perel, 1966 – Куюр (Всеволодова-Перель, 1997)
823. *Dendrodrilus rubidus* (Savigny, 1826)
Dendrodrilus rubidus tenuis (Eisen, 1874) – Блрц (Всеволодова-Перель, 1997)
824. *Eisenia fetida* (Savigny, 1826) – Навозный червь
825. *Eisenia intermedia* (Michaelsen, 1901)
826. *Eisenia nordenskioldi* (Eisen, 1879)
827. *Eisenia uralensis* Malevic, 1950
828. *Eiseniella tetraedra* (Savigny, 1826) – Четырехгранная эйзениелла
829. *Lumbricus baicalensis* Michaelsen, 1900 – Мелз
830. *Lumbricus rubellus* Hoffmeister, 1843 – Уфа, Чишм
831. *Lumbricus terrestris* Linnaeus, 1758 – Большой красный червь
832. *Octolasion lacteum* (Oerley, 1885)
833. *Perelia diplotetratheca* (Perel, 1967)
834. *Perelia tuberosa* (Svetlov, 1924)

Отряд Enchytraeida

Семейство Enchytraeidae – Энхитреиды

835. *Enchytraeus albidus* Henle, 1837 – Белый энхитрей

Семейство Propappidae

836. *Propappus volki* (Michaelsen, 1916)

Отряд Lumbriculida

Семейство Lumbriculidae

837. *Lumbriculus variegatus* (Müller, 1774)

Отряд Tubificida

Семейство Naididae

838. *Arcteonais lomondi* (Martin, 1907)

839. *Aulodrilus pigueti* Kowalewski, 1914
840. *Aulodrilus pluriseta* (Piguet, 1906)
841. *Aulophorus furcatus* (Müller, 1774)
842. *Chaetogaster diaphanus* (Gruithuisen, 1828)
843. *Chaetogaster limnaei* Baer, 1827
844. *Dero digitata* (Muller, 1774)
845. *Haemonais waldvogeli* Bretscher, 1900
846. *Isochaetides michaelseni* (Lastockin, 1937)
847. *Limnodrilus claparedianus* Ratzel, 1868
848. *Limnodrilus hoffmeisteri* Claparede, 1862
849. *Limnodrilus profundicola* (Verrill, 1871)
850. *Limnodrilus udekemianus* Claparede, 1862
851. *Nais alpina* Sperber, 1948
852. *Nais barbara* Müller, 1774
853. *Nais behningi* Michaelsen, 1923
854. *Nais bretscheri* Michaelsen, 1899
855. *Nais communis* Piguet, 1906 – водоемы, аэротенки
856. *Nais elinguis* Müller, 1774
857. *Nais pardalis* Piguet, 1906
858. *Nais pseudobtusa* Piguet, 1906 – в аэротенках
859. *Ophidonais serpentina* (Müller, 1774)
860. *Piguetiella blanci* (Piguet, 1906)
861. *Potamothrix hammoniensis* (Michaelsen, 1901)
862. *Potamothrix moldaviensis* Vejdovsky & Mrazek, 1903
863. *Pristina aequiseta* Bourne, 1891
864. *Pristina bilobata* (Bretscher, 1903)
865. *Pristina longiseta* Ehrenberg, 1831
866. *Psammoryctides barbatus* (Grube, 1860)
867. *Ripistes parasita* (Schmidt, 1847)
868. *Slavina appendiculata* (d'Udekem, 1855)
869. *Specaria josinae* (Vejdovsky, 1884)
870. *Spirosperma ferox* Eisen, 1879
871. *Stylaria lacustris* (Linnaeus, 1758)
872. *Tubifex newaensis* (Michaelson, 1903)
873. *Tubifex tubifex* (Müller, 1774)
874. *Uncinais uncinata* (Orsted, 1842)
875. *Vejdovskyella comata* (Vejdovsky, 1884)
876. *Vejdovskyella intermedia* (Bretscher, 1896)

Класс Hirudinea – Пиявки

Отряд Arhynchobdellida – Челюстные пиявки

Семейство Erpobdellidae – Глоточные пиявки

877. *Dina lineata* (O.F. Müller, 1773)

878. *Erpobdella nigricollis* (Brandes, 1900) – Черношейная гэрпобделла
879. *Erpobdella octoculata* (Linnaeus, 1758) – Обыкновенная эрпобделла
880. *Erpobdella testacea* (Savigny, 1822)

Семейство Haemopidae

881. *Haemopis sanguisuga* (Linnaeus, 1758) **–** Большая ложноконская пиявка

Семейство Hirudinidae

? Hirudo medicinalis Linnaeus, 1758 **–** Медицинская пиявка

Отряд Rhynchobdellida – Хоботные пиявки

Семейство Glossiphoniidae – Плоские пиявки

882. *Alboglossiphonia heteroclita* (Linnaeus, 1761)
883. *Glossiphonia complanata* (Linnaeus, 1758) – Улитковая пиявка
884. *Glossiphonia concolor* (Apathy, 1888)
885. *Helobdella stagnalis* (Linnaeus, 1758) – Двуглазая пиявка
886. *Hemiclepsis marginata* (O. F. Müller, 1773)
887. *Theromyzon tessulatum* (O. F. Müller, 1773) – Птичья пиявка

Семейство Piscicolidae – Рыбьи пиявки

888. *Calliobdella mammillata* (Malm, 1863) – Налимовая пиявка
889. *Piscicola geometra* (Linnaeus 1761) – Обыкновенная рыбья пиявка

Тип Mollusca – Моллюски

Класс Gastropoda – Брюхоногие моллюски

Подкласс Caenogastropoda

Отряд Architaenioglossa

Семейство Viviparidae

Род *Viviparus* Montfort, 1810

890. *Viviparus contecta* (Millet, 1813) – Живородка (лужанка) болотная. Озёра, пруды, болота и лужи со стоячей водой. Повсеместно.
891. *Viviparus viviparus* (Linnaeus, 1758) – Живородка (лужанка) речная. Реки, пойменные озёра и пруды. Повсеместно.

Отряд Littorinimorpha

Семейство Bithyniidae

Род *Bithynia* Leach in Abele, 1818

892. *Bithynia tentaculata* (Linnaeus, 1758) – Битиния щупальцевая. Реки, озёра и водоёмы речных пойм. Повсеместно.
893. *Bithynia troschelii* (Paasch, 1842) – Битиния Трошеля. Небольшие речки, водоёмы речных пойм и пересыхающие (временные) водоёмы. Повсеместно.

Семейство Hydrobiidae

Род *Ecrobia* W. Stimpson, 1865

? *Ecrobia ventrosa* (Montagu, 1803) – Гидробия выпуклая. Солоноватое оз. Мулдаккуль Абзл.

Семейство Lithoglyphidae

Род *Lithoglyphus* C. Pfeiffer, 1828

? *Lithoglyphus naticoides* (C. Pfeiffer, 1828) – Литоглиф обыкновенный. Единственная находка (14 июня 2025 г.) в р. Белой на территории Уфы.

Подкласс Heterobranchia

Семейство Valvatidae

Род *Valvata* O.F. Müller, 1774

894. *Valvata antiqua* J. Morris, 1838 – Затворка древняя. Реки, озёра и ручьи, пойменные водоёмы. Повсеместно.
895. *Valvata cristata* O.F. Müller, 1774 – Затворка плоская. Водоёмы со стоячей водой (озёра, пруды и временные водоёмы). Повсеместно.
896. *Valvata piscinalis* (O.F. Müller, 1774) – Затворка обыкновенная. Реки, озёра и пруды. Повсеместно.
897. *Valvata pulchella* S. Studer, 1789 – Затворка красивая. Озёра, пересыхающие (временные) водоёмы, в болотах. Повсеместно.

? *Valvata contorta* var. *trochoidea* Menke, 1845 – Затворка трохоидная. Озёра и пойменные водоёмы Учлн, Крмс.

? *Valvata depressa* (C. Pfeiffer, 1821) – Затворка тяжёлая. Озёра и болота. Учлн район РБ.

? *Valvata fluviatilis* var. *kliniensis* Milachevich, 1881 – Затворка клиненсис. Заиленные части оз. Архимандритское Уфмс и оз. Калкан Учлн.

Отряд Hygrophila

Семейство Lymnaeidae

Подсемейство Lymnaeinae

Род *Galba* Schrank, 1803

898. *Galba truncatula* (O.F. Müller, 1774) – Прудовик малый, или усечённый. Мелкие пересыхающие водоёмы; увлажнённые берега ручьёв, рек и озёр. Повсеместно.

Род *Lymnaea* Lamark, 1799

899. *Lymnaea fragilis* (Linnaeus, 1758) – Прудовик ломкий. Пересыхающие и ежегодно промерзающие водоёмы.
900. *Lymnaea stagnalis* (Linnaeus, 1758) – Прудовик большой, или озёрный. Непроточные пересыхающие и постоянные водоёмы; поймы рек и озёра. Повсеместно.

? *Lymnaea ampullacea* (Rossmassler, 1835) – Пузыревидный прудовик. Крупные и небольшие озёра. Южный Урал.

Род *Stagnicola* Jeffreys, 1830

901. *Stagnicola callomphala* (Servain, 1881) – Прудовик каллумфала. Временные водоёмы левобережья реки Белой.
902. *Stagnicola fuscus* (C. Pfeiffer, 1821) – Прудовик тёмный. Единичные экземпляры обнаружены на заболоченном лугу около оз. Ургун Учлн.

903. *Stagnicola palustris* (O.F. Müller, 1774) – Прудовик болотный. Заболоченные участки побережий больших и малых озёр и рек, на болотах. Повсеместно.

Подсемейство Amphipepleinae

Род *Aenigmomphiscola* Kruglov & Starobogatov, 1981

904. *Aenigmomphiscola europaea* Kruglov & Starobogatov, 1981 – Энигмомфисколя европейская. В болоте у д. Ургун (Учлн), водоёмы окрестностей Уфы.
905. *Aenigmomphiscola uvalievae* Kruglov & Starobogatov, 1981 – Энигмомфисколя Увалиевой. В болоте у д. Ургун (Учлн), водоёмы окрестностей Уфы.

Род *Ampullaceana* Servain, 1882

906. *Ampullaceana ampla* (W. Hartmann, 1821) – Ампуллацея широкая. В карстовых озёрах, в озере Бол. Толпак (Учлн), реке Сакмаре, водоёмах поймы р. Нугуш.
907. *Ampullaceana balthica* (Linnaeus, 1758) – Ампуллацея балтийская. Озёра и реки на участках с замедленным течением. Повсеместно.
908. *Ampullaceana dipkunensis* (Gundrizer & Starobogatov, 1979) – Ампуллацея дипкуненсис. Единичные находки раковин в пруду на р. Усень.
909. *Ampullaceana fontinalis* (S. Studer, 1820) – Ампуллацея родниковая. Озёра, небольшие заросшие водоёмы, в ручьях и малых реках. Повсеместно.
910. *Ampullaceana intermedia* Lamarck, 1822 – Ампуллацея средняя. Пойменные и временные водоёмы с проточной водой или слабым течением. Найден в р. Юрюзань и в пруду на р. Усень.
911. *Ampullaceana lagotis* (Schrank, 1803) – Ампуллацея заячья. Пойменные водоёмы, пруды и заросшие водные участки притоков рек Белой, Уфы, Дёмы, Нугуша, озёра: Кара-Куль, Бол. Учалы, Кандры-Куль; водоёмы верховий р. Урал.

Род *Myxas* G.B. Sowerby I, 1822

912. *Myxas glutinosa* (O.F. Müller, 1774) – Прудовик плащеносный. Крупные озёра и небольшие равнинные реки. Учлн и Уфмс.

Род *Peregriana* Servain, 1882

913. *Peregriana peregra* (O.F. Müller, 1774) – Прудовик вытянутый, или странствующий. Временные (пересыхающие) водоёмы и болота; прибрежная зона рек и озёр. Повсеместно.

Род *Radix* Montfort, 1810

914. *Radix auricularia* (Linnaeus, 1758) – Прудовик уховидный. Постоянные и временные водоёмы. Повсеместно.

Семейство Acroloxidae

Род *Acroloxus* H. Beck, 1838

915. *Acroloxus lacustris* (Linnaeus, 1758) – Чашечка озёрная. Постоянные водоёмы со стоячей водой или на прибрежье медленно текучих рек. Повсеместно.

Семейство Physidae

Род *Aplexa* J. Fleming, 1820

916. *Aplexa hypnorum* (Linnaeus, 1758) – Аплекса обыкновенная. Мелкие, пересыхающие и небольшие временные водоёмы, в озёрах. Повсеместно.

Род *Physa* Draparnaud, 1801

917. *Physa fontinalis* (Linnaeus, 1758) – Физа родниковая. Мелководье пойменных озёр, прудов и ручьёв на водной растительности. Повсеместно.
918. *Physa taslei* Bourguignat, 1860 – Физа Тасле. Озёра Карабалыкты, Карагайлы (Абзл) и Узункуль (Учлн).

? *Physella acuta* (Draparnaud, 1805) – Физелла острая. Кармановское водохранилище, Янул и оз. Тёплое Уфа (7.03.2024 г.). Интродуцированный вид.

Семейство Planorbidae

Род *Ancylus* O.F. Müller, 1773

919. *Ancylus fluviatilis* O.F. Müller, 1774 – Чашечка речная. Реки, ручьи и озёра, прикрепляются к камням. Повсеместно.

Род *Anisus* S. Studer, 1820

920. *Anisus leucostoma* (Millet, 1813) – Катушка белоротая. Небольшие сильно пересыхающие водоёмы. Болотистые места Учлн, Бклн, Уфмс.
921. *Anisus spirorbis* (Linnaeus, 1758) – Катушка закруглённая. Небольшие водоёмы озёрного типа, временные водоёмы, в малых реках. Повсеместно.
922. *Anisus strauchianus* (Clessin, 1884) – Катушка ребристая. Прибрежная зона зарастающих и хорошо прогреваемых пойменных водоёмов рек. Уфмс и Крмс.
923. *Anisus vortex* (Linnaeus, 1758) – Катушка завернутая. Крупные озёра, малые и средние реки со стоячей или слабо проточной водой. Повсеместно.
924. *Anisus vorticulus* (Troschel, 1834) – Катушка завернутая, малая. Крупные непойменные водоёмы и озёра. Повсеместно.

Род *Armiger* Hartmann, 1843

925. *Armiger crista* (Linnaeus, 1758) – Катушка гребенчатая. Небольшие внепойменные озёра и малые реки. Повсеместно.

Род *Bathyomphalus* Charpentier, 1837

926. *Bathyomphalus contortus* (Linnaeus, 1758) – Катушка скрученная. Постоянные водоёмы среди растительности. Повсеместно.

Род *Gyraulus* Charpentier, 1837

927. *Gyraulus acronicus* (A. Férussac, 1807) – Катушка альпийская. Озёра. Редкие находки в Дёмском р-не Уфы и Крмс.
928. *Gyraulus albus* (O.F. Müller, 1774) – Катушка белая. Пруды, озёра и реки, среди водной растительности. Повсеместно.
929. *Gyraulus laevis* (Alder, 1838) – Катушка гладкая. Мелководные озёра и пруды. Повсеместно.
930. *Gyraulus riparius* (Westerlund, 1865) – Катушка прибрежная. Речные старицы и озёра со стоячей водой. Учлн.
931. *Gyraulus rossmaessleri* (Auerswald, 1852) – Катушка Россмаслера. Мелководные и пересыхающие водоёмы (озёра). Абзл, Учлн и Бузд.

932. *Gyraulus stroemi* (Westerlund, 1881) – Катушка Штрёма. Небольшие постоянные водоёмы. Учлн и Абзл.

Род *Hippeutis* Charpentier, 1837

933. *Hippeutis complanatus* (Linnaeus, 1758) – Катушка сплюснутая. Временные водоёмы, в ручьях и небольших озёрах. Повсеместно.

? *Hippeutis diaphanella* (Bourguignat, 1864) – Катушка прозрачная. Один экземпляр этого моллюска обнаружен в озере Карагайлы, Учлн.

Род *Planorbarius* Duméril, 1805

934. *Planorbarius corneus* (Linnaeus, 1758) – Катушка роговая. Постоянные, стоячие или с замедленным течением водоёмы. Повсеместно.

Род *Planorbis* O.F. Müller, 1773

935. *Planorbis planorbis* (Linnaeus, 1758) – Катушка окаймлённая. Стоячие и медленно текучие водоёмы (болота, заросшие ручьи, временные лужи и озёра). Повсеместно.

936. *Planorbis carinatus* O.F. Müller, 1774 – Катушка килеватая. Прибрежная зона крупных озёр. Учлн.

Род *Segmentina* J. Fleming, 1818

937. *Segmentina nitida* (O.F. Müller, 1774) – Катушка блестящая. Небольшие озёра, водохранилища и ручьи. Повсеместно.

Отряд Ellobiida

Семейство Ellobiidae

Род *Carychium* O.F. Müller, 1774

938. *Carychium minimum* O.F. Müller, 1774 – Карихиум маленький. Смешанные леса, во влажных местах на лугах, в оврагах, по берегам ручьёв и на почве. Повсеместно.

Отряд Stylommatophora

Семейство Cochlicopidae

Род *Cochlicopa* A. Férussac, 1821

939. *Cochlicopa lubrica* (O.F. Müller, 1774) – Кохликопа гладкая. Широколиственные и смешанные леса, кустарники, редко в открытых биотопах. Повсеместно.

940. *Cochlicopa lubricella* (Porro, 1838) – Кохликопа скользкая. На лугах, в степи, редколесье, на опушках среди кустарника в дерновой подстилке. Южные районы.

941. *Cochlicopa nitens* (M. von Gallenstein, 1848) – Кохликопа блестящая. Влажные участки леса и оврагов, по берегам рек и ручьёв, на влажной почве. Повсеместно.

Семейство Enidae

Род *Chondrula* H. Beck, 1837

942. *Chondrula tridens* (O.F. Müller, 1774) – Хондрула трёхзубая. Сухие склоны, остепненные луга и степные участки в дерновине или на почве. Повсеместно.

Род *Ena* W. Turton, 1831

943. *Ena montana* (Draparnaud, 1801) – Эна горная. Широколиственные и смешанные леса, лиственная подстилка, под корой старых деревьев и пней. Повсеместно.

Род *Merdigera* Held, 1838

944. *Merdigera obscura* (O.F. Müller, 1774) – Мердигера тёмная. Широколиственные леса, лиственная подстилка, под корой старых деревьев и пней. Ишмб.

Семейство Gastrocoptidae

Род *Gastrocopta* Wollaston, 1878

945. *Gastrocopta theeli* (Westerlund, 1877) – Гастрокопта тели. Сухие южные склоны широколиственных лесов. Слвт, Кигн, Ишмб.

Семейство Pupillidae

Род *Pupilla* J. Fleming, 1828

946. *Pupilla bigranata* (Rossmässler, 1839) – Пупилла двузернистая. На осыпях, у корней кустарников открытых, сухих склонов. Повсеместно.

947. *Pupilla muscorum* (Linnaeus, 1758) – Пупилла мшистая. Остепнённые склоны и широколиственные леса как на равнине, так и в горах. Повсеместно.

Семейство Succineidae

Род *Oxyloma* Westerlund, 1885

948. *Oxyloma elegans* (Risso, 1826) – Янтарка стройная. Около водоёмов на влажной почве и прибрежной растительности; в лесах, на кустарниках в лиственном опаде. Повсеместно.

Род *Succinea* Draparnaud, 1801

949. *Succinea putris* (Linnaeus, 1758) – Янтарка обыкновенная, или тусклая. В лесах, по берегам ручьёв и рек, на влажных лугах. Повсеместно.

Род *Succinella* Draparnaud, 1801

950. *Succinella oblonga* (Draparnaud, 1801) – Янтарка продолговатая. Смешанные и широколиственные леса, пойменные луга, по берегам рек и ручьёв. Повсеместно.

Семейство Truncatellinidae

Род *Columella* Westerlund, 1878

951. *Columella columella* (G. von Martens, 1830) – Колумелла столбчатая. Пойменные луга, среди кустарников, опушки широколиственных лесов. Стмк.

952. *Columella edentula* (Draparnaud, 1805) – Колумелла беззубая. Широколиственные леса, среди травы и кустарников. Повсеместно.

Род *Truncatellina* R. T. Lowe, 1852

953. *Truncatellina costulata* (Nilsson, 1823) – Трункателлина ребристая. Открытые остепнённые луга; лиственная подстилка широколиственных лесов. Повсеместно.

954. *Truncatellina cylindrica* (A. Férussac, 1807) – Трункателлина цилиндрическая. Остепнённые биотопы, сухие луга и кустарники. Повсеместно.

Семейство Valloniidae

Род *Vallonia* Risso, 1826

955. *Vallonia costata* (O.F. Müller, 1774) – Валлония ребристая. Смешанные леса, среди кустарников, на лугах и остепнённых участках. Повсеместно.

956. *Vallonia pulchella* (O.F. Müller, 1774) – Валлония красивая. Смешанные леса, среди кустарников, на лугах и редко на остепнённых участках. Повсеместно.

Род *Acanthinula* H. Beck, 1847

957. *Acanthinula aculeata* (O.F. Müller, 1774) – Акантинула колючая. Смешанные леса, кустарниковые заросли, на склонах лесных оврагов. Слвт.

Род *Zoogenetes* E.S. Morse, 1864

958. *Zoogenetes harpa* (Say, 1824) – Зоогенетис харпа. Хвойные и смешанные леса на высоте 750 м над уровнем моря. Блрц.

Семейство Vertiginidae

Род *Vertigo* O.F. Müller, 1773

959. *Vertigo angustior* Jeffreys, 1830 – Вертига узкая. Широколиственные леса; на влажных лугах и опушках. Слвт, Нурм.

960. *Vertigo antivertigo* (Draparnaud, 1801) – Вертига антивертига. Влажные луга, широколиственные и смешанные леса. Повсеместно.

961. *Vertigo pusilla* O.F. Müller, 1774 – Вертига малая. Широколиственные и смешанные леса, в почве среди травянистых растений. Повсеместно.

962. *Vertigo pygmaea* (Draparnaud, 1801) – Вертига карликовая. Широколиственные и смешанные леса; на лугах и в степи. Повсеместно.

963. *Vertigo substriata* (Jeffreys, 1833) – Вертига морщинистая. Широколиственные и смешанные леса. Слвт.

Семейство Agriolimacidae

Род *Deroceras* Rafinesque, 1820

964. *Deroceras agreste* (Linnaeus, 1758) – Слизень полевой. Луга, лесные опушки, в огородах, садах и парках. Повсеместно.

965. *Deroceras laeve* (O.F. Müller, 1774) – Слизень гладкий. Влажные луга, болота, по берегам водоёмов. Иглн, Блвр, Давл, Ишмб, Уфа.

966. *Deroceras reticulatum* (O.F. Müller, 1774) – Слизень сетчатый. Открытые пространства, часто встречается на полях и огородах, садах и парках. Повсеместно.

Род *Krynickillus* Kaleniczenko, 1851

967. *Krynickillus melanocephalus* Kaleniczenko, 1851 – Слизень черноголовый. По берегам водоёмов, в лиственной подстилке, под камнями. Редкие находки в Ишмб, Уфа.

Семейство Arionidae

Род *Arion* A. Ferussac, 1819

968. *Arion fasciatus* (Nilsson, 1823) – Слизень полосатый. Лиственная подстилка лесов, среди кустарников и на открытых местах. Блкт, Блрц, Иглн, Уфа.
969. *Arion fuscus* (O.F. Müller, 1774) – Слизень тёмный. Смешанные и хвойные леса, под валежником, корой деревьев; в садах и парках. Повсеместно.

? *Arion vulgaris* Moquin-Tandon, 1855 – Слизень испанский. Две находки сделаны в черте Уфы: ул. Набережная реки Уфы (2020 г.) и на ул. Менделеева (2025 г.). Инвазивный вид.

Семейство Boettgerillidae

Род *Boettgerilla* Simroth, 1910

? *Boettgerilla pallens* Simroth, 1910 – Слизень бледный. Единичные находки на территории Уфы (2025).

Семейство Camaenidae

Род *Fruticicola* Held, 1838

970. *Fruticicola fruticum* (O.F. Müller, 1774) – Улитка кустарниковая. Влажные и затенённые места широколиственных и смешанных лесов. Повсеместно.

Семейство Clausiliidae

Род Cochlodina A. Férussac, 1821

971. *Cochlodina laminata* (Montagu, 1803) – Кохлодина ламината. Широколиственные и смешанные леса. Иглн, Нурм, Ишмб, Уфмс, Блвщ, Чекм и Бклн.

Семейство Discidae

Род *Discus* Fitzinger, 1833

972. *Discus ruderatus* (Férussac, 1821) – Улитка обыкновенная, дисковая. Широколиственные и смешанные леса, в лиственной подстилке. Повсеместно.

Семейство Euconulidae

Род *Euconulus* Reinhardt, 1883

973. *Euconulus fulvus* (O.F. Müller, 1774) – Эуконулус жёлтый. Широколиственные и смешанные леса, в лиственной подстилке. Повсеместно.

Семейство Gastrodontidae

Род *Aegopinella* Lindholm, 1927

974. *Aegopinella pura* (Alder, 1830) – Агопинелла прозрачная. В лиственной подстилке пойменных лесов. Повсеместно.

Род *Perpolita* H.B. Baker, 1928

975. *Perpolita hammonis* (Ström, 1765) – Петролита хамонис. Широколиственные и смешанные леса, в лиственной подстилке, среди травы. Повсеместно.
976. *Perpolita petronella* (L. Pfeiffer, 1853) – Петролита петронела. Широколиственные и смешанные леса, в лиственной подстилке; на влажных лугах среди травы. Повсеместно.

Род *Zonitoides* Lehmann, 1862

977. *Zonitoides nitidus* (O.F. Müller, 1774) – Зонитоидес блестящий. Влажные луга, лиственная подстилка широколиственных и смешанных лесов. Повсеместно.

Семейство Helicidae

Род *Helix* Linnaeus, 1758

? *Helix albescens* Rossmässler, 1839 – Улитка южная. Открытые биотопы, кустарниковые заросли, опушки леса. Немногочисленные находки в Туйм (оз. Кандрыкуль), на территории и около Уфы. Инвазивный вид.

? *Helix lucorum* Linnaeus, 1758 – Улитка турецкая, или горная. В широколиственных лесах и на открытых пространствах. Уфмс, Иглн, Чишм, и на территории Уфы. Инвазивный вид.

? *Helix pomatia* Linnaeus, 1758 – Улитка виноградная. Влажные и тенистые места среди кустарников, в лесу, на живых изгородях. Единичные находки в Бурв и Давл. Инвазивный вид.

Род *Cepaea* Held, 1838

? *Cepaea hortensis* (O.F. Müller, 1774) – Цепея садовая. Единственная находка сделана в Крмс 2020. Инвазивный вид.

? *Cepaea nemoralis* (Linnaeus, 1758) – Цепея лесная. Среди кустарников, на опушках леса, в садах и парках. Единичные находки на территории Октябрьского и Уфы. Инвазивный вид.

Род *Arianta* W. Turton, 1831

? *Arianta arbustorum* (Linnaeus, 1758) – Улитка древесная. Единственная находка сделана на территории Уфы (2024 г.). Инвазивный вид.

Род *Caucasotachea* C.R. Boettger, 1909

? *Caucasotachea vindobonensis* (C. Pfeiffer, 1828) – Улитка австрийская. Среди кустарников на хорошо прогреваемых склонах. Туйм, Октябрьский, Уфа. Инвазивный вид.

Семейство Hygromiidae

Род *Pseudotrichia* Schileyko, 1970

978. *Pseudotrichia rubiginosa* (Rossmassler, 1838) – Псевдотрихия ржавая. Широколиственные и смешанные леса, в оврагах и на склонах, по берегам водоёмов. Повсеместно.

Род *Trochulus* Chemnitz, 1786

? *Trochulus hispidus* (Linnaeus, 1758) – Улитка волосатая. Единичные находки сделаны на территории Уфы, Уфмс и Блкт.

Род *Euomphalia* Westerlund, 1889

979. *Euomphalia strigella* (Draparnaud, 1801) – Эуомфалия стригелла. Широколиственные и смешанные леса, по берегам водоёмов; в сухих местах среди кустарников и в посадках, на склонах оврагов. Повсеместно.

Семейство Limacidae

Род *Limax* Linnaeus, 1758

? *Limax cinereoniger* Wolf, 1803 – Слизень чёрный. Единственная находка около санатория Янгантау, Слвт (2025).

? *Limax maximus* Linnaeus, 1758 – Слизень большой. Единичные находки на территории Уфы (2024 г.) и Белебее (2025 г.). Инвазивный вид.

Род *Limacus* Lehmann, 1864

? *Limacus flavus* (Linnaeus, 1758) – Слизень рыжий. Две находки сделаны на территории Уфы (2024 и 2025).

Семейство Oxychilidae

Род *Oxychilus* Fitzinger, 1833

980. *Oxychilus alliarius* (J. S. Miller, 1822) – Улитка чесночная. Широколиственные леса, в лиственной подстилке. Единичные находки на территории Уфы 2024.

Семейство Punctidae

Род *Punctum* E.S. Morse, 1864

981. *Punctum pygmaeum* (Draparnaud, 1801) – Пунктум маленький. Широколиственные и смешанные леса, на лугах и в оврагах. Повсеместно.

Семейство Urocyclidae

Род *Polytoxon* Simroth, 1897

? *Polytoxon robustum* (Simroth, 1897) – Единственная находка Уфмс 2025.

Семейство Vitrinidae

Род *Vitrina* Draparnaud, 1801

982. *Vitrina pellucida* (O.F. Müller, 1774) – Витрина прозрачная. Широколиственные и смешанные леса; сухие биотопы среди травы. Повсеместно.

Класс Bivalvia – Двустворчатые моллюски

Подкласс Autobranchia

Отряд Unionida

Семейство Unionidae

Род *Anodonta* Lamarck, 1799

983. *Anodonta anatina* (Linnaeus 1758) – Беззубка утиная. В реках Белая, Уршак, Дёма, Уфа; озёра Кызылга, Ушкар и Каракуль.

984. *Anodonta cygnea* (Linnaeus, 1758) – Беззубка обыкновенная. В озёрах и реках. Повсеместно.

Род *Pseudanodonta* Bourguignat, 1877

985. *Pseudanodonta complanata* (Rossmässler, 1835) – Беззубка узкая. В озёрах Ургун, Деревенское и др.; в заводях рек Белая и Уфа.

Род *Unio* Philipsson, 1788

986. *Unio crassus* Philipson, 1788 – Перловица толстая. На гравийном или каменистом грунте небольших рек с сильным течением. Повсеместно.

987. *Unio pictorum* (Linnaeus, 1758) – Перловица обыкновенная. Реки и пойменные озёра. Повсеместно.

Unio pictorum rostratus Lamarck, 1819 – Перловица клювовидная. В реках Белая и Дема, в озёрах Кызылга, Ушкар, Каракуль и др.

988. *Unio tumidus* Philipson, 1788 – Перловица вздутая. В прибрежной зоне рек. Повсеместно.

Отряд Sphaeriida

Семейство Sphaeriidae

Род *Euglesa* Jenyns, 1832

989. *Euglesa casertana* (Poli, 1791) – Горошинка болотная. Пойменные водоёмы р. Саргая (БГПЗ), пойменные водоёмы р. Белой (Уфмс), оз. Карагайлы, Б. Учалы, Ургун, найден в болоте в окрестностях с. Учалы (Учлн).
990. *Euglesa henslowana* (Sheppard, 1823) – Горошинка озёрная. Бельская старица р. Белой; оз. Калкан (Учлн).
991. *Euglesa nitidum* Jenyns, 1832 – Горошинка блестящая. Оз. Бол. Учалы (Учлн); пойменные водоёмы р. Белой (Уфмс).
992. *Euglesa obtusalis* (Lamarck, 1818) – Горошинка тупая. Болото около оз. Карагайлы (Учлн).
993. *Euglesa personata* (Malm, 1855) – Горошинка крошечная. Пойменные водоёмы р. Белой (Уфмс).
994. *Euglesa ponderosa* (Stelfox, 1918) – Горошинка массивная. Оз. Кандрыкуль, Туйм.
995. *Euglesa pulchella* Jenyns, 1832 – Горошинка красивая. Заболоченный луг около оз. Карагайлы (Учлн), оз. Архимандритское около Уфа (Уфмс), пойменные водоёмы р. Белой (Уфмс).
996. *Euglesa supina* (A. Schmidt, 1851) – Горошинка островерхушечная. Река Белая и её пойменные озёра, пойменные водоёмы р. Белой (Уфмс); пойменные озёра реки Дёмы; Павловское вдхр.

Род *Pisidium* C. Pfeiffer, 1821

997. *Pisidium amnicum* (O.F. Müller, 1774) – Горошинка речная. В реках на илистом дне, в пойменных водоёмах и озёрах. Повсеместно.

Род *Sphaerium* Scopoli, 1777

998. *Sphaerium corneum* (Linnaeus, 1758) – Шаровка роговая. Озёра, пруды, заросшие участки водоёмов. Повсеместно.
999. *Sphaerium lacustre* (O.F. Muller, 1774) – Шаровка болотная. Пойменные водоёмы рек Демы (окрестности Уфы) и Белой (Уфмс и Крмс); в речке Ушача (Бклн).
1000. *Sphaerium nitidum* Clessin, 1876 – Шаровка блестящая. Озёра поймы реки Урал; оз. Карагайлы (Учлн), Бол. Толпак и др.; речки Узян и Саргая (БГПЗ), пойменные водоёмы р. Белой (Уфмс).
1001. *Sphaerium nucleus* (Studer, 1820) – Шаровка твёрдая. Река Белая в окрестностях Уфы.
1002. *Sphaerium rivicola* (Lamarck, 1818) – Шаровка речная. Пойменные озёра и реки. Повсеместно.
1003. *Sphaerium solidum* (Normand, 1844) – Шаровка массивная. Обитает только в реках Белой и Шалтык (Шарн).

Отряд Myida

Семейство Dreissenidae

Род *Dreissena* van Beneden, 1835

1004. *Dreissena polymorpha* (Pallas, 1771) – Дрейссена речная. В реках Белая, Уфа и их пойменных озёрах; Павловское вдхр. Уфмс, Нурм, Туйм.

Ecdysozoa – Линяющие

Тип Nematoda – Круглые черви

Класс Chromadorea

Отряд Aphelenchida

Семейство Aphelenchidae

(фитогельминты неспецифического патогенного эффекта)

1005. *Aphelenchus avenae* Bastian, 1865
1006. *Paraphelenchus pseudoparietinus* (Micoletzky, 1922)
1007. *Paraphelenchus tritici* Baranovskaya, 1958

Семейство Aphelenchoididae

(фитогельминты неспецифического патогенного эффекта)

1008. *Aphelenchoides asterocaudatus* Das, 1960
1009. *Aphelenchoides bicaudatus* (Imamura, 1931)
1010. *Aphelenchoides composticola* Franklin, 1957
1011. *Aphelenchoides dactylocercus* Hooper, 1958
1012. *Aphelenchoides helophilus* (de Man, 1880)
1013. *Aphelenchoides macronucleatus* Baranovskaya, 1963
1014. *Aphelenchoides parietinus* (Bastian, 1865)
1015. *Aphelenchoides subtenuis* (Cobb, 1926)
1016. *Seinura diversa* (Paesler, 1957)
1017. *Seinura tenuicaudata* (de Man, 1895)
1018. *Seinura winchesi* (Goodey, 1927)

Отряд Chromadorida

Семейство Ethmolaimidae

1019. *Ethmolaimus pratensis* de Man, 1880 – параризобионт

Отряд Monhysterida

Семейство Monhysteridae

(параризобионты)

1020. *Eumonhystera dispar* (Bastian, 1865)
1021. *Eumonhystera filiformis* (Bastian, 1865)
1022. *Eumonhystera vulgaris* (de Man, 1880)
1023. *Geomonhystera villosa* (Butschlii, 1873)

Отряд Plectida

Семейство Plectidae

1024. *Anaplectus granulosus* (Bastian, 1865)
1025. *Plectus assimilis* Bütschlii, 1873

1026. *Plectus cirratus* Bastian, 1865
1027. *Plectus longicaudatus* Bütschli, 1873
1028. *Plectus parietinus* Bastian, 1865
1029. *Plectus parvus* Bastian, 1865
1030. *Plectus rhizophilus* de Man, 1880
1031. *Wilsonema otophorum* (de Man, 1880) – параризобионт

Отряд Rhabditida

Подотряд Rhabditina

Семейство Cephalobidae

(девисапробионты)
1032. *Acrobeles ciliatus* von Linstow, 1877
1033. *Acrobeloides buetschlii* (de Man, 1884)
1034. *Acrobeloides nanus* (de Man, 1880)
1035. *Acrobeloides thornei* Brzeski, 1962
1036. *Acrobeloides tricornis* (Thorne, 1925)
1037. *Acrolobus emarginatus* (de Man, 1880)
1038. *Cephalobus longicaudatus* Bütschli, 1873
1039. *Cephalobus persegnis* Bastian, 1865
1040. *Cervidellus vexilliger* (de Man, 1880)
1041. *Chiloplacus lentus* (Maupas, 1900)
1042. *Chiloplacus symmetricus* (Thorne, 1925)
1043. *Eucephalobus oxyuroides* (de Man, 1876)
1044. *Eucephalobus paracornutus* de Coninck, 1943
1045. *Eucephalobus striatus* (Bastian, 1865)
1046. *Heterocephalobus elongatus* (de Man, 1880)
1047. *Stegelletina devimucronata* (Sumenkova, 1964)
1048. *Stegelletina insubrica* (Steiner, 1914)

Семейство Diplogastridae

1049. *Pristionchus lheritieri* (Maupas, 1919)

Семейство Panagrolaimidae

1050. *Panagrolaimus rigidus* (Schneider, 1866) – девисапробионт

Семейство Philometridae

1051. *Philometra ovata* (Zeder, 1803) – сиг оз.Банное 2004 (Дьяченко и др., 2006)

Семейство Rhabdiasidae

1052. *Entomelas entomelas* (Dujardin, 1845) – веретеница
1053. *Rhabdias bufonis* (Schrank, 1788) – остромордая, озерная лягушки, жерлянка, чесночница, зеленая и серая жабы
1054. *Rhabdias fuscovenosa* (Railliet, 1899) – обыкн. уж

Семейство Rhabditidae

1055. *Mesorhabditis microbursaris* (Steiner, 1926)
1056. *Mesorhabditis monhystera* (Butschli, 1873)
1057. *Poikilolaimus oxycercus* (de Man, 1895)

1058. *Rhabditis terricola* Dujardin, 1844 – в аэротенках

Семейство Srongyloididae

1059. *Strongyloides akbari* Mirza & Narayan, 1935 – обыкновенная бурозубка
1060. *Strongyloides papillosus* (Wedl, 1856) – овца, коза
1061. *Strongyloides ransomi* Schwartz & Alicata, 1930 – лошадь
1062. *Strongyloides stercoralis* (Bavay, 1876) – человек
1063. *Strongyloides westeri* Ihle, 1917 – лошадь

Подотряд Strongylina

Семейство Amidostomidae

1064. *Amidostomum acutum* (Lundahl, 1848) – дом. и дикие утки
1065. *Amidostomum anseris* (Zeder, 1800) – дом. утка и гусь

Семейство Ancylostomatidae

1066. *Ancylostoma caninum* (Ercolani, 1859) – собака
1067. *Ancylostoma duodenale* (Dubini, 1843) – человек
1068. *Bunostomum trigonocephalum* (Rudolphi, 1808) – корова, овца, коза
1069. *Uncinaria stenocephala* (Railliet, 1884) – собака, лисица

Семейство Heligmosomidae

1070. *Heligmosomum sp.* – водяная полевка
1071. *Longistriata depressa* (Dujardin, 1845) – обыкн. бурозубка
1072. *Longistriata didas* Thomas, 1953 – обыкн. бурозубка

Семейство Metastrongylidae

1073. *Angiostrongylus vasorum* (Baillet, 1866) – лисица
1074. *Crenosoma vulpis* (Dujardin, 1844) – лисица
1075. *Dictyocaulus arnfieldi* (Cobbold, 1884) – лошадь
1076. *Dictyocaulus filaria* (Rudolphi, 1809) – овца, коза
1077. *Dictyocaulus viviparus* (Bloch, 1782) – корова
1078. *Metastrongylus elongatus* (Dujardin, 1845) – свинья
1079. *Metastrongylus pudendotectus* Wostokow, 1905– свинья
1080. *Metastrongylus salmi* Gedoelst, 1923 – свинья
1081. *Muellerius capillaris* (Müller, 1889) – овца, коза
1082. *Paracrenosoma skrjabini* (Pologentzev, 1935) – обыкн. землеройка
1083. *Protostrongylus kamenskyi* Schulz, 1930 – заяц-беляк, мыши, крысы (легкие)
1084. *Protostrongylus rufescens* (Leuckart, 1865) – овца, коза
1085. *Protostrongylus terminalis* (Passerini, 1884) – заяц, мыши, крысы (серозные покровы, печень)
1086. *Protostrongylus sp.* – заяц

Семейство Molineidae

1087. *Nematodirella longissimepiculata* (Romanovich, 1915) – овца, коза
1088. *Nematodirus abnormalis* May, 1920 – овца, коза
1089. *Nematodirus filicollis* (Rudolphi, 1802) – овца, коза
1090. *Nematodirus helvetianus* May, 1920 – корова, овца, коза
1091. *Nematodirus oiratianus* Rajewskaja, 1929 – овца, коза

1092. *Nematodirus spathiger* (Railliet, 1896) – корова, овца, коза, лось
1093. *Oswaldocruzia filiformis* (Goeze, 1782) – остромордая, озерная, прудовая лягушки, зеленая жаба, обыкн. уж

Семейство Strongylidae

1094. *Chabertia ovina* (Fabricius, 1788) – корова, овца
1095. *Coronocyclus coronatus* (Looss, 1900) – лошадь
1096. *Coronocyclus labiatus* (Looss, 1902) – лошадь
1097. *Coronocyclus labriatus* (Looss, 1900) – лошадь
1098. *Coronocyclus sagittatus* (Kotlan, 1920) – лошадь
1099. *Cyathostomum alveatum* Looss, 1900 – лошадь
1100. *Cyathostomum pateratum* (Yorke & Macfie, 1919) – лошадь
1101. *Cyathostomum tetracanthum* (Mehlis, 1831) – лошадь
1102. *Cylicocyclus auriculatus* (Looss, 1900) – лошадь
1103. *Cylicocyclus brevicapsulatus* (Ihle, 1920) – лошадь
1104. *Cylicocyclus elongatus* (Looss, 1900) – лошадь
1105. *Cylicocyclus leptostomum* (Kotlan, 1920) – лошадь
1106. *Cylicocyclus nassatus* (Looss, 1900) – лошадь
1107. *Cylicocyclus radiatus* (Looss, 1900) – лошадь
1108. *Cylicocyclus ultrajectinus* (Ihle, 1920) – лошадь
1109. *Cylicodontophorus bicoronatus* (Looss, 1900) – лошадь
1110. *Cylicostephanus calicatus* (Looss, 1900) – лошадь
1111. *Cylicostephanus goldi* (Boulenger, 1917) – лошадь
1112. *Cylicostephanus hybridus* (Kotan, 1920) – лошадь
1113. *Cylicostephanus longibursatus* (Yorke & Macfie, 1918) – лошадь
1114. *Cylicostephanus minutus* (Yorke & Macfie, 1918) – лошадь
1115. *Oesophagostomum columbianum* Curtice, 1890 – овца, коза
1116. *Oesophagostomum dentatum* (Rudolphi, 1803) – свиньи
1117. *Oesophagostomum venulosum* Rudolphi, 1809 – корова, овца, коза
1118. *Parapoteriostomum euproctus* (Boulenger, 1917) – лошадь
1119. *Petrovinema catinatum* (Looss, 1900) – лошадь
1120. *Petrovinema poculatum* (Looss, 1900) – лошадь
1121. *Poteriostomum ratzii* (Kotlan, 1919) – лошадь
1122. *Strongylus edentatus* (Looss, 1900) – лошадь
1123. *Strongylus equinus* Muller, 1780 – лошадь
1124. *Strongylus vulgaris* (Looss, 1900) – лошадь
1125. *Triodontophorus brevicauda* Boulenger, 1916 – лошадь
1126. *Triodontophorus serratus* (Looss, 1900) – лошадь

Семейство Trichostrongylidae

1127. *Cooperia curticei* (Giles, 1892) – овца, коза
1128. *Cooperia oncophora* (Railliet, 1898) – корова
1129. *Cooperia punctata* (Linstow, 1906) – овца, коза
1130. *Epomidiostomum uncinatum* (Lundahl, 1848) – кряква, чирки
1131. *Haemonchus contortus* (Rudolphi, 1803) – корова, овца, коза

1132. *Marschallagia marschalli* (Ransom, 1907) – овца, коза
1133. *Obeliscoides sp.* – заяц
1134. *Ostertagia dahurica* Orloff, Belova & Gnedina, 1931 – овца, коза
1135. *Ostertagia orloffi* Sankin, 1930 – овца, коза
1136. *Ostertagia ostertagi* (Stiles, 1892) – корова, овца, коза
1137. *Teladorsagia circumcincta* (Stadelman, 1894) – корова, овца, коза, степной сурок
1138. *Teladorsagia trifurcata* (Ransom, 1907) – корова, овца, коза
1139. *Trichostrongylus axei* (Cobbold, 1879) – корова, овца, коза
1140. *Trichostrongylus colubriformis* (Giles, 1892) – лошадь, корова, овца, коза, степной сурок
1141. *Trichostrongylus probolurus* (Railliet, 1896) – овца, коза
1142. *Trichostrongylus retortaeformis* (Zeder, 1800) – заяц-беляк, заяц-русак
1143. *Trichostrongylus skrjabini* Kalantarian, 1928 – овца, коза
1144. *Trichostrongylus sp.* – человек

Подотряд Ascaridina – Аскариды

Семейство Anisakidae

1145. *Contracaecum rudolphi* Hartwich, 1964 – красноголовый нырок, большая, черношейная и красношейная поганки, чайка обыкн., стрекозы *E.najas, A.juncea, A. imperator*

Семейство Ascarididae

1146. *Ascaris lumbricoides* Linnaeus, 1758 – человек
1147. *Ascaris suum* Goeze, 1782 – свинья
1148. *Baylisascaris transfuga* (Rudolphi, 1819) – медведь
1149. *Parascaris equorum* (Goeze, 1782) – лошадь
1150. *Porrocaecum crassum* (Deslongchamps, 1824) – хохлатая чернеть
1151. *Porrocaecum depressum* (Zeder, 1800) – вальдшнеп, степной лунь
1152. *Porrocaecum ensicaudatum* (Zeder, 1800) – чибис, дрозд-рябинник
1153. *Porrocaecum sp.* (larv.) – обыкн. бурозубка
1154. *Toxascaris leonina* (Linstow, 1902) – собака, лисица, кошка
1155. *Toxocara canis* (Werner, 1782) – собака, лисица
1156. *Toxocara mystax* (Zeder, 1800) – кошка

Семейство Ascaridiidae

1157. *Ascaridia compar* (Schrank, 1790) – тетерев
1158. *Ascaridia cylindrica* (Blome, 1909) – глухарь
1159. *Ascaridia dissimilis* Vigueras, 1931 – индейка
1160. *Ascaridia galli* (Schrank, 1788) – курица, индейка, цесарка, утка

Семейство Cosmocercidae

1161. *Aplectana acuminata* (Schrank, 1788) – зеленая жаба, остромордая лягушка, чесночница
1162. *Cosmocerca commutata* (Diesing, 1851) – зеленая жаба, остромордая лягушка

1163. *Cosmocerca ornata* (Dujardin, 1845) – у прудовой лягушки, Салават (Зарипова, 2012)
1164. *Oxysomatium brevicaudatum* (Zeder, 1800) – озерная, остромордая лягушки, серая и зеленая жабы, чесночница, веретеница

Семейство Heterakidae

1165. *Heterakis dispar* (Schrank, 1790) – дом. гусь и утка
1166. *Heterakis gallinarum* (Schrank, 1788) – курица, индейка, цесарка, дом. утка
1167. *Heterakis spumosa* Schneider, 1866 – крысы

Семейство Raphidascarididae

1168. *Raphidascaris acus* (Bloch, 1779) – окунь, судак, ерш, налим, сиг-лудога, лещ, уклейка, золотой карась, пескарь, елец, голец, голавль, плотва, жерех, линь, язь, красноперка, пелядь; у *Habrophlebia lauta* (larv.)

Подотряд Oxyurina

Семейство Heteroxynematidae

1169. *Aspiculuris tetraptera* Nitzsch, 1821 – мыши и крысы

Семейство Oxyuridae

1170. *Enterobius vermicularis* (Linnaeus, 1758) – человек
1171. *Oxyuris equi* (Schrank, 1788) – лошадь
1172. *Passalurus ambiguous* (Rudolphi, 1819) – мыши, крысы, кролик
1173. *Syphacia obvelata* (Rudolphi, 1802) – лесная мышь, обыкн. полевка, крыса

Семейство Pharyngodonidae

1174. *Spauligodon lacertae* Sharpilo, 1966 – прыткая ящерица

Семейство Thelastomatidae

1175. *Blatticola blattae* (Graeffe, 1860) – черный таракан

Подотряд Tylenchina

Семейство Allantonematidae

1176. *Bradynema strasseni* Wulker, 1923 – у личинок жуков рода Rhagium

Семейство Anguinidae

1177. *Ditylenchus destructor* Thorne, 1945 – Стеблевая нематода картофеля
1178. *Ditylenchus dipsaci* (Kühn, 1857) – Стеблевая нематода лука
1179. *Ditylenchus intermedius* (de Man, 1880)
1180. *Nothotylenchus acris* Thorne, 1941

Семейство Criconematidae

1181. *Criconema sp.*

Семейство Dolichodoridae

(фитогельминты специфического патогенного эффекта)

1182. *Geocenamus bogdanovikatjkovi* (Kirjanova, 1941)
1183. *Geocenamus lenorus* (Brown, 1956)
1184. *Tylenchorhynchus cylindricus* Cobb, 1913
1185. *Tylenchorhynchus dubius* (Bütschlii, 1873)
1186. *Tylenchorhynchus ewingi* Hopper, 1959
1187. *Tylenchorhynchus nudus* Allen, 1955

Семейство Heteroderidae

1188. *Heterodera avenae* Wollenweber, 1924 – Овсяная нематода

Семейство Hoplolaimidae

1189. *Helicotylenchus multicinctus* (Cobb, 1893)
1190. *Rotylenchus robustus* (de Man, 1876)

Семейство Pratylenchidae

1191. *Pratylenchus pratensis* (de Man, 1880)

Семейство Tylenchidae

(фитогельминты специфического патогенного эффекта)

1192. *Aglenchus agricola* (de Man, 1884)
1193. *Coslenchus costatus* (de Man, 1921)
1194. *Filenchus filiformis* (Butschli, 1873)
1195. *Filenchus polyhypnus* (Steiner & Albin, 1946)
1196. *Lelenchus leptosoma* (de Man, 1880)
1197. *Paratylenchus hamatus* Thorne & Allen, 1950
1198. *Tylenchus davainei* Bastian, 1865

Подотряд Spirurina

Семейство Acuariidae

1199. *Acuaria anthuris* (Rudolphi, 1819) – серая ворона, грач
1200. *Acuaria gracilis* (Gendre, 1912) – сорока
1201. *Cosmocephalus obvelatus* (Creplin, 1825) – чайки, крачки, поганки, кулики
1202. *Dispharynx laplantei* Seurat, 1919– ястреб-перепелятник
1203. *Echinuria uncinata* (Rudolphi, 1819) – дом. утка, кряква, чирок-трескунок
1204. *Streptocara crassicauda* (Creplin, 1829) – дом. утка, большая и черношейная поганки, чайка малая; золотой карась, линь
1205. *Synhimantus sp.* – пустельга, ястреб-перепелятник

Семейство Camallanidae

1206. *Camallanus lacustris* (Zoega, 1776) – голавль, пескарь, окунь, ерш, щука, налим
1207. *Camallanus truncatus* (Rudolphi, 1814) – судак

Семейство Desmidocercidae

1208. *Desmidocercella numidica* (Seurat, 1920) – в глазах окуня (оз. Толпак)

Семейство Diplotriaenidae

1209. *Diplotriaena isabellina* Koroliova, 1926 – серая ворона, чекан
1210. *Diplotriaena tricuspis* (Fedtschenko, 1874) – дрозд-рябинник

Семейство Filariidae

1211. *Parafilaria multipapillosa* (Condamine & Drouilly, 1878) – лошадь

Семейство Gnathostomatidae

1212. *Spiroxys contortus* (Rudolphi, 1819) – прыткая ящерица (ротовая полость)

Семейство Gongylonematidae

1213. *Gongylonema sp.* (larv.) – обыкн. бурозубка

Семейство Habronematidae

1214. *Cyrnea semilunaris* (Molin, 1860) – грач
1215. *Cyrnea seurati* (Skrjabin, 1917) – обыкн. пустельга, степной лунь, ястреб-перепелятник
1216. *Draschia megastoma* (Rudolphi, 1819) – лошадь
1217. *Habronema microstoma* (Schneider, 1866) – лошадь

Семейство Onchocercidae

1218. *Onchocerca cervicalis* Railliet & Henry, 1910 – лошадь
1219. *Onchocerca lienalis* (Stiles, 1892) – корова
1220. *Onchocerca reticulata* Diesing, 1841 – лошадь
1221. *Pelecitus fulicaeatrae* (Diesing, 1861) – малый погоныш, лысуха
1222. *Setaria equina* (Abildgaard, 1789) – лошадь
1223. *Setaria labiatopapillosa* (Alessandrini, 1838) – корова

Семейство Physalopteridae

1224. *Physaloptera alata* Rudolphi, 1819 – канюк
1225. *Physaloptera clausa* (Rudolphi, 1819) – еж; прыткая ящерица
1226. *Physaloptera sibirica* Petrov & Gorbunov, 1931– лисица
1227. *Physaloptera vigisiana* Ajupov, 1951 – курица

Семейство Rhabdochonidae

1228. *Rhabdochona denudata* (Dujardin, 1845) – лещ, уклейка, елец, гольян, плотва

Семейство Spirocercidae

1229. *Ascarops strongylina* (Rudolphi, 1819) – свинья
1230. *Mastophorus muris* (Gmelin, 1790) – крысы
1231. *Spirocerca lupi* (Rudolphi, 1809) – собака

Семейство Teratocephalidae

1232. *Teratocephalus terrestris* (Bütschli, 1873)

Семейство Tetrameridae

1233. *Tetrameres fissispina* (Diesing, 1861) – дом. утка, кряква, чирок-свистунок, красноголовый нырок, лысуха, черношейная поганка
1234. *Tetrameres sp.* – лесной конек, степной лунь

Семейство Thelaziidae

1235. *Oxyspirura sygmoidea* (Molin, 1860) – галка, сорока
1236. *Thelazia gulosa* Railliet & Henry, 1910 – корова
1237. *Thelazia lacrymalis* (Gurlt, 1831) – лошадь
1238. *Thelazia rhodesi* (Desmarest, 1827) – корова

Класс Enoplea

Отряд Dioctophymatida

Семейство Dioctophymatidae

1239. *Eustrongylides mergorum* (Rudolphi, 1809) – чирок-свистунок (приносный)
1240. *Hystrichis tricolor* Dujardin, 1845 – шилохвость (приносный)

Семейство Trichuridae

1241. *Pearsonema plica* (Rudolphi, 1819) – лисица

1242. *Trichocephalus ovis* Abildgaard, 1795 – корова, овца, коза, лось
1243. *Trichuris muris* (Schrank, 1788) – обыкн. и водяная полевки
1244. *Trichuris skrjabini* Baskakov, 1924 – овца, коза
1245. *Trichuris suis* (Schrank, 1788) – свинья
1246. *Trichuris trichiura* (Linnaeus, 1771) – человек
1247. *Trichuris vulpis* (Frölich, 1789) – у собак Уфы (Валишин, Ватников, 2018)

Отряд Dorylaimida

(параризобионты)

Семейство Aporcelaimidae

1248. *Aporcelaimellus obtusicaudatus* (Bastian, 1865)
1249. *Aporcelaimellus tritici* (Bastian, 1865)

Семейство Dorylaimidae

1250. *Mesodorylaimus bastiani* (Butschli, 1873)
1251. *Mesodorylaimus centrocercus* (de Man, 1880)
1252. *Mesodorylaimus mesonyctius* (Kreis, 1930)

Семейство Longidoridae

1253. *Xiphinema sp.*

Семейство Qudsianematidae

1254. *Discolaimus major* Thorne, 1939
1255. *Dorydorella pratensis* (de Man, 1880)
1256. *Eudorylaimus acuticauda* (de Man, 1880)
1257. *Thonus ettersbergensis* (de Man, 1885)

Семейство Tylencholaimellidae

(параризобионты)

1258. *Tylencholaimellus coronatus* Thorne, 1939
1259. *Tylencholaimellus rotundoconicus* Kmuzova, 1966

Отряд Enoplida

Семейство Alaimidae

1260. *Alaimus primitivus* de Man, 1880

Отряд Mermithida

Семейство Mermitidae – Мерметиды

1261. *Amphibiomermis kirjanovae* Pologenzev & Artyukhovsky, 1958
1262. *Amphimermis elegans* (Hagmeier, 1912)
1263. *Amphimermis lagidzae* Rubzov, 1975
1264. *Camponotimermis bifidus* Ipat'eva, Pimenova & Mukhamedzyanova, 1980
1265. *Gastromermis euvaginata* (Steiner, 1926) – РБ (Киселев, Шапкин, 1984)
1266. *Hexamermis albicans* (von Siebold, 1848)
1267. *Hexamermis brevis* (Hagmeier, 1912)
1268. *Hexamermis pratensis* Polozhentsev, Artyukhovsky & Kharchenko, 1965
1269. *Hexamermis pusilla* Rubzov & Koval, 1975
1270. *Ipatjevimermis macroamphidis* Mukhamedzyanova, 1980

1271. *Limnomermis potamophila* Steiner, 1929 – РБ (Киселев, Шапкин, 1984)
1272. *Oesophagomermis brevivaginata* Artyukhovsky & Kharchenko, 1971
1273. *Oesophagomermis coriacea* Rubtzov, 1972
1274. *Oesophagomermis terricola* (Hagmeier, 1912)
1275. *Psammomermis korsakovi* Polozhentsev, 1941
1276. *Psammomermis tiliae* Rubzov, 1972
1277. *Schuurmanimermis baschkiriensis* Ipat'eva & Mukhamedzyanova, 1980
1278. *Skrjabinomermis apiculiformes* Rubzov, 1972
1279. *Skrjabinomermis latidens* Rubzov, 1972

Отряд Mononchida

Семейство Mononchidae

1280. *Clarkus papillatus* (Bastian, 1865)
1281. *Coomansus parvus* (de Man, 1880)
1282. *Paramononchus alimovi* (Tsalolikhin, 1990) – в аэротенках

Семейство Mylonchulidae

1283. *Mylonchulus brachyuris* (Bütschli, 1873)
1284. *Mylonchulus sigmaturus* (Cobb, 1917)

Отряд Trichinellida

Семейство Capillariidae

1285. *Aonchotheca eubursata* (Skarbilovitsch, 1946) – рыжая вечерница
1286. *Aonchotheca petrovi* (Rukhlyadeva, 1946) – обыкн. бурозубка
1287. *Baruscapillaria obsignata* (Madsen, 1945) – курица, индейка
1288. *Capillaria anatis* (Schrank, 1790) – шилохвость, дом. гусь, курица,
1289. *Capillaria contorta* (Creplin, 1839) – дрозд-рябинник
1290. *Capillaria sp. 1* – галка, глухарь, большая и черношейная поганки
1291. *Capillaria sp. 2* – усатый голец
1292. *Eucoleus aerophilus* (Creplin, 1839) – лисица

Семейство Trichinellidae

1293. *Trichinella nativa* Britov & Boev, 1972 – лисица, барсук, медведь, волк, колонок

? Trichinella spiralis (Owen, 1835) – ни у человека, ни у домашних свиней не зарегистрирован; все находки у диких зверей должны быть адресованы (по Шайкенову Б.) к виду *T.nativa*

Семейство Trichosomoididae

1294. *Trichosomoides crassicauda* (Bellingham, 1840) – крысы, мыши (мочевой пузырь)

Отряд Triplonchida

(параризобионты)

Семейство Diphtherophoridae

1295. *Diphtherophora communis* de Man, 1880

Семейство Prismatolaimidae

1296. *Prismatolaimus dolichurus* de Man, 1880

Тип Nematomorpha – Волосатиковые
Класс Gordioida – Волосатики
Отряд Gordea

Семейство Gordiidae

1297. *Gordius aquaticus* Linnaeus, 1758 – Волосатик: имаго в воде, личинки в теле ручейников, жуков, стрекоз и других гидрофильных насекомых.

Тип Tardigrada – Тихоходки
Класс Eutardigrada
Отряд Parachela

Семейство Doryphoribiidae

1298. *Grevenius granulifer* Thulin, 1928

Семейство Hypsibiidae

1299. *Hypsibius dujardini* (Doyere, 1840)

Семейство Murrayidae

1300. *Dactylobiotus sp.* – в аэротенках

Тип Arthropoda
Подтип Chelicerata
Класс Arachnida – Паукообразные
Подкласс Dromopoda
Отряд Pseudoscorpiones – Ложноскорпионы

Семейство Cheliferidae

1301. *Chelifer cancroides* (Linnaeus, 1758) – Книжный ложноскорпион

Семейство Chernetidae

1302. *Allochernes wideri* (C.L. Koch, 1843) – ЗШТ 1988 (Козьминых, 2017в)

Отряд Opiliones Sundevall, 1833 – Сенокосцы (С.Л. Есюнин, В.Е. Ефимик)

Подотряд Dyspnoi Hansen et Sørensen, 1904

Надсемейство Troguloidea Sundevall, 1833

Семейство Nemastomatidae Simon, 1872

1303. *Nemastoma lugubre* (O.F. Müller, 1776). Белб, Блрц (Хабибуллин, 2017б; Есюнин, 2020): леса. Обычен.

Подотряд Eupnoi Hansen et Sørensen, 1904

Надсемейство Phalangioidea Latreille, 1802

Семейство Phalangiidae Latreille, 1802

Подсемейство Oligolophinae Banks, 1893

1304. *Lacinius ephippiatus* (C. L. Koch, 1835). Бурз (Farzalieva, Esyunin, 2020): леса. Обычен.
1305. *Mitopus morio* (Fabricius, 1779). Бурз и Блрц (Farzalieva, Esyunin, 2020; Валуев, 2022а; Михайлов и др., 2025): леса, луга, горные тундры. Обычен.
1306. *Odiellus lendlii* (Sørensen, 1894). Хайб, Октябрьский (Хабибулин, 2025б): степи. Единично.
1307. *Oligolophus tridens* (C.L. Koch, 1836). Бурз (Farzalieva, Esyunin, 2020) и Блрц: леса, луга. Обычен.

Подсемейство Phalangiinae Latreille, 1802

1308. *Phalangium opilio* Linnaeus, 1758. Бурз, Белб и Уфмс (Farzalieva, Esyunin, 2020; Хабибуллин, 2017б; Валуев, 2022а, 2022б; Ефимик, Валуев, 2023): луга, постройки. Обычен.
1309. *Rilaena triangularis* (Herbst, 1799). Блрц (Есюнин, 2020): горная тундра. Единично.

Подсемейство Opilioninae C.L. Koch, 1839

?*Egaenus* sp. Бурз (Farzalieva, Esyunin, 2020; Баянов и др., 2015: как *Egaenus convexus*): скалы. Единично. Принадлежность данного вида к роду *Egaenus* C.L.Koch, 1839 до сих пор не подтверждена.
1310. *Homolophus nordenskioeldi* (L. Koch, 1879). Блрц (Михайлов и др., 2025): горная тундра. Обычен.
1311. *Opilio parietinus* (De Geer, 1778). Бурз (Farzalieva, Esyunin, 2020): скалы. Единично.
1312. *Opilio saxatilis* Koch, 1839. Уфа, Слвт (Хабибулин, 2025б): газоны. Единично.

Подсемейство Platybuninae Staręga, 1976

1313. *Lophopilio palpinalis* (Herbst, 1799). Блрц: горные тундры. Единично.

Семейство Sclerosomatidae Simon, 1879

1314. *Leiobunum gracile* (Thorell, 1876) – Лейобунум стройный. Уфа (Хабибулин, 2025б): стены построек. Редок. Синантропный вид.

Подкласс Micrura

Инфракласс Acari – Клещи

Отряд Ixodida

Семейство Ixodidae

1315. *Dermacentor marginatus* Sulzer, 1776 – Пироплазмозный кожерез (пастбищный клещ). Луга, обычен
1316. *Dermacentor reticulatus* (Fabricius, 1794) – Луговой клещ. Локально
? *Haemaphysalis sp*.
? *Hyalomma sp.*
1317. *Ixodes persulcatus* Schulze, 1930 – Таежный клещ. Леса, обычен
1318. *Ixodes ricinus* (Linnaeus, 1758) – Собачий клещ. Леса, обычен
1319. *Ixodes trianguliceps* Birula, 1895 – Треугольный прицепыш

Отряд Mesostigmata

Семейство Ascidae

1320. *Arctoseius pristinus* Karg, 1962
1321. *Iphidozercon corticalis* Evans, 1958 – пещера Шульган-Таш (Капралов, 2010)

Семейство Dermanyssidae

1322. *Dermanyssus gallinae* (De Geer, 1778) – Куриный клещ
1323. *Dermanyssus hirundinis* (Hermann, 1804) – Птичий клещ (ласточкин)
1324. *Dermanyssus passerinus* Berlese & Trouessart, 1889 – Воробьиный клещ
1325. *Liponyssoides sanguineus* (Hirst, 1914)

Семейство Haemogamasidae

1326. *Eulaelaps stabularis* (C.L. Koch, 1836) – на бурундуке, суслике, крысе, мышах, полевках, летучих мышах

Семейство Halolaelapidae

1327. *Saprolaelaps sp.* – пещера Шульган-Таш (Капралов, 2010)

Семейство Hirstionyssidae

1328. *Hirstionyssus arvicolae* (Zemskaja, 1951) – на водяной крысе
1329. *Hirstionyssus musculi* (Johnston, 1849) – Мышиный клещ
1330. *Hirstionyssus sciurinus* (Hirst, 1921) – на белке
1331. *Hirstionyssus soricis* (Turk, 1945) – на землеройках

Семейство Laelapidae

1332. *Androlaelaps semidesertus* (Bregetova, 1952) – на бурундуке, суслике, крысе, мышах, полевках, летучих мышах
1333. *Echinonyssus talpae* (Zemskaya, 1955) – на кроте
1334. *Haemolaelaps ellobii* Bregetova, 1952 – на бурундуке, суслике, крысе, мышах, полевках, летучих мышах
1335. *Haemolaelaps glasgowi* (Ewing, 1925) – на бурундуке, суслике, крысе, мышах, полевках, летучих мышах
1336. *Hyperlaelaps amphibia* (Zachvatkin, 1948) – на мышевидных
1337. *Hyperlaelaps arvalis* Zachvatkin, 1948 – на мышевидных
1338. *Laelaps agilis* C.L. Koch, 1836 – на мышевидных
1339. *Laelaps muris* (Ljungh, 1799) – на мышевидных
1340. *Laelaps pavlovsky* Zachvatkin, 1948 – на мышевидных
1341. *Myonyssus gigas* (Oudemans, 1912) – на мышевидных

Семейство Macronyssidae

1342. *Macronyssus corethroproctus* (Oudemans, 1902) – на летучих мышах – ЗШТ (Орлова, Орлов, 2013; Летопись…, 2021).
1343. *Macronyssus crosbyi* (Ewing & Stover, 1915) – на летучих мышах – ЗШТ (Орлова, Орлов, 2013; Летопись…, 2021).
1344. *Macronyssus ellipticus* (Kolenati, 1856) – на летучих мышах – ЗШТ (Орлова, Орлов, 2013; Летопись…, 2021).
1345. *Steatonyssus periblepharus* Kolenati 1858 – на летучих мышах – ЗШТ (Орлова, Орлов, 2013; Летопись…, 2021).

Семейство Melicharidae

1346. *Proctolaelaps pygmaeus* (Muller, 1859) – пещера Шульган-Таш (Капралов, 2010)

Семейство Ologamasidae

1347. *Cyrtolaelaps mucronatus* (G. & R. Canestrini, 1881)

1348. *Euryparasitus emarginatus* (C. L. Koch, 1839) – на бурундуке, суслике, крысе, мышах, полевках, летучих мышах

Семейство Pachylaelapidae

1349. *Pachylaelaps longisetis* Halbert, 1915

Семейство Parasitidae

1350. *Haemogamasus ambulans* (Thorell, 1872) – на полевках

1351. *Haemogamasus hirsutosimilis* Willmann, 1952 – на грызунах

1352. *Haemogamasus hirsutus* Berlese, 1889 – на мышевидных

1353. *Haemogamasus horridus* Michael, 1892 – на полевках

1354. *Haemogamasus liponyssoides* Ewing, 1925 – на землеройках, полевках

1355. *Parasitellus fucorum* (De Geer, 1778) – на шмелях в Уфе

1356. *Trachygamasus gracilis* (Karg, 1965) – пещера Шульган-Таш (Капралов, 2010)

1357. *Vulgarogamasus oudemansi* (Berlese, 1904)

1358. *Vulgarogamasus remberti* (Oudemans, 1912)

Семейство Phytoseiidae – Фитосеииды

1359. *Neoseiulus reticulatus* (Oudemans, 1930)

1360. *Phytoseiulus persimilis* Athias-Henriot, 1957 – в оранжереях Уфы

1361. *Typhlodromus tiliae* Oudemans, 1929 – Липовый тифлодромус

Семейство Spinturnicidae

1362. *Spinturnix myoti* (Kolenati, 1856) – на летучих мышах – ЗШТ (Орлова, Орлов, 2013; Летопись…, 2021).

1363. *Spinturnix plecotina* (C.L. Koch, 1839) **–** на буром ушане, прудовой ночнице – пещера Шульган-Таш (Орлова, Орлов, 2013)

Семейство Varroidae

1364. *Varroa destructor* Anderson & Trueman, 2000 – НП «Башкирия»

1365. *Varroa jacobsoni* Oudemans, 1904 – Пчелиный клещ

Семейство Veigaiidae

1366. *Veigaia propinqua* Willmann, 1936 – пещера Шульган-Таш (Капралов, 2010)

1367. *Veigaia sibirica* Bregetova, 1961

Отряд Sarcoptiformes

Семейство Acaridae

1368. *Acarus siro* Lannaeus, 1758 – Мучной клещ (в амбарах и в природе)

1369. *Acotyledon volgini* Zachvatkin, 1941 – Клещ Волгина

1370. *Forcellinia wasmanni* (Moniez, 1892)

1371. *Histiogaster filippovi* Zachvatkin, 1941

1372. *Mycetoglyphus fungivorus* Oudemans, 1932 – только в природе

1373. *Neoacotyledon sokolovi* (Zachvatkin, 1940) – Клещ Соколова (только в природе)
1374. *Rhizoglyphus echinopus* (Fumouze & Robin, 1868) – Луковый корневой клещ
1375. *Sancassania berlesei* (Michael, 1903) – в амбарах и зернохранилищах
1376. *Sancassania chelone* Oudemans, 1916
1377. *Sancassania geotruporum* (Zachvatkin, 1941)
1378. *Sancassania redikorzevi* (Zakhvatkin, 1937) – Клещ Редикорцева
1379. *Schwiebea sp.* – пещера Шульган-Таш (Капралов, 2010)
1380. *Thyreophagus entomophagus* (Laboulbene & Robin, 1862)
1381. *Tyrophagus longior* Gervais, 1844 – только в природе
1382. *Tyrophagus molitor* Zachvatkin, 1941 – синантроп
1383. *Tyrophagus noxius* Zachvatkin, 1935 – Удлиненный клещ (синантроп)
1384. *Tyrophagus perniciosus* Zachvatkin, 1941 – в амбарах и в природе
1385. *Tyrophagus putrescentiae* (Schrank, 1781) – Удлиненный клещ
1386. *Tyrophagus similis* Volgin, 1949

Семейство Achipteriidae

1387. *Achipteria acuta* Berlese, 1908
1388. *Achipteria coleoptrata* (Linnaeus, 1758)

Семейство Alicorhagiidae

1389. *Alicorhagia fragilis* Berlese, 1910

Семейство Analgidae

1390. *Strelkoviacarus quadratus* (Haller, 1882) – на дятлах, полевом воробье

Семейство Astegistidae

1391. *Furcoribula sp*.

Семейство Autognetidae

1392. *Autogneta traegardhi* Forsslund, 1947

Семейство Brachychthoniidae

1393. *Brachychthonius impressus* Moritz, 1976
1394. *Brachychthonius meridionalis* Bernini, 1973
1395. *Liochthonius lapponicus* (Tragardh, 1910)
1396. *Liochthonius muscorum* Forsslund, 1964
1397. *Liochthonius simplex* (Forsslund, 1942)
1398. *Verachthonius laticeps* (Strenzke, 1951)

Семейство Ceratoppiidae

1399. *Ceratoppia bipilis* (Hermann, 1904)

Семейство Ceratozetidae

1400. *Ceratozetella bregetovae* Shaldybina, 1970
1401. *Ceratozetella sellnicki* (Rajski, 1958)
1402. *Ceratozetes mediocris* Berlese, 1908
1403. *Ceratozetes minutissimus* Willmann, 1951
1404. *Fuscozetes sp.*
1405. *Lepidozetes singularis* Berlese, 1910

1406. *Trichoribates incisellus* (Kramer, 1897)
1407. *Trichoribates novus* (Sellnick, 1928)
1408. *Trichoribates punctatus* Shaldybina, 1971

Семейство Cosmochthoniidae

1409. *Cosmochthonius ponticus* Gordeeva, 1980

Семейство Crotoniidae

1410. *Camisia biverrucata* (C. L. Koch, 1839)
1411. *Camisia horrida* (Hermann, 1804)
1412. *Heminothrus peltifer* (C. L. Koch, 1839)

Семейство Ctenacaridae

1413. *Beklemishevia galeodula* Zachvatkin, 1945

Семейство Damaeidae

1414. *Belbodamaeus tuberculatus* Bulanova-Zachvatkina, 1967
1415. *Damaeus onustus* C. L. Koch, 1844
1416. *Epidamaeus sp.*

Семейство Dermationidae

1417. *Passeroptes dermicola* (Trouessart, 1866) – на воробьиных
1418. *Rivoltasia bifurcata* (Rivolta, 1876) – на курах, голубях

Семейство Epidermoptidae

1419. *Knemidokoptes mutans* (Robin & Lanquetin, 1859) – Возбудитель «известковой» ноги кур
1420. *Neocnemidocoptes laevis* (Railliet, 1885) – Возбудитель накожной «чесотки» птиц

Семейство Epilohmanniidae

1421. *Epilohmannia cylindrica* (Berlese, 1904)

Семейство Eremaeidae

1422. *Eueremaeus marshalli* Behan-Pelletier, 1993
1423. *Eueremaeus masinasin* Behan-Pelletier, 1993
1424. *Eueremaeus oblongus* (Koch, 1835)
Eueremaeus oblongus quadrilamellatus (Hammer, 1952)

Семейство Euphthiracaridae

1425. *Acrotritia ardua* (Koch, 1841)

Семейство Galumnidae

1426. *Galumna dimorpha* Krivolutskaja, 1952
1427. *Galumna flagellata* Willmann, 1925
1428. *Galumna lanceata* (Oudemans, 1900)
1429. *Galumna rossica* Sellnick, 1926
1430. *Pergalumna obvia* (Berlese, 1914)

Семейство Glycyphagidae – Волосатые клещи

1431. *Cosmoglyphus redikorzevi* **(**Zachvatkin, 1937) – в амбарах и в природе
1432. *Glycyphagus destructor* (Schrank, 1781) – Волосатый обыкновенный клещ (в амбарах и в природных условиях)

1433. *Glycyphagus domesticus* (De Geer, 1778) – Волосатый домовый клещ (синантроп)
1434. *Glycyphagus michaeli* (Oudemans, 1904) – Волосатый клещ Майкеля (в амбарах и в природных условиях)
1435. *Glycyphagus ornatus* Kramer, 1881 – Волосатый украшенный клещ (в природе)
1436. *Gohieria fusca* (Oudemans, 1902) – РБ (Ганиев и др., 2007)

Семейство Gustaviidae

1437. *Gustavia microcephala* (Nicolet, 1855)

Семейство Gymnodamaeidae

1438. *Gymnodamaeus rotundigranulatus* (Bayartogtokh, 2001)

Семейство Haplozetidae

1439. *Haplozetes vindobonensis* (Willmann, 1935)
1440. *Peloribates europaeus* Willmann, 1935

Семейство Hemileiidae

1441. *Hemileius turanicus* (Krivolutsky, 1966)
1442. *Paraleius leontonycha* (Berlese, 1910)

Семейство Humerobatidae

1443. *Diapterobates humeralis* (Hermann, 1804)

Семейство Liacaridae

1444. *Adoristes ovatus* (C. L. Koch, 1839)
1445. *Dorycranosus moraviacus* (Willmann, 1954)
1446. *Liacarus brevilamellatus* Mihelcic, 1955

Семейство Licneremaeidae

1447. *Licneremaeus prodigiosus* Schuster, 1958

Семейство Licnodamaeidae

1448. *Licnodamaeus fissuratus* (Balogh & Mahunka, 1965)
1449. *Licnodamaeus pulcherrimus* (Paoli, 1908)

Семейство Liebstadiidae

1450. *Liebstadia longior* (Berlese, 1908)
1451. *Liebstadia pannonica pannonica* (Willmann, 1951)
1452. *Liebstadia similis* (Michael, 1888)

Семейство Mochlozetidae

1453. *Podoribates sp.* – пещеры (Турбанов и др., 2016б).

Семейство Nothridae

1454. *Nothrus anauniensis* Canestrini & Fanzago, 1877

Семейство Oppiidae

1455. *Microppia minus* (Paoli, 1908)
1456. *Multioppia laniseta* Moritz, 1966
1457. *Oppia chitinophincta* Kuliev, 1962
1458. *Ramusella insculpta* (Paoli, 1908)

Семейство Oribatellidae

1459. *Oribatella reticulata* Berlese, 1916
1460. *Oribatella semilesuperbula* Weigmann, 2001
1461. *Oribatella superbula. superbula* (Berlese, 1904)

Семейство Oribatulidae

1462. *Oribatula angustolamellata* Iordansky, 1991
1463. *Oribatula exarata* Berlese, 1916
1464. *Oribatula frisiae* (Oudemans, 1900)
1465. *Oribatula tibialis* (Nicolet, 1855)
1466. *Oribatula vulgaris* (Bulanova-Zachvatkina, 1967)

Семейство Phenopelopidae

1467. *Eupelops occultus* (C. L. Koch, 1835)
1468. *Eupelops tardus* (Koch, 1835)
1469. *Eupelops torulosus* (C. L. Koch, 1839)
1470. *Peloptulus gibbus* Michelcic, 1957
1471. *Peloptulus montanus* Hull, 1914
1472. *Peloptulus phaenotus* (C. L. Koch, 1841)
1473. *Propelops canadensis* (Hammer, 1952)

Семейство Pheroliodidae

1474. *Pheroliodes inaequalis* (Balogh & Mahunka, 1965)

Семейство Phthiracaridae

1475. *Phthiracarus compressus* Jacot, 1930

Семейство Punctoribatidae

1476. *Punctoribates ghilarovi* Shaldybina, 1969
1477. *Punctoribates hexagonus* Berlese, 1908
1478. *Punctoribates minimus* Shaldybina, 1969
1479. *Punctoribates punctum* (C. L. Koch, 1839)
1480. *Punctoribates zachvatkini* Shaldybina, 1969

Семейство Protoribatidae

1481. *Protoribates capucinus* Berlese, 1908

Семейство Pseudoppiidae

1482. *Pseudoppia mediocris* (Mihelcic, 1957)

Семейство Scheloribatidae

1483. *Scheloribates fimbriatus* Thor, 1930
1484. *Scheloribates laevigatus* (C. L. Koch, 1835)
1485. *Scheloribates latipes* (C. L. Koch, 1844)
1486. *Topobates humeralis* Subbotina, 1976

Семейство Scutoverticidae

1487. *Exochocepheus laticuspis* (Balogh & Mahunka, 1965)
1488. *Scutovertex sculptus* Michael, 1879

Семейство Sphaerochthoniidae

1489. *Sphaerochthonius splendidus* (Berlese, 1904)

Семейство Syringophilidae

1490. *Syringophilus bipectinatus* Haller, 1880 – Очинный клещ (в стволе маховых и рулевых перьев кур)

Семейство Tectocepheidae

1491. *Tectocepheus alatus* Berlese, 1913
1492. *Tectocepheus velatus* (Michael, 1880)
Tectocepheus velatus sarekensis Tragardh, 1910

Семейство Tegoribatidae

1493. *Tectoribates ornatus* (Schuster, 1958)
1494. *Tegoribates latirostris* (C. L. Koch, 1844)

Семейство Trhypochthoniidae

1495. *Trhypochthonius tectorum* (Berlese, 1896)

Семейство Winterschmidtiidae

1496. *Calvolia elisabethae* Zachvatkin, 1941 – пещера Шульган-Таш (Капралов, 2010)
1497. *Calvolia fusiformis* Zachvatkin, 1941 – на короеде
1498. *Calvolia kamenskii* Zachvatkin, 1941 – Клещ Каменского
1499. *Procalvolia zacheri* (Oudemans, 1929) – на вершинном короеде

Семейство Xenillidae

1500. *Xenillus occultus* Banks, 1947
1501. *Xenillus sculptrus* Kulijev, 1963
1502. *Xenillus tegeocranus* (Hermann, 1804)

Надсемейство Sarcoptoidea – Чесоточные клещи

Семейство Laminosioptidae

1503. *Laminosioptes cysticola* (Vizioli, 1870) – Птичий зудень

Семейство Listrophoridae

1504. *Leporacarus brevicaudatus* (Ullrich, 1938) – на зайцах
1505. *Leporacarus gibbus* (Pagenstecher, 1861) – на кролике
1506. *Metalistrophorus pagenstecheri* (Haller, 1880) – на белке

Семейство Myocoptidae

1507. *Criniscansor criceti* Poppe, 1889 – на обыкн. хомяке
1508. *Myocoptes musculinus* (C. L. Koch, 1844) – на домой мыши
1509. *Trichoecius tenax* (Michael, 1889) – на полевках, лесной и домовой мышах

Семейство Psoroptidae – Клещи-накожники

1510. *Chorioptes bovis* (Hering, 1845) – Возбудитель кожеедной чесотки крупного рогатого скота и овец
1511. *Chorioptes cuniculi* (Zurn, 1874) – Возбудитель кожеедной чесотки кроликов
1512. *Chorioptes equi* Seddon, 1951 – Возбудитель кожеедной чесотки лошадей
1513. *Otodectes cyonotis canis* (Hering, 1838) – Возбудитель ушной чесотки собак, кошек, др. хищников
1514. *Psoroptes bovis* (Gerlach, 1851) – Возбудитель накожниковой чесотки у крупного рогатого скота

1515. *Psoroptes equi* (Hering, 1838) – Возбудитель накожниковой чесотки у лошадей
1516. *Psoroptes ovis* (Viborg, 1813) – Возбудитель накожниковой чесотки у овец

Семейство Sarcoptidae – Чесоточные зудни

1517. *Notoedres cati* (Hering, 1838)
1518. *Sarcoptes bovis* (Hertwig, 1842) – у крупного рогатого скота
1519. *Sarcoptes equi* Rainbow, 1906 – у лошадей
1520. *Sarcoptes scabiei* (De Geer, 1778) – Чесоточный зудень (возбудитель чесотки)

Sarcoptes scabiei canis Rainbow, 1906 – у собак
Sarcoptes scabiei caprae Delafond, 1854 – у коз
Sarcoptes scabiei cuniculi (Neumann, 1892) – у кроликов
Sarcoptes scabiei hominis (Linnaeus, 1758) – у человека
Sarcoptes scabiei ovis (Abu-Samra, 1984) – у овец
Sarcoptes scabiei suis (Gerlach, 1857) – у свиней
Sarcoptes scabiei vulpis (Furstenberg, 1861) – у лисиц и песцов

Отряд Trombidiformes

Семейство Bdellidae

1521. *Bdella sp.*

Семейство Cheyletidae – Хищные клещи

1522. *Cheyletus eruditus* (Shrank, 1781) – Обыкновенный хищный клещ

Семейство Demodecidae – Железницы, или угрицы

1523. *Demodex bovis* Stiles, 1892
1524. *Demodex canis* Leydig, 1859
1525. *Demodex folliculorum* (Simon, 1842) – Угревой клещ, или железница угревая
1526. *Demodex ovis* Railliet, 1895

Семейство Eylaidae

1527. *Eylais sp*.

Семейство Hydrachnidae – Водные клещи

1528. *Hydrachna geographica* O. F. Muller, 1776 – Географический клещ

Семейство Hydrodromidae

1529. *Hydrodroma despiciens* (O. F. Muller, 1776)

Семейство Hygrobatidae

1530. *Atractides nodipalpis* Thor, 1899 – Водяной клещ
1531. *Hygrobates calliger* Piersig, 1896
1532. *Hygrobates nigromaculatus* Lebert, 1879 – р. Белая

Семейство Eriophyidae – Галловые клещи

1533. *Aceria brevipunctata* (Nalepa, 1889) – Вязовый мешетчатый клещик
1534. *Aceria ilicis* (Canestrini, 1890) – Дубовый войлочный клещ
1535. *Aceria iteina* (Nalepa, 1925)
1536. *Aceria macrochela* (Nalepa, 1891) – Кленовый жилковый клещик
1537. *Aceria macrorhyncha* (Nalepa, 1889) – Кленовый головчатый клещик

1538. *Aceria populi* (Nalepa, 1890) – Осиновый кочанный клещик
1539. *Aceria rudis* (Nalepa, 1902) – Березовый войлочный клещ
1540. *Aceria tulipae* (Keifer, 1938) – Чесночный четырехногий клещ
1541. *Aceria varia* (Nalepa, 1892) – Осиновый войлочный клещ
1542. *Aculus tetanothrix* (Nalepa, 1889) – Ивовый галловый клещик
1543. *Cecidophyes psilonotus* (Nalepa, 1897) – Бересклетовый галловый клещ
1544. *Cecidophyopsis ribis* (Westwood, 1869) – Смородинный почковый клещ
1545. *Epitrimerus acutiformis* Roivainen, 1950 – Учлн 2005 (Четвериков, 2010)
1546. *Epitrimerus carexis* Petanovic, 1995 – Учлн 2005 (Четвериков, 2010)
1547. *Epitrimerus goodenowii* Roivainen, 1947 – Учлн 2005 (Четвериков, 2010)
1548. *Eriophyes diversipunctatus* (Nalepa, 1890) – Осиновый бородавчатый клещик
1549. *Eriophyes laevis* (Nalepa 1889) – Березовый галловый клещ
1550. *Eriophyes leiosoma* (Nalepa, 1892) – Липовый войлочный клещик
1551. *Eriophyes loewi* (Nalepa, 1890) – Сиреневый клещик
1552. *Eriophyes nervalis* Nalepa, 1918 – Липовый жилковый клещик
1553. *Eriophyes padi* Domes, 2000 – Черемуховый галловый клещик
1554. *Eriophyes pyri* (Pagenstecher, 1857) – Грушевый галловый клещик
1555. *Eriophyes tiliae* (Pagenstecher, 1857) – Липовый галловый клещик
1556. *Phyllocoptes gracilis* (Nalepa, 1891) – Малинный клещик
1557. *Phyllocoptes malinus* (Nalepa, 1892) – Яблочный войлочный клещик
1558. *Phyllocoptes sorbeus* (Nalepa, 1926) – Рябиновый краевой клещик
1559. *Stenacis triradiatus* (Nalepa, 1892) – Ивовый трехлучевой клещ

Семейство Erythraeidae

1560. *Leptus beroni* Fain, 1992 – паразит сенокосцев Phalangiidae – Бурз 1978

Семейство Lebertiidae

1561. *Lebertia stackelbergi* Sokolow, 1934

Семейство Limnocharidae

1562. *Limnochares aquatica* (Linnaeus, 1758)

Семейство Microtrombidiidae

1563. *Eutrombidium trigonum* (Hermann, 1804)

Семейство Mideidae

1564. *Midea orbiculata* (O. F. Muller, 1776)

Семейство Phytoptidae

1565. *Novophytoptus rostratae* Roivainen, 1947 – Учлн 2005 (Четвериков, 2010)
1566. *Trisetacus quadrisetus* (Thomas, 1889) – Можжевельниковый ягодный клещик

Семейство Pyemotidae – Пузатые клещи

1567. *Pyemotes ventricosus* (Newport, 1850) – Пузатый клещ

Семейство Pygmephoridae

1568. *Pygmephorus sp.* – пещеры (Турбанов и др., 2016б).

Семейство Rhagidiidae

1569. *Foveacheles uralensis* Khaustov, Kolesnikov, Turbanov & Tolstikov, 2024 – пещера «Шульган-Таш» (Капралов, 2015).

Семейство Siteroptidae

1570. *Pediculopsis graminum* Reuter, 1907
1571. *Siteroptes cerealium* (Kirchner, 1864) – Хлебный клещик

Семейство Sperchontidae

1572. *Sperchonopsis verrucosa* (Protz, 1896)

Семейство Tarsonemidae

1573. *Acarapis woodi* (Rennie, 1921) – Клещ вуди
1574. *Phytonemus pallidus* (Banks, 1899) – Земляничный клещ
Phytonemus pallidus fragariae (Zimmermann 1905)
1575. *Steneotarsonemus panshini* Wainstein & Beglarov, 1968 – Пшеничный цветочный клещ (Ганиев, Недорезков, 2008)
1576. *Tarsonemus sp.* – пещера Шульган-Таш (Капралов, 2010)

Семейство Tetranychidae – Паутинные клещи

1577. *Amphitetranychus viennensis* (Zacher, 1920) – Бояршниковый паутинный клещ
1578. *Bryobia rubrioculus* (Scheuten, 1857) – Бурый плодовый клещ
1579. *Bryobia tiliae* Bagdasarian, 1957 – Липовая бриобия
1580. *Eotetranychus aceri* Reck, 1948 – Виноградный паутинный клещ
1581. *Eotetranychus carpini* (Oudemans, 1905) – Грабовый паутинный клещ
1582. *Eotetranychus tiliarium* (Hermann, 1804) – Липовый паутинный клещ
1583. *Panonychus ulmi* (Koch, 1836) – Красный плодовый клещ
1584. *Schizotetranychus schizopus* (Zacher, 1913) – Ивовый паутинный клещ
1585. *Tetranychus urticae* Koch, 1836 – Обыкновенный паутинный клещ

Отряд Araneae Clerck, 1757 – Пауки (С.Л. Есюнин, В.Е. Ефимик)

Семейство Agelenidae C.L. Koch, 1837 – Пауки-воронкопряды

1586. *Agelena labyrinthica* (Clerck, 1757) – Добытчица лабиринтовая. Уфмс (Валуев, 2022б), Мелз, Бурз: сосново-березовые леса, луга, степи, каменистые осыпи. Редко.
1587. *Tegenaria domestica* (Clerck, 1757) – Домовый паук. Уфмс (Валуев, 2022а; Валуев, 2022б; Ефимик, Валуев, 2023), Бурз, Салават: жилые и технические помещения. Редко.

Семейство Anyphaenidae Bertkau, 1878 – Анифениды

1588. *Anyphaena accentuata* (Walckenaer, 1802) – Анифена подчеркнутая. Уфа (Хабибуллин, 2025б). Единично.

Семейство Araneidae Clerck, 1757 – Пауки-кругопряды

1589. *Aculepeira carbonarioides* (Keyserling, 1892) – Крестовичка угольщик. Блрц (Михайлов и др., 2025) и Учлн: гольцы в высокогорьях. Обычно.
1590. *Aculepeira ceropegia* (Walckenaer, 1802) – Крестовичка бурокрасная. Ишмб, Бижб, Илиш, Иглн, Архн (Валуев, 2020в, Есюнин, Валуев, 2020а; Есюнин,

Валуев, 2020б; Валуев, 2022а; Ефимик, Валуев, 2023), Белб и Ермк. Степи и луга. Редко.

1591. *Agalenatea redii* (Scopoli, 1763) – Кругопряд Реди. Дувн, Блтч, Абзл (Валуев, 2022б; Козьминых, 2022б; Власов, Есюнин, 2025) и Блкт, Салават: степи. Единично.

1592. *Araneus alsine* (Walckenaer, 1802) – Крестовик зябкий. Блрц и Бурз: сосновые и сосново-березовые леса, луга – редко; степи – единично.

1593. *Araneus angulatus* Clerck, 1757 – Крестовик угловатый. Бурз, Кигн, Кркм (Есюнин, Валуев, 2020б; Валуев, 2022б; Валуев, 2023а; Ефимик, Валуев, 2023), Блрц, Ермк, Зилр, Блкт, Мелз и Бурз: различные леса, пойменные кустарники. Редко.

1594. *Araneus diadematus* Clerck, 1757 – Крестовик украшенный. Давл, Ишмб, Кигн, Кркм, Нурм, Чишм (Валуев, 2022а; Валуев, 2022б; Есюнин, Валуев, 2020б; Ефимик, Валуев, 2023), Белб, Ермк, Уфмс, Блкт, Мелз и Бурз, Уфа, Салават: различные леса, кустарники. Обычно.

1595. *Araneus grossus* (C.L. Koch, 1844) – Крестовик толстый. Бурз (Хабибуллин, 2025б).

1596. *Araneus marmoreus* Clerck, 1757 – Крестовик мраморный. Белогорский (Есюнин, 2020), Белб, Ермк, Блкт, Мелз, Учлн и Бурз, Уфа: различные леса и пойменные кустарники – обычно; луга и сельскохозяйственные угодья – единично.

1597. *Araneus nordmanni* (Thorell, 1870) – Крестовик Нордманна. Бурз: сосновый лес. Единично.

1598. *Araneus quadratus* Clerck, 1757 – Крестовик квадратный. Салават, Гафр, Ермк, Уфмс, Блкт и Бурз: луга, степи, остепненные леса. Редко.

1599. *Araneus saevus* (L. Koch, 1872) – Крестовик устрашающий. Бурз: широколиственный лес. Единично.

1600. *Araneus sturmi* (Hahn, 1831) – Крестовик Штурма. Бурз (Есюнин, Валуев, 2020б), Блкт, Мелз и Бурз: различные леса – редко, луга и пойменные кустарники – единично.

1601. *Araniella cucurbitina* (Clerck, 1757) – Паученька зеленая. Бурз: различные леса, пойменные кустарники, луга, степи. Единично.

1602. *Araniella displicata* (Hentz, 1847) – Паученька гладкая. Бурз: сосновый лес. Единично.

1603. *Araniella opisthographa* (Kulczyński, 1905) – Паученька расписная. Бурз: суходольный луг. Единично.

1604. *Araniella proxima* (Kulczyński, 1885) – Паученька сходная. Кркм (Ефимик, Валуев, 2023), Блрц, Мелз и Бурз: сосново-березовый лес, луга. Единично.

1605. *Argiope bruennichi* (Scopoli, 1772) – Аргиопа Брюнниха. Абзл (Власов, Есюнин, 2025): луг. Единично.

1606. *Argiope lobata* (Pallas, 1772) – Аргиопа дольчатая. Мелз: зональные и горные степи. Единично. Украшающий природу крупный вид, охраняемый в Европе и некоторых регионах России.

1607. *Cercidia prominens* (Westring, 1851) – Челночница выдающаяся. Абзл (Власов, Есюнин, 2025) и Бурз: различные леса, луга, степи. Редко.
1608. *Cyclosa conica* (Pallas, 1772) – Циклоза коническая. Ермк, Блрц, Мелз и Бурз, Уфа: различные леса, пойменные кустарники – обычно; луга – редко.
1609. *Cyclosa oculata* (Walckenaer, 1802) – Циклоза глазчатая. Абзл (Власов, Есюнин, 2025) и Блкт: степь луговая, солонец. Единично.
1610. *Gibbaranea bituberculata* (Walckenaer, 1802) – Горбунья двубугорчатая. Бурз: сосново-березовые и сосновые леса, луга, степи. Единично.
1611. *Gibbaranea ullrichi* (Hahn, 1835) – Горбунья Улриха. Стмк (Хабибуллин, 2025б): степь.
1612. *Hypsosinga albovittata* (Westring 1851) – Гипсосинга белополосая. Бурз: степи. Редко.
1613. *Hypsosinga pygmaea* (Sundevall, 1831) – Гипсосинга карликовая. Блкт, Мелз и Бурз: луга, степи. Редко.
1614. *Hypsosinga sanguinea* (C.L. Koch, 1844) – Гипсосинга кроваво-красная. Мелз и Бурз: различные леса, луга, степи. Редко.
1615. *Larinia jeskovi* Marusik, 1986 – Лариниа Еськова. Абзл (Власов, Есюнин, 2025): луг. Единично.
1616. *Larinioides cornutus* (Clerck, 1758) – Кругопряд рогатый. Архн, Янул, Клтс, Кркм и Иглн, Уфа (Ефимик, Валуев, 2023; Хабибуллин, 2025б). Луга. Единично.
1617. *Larinioides ixobolus* (Thorell, 1873) – Кругопряд домовый. Уфа, Блкт и Мелз: луг, кустарники по берегу старицы. Единично.
1618. *Larinioides patagiatus* (Clerck, 1757) – Кругопряд окаймленный. Блвр, Мечт, Учлн, Янул (Есюнин, Валуев, 2020б; Валуев, 2022а; Валуев, 2022б; Ефимик, Валуев, 2023), Ермк, Белб, Ишмб, Блкт, Мелз и Бурз, Салават, р. Юрюзань: различные леса – редко; луга, степи – единично.
1619. *Larinioides suspicax* (O. Pickard-Cambridge, 1876) – Кругопряд подозрительный. Слвт, Абзл (Власов, Есюнин, 2025; Михайлов и др., 2025), Ермк, Белб, Кркм, Мелз и Бурз, р. Юрюзань: прибрежная растительность – обычно; лиственные леса, луга – редко; скалы, остепненные участки по берегам рек – единично.
1620. *Leviellus stroemi* (Thorell, 1870) – Левиеллус Штрёма. Бурз: сосново-березовый лес, скалы. Единично.
1621. *Mangora acalypha* (Walckenaer, 1802) – Мангора крапивная. Мелз и Бурз: различные степи и суходольные луга – обычно (местами массовый вид); различные леса, пойменные луга – редко.
1622. *Neoscona adianta* (Walckenaer, 1802) – Неоскона сухолюбивая. Абзл (Власов, Есюнин, 2025), Белб, Блкт и Мелз, р. Юрюзань: степи. Редко.
1623. *Nuctenea silvicultrix* (C.L. Koch, 1835) – Нуктения лесная. Бурз: сосновый лес. Единично.
1624. *Singa hamata* (Clerck, 1757) – Синга перевязанная. Блвр, Янул, Блтч, Слвт (Валуев, 2022а; Ефимик, Валуев, 2023; Козьминых, 2022б; Михайлов и др.,

2025), Блкт и Бурз, р. Юрюзань: прибрежные кустарники, луга – обычно; степи – редко; широколиственный лес – единично.

1625. *Singa nitidula* (C.L. Koch, 1844) – Синга блестящая. Абзл (Власов, Есюнин, 2025), Блкт и Бурз, р. Юрюзань: луга, степь луговая. Единично.

1626. *Zilla diodia* (Walckenaer, 1802) – Цилла. Ишмб (Хабибуллин, 2025б).

Семейство Argyronetidae Thorell, 1869 – Аргиронетиды

1627. *Argyroneta aquatica* (Clerck, 1757) – Паук-серебрянка. Уфа, Бурз: водоемы. Редко.

1628. *Argenna subnigra* (O. Pickard-Cambridge, 1861) – Аргенна черноватая. Мелз и Бурз: луга – редок; сосново-березовый лес и горные степи – единично.

Семейство Cheiracanthidae Wagner, 1887 – Желтые пауки-мешкопряды

1629. *Cheiracanthium erraticum* (Walckenaer, 1802) – Херакантиум странствующий. Мелз и Бурз: луга, степи – редко; различные леса – единично.

1630. *Cheiracanthium punctorium* (Villers, 1789) – Херакантиум важнейший. Абзл, Октябрьский и Хайб (Власов, Есюнин, 2025; Хабибуллин, 2025б): степи. Единично.

1631. *Cheiracanthium virescens* (Sundevall, 1833) – Херакантиум зеленоватый. Мелз и Бурз: степи, суходольный луг – редко; широколиственные леса – единично.

Семейство Clubionidae Simon, 1878 – Пауки-мешкопряды

1632. *Clubiona bashkirica* Michailov, 1992 – Затворница башкирская. Бурз: пойменный луг. Единично.

1633. *Clubiona caerulescens* L. Koch, 1867 – Затворница сумеречная. Уфа, Блкт, Блрц, Мелз и Бурз: различные леса, луга. Редко.

1634. *Clubiona diversa* O. Pickard-Cambridge, 1862 – Затворница особая. Учлн (Есюнин, Валуев, 2020б) и Бурз: пойменный луг. Единично.

1635. *Clubiona genevensis* L. Koch, 1866 – Затворница швейцарская. Бурз: горные степи. Единично.

1636. *Clubiona germanica* Thorell, 1871 – Затворница немецкая. Слвт (Михайлов и др., 2025), Учлн и Бурз, р. Юрюзань: горная степь, каменистые осыпи. Единично.

1637. *Clubiona kulczynskii* Lessert, 1905 – Затворница Кульчинского. Блрц (Михайлов и др., 2025), Учлн и Бурз: луга, сосново-березовые и березовые леса, горные тундры. Редко.

1638. *Clubiona lutescens* Westring, 1851 – Затворница желтоватая. Бурз: осинник. Единично.

1639. *Clubiona neglecta* O. Pickard-Cambridge, 1862 – Затворница незаметная. Слвт (Михайлов и др., 2025), Мелз и Бурз, р. Юрюзань: различные леса, луга, степи. Единично.

1640. *Clubiona pallidula* (Clerck, 1757) – Затворница бледная. Учлн (Есюнин, Валуев, 2020б), Мелз и Бурз: лес березовый. Единично.

1641. *Clubiona phragmitis* C.L. Koch, 1843 – Затворница тростниковая. Абзл (Власов, Есюнин, 2025) и Бурз: луга, прибрежная травяная растительность. Единично.
1642. *Clubiona reclusa* O. Pickard-Cambridge, 1863 – Затворница отшельник. Бурз: березовый лес, пойменный луг. Единично.
1643. *Clubiona riparia* L. Koch, 1866 – Затворница прибрежная. Бурз: горная степь, скалы. Единично.
1644. *Clubiona stagnatilis* Kulczyński, 1897 – Затворница прудовая. Абзл (Власов, Есюнин, 2025): луг. Единично.
1645. *Clubiona subsultans* Thorell, 1875 – Затворница подпрыгивающая. Учлн и Бурз: сосновый и темнохвойный леса. Единично.

Семейство Cybaeidae Banks, 1892 – Цибеиды

1646. *Cryphoeca silvicola* (C.L. Koch, 1834) – Крифэка лесная. Учлн: елово-пихтовые леса. Обычно.
1647. *Mastigusa arietina* (Thorell, 1871) – Биченоска рогатая. Мелз: поляна в лесу. Единично.

Семейство Dictynidae O. Pickard-Cambridge, 1871 – Пауки-нитеплёты

1648. *Archaeodictyna consecuta* (O. Pickard-Cambridge, 1872) – Архедиктина подражатель. Мелз и Бурз: степи, луга. Единично.
1649. *Dictyna arundinacea* (Linnaeus, 1758) – Диктина тростниковая. Учлн, Мелз и Бурз: сосново-березовые и березовые леса, луга – редко; степи – единично.
1650. *Dictyna pusilla* Thorell, 1856 – Диктина кроха. Блтч (Козьминых, 2022б), Байм, Мелз и Бурз: сосновые и березовые леса, пойменный луг – редко; степи – единично.
1651. *Dictyna uncinata* Thorell, 1856 – Диктина крючконосная. Учлн, Мелз и Бурз: луга. Единично.

Семейство Dolomedidae Simon, 1876 – Пауки-рыбаки

1652. *Dolomedes fimbriatus* (Clerck, 1757) – Паук-рыбак окаймленный. Учлн и Бурз: в предгорьях пойменный луг, широколиственный лес – редко, в горных раонах болота единично.

Семейство Eresidae C.L. Koch, 1845 – Пауки-толстоголовки

1653. *Eresus kollari* Rossi, 1846 – Толстоголовка Коллара. Бурз: зональные и горные степи, каменистые осыпи и склоны, реже на сухих лугах. Единично. Украшающий природу вид, охраняется во многих странах Европы. Включен в Красную Книгу РБ (Ефимик, 2025).

Семейство Gnaphosidae Banks, 1892 – Гнафозиды

1654. *Berlandina cinerea* (Menge, 1872) – Берландина пепельная. Бурз: степь. Единично.
1655. *Callilepis nocturna* (Linnaeus, 1758) – Красавчик ночной. Крмс (Валуев, 2022а) и Бурз: степи, каменистые обнажения. Редко.

1656. *Civizelotes pygmaeus* (Miller, 1943) – Цивизелот карлик. Мелз: степи. Единично.
1657. *Drassodes lapidosus* (Walckenaer, 1802) – Ловец каменистый. Блрц, Бурз и Учлн: предгорья – скалы, горные степи, горные районы – горная тундра, гольцы. Редко.
1658. *Drassodes lutescens* (C.L. Koch, 1839) – Ловец степной. Салават. Горная степь. Единично.
1659. *Drassodes natali* Esyunin et Tuneva, 2002 – Ловец Мазура. Учлн (Есюнин, Валуев, 2020а; Есюнин, Валуев, 2020б). Степи. Единично.
1660. *Drassodes pubescens* (Thorell, 1856) – Ловец волосатый. Река Сакмара.
1661. *Drassodes villosus* (Thorell, 1856) – Ловец мохнатый. Мелз и Бурз: горные степи, каменистые обнажения – редок; широколиственные леса – единично.
1662. *Drassyllus lutetianus* (L. Koch, 1866) – Хватальщик лютецкий. Мелз: берега водоемов, большей частью с редкой растительностью. Единично.
1663. *Drassyllus praeficus* (L. Koch, 1866) – Хватальщик траурный. Мелз: луга – редко; горные степи, каменистые обнажения – единично.
1664. *Drassyllus pusillus* (C.L. Koch, 1833) – Хватальщик малый. Бурз: луга, степи, каменистые обнажения. Редко.
1665. *Gnaphosa lugubris* (C.L. Koch, 1839) – Гнафоза траурная. Мелз Бурз: горные степи. Единично.
1666. *Gnaphosa montana* (L. Koch, 1866) – Гнафоза горная. Уфмс (Валуев, 2022а), Мелз и Бурз: горная степь. Единично.
1667. *Gnaphosa muscorum* (L. Koch, 1866) – Гнафоза моховая. Блрц (Михайлов и др., 2025), Учлн и Бурз: в предгорьях сосново-березовый лес, горная степь, каменистые осыпи – единично, в горной части горные тундры – редко.
1668. *Gnaphosa taurica* Thorell, 1875 – Гнафоза крымская. Бурз: горная степь. Единично.
1669. *Haplodrassus cognatus* (Westring, 1861) – Гаплодрассус двойник. Уфа, Блрц и Бурз: в предгорьях – сосново-березовый лес; в горных районах – горная тундра. Единично.
1670. *Haplodrassus kulczynskii* Lohmander, 1942 – Гаплодрассус Кульчинского. Мелз и Бурз: степи. Единично.
1671. *Haplodrassus pseudosignifer* Marusik, Hippa et Koponen, 1996 – Гаплодрассус псевдоукрашенный. Блрц, Мелз и Бурз: горные степи и тундры, каменистые осыпи. Редко.
1672. *Haplodrassus soerenseni* (Strand, 1900) – Гаплодрассус Сёренсена. Учлн и Бурз: в предгорьях – березовый лес, в горных районах – горная тундра. Единично.
1673. *Haplodrassus umbratilis* (L.Koch, 1866) – Гаплодрассус теневой. Кркм (Ефимик, Валуев, 2023).
1674. *Kishidaia conspicua* (L. Koch, 1866) – Кисгидаиа яркая. Бурз: дубовые леса и редколесья. Единично.

1675. *Micaria aenea* Thorell, 1871 – Блескун бронзовый. Блрц (Михайлов и др., 2025) и Учлн: сфагновое болото. Единично.
1676. *Micaria formicaria* (Sundevall, 1831) – Блескун муравьевидный. Мелз и Бурз: горная степь. Единично.
1677. *Micaria fulgens* (Walckenaer, 1802) – Блескун сверкающий. Мелз и Бурз: горная степь, суходольный луг. Единично.
1678. *Micaria nivosa* L. Koch, 1866 – Блескун снежная. Мелз и Бурз: горная степь, каменистые обнажения, пойменный луг. Единично.
1679. *Micaria pulicaria* (Sundevall, 1831) – Блескун прыгающий. Блрц (Михайлов и др., 2025) и Учлн: горная тундра. Единично.
1680. *Micaria rossica* Thorell, 1875 – Блескун русский. Байм: каменистые обнажения. Единично.
1681. *Micaria silesiaca* L. Koch, 1875 – Блескун силезский. Мелз, Бурз и Блрц: степи, суходольные луга, горная тундра. Единично.
1682. *Nomisia aussereri* (L. Koch, 1872) – Номизия Ауссерера. Абзл (Власов, Есюнин, 2025): солонец. Единично.
1683. *Phaeocedus braccatus* (L. Koch, 1866) – Фэоцедус. Бурз: каменистые обнажения, пойменный луг, гравийный берег реки. Единично.
1684. *Poecilochroa variana* (C.L. Koch, 1839) – Поецилохроа изменчивая. Стмк (Хабибуллин, 2025б). Единично.
1685. *Scotophaeus quadripunctatus* (Linnaeus, 1758) – Скотофэй четырехпятнистый. Бурз: широколиственный лес. Единично.
1686. *Sosticus loricatus* (L. Koch, 1866) – Состикус панцирный. Бурз: помещения. Единично. Синантропный вид.
1687. *Zelotes azsheganovae* Esyunin et Ефимик, 1992 – Зелот Ажегановой. Блрц (Михайлов и др., 2025), Мелз и Бурз: степи, каменистые осыпи. Единично.
1688. *Zelotes electus* (C.L. Koch, 1839) – Зелот особый. Мелз и Бурз: степи, каменистые осыпи. Единично.
1689. *Zelotes latreillei* (Simon, 1878) – Зелот Латрейлля. Бурз: степи. Единично.
1690. *Zelotes longipes* (L. Koch, 1866) – Зелот длинноногий. Зилр и Мелз: степи, луга, берега ручьев. Единично.
1691. *Zelotes petrensis* (C.L. Koch, 1839) – Зелот подкаменщик. Блкт, Мелз и Бурз: сосновый лес, степи, каменистые обнажения. Единично.
1692. *Zelotes potanini* Schenkel, 1963 –Зелот Потанина. Мелз: кустарниковая степь. Единично.
1693. *Zelotes puritanus* Chamberlin, 1922 – Зелот скромный. Бурз: степи, каменистые осыпи, луга, сосновые леса. Единично.
1694. *Zelotes rufi* Efimik, 1997 – Зелот башкирский. Мелз: луг. Единично.
1695. *Zelotes subterraneus* (C.L. Koch, 1833) – Зелот земляной. Блрц, Мелз и Бурз, р. Сакмара: различных лесах – обычно; луга, каменистые обнажения, степи – единично.

Семейство Hahniidae Bertkau, 1878 – Ханииды

1696. *Antistea elegans* (Blackwall, 1841) – Смотрительница элегантная. Блрц: сфагновое болото. Обычно.
1697. *Hahnia ononidum* Simon, 1875 – Хания лесная. Мелз и Бурз: различные леса, горная степь. Редко.
1698. *Hahnia pusilla* C.L. Koch, 1841 – Хания малая. Мелз и Бурз: сосновые и широколиственные леса. Единично.

Семейство Lathyidae Cala-Riquelme, Montana, Crews et Esposito, 2025 – Пауки-скрытники

1699. *Lathys nielseni* (Schenkel, 1932) – Скрытник Нэльсона. Бурз и Зилр: сосновые и сосново-березовые леса. Единично.
1700. *Lathys stigmatisata* (Menge, 1869) – Скрытник точечнорядный. Бурз: горная степь, каменистые осыпи. Единично.

Семейство Linyphiidae Blackwall, 1859 – Линифииды

1701. *Abacoproeces saltuum* (L. Koch, 1872) – Абакопрэцес пастбищный. Бурз: широколиственные и сосново-березовые леса. Редко.
1702. *Abiskoa abiskoensis* (Holm, 1945) – Абискоа. Учлн и Бурз: в предгорьях – скалы, горные степи, сосново-березовый лес, в горной части – елово-пихтовые леса. Единично.
1703. *Acartauchenius scurrilis* (O. Pickard-Cambridge, 1873) – Акартаухениус. Абзл (Власов, Есюнин, 2025): солонец. Единично.
1704. *Agnyphantes expunctus* (O. Pickard-Cambridge, 1875) – Агнифантес. Учлн и Бурз: в предгорьях – широколиственный лес; в горных районах – горные тундры. Единично.
1705. *Agyneta affinis* (Kulczyński, 1898) – Агинета полевая. Блрц (Михайлов и др., 2025) и Учлн: горная тундра. Единично.
1706. *Agyneta conigera* (O. Pickard-Cambridge, 1863) – Агинета таежная. Блрц (Михайлов и др., 2025), Учлн и Бурз: различные леса, горная тундра. Единично.
1707. *Agyneta decora* (O. Pickard-Cambridge, 1871) – Агинета красивая. Блрц: сфагновое болото. Единично.
1708. *Agyneta gulosa* (L. Koch, 1869) – Агинета прожорливая. Учлн: горные тундры. Редко.
1709. *Agyneta innotabilis* (O. Pickard-Cambridge, 1863) – Агинета великолепная. Бурз: тополевый лес. Единично.
1710. *Agyneta rurestris* (C.L. Koch, 1836) – Агинета сельская. Блкт, Мелз, Учлн и Бурз: луга, гравийный берег реки. Единично.
1711. *Agyneta saaristoi* Tanasevitch, 2000 – Агинета Сааристо. Блрц, Слвт (Михайлов и др., 2025), Учлн, Мелз и Бурз, Стерлитамак, р. Юрюзань: горные и зональные степи, суходольный луг – обычно (местами массовый); остепненные леса, дубовых криволесьях, горные тундры – единично.
1712. *Agyneta subtilis* (O. Pickard-Cambridge, 1863) – Агинета изящная. Учлн и Бурз: лиственные леса, сосняки и прибрежные кустарники. Обычно.

1713. *Allomengea dentisetis* (Grube, 1861) – Алломенгеа кустарниковая. Бурз: луга, пойменные кустарники. Единично.
1714. *Allomengea scopigera* (Grube, 1859) – Алломенгеа метельчатая. Блкт, Учлн и Бурз: различные леса, ольховник. Обычно.
1715. *Allomengea vidua* (L. Koch, 1879) – Алломенгеа вдова. Зилр: влажный луг. Единично.
1716. *Anguliphantes angulipalpis* (Westring, 1851) – Ангулифантес угловатый. Блрц (Есюнин, 2020), Блкт, Учлн, Мелз и Бурз: сосновые, сосново-березовые и березовые леса – обычно; широколиственные леса – редко; луга и степи – единично.
1717. *Araeoncus vorkutensis* Tanasevitch, 1984 – Ареонкус воркутинский. Бурз: сосново-березовый лес. Единично.
1718. *Baryphyma trifrons* (O. Pickard-Cambridge, 1863) – Барифима трехлобая. Блрц (Михайлов и др., 2025), Учлн и Бурз: пойменный луг, болото, горная тундра. Единично.
1719. *Bathyphantes gracilis* (Blackwall, 1841) – Батифантес стройный. Блрц и Бурз: сосново-березовые и березовые леса, луга. Единично.
1720. *Bathyphantes nigrinus* (Westring, 1851) – Батифантес черноватый. Блрц, Абзл (Есюнин, 2020; Власов, Есюнин, 2025), Блкт, Учлн и Бурз: различные леса – обычно; луга и кустарники – редко; горные тундры – единично.
1721. *Bathyphantes reprobus* (Kulczyński, 1916) – Батифантес бореальный. Учлн: еловый лес. Единично.
1722. *Bolephthyphantes index* (Thorell, 1856) – Болефтифантес отмеченный. Учлн: горные тундры. Единично.
1723. *Bolyphantes alticeps* (Sundevall, 1833) – Болифантес высокоголовый. Блрц, Блкт, Учлн, Мелз и Бурз: различные леса – обычно (местами обилен); луга и степи – редко.
1724. *Bolyphantes luteolus* (Blackwall, 1833) – Болифантес желтоватый. Мелз и Бурз: различные леса, луга, горные степи. Редко.
1725. *Centromerita bicolor* (Blackwall, 1833) – Центромерита двуцветная. Учлн: сосняк нагорный. Единично.
1726. *Centromerita concinna* (Thorell, 1875) – Центромерита стройная. Учлн и Бурз: широколиственный лес, гравийный берег реки. Единично.
1727. *Centromerus arcanus* (O. Pickard-Cambridge, 1873) – Центромерус скрытный. Блрц (Есюнин, 2020), Учлн и Бурз: сосновые, сосново-березовые и березовые леса. Редко.
1728. *Centromerus clarus* (L. Koch, 1879) – Центромерус светлый. Байм, Блкт, Мелз, Учлн и Бурз: различные леса. Единично.
1729. *Centromerus incilium* (L. Koch, 1881) – Центромерус волосатый. Бурз: луга. Единично.
1730. *Centromerus sylvaticus* (Blackwall, 1841) – Центромерус лесной. Блкт, Мелз, Учлн и Бурз: различные леса – обычно (местами массовый); лугах, пойменные кустарники – редко: гольцы в высокогорье – единично.

1731. *Ceratinella brevis* (Wider, 1834) – Цератинелла малая. Блкт, Мелз, Учлн и Бурз: различные леса – обычно; лугах – редко; в высокогорье на сфагновом болоте – единично.
1732. *Ceratinella scabrosa* (O. Pickard-Cambridge, 1871) – Цератинелла шероховатая. Учлн и Бурз: в предгорье – широколиственные леса, луга; в горной части – горная тундра. Единично.
1733. *Cnephalocotes obscurus* (Blackwall, 1834) – Кнефалокотес темный. Блрц (Михайлов и др., 2025), Учлн и Бурз: в предгорьях сосняк, сосново-березовый лес, луга – редко; в горной части горная тундра – редко; сфагновое болото – единично.
1734. *Collinsia distinctus* (Simon, 1884) – Коллинзия особая. Бурз: пойменный луг, гравийный берег. Единично.
1735. *Collinsia inerrans* (O. Pickard-Cambridge, 1885) – Коллинзия невзрачная. Зилр: пойменный луг. Единично.
1736. *Decipiphantes decipiens* (L. Koch, 1879) – Деципифантес. Блрц (Михайлов и др., 2025), Мелз, Учлн и Бурз: в предгорьях – широколиственный и сосново-березовый лес, в горной части – горная тундра. Единично.
1737. *Dicymbium nigrum* (Blackwall, 1834) – Дицимбиум черный. Стерлитамак, Бурз: луга. Редко.
1738. *Dicymbium tibiale* (Blackwall, 1836) – Дицимбиум голенастый. Учлн: еловый лес. Редко.
1739. *Diplocentria bidentata* (Emerton, 1882) – Двушпорница двузубчатая. Учлн: темнохвойный лес. Единично.
1740. *Diplocephalus connatus* Bertkau, 1889 – Двуглав двойник. Бурз: луга – редко; степь и остепненный лес – единично.
1741. *Diplocephalus cristatus* (Blackwall, 1833) – Двуглав гребенчатый. Мелз и Бурз: скалы, горные степи, каменистый берег реки. Единично.
1742. *Diplocephalus picinus* (Blackwall, 1841) – Двуглав смоляно-черный. Мелз и Бурз: широколиственные и производные от них лесах – обычно; луга и пойменные кустарники – единично.
1743. *Diplostyla concolor* (Wider, 1834) – Диплостила одноцветная. Белогорский (Есюнин, 2020), Блкт, Мелз и Бурз: лиственные леса – обычно; ольшаник, луг пойменный, хвощевые ассоциации на берегу рек, горной степи – единично.
1744. *Dismodicus bifrons* (Blackwall, 1841) – Дисмодикус двуголовый. Блрц (Михайлов и др., 2025), Учлн и Бурз: березняк, луга, горная тундра. Единично.
1745. *Drapetisca socialis* (Sundevall, 1833) – Беглянка общественная. Учлн, Мелз и Бурз: различные леса. Обычно.
1746. *Drepanotylus borealis* Holm, 1945 – Дрепанотилус таежный. Зилр: луг пойменный. Единично.
1747. *Entelecara acuminata* (Wider, 1834) – Головачка острогловая. Мелз и Бурз: различные лиственные леса. Редко.

1748. *Entelecara congenera* (O. Pickard-Cambridge, 1879) – Головачка родственная. Мелз и Бурз: сосново-березовый лес. Единично.
1749. *Entelecara erythropus* (Westring, 1851) – Энтелекара красноногая. Бурз: найден на стене сарая.
1750. *Erigone atra* Blackwall, 1833 – Эригоне темная. Абзл, Блрц (Власов, Есюнин, 2025; Михайлов и др., 2025), Блкт, Мелз, Учлн и Бурз: в предгорьях на лугах, берегах рек – обычно; в разреженных лесах и степях – редко; в горных районах горные тундры – единично.
1751. *Erigone dentipalpis* (Wider, 1834) – Эригоне зубчатая. Блкт, Мелз, Учлн и Бурз: луга, берега рек – обычно; разреженные леса, степи – редко.
1752. *Erigonella hiemalis* (Blackwall, 1841) – Эригонелла холодолюбивая. Учлн и Бурз: сосновые и сосново-березовые леса, луга. Редко.
1753. *Erigonella ignobilis* (O. Pickard-Cambridge, 1871) – Эригонелла невзрачная. Бурз: пойменный луг. Единично.
1754. *Flagelliphantes bergstroemi* (Schenkel, 1931) – Флагеллифантес Бергштрэма. Бурз: сосновый остепненный лес, горная степь. Единично.
1755. *Glyphesis nemoralis* Esyunin et Ефимик, 1994 – Глифезис неморальный. Мелз и Бурз, Стерлитамак: широколиственные, сосновые и сосново-березовые леса – редко; суходольный луг – единично.
1756. *Gonatium paradoxum* (L. Koch, 1869) – Гонатиум парадоксальный. Бурз, Стерлитамак: березняк, дубовая лесополоса. Единично.
1757. *Gonatium rubellum* (Blackwall, 1841) – Гонатиум красноватый. Учлн: горная тундра. Единично.
1758. *Gonatium rubens* (Blackwall, 1833) – Гонатиум красный. Учлн: горная тундра. Единично.
1759. *Gongylidiellum latebricola* (O. Pickard-Cambridge, 1871) – Гонгилидиэллюм скрытный. Бурз: сосново-березовый лес. Единично.
1760. *Gongylidium rufipes* (Linnaeus, 1758) – Гонгилидиум красноногий. Мелз: тополевый лес. Единично.
1761. *Helophora insignis* (Blackwall, 1841) – Гелофора поразительная. Уфа, Салават, Блкт, Мелз, Учлн и Бурз: различные леса, пойменные кустарники – массовый; луга, степи – редко.
1762. *Hilaira herniosa* (Thorell, 1875) – Гилайра выпуклая. Блрц (Михайлов и др., 2025) и Учлн: горные темнохвойные леса и редколесья. Редко.
1763. *Hypomma bituberculatum* (Wider, 1834) – Гипомма двубугорчатая. Учлн и Бурз: пойменный луг – редко; горная тундра – единично.
1764. *Hypselistes jacksoni* (O. Pickard-Cambridge, 1902) – Гипселистес Джексона. Блкт и Бурз: различные леса – обычно; луга – редко.
1765. *Improphantes improbulus* (Simon, 1929) – Импрофантес горный. Блрц (Михайлов и др., 2025), Учлн и Бурз: скалы, пещеры, горные степи и тундры. Единично.

1766. *Incestophantes crucifer* (Menge, 1866) – Инцестофантес крестоносец. Бурз: сосновые, сосново-березовые и березовые леса, суходольные луга, горные тундры. Единично.
1767. *Incestophantes incestoides* (Tanasevitch et Eskov, 1987) – Инцестофантес сибирский. Блрц (Михайлов и др., 2025), Бурз и Учлн: скалы, горная тундра. Единично.
1768. *Incestophantes incestus* (L. Koch, 1879) – Инцестофантес смешанный. Блрц (Михайлов и др., 2025) и Учлн: горная тундра. Единично.
1769. *Ipa terrenus* (L. Koch, 1879) – Ипа земляная. Бурз: каменистые осыпи, степи. Единично.
1770. *Kaestneria dorsalis* (Wider, 1834) – Кестнерия выпуклая. Бурз: сосновый лес. Единично.
1771. *Lepthyphantes luteipes* (L. Koch, 1879) – Лертифантес сибирский. Блрц (Михайлов и др., 2025) и Учлн: горная тундра. Единично.
1772. *Leptorhoptrum robustum* (Westring, 1851) – Лептороптрум мощный. Блкт, Учлн и Бурз: в предгорьях – березовый лес, ольховник; в горной части – еловое криволесье, сфагновое болото. Единично.
1773. *Linyphia hortensis* Sundevall, 1830 – Линифия садовая. Бурз: лиственные и сосново-березовые леса, луга. Единично.
1774. *Linyphia triangularis* (Clerck, 1757) – Линифия вильчатая. Давл, Чишм, Аскн, Дувн, Крдл, Нурм (Валуев, 2022а; Валуев, 2022б), Зилр, Уфмс, Блкт, Мелз и Бурз: различные леса и пойменные кустарники – обычно; луга и степи – редко.
1775. *Macrargus carpenteri* (O. Pickard-Cambridge, 1894) – Макраргус Карпентера. Мелз: степи. Единично.
1776. *Macrargus multesimus* (O. Pickard-Cambridge, 1875) – Макраргус малый. Стерлитамак, Учлн и Мелз: широколиственный и березовый леса, ольшаник, горные темнохвойные леса – редко.
1777. *Macrargus rufus* (Wider, 1834) – Макраргус рыжий. Блкт, Учлн, Мелз и Бурз: различные леса – обычно; луга – единично.
1778. *Maro minutus* O. Pickard-Cambridge, 1907 – Маро малый. Блрц (Михайлов и др., 2025).
1779. *Maro pansibiricus* Tanasevitch, 2006 – Маро сибирский. Блкт, Зилр, Мелз, Учлн и Бурз: в предгорьях – сосновый и березово-сосновый лес; в горной части – сфагновое болото. Единично.
1780. *Maso sundevalli* (Westring, 1851) – Мазо Сандевалла. Мелз и Бурз: различные леса – редко; луга, степи – единично.
1781. *Megalepthyphantes nebulosus* (Sundevall, 1830) – Мегалептифантес темный. Салават: в помещении.
1782. *Megalepthyphantes pseudocollinus* Saaristo, 1997 – Мегалептифантес скальный. Уфа, Мелз и Бурз: дубрава, скалы, каменистые горные степи. Единично.

1783. *Metopobactrus prominulus* (O. Pickard-Cambridge, 1872) – Меторобактрус выступающий. Блрц (Михайлов и др., 2025), Зилр и Учлн: в предгорьях – пойменный луг; в горной части – горная тундра. Единично.
1784. *Micrargus herbigradus* (Blackwall, 1854) – Мелкоглаз травяной. Бурз: сосново-березовый лес, луг пойменный. Единично.
1785. *Micrargus subaequalis* (Westring, 1851) – Мелкоглаз буроватый. Бурз: луга, степь, остепненный сосново-березовый лес. Единично.
1786. *Microlinyphia pusilla* (Sundevall, 1830) – Микролинифия кроха. Блкт, Мелз, Учлн и Бурз: луга, степи, разреженные лесонасаждения – обычно; леса, горная тундры – редко.
1787. *Microneta viaria* (Blackwall, 1841) – Микронета придорожная. Блкт, Мелз и Бурз: различные леса – обычно (местами массовый).
1788. *Minicia marginella* (Wider, 1834) – Миниция окаймленная. Блрц (Михайлов и др., 2025), Учлн и Бурз: луга, степи, остепненные леса. Единично.
1789. *Minyriolus pusillus* (Wider, 1834) – Миниролюс кроха. Блкт, Учлн и Бурз: сосновые и сосново-березовые леса – обычно (местами массовый).
1790. *Moebelia penicillata* (Westring, 1851) – Мобелиа каёмчатая. Бурз: сосняк, горная степь. Единично.
1791. *Mughiphantes suffusus* (Strand, 1901) – Мухифантес застенчивый. Блрц (Михайлов и др., 2025), Учлн: горный елово-пихтовый лес. Единично.
1792. *Neriene clathrata* (Sundevall, 1830) – Нериена решётчатая. Бурз: различные леса, пойменные кустарники – обычно; луга – единично.
1793. *Neriene emphana* (Walckenaer, 1841) – Нериена выразительная. Илиш, Клтс, Кркм (Ефимик, Валуев, 2023), Блкт, Блрц, Мелз и Бурз, Салават, р. Сакмара: различные леса, пойменные кустарники – обычно; луга, степи – единично.
1794. *Neriene furtiva* (O. Pickard-Cambridge, 1871) – Нериена скрытная. Бурз: степь. Единично.
1795. *Neriene montana* (Clerck, 1757) – Нериена горная. Архн, Гафр (Есюнин, Валуев, 2020б; Ефимик, Валуев, 2023) и Бурз, Салават: различные леса, пойменные кустарники – обычно; скалы – единично.
1796. *Neriene peltata* (Wider, 1834) – Нериена вооруженная. Крдл (Валуев, 2022б) и Бурз: широколиственный лес. Единично.
1797. *Neriene radiata* (Walckenaer, 1841) – Нериена окаймленная. Салават, Ермк, Мелз и Бурз: различные леса, пойменные кустарники – обычно; луга, степи – единично.
1798. *Notioscopus sarcinatus* (O. Pickard-Cambridge, 1872) – Капюшонник навьюченный. Учлн и Зилр: в предгорьях – сосново-березовый лес; в горной части – сфагновое болото. Единично.
1799. *Obscuriphantes obscurus* (Blackwall, 1841) – Обскурифантес темный. Учлн и Бурз: в предгорьях – широколиственный лес; в горной части – сфагновое болото. Единично.

1800. *Oedothorax agrestis* (Blackwall, 1853) – Эдоторакс полевой. Блкт, Учлн, Мелз и Бурз: гравийный берег, пойменные кустарники – редко; степь горная – единично.
1801. *Oedothorax apicatus* (Blackwall, 1850) – Эдоторакс жрец. Стерлитамак, Блкт, Мелз, Учлн и Бурз: береговая линия – редко; пойменный луг, нарушенные горные степи – единично.
1802. *Oedothorax retusus* (Westring, 1851) – Эдоторакс выемчатый. Учлн: луг. Единично.
1803. *Oreoneta* ?*uralensis* Saaristo et Marusik, 2004 – Ореонета уральская. Учлн: горная тундра. Единично.
1804. *Oryphantes angulatus* (O. Pickard-Cambridge, 1881) – Орифантес угловатый. Блрц и Бурз: сосновые, сосново-березовые и березовые леса. Единично.
1805. *Palliduphantes alutacius* (Simon, 1884) – Паллидуфантес серовато-желтый. Блрц (Есюнин, 2020) и Бурз: лиственные и смешанные леса – редко, сосновые леса – единично.
1806. *Panamomops mengei* Simon, 1926 – Панамомопс Менге. Мелз и Бурз: различные леса. Единично.
1807. *Panamomops tauricornis* (Simon, 1881) – Панамомопс бычьерогий. Блрц (Михайлов и др., 2025) и Учлн: березовое криволесье, горная тундра. Единично.
1808. *Pelecopsis elongata* (Wider, 1834) – Шлемник вытянутый. Блрц (Михайлов и др., 2025) и Учлн: березовое криволесье, гольцы. Единично.
1809. *Pelecopsis mengei* (Simon, 1884) – Шлемник Менге. Блрц (Михайлов и др., 2025), Бурз и Учлн: пойменный луг, березовое криволесье – единично; горная тундра – редко.
1810. *Pelecopsis parallela* (Wider, 1834) – Шлемник параллельный. Бурз: горные степи. Единично.
1811. *Peponocranium ludicrum* (O. Pickard-Cambridge, 1861) – Забавный пепонокраниум. Бурз: тополевый лес. Единично.
1812. *Peponocranium orbiculatum* (O. Pickard-Cambridge, 1882) – Пепонокраниум закругленный. Бурз: пойменный луг. Единично.
1813. *Peponocranium praeceps* Miller, 1943 – Пепонокраниум склоненный. Бурз: пойменный луг, горная степь. Единично.
1814. *Pityohyphantes phrygianus* (C.L. Koch, 1836) – Питиохифантес вышитый. Салават, Блкт, Учлн и Бурз: сосново-березовый лес. Единично.
1815. *Pocadicnemis pumila* (Blackwall, 1841) – Покадикнемис карлик. Блрц (Михайлов и др., 2025), Учлн и Бурз: в предгорьях пойменный луг – единично; в горной части сфагновое болото, ельник – редко; горная тундра – единично.
1816. *Poeciloneta variegata* (Blackwall, 1841) – Поецилонета изменчивая. Бурз: скалы. Единично.
1817. *Porrhomma microphthalmum* (O. Pickard-Cambridge, 1871) – Порромма мелкоглазая. Бурз: горные степи, скалы. Единично.

1818. *Porrhomma montana* Jackson, 1913 – Порромма горная. Бурз: горная степь, скалы. Единично.
1819. *Porrhomma pallidum* Jackson, 1913 – Порромма бледная. Блрц (Михайлов и др., 2025), Учлн и Бурз: в предгорьях – сосновый лес, в горной части – темнохвойный лес. Единично.
1820. *Praestigia pini* (Holm, 1950) – Прэстигиа сосновая. Бурз: осиновый лес. Единично.
1821. *Savignya producta* Holm, 1977 – Савиния сибирская. Зилр и Мелз: дубрава, пойменный луг. Единично.
1822. *Scotinotylus alpigena* (L. Koch, 1869) – Скотинотилус альпийский. Учлн: еловый лес. Единично.
1823. *Semljicola faustus* (O. Pickard-Cambridge, 1900) – Семликола лесная. Блрц: темнохвойный горный лес. Единично.
1824. *Semljicola latus* (Holm, 1939) – Семликола обычная. Блрц (Михайлов и др., 2025) и Учлн: еловый лес. Единично.
1825. *Semljicola thaleri* (Eskov, 1981) – Семликола семликола. Блрц (Михайлов и др., 2025), Учлн и Бурз: сосново-березовые и сосновые леса. Редко.
1826. *Silometopus elegans* (O. Pickard-Cambridge, 1873) – Высокоголов элегантный. Абзл (Власов, Есюнин, 2025): луг. Единично.
1827. *Stemonyphantes conspersus* (L. Koch, 1879) – Стемонифантес бореальный. Блрц и Учлн: еловый лес. Единично.
1828. *Stemonyphantes lineatus* (Linnaeus, 1758) – Стемонифантес линейчатый. Учлн и Мелз: горные степи, луга. Единично.
1829. *Styloctetor compar* (Westring, 1861) – Выступающий стилоктетор. Стерлитамак: лес широколиственный. Единично.
1830. *Styloctetor romanus* (O. Pickard-Cambridge, 1872) – Стилоктетор римский. Байм и Мелз: степи, суходольные луга. Единично.
1831. *Tallusia experta* (O. Pickard-Cambridge, 1871) – Таллусиа. Бурз: пойменный луг. Единично.
1832. *Tapinocyba biscissa* (O. Pickard-Cambridge, 1872) – Низкоголовка двурогая. Бурз, Стерлитамак: широколиственный лес – редко; горные степи – единично.
1833. *Tapinocyba insecta* (L. Koch, 1869) – Низкоголовка разрезная. Байм, Блкт, Учлн и Бурз: сосновые и березовые леса. Единично.
1834. *Tapinocyboides pygmaeus* (Menge, 1869) – Тапиноцибоидес карликовый. Блкт и Бурз: березняк остепненный, пойменный луг. Единично.
1835. *Tapinopa longidens* (Wider, 1834) – Тапинопа длиннозубая. Блкт, Мелз и Бурз, р. Сакмара: различные леса, пойменные кустарники – обычно; луга – единично.
1836. *Tenuiphantes alacris* (Blackwall, 1853) – Тенуифантес лесной. Учлн и Бурз: дубрава, пойменный луг. Единично.
1837. *Tenuiphantes cristatus* (Menge, 1866) – Тенуифантес гребенчатый. Блрц (Есюнин, 2020) и Бурз: широколиственный и березовый лес. Единично.

1838. *Tenuiphantes mengei* (Kulczyński, 1887) – Тенуифантес Менге. Блкт, Блрц, Мелз и Бурз: различные леса, пойменные кустарники – обычно; луга – редок.
1839. *Tenuiphantes nigriventris* (C.L. Koch, 1879) – Тенуифантес черноватый. Блкт, Блрц и Бурз: различные леса, пойменные кустарники, луга. Редок.
1840. *Tenuiphantes tenebricola* (Wider, 1834) – Тенуифантес темный. Блрц (Есюнин, 2020), Блкт, Мелз, Учлн и Бурз, Уфа: различные леса – обычно; луга – редко.
1841. *Thyreostenius biovatus* (O. Pickard-Cambridge, 1875) – Тиреостениус дваждывыпуклый. Мелз и Бурз: дубрава. Единично. Мирмекофильный вид, живущий в муравейниках рода *Formica*.
1842. *Thyreostenius parasiticus* (Westring, 1851) – Тиреостениус паразитический. Учлн: еловый лес. Единично.
1843. *Tibioplus diversus* (L. Koch, 1879) – Тибиоплус обращенный. Учлн и Бурз: сосновый лес. Единично.
1844. *Trematocephalus cristatus* (Wider, 1834) – Дыроголов гребенчатый. Блкт и Бурз: различные леса, луга, горные степи. Единично.
1845. *Trichoncus affinis* Kulczyński, 1894 – Трихонкус двойник. Абзл (Власов, Есюнин, 2025), Мелз и Бурз: степь – редко; остепненный березняк, суходольный луг. Единично.
1846. *Trichoncus auritus* (L. Koch, 1869) – Трихонкус ушастый. Мелз: степь горная. Единично.
1847. *Trichopterna cito* (O. Pickard-Cambridge, 1872) – Трихоптерна проворная. Абзл (Власов, Есюнин, 2025), Мелз и Бурз: луга, горная степь, горная тундра. Единично.
1848. *Troxochrus scabriculus* (Westring, 1851) – Троксохрус шероховатый. Мелз, Учлн и Бурз: березовый лес, луга. Единично.
1849. *Walckenaeria alticeps* (Denis, 1952) – Валькенерия кудрявая. Блрц, Мелз и Бурз: в предгорьях сосновые и сосново-березовые леса – редок; широколиственные леса – единично; в горной части сфагновое болото – единично.
1850. *Walckenaeria atrotibialis* (O. Pickard-Cambridge, 1878) – Валькенерия темноголовая. Блрц (Михайлов и др., 2025), Блкт и Бурз: широколиственный лес, сосняк, ольшаник. Единично.
1851. *Walckenaeria capito* (Westring, 1861) – Валькенерия головастая. Блрц (Михайлов и др., 2025) и Учлн: горная травяно-моховая тундра. Единично.
1852. *Walckenaeria dysderoides* (Wider, 1834) – Валькенерия выемчатая. Бурз: дубрава, скалы. Единично.
1853. *Walckenaeria furcillata* (Menge, 1869) – Валькенерия вильчатая. Бурз: степи. Единично.
1854. *Walckenaeria karpinskii* (O. Pickard-Cambridge, 1873) – Валькенерия Карпинского. Учлн: горная тундра. Редко.
1855. *Walckenaeria kazakhstanica* Eskov, 1995 – Валькенерия казахстанская. Мелз и Бурз: горная кустарниковая и каменистая степи. Единично.

1856. *Walckenaeria korobeinikovi* Esyunin et Efimik, 1996 – Валькенерия Коробейникова. Блрц (Михайлов и др., 2025).
1857. *Walckenaeria mitrata* (Menge, 1868) – Валькенерия тюрбаноносная. Учлн и Бурз: в предгорьях – сосново-березовый лес, пойменный луг; в горной части – гравийный берег ручья. Единично.
1858. *Walckenaeria nodosa* O. Pickard-Cambridge, 1873 – Валькенерия узловатая. Блрц (Михайлов и др., 2025) и Учлн: горный еловый лес. Единично.
1859. *Walckenaeria unicornis* O. Pickard-Cambridge, 1861 – Валькенерия однорогая. Байм и Бурз: березовые леса, пойменные луга. Единично.
1860. *Walckenaeria vigilax* (Blackwall, 1853) – Валькенерия ночная. Учлн: горная тундра. Единично.
1861. *Wubanoides uralensis* (Pakhorukov, 1981) – Вубаноидэс уральский. Бурз: березовый лес, пойменный луг. Единично.
1862. *Zornella cultrigera* (L. Koch, 1879) – Зорнелла бореальная. Учлн: горный темнохвойный лес. Единично.

Семейство Liocranidae Simon, 1897 – Пауки-бегуны

1863. *Agroeca brunnea* (Blackwall, 1833) – Бегун бурый. Бурз: дубрава, сосново-березовый лес, пойменный луг – редко; горная степь, каменистые осыпи – единично.
1864. *Agroeca cuprea* Menge, 1873 – Бегун медный. Абзл (Власов, Есюнин, 2025) и Бурз: горная кустарниковая степь, солонец. Единично.
1865. *Agroeca lusatica* (L. Koch, 1875) – Бегун лужицкий. Бурз: горная степь. Единично.
1866. *Agroeca maculata* L. Koch, 1879 – Бегун пятнистый. Бурз: горная степь. Единично.
1867. *Agroeca proxima* (O. Pickard-Cambridge, 1871) – Бегун двойник. Блрц (Михайлов и др., 2025), Блкт, Учлн и Бурз: в предгорьях сосновые и сосново-березовые леса – редко; горная кустарниковая степь – единично; в горной части гарь елового леса – единично.

Семейство Lycosidae Sundevall, 1833 – Пауки-волки

1868. *Acantholycosa lignaria* (Clerck, 1757) – Акантоликоза дровяная. Мелз, Учлн и Бурз: сосновый и сосново-березовый лес – редко; пойменный кустарник, горная степь – единично.
1869. *Acantholycosa norvegica* (Thorell, 1872) – Акантоликоза норвежская. Блрц (Михайлов и др., 2025), Учлн и Бурз: гольцы. Обычно.
1870. *Allohogna singoriensis* (Laxman, 1770) – Тарантул русский. Аскн (Валуев, 2015а), Мелз и Бурз, Уфа, Салават: степи, остепненный луг, огород. Единично.
1871. *Alopecosa aculeata* (Clerck, 1758) – Паук-лиса колючая. Учлн (Есюнин, Валуев, 2020б).
1872. *Alopecosa cuneata* (Clerck, 1757) – Паук-лиса клиновидная. Мишк, Архн, Уфмс (Валуев, 2022а; Ефимик, Валуев, 2023) и Бурз: луга – редко; степи, каменистые обнажения – единично.

1873. *Alopecosa fabrilis* (Clerck, 1757) – Паук-лиса изящная. Бурз: горная степь, осинник. Единично.
1874. *Alopecosa farinosa* (Herman, 1879) – Паук-лиса мельник. Мишк, Уфмс (Валуев, 2022б; Ефимик, Валуев, 2023) и Бурз: степи – редко; каменистые обнажения, сосново-березовый лес – единично.
1875. *Alopecosa inquilina* (Clerck, 1757) – Паук-лиса пришлая. Блкт, Мелз и Бурз: луга, степи, остепненный березняк. Единично.
1876. *Alopecosa kasakhstanica* Savelyeva, 1972 – Паук-лиса казахстанская. Бурз: горная степь. Единично.
1877. *Alopecosa pinetorum* (Thorell, 1856) – Паук-лиса сосняковая. Учлн: темнохвойные леса. Единично.
1878. *Alopecosa pulverulenta* (Clerck, 1757) – Паук-лиса запыленная. Чишм (Валуев, 2022а), Учлн, Мелз и Бурз: луга – обычно; степи, сосновых и березовых лесах – единично.
1879. *Alopecosa solitaria* (Herman, 1876) – Паук-лиса одиночка. Бурз и Мелз: горная степь. Единично.
1880. *Alopecosa sulzeri* (Pavesi, 1873) – Паук-лиса Сулзера. Мелз и Бурз: сосново-березовый лес, горная степь. Единично.
1881. *Alopecosa taeniata* (C.L. Koch, 1835) – Паук-лиса перевязанная. Уфмс, Блрц (Валуев, 2022а; Михайлов и др., 2025), Мелз, Учлн и Бурз: сосновые, сосново-березовые и березовые леса – обычно; луга, скалы и степи – единично.
1882. *Alopecosa taeniopus* (Kulczyński, 1895) – Паук-лиса степная. Мелз и Бурз: степи. Редок.
1883. *Alopecosa trabalis* (Clerck, 1757) – Паук-лиса южная. Мелз и Бурз: сосновый лес, суходольный луг, горная степь, каменистые осыпи. Единично.
1884. *Arctosa alpigena* (Doleschall, 1852) – Паук-медведь альпийский. Блрц: сфагновое болото. Редко.
1885. *Arctosa cinerea* (Fabricius, 1777) – Паук-медведь пепельный. Блкт и Бурз: пойменный луг, галечники по берегам рек. Единично.
1886. *Arctosa figurata* (Simon, 1876) – Паук-медведь пестрый. Бурз: горная степь, каменистая осыпь. Единично.
1887. *Arctosa leopardus* (Sundevall, 1833) – Паук-медведь леопардовый. Мелз и Бурз: гравийная береговая линия. Единично.
1888. *Arctosa stigmosa* (Thorell, 1875) – Паук-медведь пятнистый. Блкт, Мелз и Бурз: горная степь, берега рек. Единично.
1889. *Hygrolycosa rubrofasciata* (Ohlert, 1865) – Гигроликоза краснополосая. Бурз: пойменный луг, каменистые осыпи. Единично.
1890. *Pardosa agrestis* (Westring, 1861) – Пардоза полевая. Крмс, Мияк, Слвт, Янул, Блрц, Абзл (Валуев, 2022а; Валуев, 2022б; Ефимик, Валуев, 2023; Власов, Есюнин, 2025; Михайлов и др., 2025), Мелз, Бурз, Байм и Учлн, р. Юрюзань: в предгорьях мезофитные луга – редко; каменистые осыпи – единично; в горной части горные тундры – единично.

1891. *Pardosa agricola* (Thorell, 1856) – Пардоза сельская. Блкт, Мелз и Бурз: каменистые берега рек, луг пойменный, каменистые осыпи. Единично.
1892. *Pardosa amentata* (Clerck, 1757) – Пардоза стройная. Блкт, Мелз, Учлн и Бурз: пойменный луг, огород – редко; сосново-березовый лес, пойменный кустарник, каменистые обнажения, травянистые берега рек – единично.
1893. *Pardosa atrata* (Thorell, 1873) – Пардоза траурная. Учлн: сфагновое болото. Единично.
1894. *Pardosa fulvipes* (Collett, 1876) – Пардоза желтоногая. Гафр, Архн, Блрц (Есюнин, Валуев, 2020б; Ефимик, Валуев, 2023; Михайлов и др., 2025), Блкт, Байм, Учлн и Бурз, р. Юрюзань: луга – обычно; разреженные леса, степи, горная тундра – единично.
1895. *Pardosa hyperborea* (Thorell, 1872) – Пардоза северная. Блрц (Михайлов и др., 2025) и Учлн: горные тундры – обычно.
1896. *Pardosa lasciva* (L. Koch, 1879) – Пардоза резвая. Учлн и Бурз: в предгорьях – сосново-березовый лес; в горной части – ельник. Единично.
1897. *Pardosa lugubris* (Walckenaer, 1802) – Пардоза траурная. Учлн, Альш, Бижб, Крмс, Уфмс, Мечт, Илиш (Есюнин, Валуев, 2020б; Валуев, 2022а; Ефимик, Валуев, 2023; Валуев, 2022б; Ефимик, Валуев, 2023), Блкт, Блрц, Мелз и Бурз, р. Юрюзань, Уфа, р. Сакмара: сосново-березовые и березовые леса – обычно; луга – редко; степи, каменистые осыпи – единично.
1898. *Pardosa maisa* Hippa et Mannila, 1982 – Пардоза Ярва. Байм: заболоченный луг. Единично.
1899. *Pardosa paludicola* (Clerck, 1757) – Пардоза весенняя. Блвр, Уфмс (Валуев, 2022а; Валуев, 2022б), Мелз и Бурз, Уфа: луга – редко; сосновые и сосново-березовые леса, горная степь, каменистые осыпи – единично.
1900. *Pardosa palustris* (Linnaeus, 1758) – Пардоза болотная. Гафр, Альш, Давл, Аскн, Кигн, Уфмс, Блрц (Есюнин, Валуев, 2020б; Валуев, 2022а; Валуев, 2022б; Ефимик, Валуев, 2023; Михайлов и др., 2025), Блкт, Мелз, Учлн и Бурз, р. Юрюзань: луга – обычно; сосново-березовые и березовые леса, травянистые берега рек, горная степь – редок; горная тундра – единично.
1901. *Pardosa plumipes* (Thorell, 1875) – Пардоза мохноногая. Блрц (Михайлов и др., 2025), Бурз и Учлн: пойменный луг, горная тундра. Единично.
1902. *Pardosa prativaga* (L. Koch, 1870) – Пардоза луговая. Бурз: охотник бегающий, герпетобионт, мезофильный.
1903. *Pardosa riparia* (C.L. Koch, 1833) – Пардоза прибрежная. Блрц (Михайлов и др., 2025), Учлн и Бурз, Салават: луга – редко; осинник, пойменный кустарник, горная степь, горная тундра – единично.
1904. *Pardosa sphagnicola* (F. Dahl, 1908) – Пардоза торфяная. Блрц (Михайлов и др., 2025) и Учлн: сфагновое болото – обычно; горная тундра – единично.
1905. *Pardosa sp.* Неописанный вид. Мелз: гравийный берег реки.
1906. *Pirata piraticus* (Clerck, 1757) – Паук-пират. Блкт, Учлн и Мелз: берега водоемов, болота. Обычно.

1907. *Pirata piscatorius* (Clerck, 1757) – Паук-рыбак. Блкт: травянистые берега водоемов. Единично.
1908. *Piratula hygrophila* (Thorell, 1872) – Пиратула лесная. Архн, Блкт, Мелз, Учлн и Бурз, р. Юрюзань: пойменные луга, кустарники, берега рек и каменистые обнажения. Единично.
1909. *Piratula insularis* (Emerton, 1885) – Пиратула островная. Блрц (Михайлов и др., 2025) и Учлн: болото сфагновое. Редко.
1910. *Piratula uliginosus* (Thorell, 1856) – Пиратула влаголюбивая. Блрц (Михайлов и др., 2025), Учлн и Бурз: в предгорьях на лугах – единично; в горных районах на сфагновом болоте – редко.
1911. *Tricca lutetiana* (Simon, 1876) – Трикка лютецкая. Бурз: горная степь. Единично.
1912. *Trochosa ruricola* (De Geer, 1778) – Трохоза деревенская. Уфмс, Дувн, Абзл (Валуев, 2022а; Валуев, 2022б; Власов, Есюнин, 2025), Блкт, Блрц, Мелз и Бурз, р. Юрюзань: пойменный луг, травянистые берега стариц. Единично.
1913. *Trochosa spinipalpis* (F.O. Pickard-Cambridge, 1895) – Трохоза вооруженная. Блкт, Блрц, Мелз и Бурз: в предгорьях сосновые и сосново-березовые леса, мезофитные луга, каменистые обнажения – единично; в горных районах сфагновое болото – редок.
1914. *Trochosa terricola* Thorell, 1856 – Трохоза земляная. Учлн, Крдл, Кркм (Есюнин, Валуев, 2020б; Валуев, 2022б; Ефимик, Валуев, 2023), Блрц, Мелз и Бурз, Уфа, Салават, р. Юрюзань: различные леса – обычно; луга, степи – редко.
1915. *Xerolycosa miniata* (C.L. Koch, 1834) – Сухолюб красноватый. Уфмс, Янул (Ефимик, Валуев, 2023), Блкт, Мелз и Бурз: степи, каменистые обнажения, горная тундра. Единичен.
1916. *Xerolycosa nemoralis* (Westring, 1861) – Сухолюб дубравный. Слвт, Блрц (Валуев, 2022б; Михайлов и др., 2025), Блрц, Мелз и Бурз, р. Сакмара: остепненные луга, степи – обычно; дубрава, березовый лес, горная тундра – единично.

Семейство Mimetidae Simon, 1881 – Пауки-пираты

1917. *Ero cambridgei* Kulczyński, 1911 – Эро Кэмбриджа. Бурз: луга, степи, берега водоемов.
1918. *Ero furcata* (Villers, 1789) – Эро вильчатое. Блрц и Бурз: леса с участием лиственных пород, реже луга и степи.

Семейство Miturgidae Simon, 1886 – Митургиды

1919. *Zora nemoralis* (Blackwall, 1861) – Шипоног дубравный. Блрц, Мелз и Бурз: сосновые, сосново-березовые и березовые леса, луга. Единично.
1920. *Zora pardalis* Simon, 1878 – Шипоног леопард. Мелз и Бурз: степи, каменные осыпи, березовый лес. Единично.
1921. *Zora silvestris* Kulczyński, 1897 – Шипоног лесной. Бурз: сосново-березовый лес, степи. Единично.

1922. *Zora spinimana* (Sundevall, 1833) – Шипоног шипастый. Бурз: лес сосново-березовый, луга, степи. Единично.

Семейство Oxyopidae Thorell, 1869 – Пауки-рыси

1923. *Oxyopes heterophthalmus* (Latreille, 1804) – Остроглаз разноглазый. Блрц: луг. Единично.
1924. *Oxyopes ramosus* (Martini et Goeze, 1778) – Остроглаз разветвленный. Блрц: луг суходольный. Единично.

Семейство Philodromidae Thorell, 1869 – Травяные пауки-крабы

1925. *Emargidromus emarginatus* (Schrank, 1803) – Бегун неокаймленный. Мелз и Бурз: березовые леса, луга, степи. Единично.
1926. *Philodromus cespitum* (Walckenaer, 1802) – Бегун луговой. Гафр (Есюнин, Валуев, 2020б), Мелз и Бурз, р. Юрюзань, р. Сакмара: луга, степи – обычно, леса – редко.
1927. *Philodromus fuscomarginatus* (De Geer, 1778) – Бегун темнокаемчатый. Бурз: сосновые, сосново-березовые и березовые леса. Единично.
1928. *Philodromus margaritatus* (Clerck, 1757) – Бегун окаймленный. Уфа, Бурз: сосново-березовые и сосновые леса. Единично.
1929. *Philodromus poecilus* (Thorell, 1872) – Бегун пестрый. Салават, Мелз и Бурз: сосновые, сосново-березовые и березовые леса – редко; постройки – единично.
1930. *Philodromus rufus* Walckenaer, 1826 – Бегун рыжий. Мелз и Бурз: горные степи, широколиственные и дубовые леса, пойменный луг. Единично.
1931. *Rhysodromus histrio* (Latreille, 1819) – Ризодромус актер. Абзл и Хайб (Власов, Есюнин, 2025; Хабибуллин, 2025б): степи. Обычно.
1932. *Thanatus arenarius* L. Koch in Thorell, 1872 – Танатус песчаный. Мелз и Байм: суходольный луг, горная степь. Единично.
1933. *Thanatus atratus* Simon, 1875 – Танатус траурный. Бурз и Слвт: горная степь. Единично.
1934. *Thanatus bungei* (Kulczyński, 1908) – Танатус скальный. Блрц (Михайлов и др., 2025) и Учлн: гольцы. Единично.
1935. *Thanatus formicinus* (Clerck, 1757) – Танатус муравьиный. Блрц (Михайлов и др., 2025), Бурз и Учлн: луга, сосновые и сосново-березовые леса – редок; степи – обычно; горная тундра – единично.
1936. *Thanatus oblogiusculus* (Lukas, 1846) – Танатус вытянутый. Мелз: кустарниковые степи. Единично.
1937. *Thanatus sabulosus* (Menge, 1875) – Танатус песчаный. Бурз: сухие сосново-березовые и березовые леса, луга – редок; степи – единично.
1938. *Tibellus macellus* Simon, 1875 – Тибеллус худощавый. Мелз и Бурз: степи. Единично.
1939. *Tibellus maritimus* (Menge, 1875) – Тибеллус приморский. Салават: пойменный луг. Единично.

1940. *Tibellus oblongus* (Walckenaer, 1802) – Тибеллус удлиненный. Уфмс (Валуев, 2022а; Валуев, 2022б), Блкт, Мелз и Бурз, Салават, р. Юрюзань: луга, степи – обычно; леса – редко.

Семейство Pholcidae C.L. Koch, 1850 – Пауки-сенокосцы

1941. *Pholcus ponticus* Thorell, 1875 – Косоглаз понтический. Уфмс (Валуев, 2022а; Валуев, 2022в; Ефимик, Валуев, 2023; Хабибуллин, 2025). В помещениях. Обычен.

Семейство Phrurolithidae Banks, 1892 – Фруролитиды

1942. *Phrurolithus festivus* (C.L. Koch, 1835) – Фруролитус изящный. Блкт, Мелз и Бурз, р. Сакмара: степи, луга, каменистые осыпи – редко; широколиственный лес – единично.

1943. *Phrurolithus pullatus* Kulczyński, 1897 – Фруролитус темный. Мелз и Бурз: степи, сосново-березовый лес. Единично.

Семейство Pisauridae Simon, 1890 – Пауки-няньки

1944. *Pisaura mirabilis* (Clerck, 1757) – Пизаура удивительная. Уфмс, Кркм (Валуев, 2022б; Ефимик, Валуев, 2023; Ефимик, Валуев, 2023) и Бурз: луг остепненный. Единично.

1945. *Pisaura novicia* (L. Koch, 1878) – Пизаура кавказская. Аург, р. Сакмара: гипсовый карст. Единично.

Семейство Salticidae Blackwall, 1841 – Пауки-скакунчики

1946. *Aelurillus m-nigrum* Kulczyński, 1891 – Элуриллус чернопятнистый. Хайб (Хабибуллин, 2025б).

1947. *Asianellus festivus* (C.L. Koch, 1834) – Азианеллус красивый. Бурз и Зилр: степи, каменистые обнажения южной экспозиции. Редко.

1948. *Attulus caricis* (Westring, 1861) – Аттулюс разрисованный. Учлн: еловый лес. Единично.

1949. *Attulus distinguendus* (Simon, 1868) – Аттулюс украшенный. Бурз: горная степь. Единично.

1950. *Attulus dzieduszyckii* (L. Koch, 1870) – Аттулюс Джидусжики. Уфа, Крмс, Хайб, Слвт (Хабибуллин, 2025б), Блкт, Мелз и Бурз, Салават: горная степь, каменистые обнажения, гравийная прибрежная полоса, широколиственный лес. Единично.

1951. *Attulus floricola* (C.L. Koch, 1837) – Аттулюс цветочный. Мелз: каменистый берег реки. Единично.

1952. *Attulus penicillatus* (Simon, 1875) – Аттулюс раскрашенный. Бурз: горные степи. Единично.

1953. *Attulus terebratus* (Clerck, 1757) – Аттулюс пронзенный. Салават, Бурз: сосновый лес – единично; на стенах построек – редко.

1954. *Ballus chalybeius* (Walckenaer, 1802) – Баллус серый. Мелз и Бурз: горные степи, березовый лес. Единично.

1955. *Chalcoscirtus alpicola* (L. Koch, 1876) – Халкосциртус горный. Блрц (Михайлов и др., 2025) и Учлн: горная тундра. Единично.

1956. *Chalcoscirtus brevicymbialis* Wunderlich, 1980 – Халкосциртус степной. Байм: горная степь. Единично.
1957. *Dendryphantes rudis* (Sundevall, 1833) – Древожил суровый. Бурз: сосновый лес. Единично.
1958. *Euophrys frontalis* (Walckenaer, 1802) – Евофрис лобастый. Салават, Стерлитамак, Мелз и Бурз: сосновые, сосново-березовые и березовые леса – редко; степи, луга, каменистые осыпи – единично.
1959. *Euophrys uralensis* Logunov, Cutler et Marusik 1993 – Евофрис уральский. Мелз и Бурз: степи, каменистые склоны. Единично.
1960. *Evarcha arcuata* (Clerck, 1757) – Эварха темная. Уфмс, Блрц (Есюнин, Валуев, 2020б; Козьминых, 2022б), Мелз и Бурз: луга, степи. Редко.
1961. *Evarcha falcata* (Clerck, 1757) – Эварха пестрая. Блрц, Крдл (Есюнин, 2020; Михайлов и др., 2025; Валуев, 2022б), Блкт, Мелз, Учлн и Бурз: различные леса, луга, степь. Обычно.
1962. *Evarcha laetabunda* (C.L. Koch, 1846) – Эварха радостная. Мелз и Бурз: степи, луга. Единично.
1963. *Evarcha michailovi* Logunov, 1992 – Эварха Михайлова. Абзл (Власов, Есюнин, 2025): луг. Единично. Указание для Туйм (Хабибулин, 2025) нуждается в подтверждении коллекционными экземплярами.
1964. *Heliophanus auratus* C.L. Koch, 1835 – Солнцелюб золотистый. Бурз: луга, степи, каменистые осыпи, различные леса. Единично.
1965. *Heliophanus camtschadalicus* Kulczyński, 1885 – Солнцелюб камчатский. Учлн: горная тундра. Единично.
1966. *Heliophanus cupreus* (Walckenaer, 1802) – Солнцелюб медный. Мелз и Бурз: различные леса, луга, степи. Единично.
1967. *Heliophanus dubius* C.L. Koch, 1835 – Солнцелюб сомнительный. Бурз: различные леса, луга, степи, каменистые обнажения. Единично.
1968. *Heliophanus flavipes* (Hahn, 1832) – Солнцелюб желтоногий. Мелз и Бурз: степи – редко; луга – единично.
1969. *Marpissa muscosa* (Clerck, 1757) – Марписса лесная. Мелз: дубрава, луга. Единично.
1970. *Marpissa pomatia* (Walckenaer, 1802) – Марписса садовая. Мелз и Бурз: луга, горные степи, березовый лес. Единично.
1971. *Neon reticulatus* (Blackwall, 1853) – Неон сетчатый. Бурз: сосновые и сосново-березовые леса. Редко.
1972. *Philaeus chrysops* (Poda, 1761) – Филэус пестрый. Мелз и Бурз: степи, каменистые осыпи. Единично.
1973. *Phlegra fasciata* (Hahn, 1826) – Флегра полосатая. Мелз и Бурз: степи. Единично.
1974. *Pseudeuophrys erratica* (Walckenaer, 1826) – Лжеэвофрис странствующий. Бурз: сосновые и сосново-березовые леса. Единично.
1975. *Pseudicius encarpatus* (Walckenaer, 1802) – Лжеициус гирляндовый. Иглн и Чишм (Хабибулин, 2025).

1976. *Salticus cingulatus* (Panzer, 1797) – Скакунчик перевязанный. Бурз: сосново-березовые и березовые леса, пойменные кустарники. Единично.
1977. *Sibianor larae* Logunov, 2001 – Сибианор Логуновой. Бурз: луга, степи, каменистые обнажения. Единично.
1978. *Synageles hilarulus* (C.L. Koch, 1846) – Синагелес веселый. Бурз: степи. Единично.
1979. *Synageles venator* (Lucкак, 1836) – Синагелес исследователь. Мелз, Учлн и Бурз: луга, степи, горные тундры. Единично.
1980. *Talavera thorelli* (Kulczyński in Chyzer et Kulczyński, 1891) – Талавера Тореля. Бурз: березовый лес. Единично.

Семейство Sparassidae Bertkau, 1872 – Гигантские пауки-бокоходы

1981. *Micrommata virescens* (Clerck, 1757) – Мелкоглазка зеленая. Учлн, Гафр, Альш (Есюнин, Валуев, 2020б; Валуев, 2022а), Мелз и Бурз, р. Сакмара: луга, лиственные леса – обычно; степи – редко.

Семейство Tetragnathidae Menge, 1866 – Длинночелюстные кругопряды

1982. *Metellina mengei* (Blackwall, 1869) – Метеллина Менге. Учлн, Татш (Есюнин, Валуев, 2020; Есюнин, Валуев, 2020б; Ефимик, Валуев, 2023), Бурз, Ишмб и Уфмс: леса. Обычен.
1983. *Metellina merianae* (Scopoli, 1763) – Метеллина Мэрианы. Мелз: скалы. Единично.
1984. *Metellina segmentata* (Clerck, 1757) – Метеллина окаймленная. Уфа, Мелз, Учлн и Бурз: различные леса, пойменные кустарники, луга – редко; степи, скалы – единично.
1985. *Pachygnatha clercki* Sundevall, 1823 – Толсточелюстница Клерка. Блкт и Бурз: луга, прибрежная растительность. Редко.
1986. *Pachygnatha degeeri* Sundevall, 1830 – Толсточелюстница Де Гира. Абзл (Власов, Есюнин, 2025), Блкт, Мелз, Учлн и Бурз: луга, берегам водоемов – обычно; степи, березовые леса – редко.
1987. *Pachygnatha listeri* Sundevall, 1830 – Толсточелюстница Листера. Стерлитамак, Блкт, Блрц, Мелз и Бурз: сосновые, сосново-березовые и березовые леса – редко; луга, прибрежная растительность, широколиственные леса – единично.
1988. *Tetragnatha dearmata* Thorell, 1873 – Длинночелюстница невооруженная. Салават: широколиственный лес. Единично.
1989. *Tetragnatha extensa* (Linnaeus, 1758) – Длинночелюстница вытянутая. Абзл, Слвт (Власов, Есюнин, 2025; Михайлов и др., 2025), Белб, Гафр, Мелз, Учлн, Блкт и Бурз, р. Юрюзань: сосновые и березовые леса, пойменные кустарники – обычно; луга, степи, сельскохозяйственных угодья – редко.
1990. *Tetragnatha montana* Simon, 1874 – Длинночелюстница горная. Крмс, Мечт (Валуев, 2022а; Валуев, 2022б), Мелз и Бурз, р. Сакмара: различные леса, пойменные кустарники – редко; луга, степи – единично.

1991. *Tetragnatha nigrita* Lendl, 1886 – Длинночелюстница черноватая. Бурз, р. Юрюзань: различные леса – редко; лугах – единично.
1992. *Tetragnatha obtusa* C.L. Koch, 1837 – Длинночелюстница тусклая. Мелз и Бурз: различные леса – редко, луга – единично.
1993. *Tetragnatha pinicola* L. Koch, 1870 – Длинночелюстница сосновая. Кркм, Татш, Янул (Ефимик, Валуев, 2023), Мелз, Учлн и Бурз, р. Юрюзань: различные леса, пойменные кустарники, луга, степи. Обычно (местами массовый).
1994. *Tetragnatha reimoseri* (Roşca, 1939) – Длинночелюстница Реймозера. Абзл (Власов, Есюнин, 2025): степь. Единично.

Семейство Theridiidae Sundevall, 1833 – Гребненогие пауки

1995. *Asagena phalerata* (Panzer, 1801) – Безтенетник украшенный. Байм, Мелз и Бурз: степи, суходольные луга. Редко.
1996. *Canalidion montanum* (Emerton, 1882) – Каналидион горный. Блрц и Бурз: сосновый и сосново-березовый лес, гольцы. Единично.
1997. *Chrysso nordica* (Chamberlin et Ivie, 1947) – Хриссо северная. Бурз: зональные и горные степи. Единично.
1998. *Crustulina guttata* (Wider, 1834) – Крустулина пятнистая. Бурз: луга, степи, каменистые россыпи. Редко.
1999. *Crustulina sticta* (O. Pickard-Cambridge, 1861) – Крустулина ямчатая. Учлн: гольцы. Единично.
2000. *Cryptachaea riparia* (Blackwall, 1834) – Криптахеа прибрежная. Бурз: различные леса, луга, каменистые осыпи, кустарниковая степь. Единично.
2001. *Dipoena torva* (Thorell, 1875) – Дипэна мрачная. Бурз: лес сосново-березовый. Единично.
2002. *Enoplognatha ovata* (Clerck, 1757) – Эноплогната овальная. Бурз и Блкт, Стерлитамак, р. Сакмара: различные леса – обычно; луга, степи – редко.
2003. *Episinus angulatus* (Blackwall, 1836) – Эпизинус угловатый. Мелз: лес тополевый. Единично.
2004. *Euryopis flavomaculata* (C.L. Koch, 1836) – Эуриопис золотопятнистая. Бурз: леса – обычно; луга, степи – редко.
2005. *Euryopis laeta* (Westring, 1861) – Эуриопис привлекательный. Мелз: горные и зональные степи. Единично.
2006. *Heterotheridion nigrovariegatum* (Simon, 1873) – Гетеротеридион чернопятнистый. Бурз: горная степь, сосново-березовый лес. Единично.
2007. *Latrodectus tredecimguttatus* (Rossi, 1790) – Каракýрт. РБ (Казадаев, 1977): биотопическая приуроченность не известна. Укус каракурта опасен для человека.
2008. *Neottiura bimaculata* (Linnaeus, 1767) – Охранник двуцветный. Блкт и Бурз: луга, степи – обычно; леса – редко; болота, берега водоемов – единично.
2009. *Neottiura suaveolens* (Simon, 1879) – Охранник симпатичный. Мелз и Бурз: горные степи, суходольные луга. Единично.

2010. *Ohlertidion ohlerti* (Thorell, 1870) – Олертидион Олерта. Учлн и Бурз: лес сосново-березовый, луга. Единично.
2011. *Paidiscura pallens* (Blackwall, 1834) – Паидискура бледная. Бурз: горная степь. Единично.
2012. *Parasteatoda lunata* (Clerck, 1757) – Парастеатода серповидная. Уфа, Бурз, р. Сакмара: различные леса, каменистые осыпи, кустарниковая степь. Единично.
2013. *Parasteatoda tabulata* (Levi, 1980) – Парастеатода лопастная. Уфмс и Крмс (Валуев, 2022б; Ефимик, Валуев, 2023; Хабибулин, 2025). Сады. Обычен.
2014. *Parasteatoda tepidariorum* (C.L. Koch, 1841) – Парастеатода теплолюбивая. Уфа, Салават, Бурз: различные леса. Единично.
2015. *Phylloneta impressa* (L. Koch, 1881) – Филлонеа вдавленная. Гафр, Ермк, Блкт и Бурз: зональные и горные степи, луга – обычно; опушки лесов, прибрежная растительность – редко.
2016. *Phylloneta sisyphia* (Clerck, 1757) – Филлонеа сизифова. Уфа: биотопическая приуроченность не известна.
2017. *Platnickina tincta* (Walckenaer, 1802) – Платникина пестрая. Бурз: лес сосново-березовый. Единично.
2018. *Robertus arundineti* (O. Pickard-Cambridge, 1871) – Робертус камышевый. Блкт, Учлн, Мелз и Бурз: в предгорьях – сосновые и сосново-березовые леса, луга; в горной части – горные тундры. Единично.
2019. *Robertus lividus* (Blackwall, 1836) – Робертус серый. Блрц (Есюнин, 2020), Блкт, Учлн и Бурз: различные леса – обычно; луга – редко.
2020. *Robertus neglectus* (O. Pickard-Cambridge, 1871) – Робертус неприметный. Бурз: луга. Единично.
2021. *Rugathodes aurantius* (Emerton, 1915) – Ругатодес золотистый. Учлн и Бурз: в предгорьях осветленные сосновые, сосново-березовые и березовые леса, луга; в горной части темнохвойный лес. Единично.
2022. *Simithidion simile* (C.L. Koch, 1836) – Симитидион подобный. Бурз: зональные и горные степи – обычно, суходольный луг, опушки лесополос – единично.
2023. *Steatoda albomaculata* (De Geer, 1778) – Толстунья белопятнистая. Блкт и Бурз: степи – редок; суходольные луга, сухие сосновые леса, каменистые обнажения – единично.
2024. *Steatoda bipunctata* (Linnaeus, 1758) – Толстунья двупятнистая. Уфа, Салават, Бурз: различные леса; скалы, стены на деревянных строениях. Единично.
2025. *Steatoda castanea* (Clerck, 1757) – Толстунья каштановая. Уфмс (Валуев, 2022а), Салават: синантропный вид; изредка встречается в лесополосах.
2026. *Steatoda grossa* (C.L. Koch, 1838) – Толстунья большая. Салават: синантропный вид.
2027. *Theridion cinereum* Thorell, 1875 – Теридион пепельный. Мелз и Бурз: степи. Единично.

2028. *Theridion innocuum* Thorell, 1875 – Теридион безупречный. Мелз и Бурз: зональные и горные степи – редок; изредка встречается в остепненных сосново-березовых и березовых лесах, на суходольных лугах – единично.
2029. *Theridion melanurum* Hahn, 1831 – Теридион чернозадый. Бурз: горная степь. Единично.
2030. *Theridion pictum* (Walckenaer, 1802) – Теридион разукрашенный. Бурз: остепненные леса, луга, степи. Редко.
2031. *Theridion pinastri* L. Koch, 1872 – Теридион сосновый. Мелз: луг суходольный. Единично.
2032. *Theridion sibiricum* Marusik, 1988 – Теридион сибирский. Зилр, Учлн и Бурз: в предгорьях – каменистые осыпи, горные степи; в горной части – гольцы. Единично.
2033. *Theridion varians* (Hahn, 1833) – Теридион изменчивый. Салават, Стерлитамак, Блкт, Блрц и Бурз: различные леса – обычно; луга, скалы, степи – единично.
2034. *Thymoites bellissimus* (L. Koch, 1879) – Тимоитес светлый. Бурз: скалы, горные степи, кустарниковые заросли. Единично.
2035. *Yunohamella serpatusa* (Guan et Zhu, 1993) *(=Theridion tigrae* Esyunin et Efimik, 1996) – Юнохамелла. Бурз: широколиственные и производные от них леса. Единично.

Семейство Thomisidae Sundevall, 1833 – Пауки-бокоходы или Пауки-крабы

2036. *Bassaniodes robustus* (Hahn, 1832) – Бассаниодес могучий. Мелз и Бурз: кустарниковая степь – редко; березовый лес – единично.
2037. *Coriarachne depressa* (C.L. Koch, 1837) – Паучиха-клопоедка сплющенная. Бурз: сосново-березовый лес. Единично.
2038. *Diaea dorsata* (Fabricius, 1777) – Диея выпуклая. Уфа: лес. Единично.
2039. *Ebrechtella tricuspidatus* (Fabricius, 1775) – Эбрехтелла терхбугорчатая. Уфмс, Блтч, Абзл (Валуев, 2022а; Козьминых, 2022б; Власов, Есюнин, 2025) и Блкт, Уфа: степи, луг пойменный, травянистые берега стариц. Единично.
2040. *Heriaeus oblongus* Simon, 1918 – Гериэус продолговатый. Мелз и Бурз: степи. Редко.
2041. *Misumena vatia* (Clerck, 1757) – Мизумена прорицательница. Янул (Ефимик, Валуев, 2023), Гафр, Блкт, Мелз, Учлн и Бурз, Уфа, Салават: луга, степи – обычно; различные леса – редко; огород – единично.
2042. *Ozyptila atomaria* (Panzer, 1801) – Озиптиля мелкоточечная. Бурз: кустарниковая степь. Единично.
2043. *Ozyptila claveata* (Walckenaer, 1837) – Озиптиля черная. Мелз и Бурз: степи. Единично.
2044. *Ozyptila orientalis basegica* Esyunin, 1992 – Озиптиля басежская. Блрц: горные тундры. Редко.
2045. *Ozyptila praticola* (C.L. Koch, 1837) – Озиптиля лесная. Учлн (Есюнин, Валуев, 2020б), Блкт, Мелз и Бурз, Уфа: различные леса. Обычно.

2046. *Ozyptila scabricula* (Westring, 1851) – Озиптиля шероховатая. Мелз: степи, суходольный луг. Единично.
2047. *Ozyptila trux* (Blackwall, 1846) – Озиптиля жесткая. Учлн и Бурз: березовый лес, горная тундра. Единично.
2048. *Pistius truncatus* (Pallas, 1772) – Пистиус усеченный. Бурз: сосновый лес. Единично.
2049. *Psammitis bonneti* (Denis, 1938) – Псаммитис Боннета. Блрц, Байм и Учлн: в предгорьях каменистая горная степь и каменные осыпи – единично; в горной части гольцы – обычно, горные тундры – обычно.
2050. *Spiracme striatipes* (L. Koch, 1870) – Спиракме складчатая. Блтч, Туйм, Давл, Абзл (Козьминых, 2022б; Власов, Есюнин, 2025; Хабибуллин, 2025б), Блкт и Мелз, р. Юрюзань: зональные и горные степи – обычно.
2051. *Synema utotchkini* Marusik et Logunov, 1995 – Синема Уточкина. Хайб (Хабибуллин, 2025б: как *Synema globosum*) и Бурз: степи. Редко.
2052. *Thomisus onustus* Walckenaer, 1805 – Томизуз белый. Мелз и Бурз: сосновый лес, суходольный луг. Единично.
2053. *Tmarus rimosus* Paik, 1937 – Тмарус складчатобрюхий. Мелз и Бурз: широколиственные леса. Единично.
2054. *Xysticus acerbus* Thorell, 1872 – Ксистикус жестокий. Блрц (Михайлов и др., 2025).
2055. *Xysticus audax* (Schrank, 1803) – Ксистикус кустарниковый. Блрц (Михайлов и др., 2025), Учлн и Бурз, Уфа, Салават: сосновые, соснов-березовые и березовые леса, луга – обычно; степи – единично.
2056. *Xysticus austrosibiricus* Logunov et Marusik, 1998 – Ксистикус южносибирский. Блрц (Михайлов и др., 2025) и Учлн: горные тундры. Обычно.
2057. *Xysticus bifasciatus* C.L. Koch, 1837 – Ксистикус двухполосый. Слвт, Уфмс (Валуев, 2022а; Михайлов и др., 2025) и Бурз, р. Юрюзань: луга. Редко.
2058. *Xysticus cristatus* (Clerck, 1757) – Ксистикус гребенчатый. Уфа, Салават, Бурз: степи – редко; сосновые, сосново-березовые и березовые леса, лугах – единично.
2059. *Xysticus emertoni* Keyserling, 1880 – Ксистикус Эмертона. Бурз: сосновые, сосново-березовые и березовые леса, суходольные луга. Единично.
2060. *Xysticus gallicus* Simon, 1875 – Ксистикус гальский. Мелз и Бурз: степи. Единично.
2061. *Xysticus kochi* Thorell, 1872 – Ксистикус Коха. Давл (Валуев, 2022а), Мелз и Бурз: луга – редко; степи, широколиственные и березовые леса – единично.
2062. *Xysticus lineatus* (Westring, 1851) – Ксистикус линейный. Бурз: луга, степи. Единично.
2063. *Xysticus luctator* L. Koch, 1870 – Ксистикус борец. Уфмс (Валуев, 2022б), Мелз и Бурз: дубовый лес. Единично.
2064. *Xysticus luctuosus* (Blackwall, 1836) – Ксистикус скорбящий. Бурз: луга – редко; сосново-березовые и березовые леса – единично.

2065. *Xysticus obscurus* Collett, 1877 – Ксистикус темный. Мелз и Бурз: сосновые и сосново-березовые леса, пойменные луга. Единично.
2066. *Xysticus slovacus* Svaton, Pekár et Pridavka, 2000 – Ксистикус словацкий. Блрц (Михайлов и др., 2025), Учлн и Бурз: луга – редко; сосново-березовый лес – единично.
2067. *Xysticus ulmi* (Hahn, 1831) – Ксистикус вязовый. Блрц (Михайлов и др., 2025), Бурз и Учлн: луга – обычно; мелколиственные леса – редко; степи, горная тундра – единично.
2068. *Xysticus viduus* Kulczyński, 1898 – Ксистикус вдовец. Блрц (Михайлов и др., 2025), Учлн и Бурз: луга, горные тундры. Единично.

Семейство Titanoecidae Lehtinen, 1967 – Титанэциды

2069. *Titanoeca schineri* L. Koch, 1872 – Титанэка Шинера. Мелз и Бурз: горные степи, каменистые обнажения. Единично.
2070. *Titanoeca sibirica* L. Koch, 1879 – Титанэка сибирская. Байм: каменистые обнажения. Единично.
2071. *Titanoeca spominima* (Taczanowski, 1866) – Титанэка песчаная. Байм, Мелз и Бурз: горные степи, суходольный луг, каменистая осыпь. Единично.

Myriapoda Latreille, 1802 – Многоножки

(Г.Ш. Фарзалиева)

Класс Chilopoda Latreille, 1817

Отряд Lithobiomorpha Pocock, 1895

Семейство Henicopidae Pocock, 1901

2072. *Lamyctes emarginatus* (Newport, 1844). Блкт: поймы рек, луга. Обычно.

Семейство Lithobiidae Newport, 1844

2073. *Lithobius* (*Chinobius*) *uralensis* (Farzalieva, 2004). Блкт: пойма реки Большой Ик, под корой мертвых деревьев. Единично.
2074. *Lithobius* (*Ezembius*) *ostiacorum* Stuxberg, 1876. Блрц: склоны и подножия гор. Редко.
2075. *Lithobius* (*Ezembius*) *proximus* Sseliwanoff, 1878. РБ (Залесская, 1978); Ишмб (Фарзалиева, Есюнин, 2008), Блрц (Михайлов, Ермаков, 2016), Блкт: различные леса, луга, горные тундры. Обычно.
2076. *Lithobius* (*Lithobius*) *forficatus* (Linnaeus, 1758). РБ: обычно (Баянов и др., 2015).
2077. *Lithobius* (*Monotarsobius*) *curtipes* C. L. Koch, 1847. Ишмб (Фарзалиева, Есюнин, 2008); Блрц (Михайлов, Ермаков, 2016); Блкт: различные леса, луга, горные тундры, каменные осыпи, степи. Обычно.

Отряд Scutigeromorpha Pocock, 1895

Семейство Scutigeridae Leach, 1814

2078. *Scutigera coleoptrata* (Linnaeus, 1758). Дюрт, Уфмс, Стмк, Туйм: постройки, синантропно (Khabibullin, 2017).

Отряд Geophilomorpha Pocock, 1895

Семейство Geophilidae Leach, 1815

2079. *Arctogeophilus macrocephalus* Folkmanová et Dobroruka, 1960. РБ (Залесская и др., 1982).
2080. *Geophilus flavus* (De Geer, 1778). РБ (Баянов и др., 2015).
2081. *Geophilus proximus* C. L. Koch, 1847. РБ (Залесская и др., 1982); Блтч, Блкт и Ишмб: различные леса, луга, постройки. Обычно.
2082. *Pachymerium ferrugineum* (C. L. Koch, 1835). РБ (Залесская и др., 1982).

Семейство Linotaeniidae Cook, 1899

2083. *Strigamia pusilla* (Sseliwanoff, 1884). РБ (Залесская и др., 1982); Блрц (Михайлов, Ермаков, 2016): каменные осыпи, горные тундры. Обычно.

Семейство Schendylidae Cook, 1896

2084. *Escaryus chadaevae* Titova, 1973. РБ: единично (Титова, 1973).
2085. *Escaryus japonicus* Attems, 1927. РБ (Титова, 1973).

Класс Symphyla Ryder, 1880

Отряд Cephalostigmata Verhoeff, 1934

Семейство Scutigerellidae Bagnall, 1913

2086. *Scutigerella immaculata* (Newport, 1845). РБ (Баянов и др., 2015).

Класс Diplopoda de Blainville in Gervais, 1844

Отряд Polyzoniida Cook, 1895

Семейство Polyzoniidae Newport, 1844

2087. *Polyzonium germanicum* Brandt, 1830. РБ (Локшина, 1969); Блрц и Блкт: различные леса, болота, влажные местообитания на склонах гор. Обычно.

Отряд Julida Brandt, 1833

Семейство Blaniulidae C. L. Koch, 1847

2088. *Nopoiulus kochii* (Gervais, 1847). Уфмс: посадки тополя по берегу р. Уфы (Локшина, 1969).

Семейство Julidae Leach, 1814

2089. *Brachyiulus jawlowskii* (Lohmander, 1928). Уфмс: посадки тополя по берегу р. Уфы, обычно (Локшина, 1969).
? Leptoiulus proximus (Nemec, 1896)
2090. *Megaphyllum sjaelandicum* (Meinert, 1868). РБ: поля (Локшина, 1969).
2091. *Ommatoiulus sabulosus* (Linnaeus, 1758). РБ: различные леса, поля (Локшина, 1969).
2092. *Rossiulus kessleri* (Lohmander, 1927). РБ: различные леса, лесопосадки, полезащитные полосы (Локшина, 1969); Бурз: каменистые обнажения. Единично.

Отряд Chordeumatida Pocock, 1894

Семейство Diplomaragnidae Attems, 1907

2093. *Altajosoma golovatchi* (Shear, 1990). Бурз (Shear, 1990) и Блрц: леса, каменные осыпи. Редко.

Отряд Polydesmida Pocock, 1887

Семейство Paradoxosomatidae

? Strongylosoma stigmatosum (Eichwald, 1830)

Семейство Polydesmidae Leach, 1815

2094. *Polydesmus complanatus* (Linnaeus, 1758). РБ: таёжные леса, редко (Локшина, 1969).

2095. *Polydesmus denticulatus* C. L. Koch, 1847. Уфмс: поймы рек, обычно. (Локшина, 1969).

2096. *Polydesmus inconstans* Latzel, 1884. Уфмс: синантропно (Локшина, 1969).

Подтип Crustacea – Ракообразные

Класс Branchiopoda

Подкласс Sarsostraca

Отряд Anostraca

Семейство Artemiidae

2097. *Artemia salina* (Linnaeus, 1758) – Соляный рачок

Семейство Chirocephalidae

2098. *Chirocephalus josephinae* (Grube, 1853)

2099. *Chirocephalus shadini* (Smirnov, 1928)

Семейство Streptocephalidae

2100. *Streptocephalus torvicornis* (Waga, 1842)

Подкласс Phyllopoda

Отряд Notostraca – Щитни

Семейство Triopsidae

2101. *Lepidurus apus* (Linnaeus, 1758) – Весенний щитень

2102. *Triops cancriformis* (Bosc, 1801) – Летний щитень

Отряд Diplostraca

Подотряд Spinicaudata

Семейство Cyzicidae

2103. *Cyzicus tetracerus* (Krynicki, 1830) – Цизик

Семейство Limnadiidae

2104. *Limnadia lenticularis* (Linnaeus, 1761) – Лимнадия

Подотряд Laevicaudata

Семейство Lynceidae

2105. *Lynceus brachyurus* O.F.Muller, 1776 – Линсей

Подотряд Cladocera – Ветвистоусые ракообразные

Инфраотряд Anomopoda

Семейство Acantholeberidae

2106. *Acantholeberis curvirostris* (O. F. Müller, 1776)

Семейство Bosminidae

2107. *Bosmina longirostris* (O. F. Müller, 1785)
2108. *Bosmina coregoni* Baird, 1857
2109. *Eubosmina longicornis* Schoedler, 1866
Eubosmina longicornis kessleri Uljanin, 1874
2110. *Bosminopsis deitersi* Richard, 1895

Семейство Chydoridae

2111. *Acroperus angustatus* Sars, 1863
2112. *Acroperus elongatus* (Sars, 1862)
2113. *Acroperus harpae* (Baird, 1834)
2114. *Alona affinis* (Leydig, 1860)
2115. *Alona costata* Sars, 1862
2116. *Alona guttata* Sars, 1862
2117. *Alona intermedia* Sars, 1862
2118. *Alona quadrangularis* (O. F. Müller, 1876)
2119. *Alona rectangular* Sars, 1862
2120. *Alonella excisa* (Fischer, 1854)
2121. *Alonella exigua* (Lilljeborg, 1853)
2122. *Alonella nana* (Baird, 1850)
2123. *Camptocercus lilljeborgi* Schoedler, 1862
2124. *Camptocercus rectirostris* Schoedler, 1862
2125. *Camptocercus uncinatus* Smirnov, 1971
2126. *Chydorus gibbus* Sars, 1890
2127. *Chydorus latus* Sars, 1862
2128. *Chydorus sphaericus* (O. F. Müller, 1776)
2129. *Chydorus ovalis* Kurz, 1875
2130. *Disparalona rostrata* (Koch, 1841)
2131. *Dunhevedia crassa* King, 1853
2132. *Graptoleberis testudinaria* (Fischer, 1851)
2133. *Monospilus dispar* Sars, 1862
2134. *Oxyurella tenuicaudis* (Sars, 1862)
2135. *Peracantha truncata* (O. F. Müller, 1785)
2136. *Picipleuroxus laevis* (Sars, 1862)
2137. *Pleuroxus aduncus* (Jurine, 1820)
2138. *Pleuroxus trigonellus* (O. F. Müller, 1776)
2139. *Pleuroxus uncinatus* (Baird, 1850)
2140. *Pseudochydorus globosus* (Baird, 1843)
2141. *Rhynchotalona falcata* (Sars, 1862)

Семейство Daphniidae

2142. *Ceriodaphnia dubia* Richard, 1894
2143. *Ceriodaphnia laticaudata* P. E. Müller, 1867
2144. *Ceriodaphnia megops* Sars, 1862

2145. *Ceriodaphnia pulchella* Sars, 1862
2146. *Ceriodaphnia quadrangula* (O. F. Müller, 1785)
2147. *Ceriodaphnia reticulata* (Jurine, 1820)
2148. *Daphnia (Ctenodaphnia) magna* Straus, 1820
2149. *Daphnia (Ctenodaphnia) similis* Claus, 1876
2150. *Daphnia (Daphnia) cristata* Sars, 1861
2151. *Daphnia (Daphnia) cucullata* Sars, 1862
2152. *Daphnia (Daphnia) galeata* Sars, 1864
2153. *Daphnia (Daphnia) hyalina* Leydig, 1860
2154. *Daphnia (Daphnia) longispina* (O. F. Muller, 1776)
2155. *Daphnia (Daphnia) pulex* Leydig, 1860
2156. *Megafenestra aurita* (Fischer, 1849)
2157. *Scapholeberis microcephala* Sars, 1890
2158. *Scapholeberis mucronata* (O. F. Müller, 1776)
2159. *Simocephalus congener* Schoedler, 1858)
2160. *Simocephalus exspinosus* (Koch, 1841)
2161. *Simocephalus serrulatus* (Koch, 1841)
2162. *Simocephalus vetulus* (O. F. Müller, 1776)

Семейство Eurycercidae

2163. *Eurycercus lamellatus* (O. F. Müller, 1776)

Семейство Ilyocryptidae

2164. *Ilyocryptus acutifrons* Sars, 1862
2165. *Ilyocryptus sordidus* (Lievin, 1848)

Семейство Macrothricidae

2166. *Lathonura rectirostris* (O.F.Müller, 1785)
2167. *Macrothrix hirsuticornis* Norman & Brady, 1867
2168. *Macrothrix laticornis* (Jurine, 1820)
2169. *Macrothrix rosea* (Jurine, 1820)

Семейство Moinidae

2170. *Moina brachiata* (Jurine, 1820)
2171. *Moina macrocopa* (Straus, 1820)
2172. *Moina micrura* Kurz, 1875

Инфраотряд Ctenopoda

Семейство Holopediidae

2173. *Holopedium gibberum* Zaddach, 1855

Семейство Sididae

2174. *Diaphanosoma brachyurum* (Liévin, 1848)
2175. *Diaphanosoma mongolianum* Ueno, 1938
2176. *Diaphanosoma orghidani* Negrea, 1982
2177. *Sida crystallina* (O. F. Müller, 1776)

Инфраотряд Haplopoda

Семейство Leptodoridae

2178. *Leptodora kindtii* (Focke, 1844)

Инфраотряд Onychopoda

Семейство Cercopagidae

2179. Гибрид *Bythotrephes brevimanus* Lilljeborg, 1901 x *Bythotrephes cederstromii* Schodler & Karesuando, 1877 – РБ (Korovchinsky, 2019)

Семейство Polyphemidae

2180. *Polyphemus pediculus* (Linnaeus, 1761)

Класс Copepoda – Веслоногие ракообразные

Отряд Calanoida – Каляниды

Семейство Diaptomidae

2181. *Acanthodiaptomus denticornis* (Wierzejski, 1887)
2182. *Arctodiaptomus acutilobatus* (Sars, 1903)
2183. *Arctodiaptomus bacillifer* (Koelbel, 1885)
2184. *Arctodiaptomus salinus* (Daday, 1885)
2185. *Diaptomus mirus* Lilljeborg, 1889
2186. *Eudiaptomus gracilis* (Sars, 1863)
2187. *Eudiaptomus graciloides* (Lilljeborg, 1888)
2188. *Eudiaptomus transylvanicus* (Daday, 1891)
2189. *Hemidiaptomus ignatovi* Sars, 1903
2190. *Metadiaptomus asiaticus* (Uljanin, 1875)

Семейство Temoridae

2191. *Eurytemora gracilis* (Sars, 1898)
2192. *Heterocope borealis* (Fischer, 1851)

Отряд Cyclopoida – Циклопиды

Семейство Cyclopidae

Подсемейство Cyclopinae

2193. *Acanthocyclops venustus* (Norman & Scott, 1906)
2194. *Acanthocyclops vernalis* (Fischer, 1853)
2195. *Cryptocyclops bicolor* (Sars, 1863)
2196. *Cyclops insignis* Claus, 1857
2197. *Cyclops scutifer* Sars, 1863
2198. *Cyclops strenuus* Fischer, 1851
2199. *Cyclops vicinus* Ulianine, 1875
2200. *Diacyclops bicuspidatus* (Claus, 1857)
2201. *Diacyclops crassicaudis* (Sars, 1863)
2202. *Diacyclops languidoides* (Lilljeborg, 1901)
2203. *Diacyclops languidus* (Sars, 1863)
2204. *Megacyclops gigas* (Claus, 1857)
2205. *Megacyclops viridis* (Jurine, 1820)
2206. *Mesocyclops leuckarti* (Claus, 1857)
2207. *Metacyclops gracilis* (Lilljeborg, 1853)

2208. *Microcyclops varicans* (Sars, 1863)
2209. *Thermocyclops crassus* (Fischer, 1853)
2210. *Thermocyclops dybowskii* (Lande, 1890)
2211. *Thermocyclops oithonoides* (Sars, 1863)

Подсемейство Eucyclopinae

2212. *Eucyclops macruroides* (Lilljeborg, 1901)
2213. *Eucyclops macrurus* (Sars, 1863)
2214. *Eucyclops serrulatus* (Fischer, 1851)
2215. *Macrocyclops albidus* (Jurine, 1820)
2216. *Macrocyclops distinctus* (Richard, 1887)
2217. *Macrocyclops fuscus* (Jurine, 1820)
2218. *Paracyclops affinis* (Sars, 1863)
2219. *Paracyclops fimbriatus fimbriatus* (Fischer, 1853)
2220. *Paracyclops poppei* (Rehberg, 1880)
2221. *Tropocyclops prasinus* (Fischer, 1860)

Семейство Ergasilidae

2222. *Ergasilus sieboldi* von Nordmann, 1832 – на жабрах многих видов рыб

Семейство Lernaeidae

2223. *Lamproglena pulchella* von Nordmann, 1832 – на жабрах голавлей
2224. *Lernaea cyprinacea* Linnaeus, 1758 – на карасях

Отряд Harpacticoida

Семейство Canthocamptidae

2225. *Bryocamptus sp.* – Бурз, пещера Шульган-Таш (Турбанов и др., 2016а).

Семейство Laophontidae

2226. *Onychocamptus mohammed* (Blanchard & Richard, 1891) – Уфа 2019

Отряд Siphonostomatoida

Семейство Lernaeopodidae

2227. *Achtheres percarum* von Nordmann, 1832 – на коже и жабрах окуневых рыб
2228. *Tracheliastes polycolpus* von Nordmann, 1832 – у ельцов и язей

Класс Maxillopoda

Отряд Arguloida

Семейство Argulidae

2229. *Argulus coregoni* Thorell, 1864 – на рыбах р. Узян, Тирлянка, верховья р. Белая
2230. *Argulus foliaceus* (Linnaeus, 1758) – Кармановское вдхр., оз. Банное, Белое, Ургун, р. Белая

Отряд Cephalobaenida

Семейство Reighardiidae

2231. *Reighardia sternae* (Diesing, 1864) – в носовых ходах речной крачки

Класс Ostracoda – Ракушковые

Отряд Podocopida – Ракушковые

Семейство Candonidae

2232. *Candona candida* (O. F. Müller, 1776)
2233. *Cyclocypris laevis* (O. F. Müller, 1776)

Семейство Cyprididae

2234. *Cypria ophtalmica* (Jurine, 1820)
2235. *Cypris sp.*
2236. *Eucypris inflata* (Sars, 1903)

Семейство Darwinulidae

2237. *Darwinula stevensoni* (Brady & Robertson, 1870)

Семейство Limnocytheridae

2238. *Kovalevskiella rudjakovi* (Danielopol 1969) – Бурз, пещера Шульган-Таш (= Каповая) (Турбанов и др., 2016а).
2239. *Limnocythere sp.*

Семейство Notodromadidae

2240. *Notodromas monacha* (O. F. Müller, 1776) – в пещерных водоемах

Класс Malacostraca – Высшие ракообразные

Отряд Mysida – Мизиды

Семейство Mysidae

2241. *Paramysis intermedia* (Czerniavsky, 1882)
2242. *Paramysis lacustris* (Czerniavsky, 1882) – Нижнекамское вдхр. (Кортунова, 1989).
2243. *Paramysis ullskyi* (Czerniavsky, 1882) – низовья р. Белая; завезен в оз. Аслыкуль

Отряд Isopoda – Равноногие

Подотряд Oniscidea

Семейство Agnaridae

2244. *Protracheoniscus major* (Dollfus, 1903) – Уфа 2024, в здании

Семейство Armadillidiidae

2245. *Armadillidium versicolor* Stein, 1859 – Уфа и Салават 2020-2025

Семейство Cylisticidae

2246. *Cylisticus convexus* (De Geer, 1778) – Уфа 2023
2247. *Parcylisticus sp.* – Ишмб 2022

Семейство Oniscidae

2248. *Oniscus asellus* (Linnaeus, 1758) – Мокрица обыкновенная
? *Oniscus murarius* Cuvier, 1792 – Мокрица стенная

Семейство Porcellionidae

2249. *Porcellio scaber* Latreille, 1804 – Уфа 2023 и 2024

2250. *Porcellio spinicornis* Say, 1818 – Уфа, Крмс 2018-2024
2251. *Porcellionides pruinosus* (Brandt, 1833) – Блкт 2020, Дюрт 2020, Ермк 2020, Кгрч 2020

Семейство Trachelipodidae

2252. *Trachelipus rathkii* (Brandt, 1833) – повсеместно, обычен

Семейство Trichoniscidae

2253. *Hyloniscus riparius* (C.Koch, 1838) – Уфа 2023 и 2024

Подотряд Asellota

Семейство Asellidae

2254. *Asellus aquaticus* (Linnaeus, 1758) – Водяной ослик

Отряд Amphipoda – Разноногие

Семейство Corophiidae

2255. *Chelicorophium curvispinum* (Sars, 1895) – в низовьях р. Белая

Семейство Gammaridae – Бокоплавы

2256. *Dikerogammarus haemobaphes* (Eichwald, 1841)
2257. *Gammarus lacustris* Sars, 1863 – Озерный бокоплав
2258. *Gammarus pulex* (Linnaeus, 1758)

Семейство Iphigenellidae

2259. *Iphigenella acanthopoda* Sars, 1896

Семейство Pontogammaridae

2260. *Pontogammarus sarsi* (Sowinsky, 1898)

Отряд Decapoda – Десятиногие

Семейство Astacidae

2261. *Ponastacus leptodactylus* (Eschscholtz, 1823) – Тонкопалый речной рак

Подтип Hexapoda – Шестиногие

Класс Entognatha – Скрыточелюстные насекомые

Отряд Collembola – Ногохвостки, или Коллемболы

Подотряд Poduromorpha

Семейство Brachystomellidae

2262. *Brachystomella parvula* (Schaeffer, 1896)

Семейство Hypogastruridae

2263. *Ceratophysella armata* (Nicolet, 1841) – Грибная подура
2264. *Ceratophysella bengtssoni* (Agren, 1904)
2265. *Ceratophysella denticulata* (Bagnall, 1941)
2266. *Ceratophysella kapoviensis* (Babenko, 1994)
2267. *Ceratophysella mosquensis* (Becker, 1905)
2268. *Ceratophysella sigillata* (Uzel, 1891).
2269. *Ceratophysella succinea* (Gisin, 1949)
2270. *Choreutinula inermis* (Tullberg, 1871)

2271. *Hypogastrura manubrialis* (Tullberg, 1869)
2272. *Hypogastrura nivicola* (Fitch, 1847) – Снежная блоха – Блкт, Учлн, Янул
2273. *Hypogastrura purpurescens* (Lubbock, 1967)
2274. *Hypogastrura sahlbergi* (Reuter, 1895)
2275. *Hypogastrura sensilis* (Folsom, 1919)
2276. *Hypogastrura socialis* (Uzel, 1891)
2277. *Hypogastrura subboldorii* Delamare Deboutteville et Jacquemart 1962 – пещеры
2278. *Hypogastrura tullbergi* (Schaeffer, 1900)
2279. *Hypogastrura vernalis* (Carl, 1901)
2280. *Hypogastrura viatica* (Tullberg, 1872)
2281. *Schaefferia baschkirica* Kniss, 1985
2282. *Typhlogastrura alabamensis* Thibaud, 1975 – пещеры (Турбанов и др., 2016б)
2283. *Willemia anophthalma* Börner, 1901 – Блтч, Чшмн (Ханисламова, 1982)
2284. *Willemia intermedia* Mills, 1934 – Блтч, Чшмн (Ханисламова, 1982)
2285. *Xenylla maritima* Tullberg, 1869

Семейство Neanuridae

2286. *Anurida carpatica* Babenko, 1998
2287. *Anurida granulata* Agrell, 1943
2288. *Friesea mirabilis* (Tullberg, 1871)
2289. *Morulina sp.*
2290. *Neanura muscorum* (Templeton, 1835)
2291. *Neanura parva* (Stach, 1951)
2292. *Philotella olgae* (Kniss & Thibaud, 1995)

Семейство Odontellidae

2293. *Axenyllodes bayeri* (Kseneman, 1935) – Блтч; в пещерах

Семейство Onychiuridae

2294. *Deuteraphorura inermis* (Tullberg, 1869)
2295. *Hymenaphorura pseudosibirica* (Stach, 1954)
2296. *Hymenaphorura sibirica* (Tullberg, 1877)
2297. *Hymenaphorura valdegranulata* (Stach, 1954) – в теплице Ботсада Уфы
2298. *Kalaphorura burmeisteri* (Lubbock, 1873) – Архн
2299. *Micraphorura uralica* (Khanislamova, 1986)
2300. *Oligaphorura absoloni* (Borner, 1901)
2301. *Oligaphorura schoetti* (Lie-Pettersen, 1896)
2302. *Onychiuroides granulosus* (Stach, 1930)
2303. *Onychiurus ambulans* (Linnaeus, 1758) – Белая подура
2304. *Orthonychiurus stachianus* (Bagnall, 1939)
2305. *Protaphorura armata* (Tullberg, 1869)
2306. *Protaphorura aurantiaca* (Ridley, 1881)
2307. *Protaphorura bicampata* (Gisin, 1956) – Блтч, Чшмн (Ханисламова, 1982)
2308. *Protaphorura octopunctata* (Tullberg, 1877)
2309. *Protaphorura quadriocellata* (Gisin, 1947)
2310. *Protaphorura stachi* Bagnall, 1935 – в пещерах

2311. *Protaphorura suboctopunctata* (Khanislamova, 1986)
2312. *Psyllaphorura bashkirica* (Khanislamova, 1986) – пещера Шульган-Таш (Капралов, 2010)
2313. *Supraphorura furcifera* (Borner, 1901)

Семейство Poduridae

2314. *Podura aquatica* Linnaeus, 1758

Семейство Tullbergiidae

2315. *Mesaphorura hygrophila* (Rusek, 1971)
2316. *Mesaphorura krausbaueri* (Borner, 1901)
2317. *Mesaphorura sylvatica* (Rusek, 1971) – Блтч, Чшмн (Ханисламова, 1982)
2318. *Metaphorura affinis* (Börner, 1903)
2319. *Neonaphorura duboscqi* (Denis & J-R, 1932) – Блтч, Чшмн (Ханисламова, 1982)
2320. *Stenaphorura sp.* – Брзн, Мелз

Подотряд Entomobryomorpha

Семейство Entomobryidae

2321. *Entomobrya corticalis* (Nicolet, 1842)
2322. *Entomobrya dorsalis* Uzel, 1891
2323. *Entomobrya lanuginosa* (Nicolet, 1841)
2324. *Entomobrya multifasciata* (Tullberg, 1871)
2325. *Entomobrya muscorum* (Nicolet, 1842)
2326. *Entomobrya nivalis* (Linnaeus, 1758)
2327. *Entomobrya superba* (O.M.Reuter, 1876) – Ишмб, Иглн 2025
2328. *Lepidocyrtus curvicollis* Bourlet, 1839
2329. *Lepidocyrtus cyaneus* Tullberg, 1871 – Бурз, Мелз
2330. *Lepidocyrtus lanuginosus* (Linnaeus, 1788)
2331. *Lepidocyrtus lignorum* (Fabricius, 1775) – в пещерах
2332. *Lepidocyrtus paradoxus* Uzel, 1890
2333. *Pseudosinella octopunctata* Börner, 1901 – в теплице Ботсада Уфы; Бурз, Мелз
2334. *Seira squamoornata* (Scherbakov, 1898)– Бурз, Мелз
2335. *Willowsia buski* (Lubbock, 1870)
2336. *Willowsia nigromaculata* (J.Lubbock, 1873) – Иглн 2025

Семейство Isotomidae

2337. *Anurophorus laricis* Nicolet, 1842
2338. *Bagnallella ripicola* Linnaniemi, 1912
2339. *Ballistura navacerradensis* (Selga, 1962) – Блтч, Чшмн (Ханисламова, 1982)
2340. *Desoria nivea* (Schaeffer, 1896)
2341. *Desoria olivacea* (Tullberg, 1871)
2342. *Desoria violacea* (Tullberg, 1877)
2343. *Folsomia diplophthalma* (Axelson, 1902)
2344. *Folsomia fimetaria* (Linnaeus, 1758) – Овощная изотома

2345. *Folsomia fimetarioides* (Axelson, 1903)
2346. *Folsomia paoinflata* Potapov et Stebaeva 2006 – Ишмб, в пещерах (Турбанов и др., 2016б)
2347. *Folsomia penicula* Bagnall, 1939
2348. *Folsomia quadrioculata* (Tullberg, 1871)
2349. *Folsomia sexoculata* (Tullberg, 1871)
2350. *Folsomia spinosa* Kseneman, 1936
2351. *Hemisotoma thermophila* (Axelson, 1900)
2352. *Heteroisotoma stebaevae* (Rusek, 1991)
2353. *Isotoma viridis* Bourlet, 1839
2354. *Isotomiella minor* (Schaeffer, 1896)
2355. *Isotomodes notabilis* (Schaeffer, 1896)
2356. *Isotomodes productus* (Axelson, 1906)
2357. *Isotomurus palliceps* (Uzel, 1891) – Бурз, Мелз
2358. *Isotomurus palustris* (O.F.Müller, 1776)
2359. *Isotomurus plumosus* Bagnall, 1940 – Бурз, Мелз
2360. *Pachyotoma topsenti* (Denis, 1948)
2361. *Parisotoma notabilis* (Schaeffer, 1896)
2362. *Pseudisotoma monochaeta* (Kos, 1942) – Блтч
2363. *Pseudofolsomia acanthella* Martynova, 1967
2364. *Proisotoma minima* (Absolon, 1901)
2365. *Proisotoma minuta* (Tullberg, 1871)
2366. *Sericeotoma knissi* Potapov, 1991
2367. *Tetracanthella pilosa* Schoett, 1891

Семейство Orchesellidae

2368. *Heteromurus nitidus* (Templeton, 1836)
2369. *Orchesella cincta* (Linnaeus, 1758) – Иглн 2025
2370. *Orchesella flavescens* (Bourlet, 1839)
2371. *Orchesella multifasciata* A.M.Scherbakov, 1898 – Иглн 2025

Семейство Tomoceridae

2372. *Plutomurus baschkiricus* (Skorikow, 1900)
2373. *Pogonognathellus flavescens* (Tullberg, 1871) – Свинцово-серая ногохвостка
2374. *Pogonognathellus longicornis* (O.F. Müller, 1776)
2375. *Tomocerina varia* (J.W.Folsom, 1899)
2376. *Tomocerus asiaticus* Martynova, 1969
2377. *Tomocerus minor* (Lubbock, 1862)
2378. *Tomocerus punctatus* Yosii, 1967
2379. *Tomocerus vulgaris* (Tullberg, 1871)

Подотряд Symphypleona

Семейство Arrhopalitidae

2380. *Arrhopalites acanthophthalmus* Gisin, 1958
2381. *Arrhopalites carpaticus* Vargovich, 1999 – Мелз, пещера
2382. *Pygmarrhopalites benitus* (J.W.Folsom, 1896)

2383. *Pygmarrhopalites pygmaeus* (Wankel, 1860)
2384. *Pygmarrhopalites secundarius* (Gisin, 1958)
2385. *Pygmarrhopalites sericus* (Gisin, 1947)

Семейство Bourletiellidae

2386. *Deuterosminthurus bicinctus* (Koch, 1840)
2387. *Deuterosminthurus pallipes* (Bourlet, 1843) – Блтч, Чшмн (Ханисламова, 1984)
2388. *Heterosminthurus insignis* (Reuter, 1876) – Блтч, Чшмн (Ханисламова, 1984)
2389. *Heterosminthurus novemlineatus* (Tullberg, 1871) – Блтч (Ханисламова, 1984)

Семейство Dicyrtomidae

2390. *Dicyrtoma fusca* (Lubbock, 1873)
2391. *Ptenothrix reticulata* Stach, 1957

Семейство Katiannidae

2392. *Sminthurinus aureus* (Lubbock, 1862)

Семейство Sminthuridae

2393. *Lipothrix lubbocki* (Tullberg, 1872)
2394. *Sminthurus viridis* (Linnaeus, 1758) – Зеленый сминтур

Семейство Sminthurididae

2395. *Sminthurides malmgreni* (Tullberg, 1877) – Блтч (Ханисламова, 1982)
2396. *Sphaeridia pumilis* (Krausbauer, 1898)

Подотряд Neelipleona

Семейство Neelidae

2397. *Megalothorax minimus* Willem, 1900 – Блтч (Ханисламова, 1984)

Отряд Diplura – Двухвостки

Семейство Campodeidae

2398. *Campodea plusiochaeta* Silvestri, 1912
2399. *Campodea staphylinus* Westwood, 1842

Семейство Japygidae

2400. *Catajapyx confusus* (Silvestri, 1929) – ЗШТ

Класс Insecta – Насекомые

Hemimetabola – Насекомые с неполным превращением

Отряд Zygentoma – Щетинохвостки

Семейство Lepismatidae

2401. *Lepisma saccharinum* Linnaeus, 1758 – Сахарная (обыкновенная) чешуйница
2402. *Thermobia domestica* (Packard, 1837) – Домашняя чешуйница

Отряд Blattodea – Тараканы

Семейство Blattidae

2403. *Blatta orientalis* Linnaeus, 1758 – Черный таракан (синантроп)
2404. *Periplaneta lateralis* Walker, 1868 – Уфа 2022, Ишмб 2023 (инвазивный вид)

Семейство Ectobiidae

2405. *Blattella germanica* (Linnaeus, 1767) – Рыжий таракан, прусак (синантроп)
2406. *Ectobius lapponicus* (Linnaeus, 1758) – Лапландский таракан – Давл 2017, Нефтекамск 2020-2021, Туйм 2023, Чишм 2024
2407. *Ectobius sylvestris* (Poda, 1761) – Лесной таракан – леса, единично

Отряд Mantodea– Богомолы

Семейство Mantidae

2408. *Mantis religiosa* (Linnaeus, 1758) – Обыкновенный богомол – степи, обычен

Семейство Rivetinidae

? *Bolivaria brachyptera* Pallas, 1773 – Зилр (Петров и др., 2019)

Отряд Orthoptera – Прямокрылые

Подотряд Caelifera – Короткоусые

Семейство Acrididae – Настоящие саранчовые

Подсемейство Acridinae

2409. *Acrida bicolor* (Thunberg, 1815) – Двухцветная акрида

Подсемейство Calliptaminae

2410. *Calliptamus barbarus* (Costa, 1836) – Пустынный прус
2411. *Calliptamus italicus* (Linnaeus, 1758) – Итальянский прус

Подсемейство Catantopinae

2412. *Confusacris longipennis* Zheng & Shi, 2010
2413. *Podisma pedestris* (Linnaeus, 1758) – Бескрылая кобылка

Подсемейство Cyrtacanthacridinae

2414. *Anacridium aegyptium* (Linnaeus, 1764) – Египетская кобылка
2415. *Schistocerca gregaria* (Forskål, 1775) – Пустынная саранча

Подсемейство Gomphocerinae

2416. *Aeropedellus variegatus* (Fischer de Waldheim, 1846)
2417. *Arcyptera fusca* (Pallas, 1773) – Пестрая кобылка
2418. *Arcyptera microptera* (Fischer de Waldheim, 1833) – Крестовая кобылка
2419. *Chorthippus albomarginatus* (De Geer, 1773) – Белополосая кобылка
2420. *Chorthippus apricarius* (Linnaeus, 1758) – Бурый конек
2421. *Chorthippus biguttulus* (Linnaeus, 1758)
2422. *Chorthippus brunneus* (Thunberg, 1815) – Двухцветная кобылка
2423. *Chorthippus dorsatus* (Zetterstedt, 1821) – Луговой конек
2424. *Chorthippus dubius* (Zubovski, 1898) – Мелз 2021
2425. *Chorthippus karelini* (Uvarov, 1910) – Куюр 2023
2426. *Chorthippus macrocerus* (Fischer de Waldheim, 1846)
Chorthippus macrocerus purpuratus (Vorontsovsky, 1928)
2427. *Chorthippus mollis* (Charpentier, 1825)
2428. *Chorthippus pullus* (Philippi, 1830) – Нефтекамск 2020
2429. *Chrysochraon dispar* (Germar, 1834) – Непарный зеленчук
2430. *Dociostaurus brevicollis* (Eversmann, 1848) – Малая крестовичка

2431. *Dociostaurus kraussi* (Ingenitzky, 1897)
2432. *Dociostaurus maroccanus* (Thunberg, 1815) – Марокканская саранча
2433. *Euchorthippus pulvinatus* (Fischer de Waldheim, 1846)
2434. *Euthystira brachyptera* (Ocskay, 1826) – Короткокрылый зеленчук
2435. *Gomphocerippus rufus* (Linnaeus, 1758) – Гафр 2014, Блрц 2019-2024, Абзл 2022, Зилр 2020
2436. *Gomphocerus sibiricus* (Linnaeus, 1767) – Сибирская кобылка
2437. *Myrmeleotettix antennatus* (Fieber, 1853) – Волосатая (длинноусая) копьеуска
2438. *Myrmeleotettix pallidus* (Brunner von Wattenwyl, 1882) – Бледная копьеуска
2439. *Omocestus haemorrhoidalis* (Charpentier, 1825) – Красная травянка
2440. *Omocestus petraeus* (Brisout de Barneville, 1856) – Малая травянка
2441. *Omocestus viridulus* (Linnaeus, 1758) – Зеленая травянка
2442. *Podismopsis altaica* (Zubovski, 1900)
2443. *Pseudochorthippus montanus* (Charpentier, 1825) – Кард 2020
2444. *Pseudochorthippus parallelus* (Zetterstedt, 1821)
2445. *Stauroderus scalaris* (Fischer von Waldheim, 1846) – Темнокрылая кобылка
2446. *Stenobothrus carbonarius* (Eversmann, 1848)
2447. *Stenobothrus eurasius* Zubovskii, 1898 – Евразийская травянка
2448. *Stenobothrus fischeri* (Eversmann, 1848) – Травянка Фишера
2449. *Stenobothrus lineatus* (Panzer, 1796) – Толстоголовая травянка
2450. *Stenobothrus miramae* Dirsh, 1931
2451. *Stenobothrus nigromaculatus* (Herrich-Schaeffer, 1840) – Пятнистая травянка

Подсемейство Oedipodinae

2452. *Aiolopus thalassinus* (Fabricius, 1781) – Обыкновенная летунья
2453. *Angaracris barabensis* (Pallas, 1773) – юг, Зауралье
2454. *Bryodemella tuberculata* (Fabricius, 1775) – Ширококрылая трещотка
2455. *Celes variabilis* (Pallas, 1771) – Изменчивая кобылка
2456. *Epacromius tergestinus* (Megerle von Mühlfeld, 1825)
2457. *Locusta migratoria* (Linnaeus, 1758) – Перелетная саранча
2458. *Oedaleus decorus* (Germar, 1825) – Чернополосая кобылка
2459. *Oedipoda caerulescens* (Linnaeus, 1758) – Голубокрылая кобылка
2460. *Psophus stridulus* (Linnaeus, 1758) – Обыкновенная огневка
2461. *Sphingoderus carinatus* (Saussure, 1888)
2462. *Sphingonotus caerulans* (Linnaeus, 1767) – Голубокрылая пустынница
Sphingonotus caerulans cyanopterus (Charpentier, 1825)
2463. *Stethophyma grossum* (Linnaeus, 1758) – Болотная кобылка

Семейство Pamphagidae

2464. *Asiotmethis muricatus* (Pallas, 1771) – Степная кобылка

Семейство Tetrigidae

2465. *Tetrix bipunctata* (Linnaeus, 1758)
2466. *Tetrix subulata* (Linnaeus, 1758) – Узкий тетрикс
2467. *Tetrix tenuicornis* (Sahlberg, 1891) – Тонкоусый тетрикс

Подотряд Ensifera – Длинноусые

Семейство Gryllidae – Сверчки

2468. *Acheta domesticus* (Linnaeus, 1758) – Домовый сверчок
? Gryllus bimaculatus De Geer, 1773 – Блвщ 2023
2469. *Gryllus campestris* Linnaeus, 1758 – Полевой сверчок – обычен
? Eumodicogryllus bordigalensis (Latreille, 1804) – Уфа 2019
2470. *Melanogryllus desertus* (Pallas, 1771) – Степной сверчок
2471. *Modicogryllus frontalis* (Fieber, 1844) – Лобастый сверчок – Предуралье, обычен
2472. *Oecanthus pellucens* (Scopoli, 1763) – Обыкновенный трубачник

Семейство Gryllotalpidae – Медведки

2473. *Gryllotalpa gryllotalpa* (Linnaeus, 1758) – Обыкновенная медведка

Семейство Myrmecophilidae

2474. *Myrmecophilus acervorum* (Panzer, 1799) – Крмс 2024

Семейство Tettigoniidae – Настоящие кузнечики

2475. *Barbitistes constrictus* Brunner von Wattenwyl, 1878 – Чшмн (Хабибуллин, 2018б)
2476. *Bicolorana bicolor* (Philippi, 1830) – Двухцветный скачок
2477. *Conocephalus dorsalis* (Latreille, 1804) – Чшмн (Хабибуллин, 2018б)
2478. *Conocephalus fuscus* (Fabricius, 1793) – Мелз 2020, Крмск 2020, Архн 2022, Уфа 2022, Ишмб 2022-2023, Уфмс 2023, Куюр 2023, Октябрьский 2024
2479. *Decticus verrucivorus* (Linnaeus, 1758) – Серый кузнечик
2480. *Gampsocleis glabra* (Herbst, 1786) – Гладкий кузнечик – Дюртюли
? Gampsocleis sedakovii (Fischer von Waldheim, 1846) – Байм 2010
2481. *Glyphonotus thoracicus* (Fischer von Waldheim, 1846)
2482. *Isophya modesta rossica* Bey-Bienko, 1954 – Русская изофия
2483. *Leptophyes albovittata* (Kollar, 1833) – Кумертау 2020, Уфа 2020-2024
2484. *Metrioptera brachyptera* (Linnaeus, 1761) – Короткокрылый кузнечик
2485. *Montana montana* (Kollar, 1833) – Степной скачок – Дюртюли, Чишм, Бузд, Ермк
2486. *Onconotus laxmanni* (Pallas, 1771) – Севчук Лаксманна
2487. *Onconotus servillei* Fischer de Waldheim, 1846 – Кушн, Бузд, Белб, Стмк
2488. *Phaneroptera falcata* (Poda, 1761) – Обыкновенный пластинокрыл
2489. *Pholidoptera griseoaptera* (De Geer, 1773) – Пепельная кустолюбка
2490. *Platycleis affinis* Fieber, 1853 – Хайб 2014
2491. *Platycleis albopunctata* (Goeze, 1778) – Пятнистый скачок
2492. *Poecilimon intermedius* (Fieber, 1853) – Чишм, Ермк
2493. *Roeseliana roeselii* (Hagenbach, 1822) – Зеленый скачок
2494. *Saga pedo* (Pallas, 1771) – Степная дыбка – юг
2495. *Tessellana veyseli* (Koçak, 1984) – Абзл 2022, Уфмс 2024
2496. *Tettigonia cantans* (Fuessly, 1775) – Певчий кузнечик – локально
2497. *Tettigonia caudata* (Charpentier, 1845) – Хвостатый кузнечик – Уфа, юг
2498. *Tettigonia viridissima* (Linnaeus, 1758) – Зеленый кузнечик – обычен

Отряд Dermaptera – Уховертки, или кожистокрылые

Семейство Forficulidae

2499. *Anechura bipunctata* (Fabricius, 1781) – Абзл 2018, Слвт 2023, Блрц 2025
2500. *Forficula auricularia* Linnaeus, 1758 – Обыкновенная уховёртка – обычна
2501. *Forficula tomis* (Kolenati, 1846) – Огородная уховёртка – обычна

Семейство Labiduridae

2502. *Labidura riparia* (Pallas, 1773) – Прибрежная уховёртка

Семейство Spongiphoridae

2503. *Labia minor* (Linnaeus, 1758) – Малая уховертка

Отряд Plecoptera – Веснянки

Семейство Capniidae

2504. *Capnia atra* Morton, 1896
2505. *Capnia nigra* (Pictet, 1833) – Стерлитамак (Чаус, 2015)
2506. *Zwicknia bifrons* (Newman, 1839)

Семейство Chloroperlidae

2507. *Siphonoperla burmeisteri* (Pictet, 1841)
2508. *Xanthoperla apicalis* (Newman, 1836)

Семейство Leuctridae

2509. *Leuctra digitata* Kempny, 1899
2510. *Leuctra fusca* (Linnaeus, 1758)
2511. *Leuctra hippopus* Kempny, 1899
2512. *Leuctra nigra* (Olivier, 1811)

Семейство Nemouridae

2513. *Amphinemura borealis* (Morton, 1894)
2514. *Amphinemura standfussi* (Ris, 1902)
2515. *Nemoura avicularis* Morton, 1894
2516. *Nemoura cinerea* (Retzius, 1783) – реки Ашкадар, Селеук, Инзер, Зилаир, Большой Ик (Чаус, 2018б), Стерлитамак (Чаус, 2015)
2517. *Nemoura flexuosa* Aubert, 1949
2518. *Nemurella pictetii* (Klapalek, 1900) – Стерлитамак (Чаус, 2015)

Семейство Perlidae

2519. *Perla marginata* (Panzer, 1799)

Семейство Perlodidae

2520. *Arcynopteryx sp.* – ЗШТ (Летопись…, 2021).
? Diura bicaudata (Linnaeus, 1758) – Уфа 2024
2521. *Isogenus nubecula* Newman, 1833
2522. *Isoperla difformis* (Klapalek, 1909)
2523. *Isoperla grammatica* (Poda, 1761)
2524. *Isoperla obscura* (Zetterstedt, 1840)
2525. *Perlodes dispar* (Rambur, 1842)
2526. *Perlodes microcephalus* (Pictet, 1833) – Альш 2016

Семейство Taeniopterygidae

2527. *Brachyptera braueri* Klapálek, 1900 – Ишмб 2022
2528. *Brachyptera risi* (Morton, 1896) – Стерлитамак (Чаус, 2015)
2529. *Taeniopteryx nebulosa* (Linnaeus, 1758)

Отряд Psocodea – Сеноеды

Семейство Amphipsocidae

2530. *Kolbia quisquiliarum* Bertkau, 1882 – ЮУГПЗ (Голуб, 2015)

Семейство Caeciliusidae

2531. *Caecilius fuscopterus* (Latreille, 1799) – Архн, ЮУГПЗ (Голуб, 2015)
2532. *Valenzuela burmeisteri* (Brauer, 1876) – ЮУГПЗ (Голуб, 2015)
2533. *Valenzuela flavidus* (Stephens, 1836) – Архн, ЮУГПЗ (Голуб, 2015), Иглн 2025 - обычен, Салават 2025
2534. *Valenzuela gynapterus* (Tetens, 1891) – Архн, ЮУГПЗ (Голуб, 2015)
2535. *Valenzuela piceus* (Kolbe, 1882) – ЮУГПЗ (Голуб, 2015)

Семейство Elipsocidae

2536. *Hemineura dispar* Tetens, 1891 – ЮУГПЗ (Голуб, 2015)

Семейство Epipsocidae

2537. *Bertkauia lucifuga* (Rambur, 1842) – ЮУГПЗ (Голуб, 2015)

Семейство Lachesillidae

2538. *Lachesilla pedicularia* (Linnaeus, 1758) – Архн (Голуб, 2015)
2539. *Lachesilla quercus* (Li, 2002) – Архн, ЮУГПЗ (Голуб, 2015)

Семейство Liposcelididae

2540. *Liposcelis decolor* (Pearman, 1925) – Книжная вошь

Семейство Mesopsocidae

2541. *Mesopsocus laticeps* (Kolbe, 1880) – Архн, ЮУГПЗ (Голуб, 2015)

Семейство Peripsocidae

2542. *Peripsocus alboguttatus* (Dalman, 1823) – ЮУГПЗ (Голуб, 2015)
2543. *Peripsocus phaeopterus* (Stephens, 1836) – Архн, ЮУГПЗ (Голуб, 2015)
2544. *Peripsocus subfasciatus* (Rambur, 1842) – ЮУГПЗ (Голуб, 2015), Иглн 2025

Семейство Philotarsidae

2545. *Philotarsus picicornis* (Fabricius, 1793) – ЮУГПЗ (Голуб, 2015)

Семейство Psocidae

2546. *Amphigerontia bifasciata* (Latreille, 1799) – ЮУГПЗ (Голуб, 2015), Иглн 2025
2547. *Amphigerontia contaminata* (Stephens, 1836) – ЮУГПЗ (Голуб, 2015)
2548. *Blaste conspurcata* (Rambur, 1842) – ЮУГПЗ (Голуб, 2015)
2549. *Blaste quadrimaculata* (Latreille, 1794) – ЮУГПЗ (Голуб, 2015)
2550. *Hyalopsocus contrarius* (Reuter, 1893) – Архн (Голуб, 2015)
2551. *Metylophorus nebulosus* (Stephens, 1836) – Архн, ЮУГПЗ (Голуб, 2015), Иглн
2552. *Psococerastis gibbosa* (Sulzer, 1776) – ЮУГПЗ (Голуб, 2015)
2553. *Trichadenotecnum majus* (Kolbe, 1880) – Архн, ЮУГПЗ (Голуб, 2015), Иглн

Семейство Psyllipsocidae

2554. *Psyllipsocus ramburii* Selys-Longchamps, 1872

Семейство Stenopsocidae

2555. *Graphopsocus cruciatus* (Linnaeus, 1768) – Архн, ЮУГПЗ (Голуб, 2015), Иглн
2556. *Stenopsocus immaculatus* (Stephens, 1836) – Агидель
2557. *Stenopsocus lachlani* Kolbe, 1880 – Архн, ЮУГПЗ (Голуб, 2015)

Семейство Trogiidae

2558. *Lepinotus inquilinus* Heyden, 1850
2559. *Lepinotus reticulatus* Enderlein, 1905
2560. *Trogium pulsatorium* (Linnaeus, 1758)

Отряд Ephemeroptera – Поденки

Семейство Ameletidae

2561. *Ameletus inopinatus* Eaton, 1887 – ЗШТ (Летопись…, 2021).

Семейство Ametropodidae

2562. *Metretopus borealis* (Eaton, 1871)

Семейство Baetidae

2563. *Acentrella lapponica* (Bengtsson, 1912) – ЗШТ (Летопись…, 2021).
2564. *Baetis fuscatus* (Linnaeus, 1761) – Стерлитамак (Чаус, 2015)
2565. *Baetis rhodani* (Pictet, 1843)
2566. *Baetis vernus* Curtis, 1834 – Синяя поденка
2567. *Centroptilum luteolum* Müller, 1776 – реки Белая (Чаус, 2019), Ашкадар, Селеук, Инзер, Зилаир, Большой Ик (Чаус, 2018б)
2568. *Cloeon dipterum* (Linnaeus, 1761) – Двукрылая поденка, обычна
2569. *Cloeon simile* Eaton, 1870
2570. *Labiobaetis tricolor* (Tshernova, 1928) – реки Белая (Чаус, 2019), Ашкадар, Селеук, Инзер, Зилаир, Большой Ик (Чаус, 2018б)
2571. *Parameletus chelifer* Bengtsson, 1908
2572. *Procloeon bifidum* (Bengtsson, 1912)

Семейство Behningiidae

2573. *Behningia ulmeri* Lestage, 1929

Семейство Caenidae – Грязевые поденки

2574. *Brachycercus harrisella* Curtis, 1834
2575. *Caenis horaria* (Linnaeus, 1758)
2576. *Caenis lactea* (Burmeister, 1839)
2577. *Caenis luctuosa* (Burmeister, 1839)
2578. *Caenis macrura* Stephens, 1835 – Длиннохвостая поденка
2579. *Caenis rivulorum* Eaton, 1884 – ЗШТ (Летопись…, 2021).
2580. *Caenis robusta* Eaton, 1884

Семейство Ephemerellidae

2581. *Ephemerella mucronata* (Bengtsson, 1909)
2582. *Serratella ignita* (Poda, 1761) – ЗШТ (Летопись…, 2021), реки Белая, Нугуш, Ашкадар, Селеук, Инзер, Юрюзань, Зилаир, Большой Ик (Чаус, 2017б)

2583. *Torleya major* (Klapálek, 1905) – Стерлитамак (Чаус, 2015)

Семейство Ephemeridae

2584. *Ephemera danica* Muller, 1764
2585. *Ephemera lineata* Eaton, 1870
2586. *Ephemera vulgata* Linnaeus, 1758 – Обыкновенная поденка

Семейство Heptageniidae

2587. *Arthroplea congener* Bengtsson, 1908
2588. *Ecdyonurus aurantiacus* (Burmeister, 1839)
2589. *Ecdyonurus forcipula* (Pictet, 1843) – Стерлитамак (Чаус, 2015)
2590. *Ecdyonurus venosus* (Fabricius, 1775) – Жилковатая горная поденка
2591. *Dacnogenia coerulans* (Rostock, 1878)
2592. *Heptagenia flava* Rostock, 1878
2593. *Heptagenia longicauda* (Stephens, 1836) – Уфа 2020
2594. *Heptagenia sulphurea* (Muller, 1776)
2595. *Kageronia fuscogrisea* (Retzius, 1783)

Семейство Isonychiidae

2596. *Isonychia ignota* (Walker, 1853)

Семейство Leptophlebiidae

2597. *Choroterpes picteti* (Eaton, 1871) – Стерлитамак (Чаус, 2015)
2598. *Habrophlebia fusca* (Curtis, 1834)
2599. *Habrophlebia lauta* McLachlan, 1884
2600. *Leptophlebia marginata* (Linnaeus, 1767)
2601. *Paraleptophlebia cincta* (Retzius, 1783)
2602. *Paraleptophlebia submarginata* (Stephens, 1835)

Семейство Oligoneuriidae

2603. *Oligoneuriella rhenana* (Imhoff 1852) – Стерлитамак (Чаус, 2015)

Семейство Palingeniidae

2604. *Palingenia longicauda* (Olivier, 1791)

Семейство Polymitarcyidae

2605. *Ephoron virgo* (Olivier, 1791) – Стерлитамак (Чаус, 2015)

Семейство Potamanthidae

2606. *Potamanthus luteus* (Linnaeus, 1767)

Семейство Siphlonuridae

2607. *Siphlonurus aestivalis* Eaton, 1903 – реки Белая (Чаус, 2019), Ашкадар, Селеук, Инзер, Зилаир, Большой Ик (Чаус, 2018б), Стерлитамак (Чаус, 2015)
2608. *Siphlonurus alternatus* (Say, 1824) – реки Белая (Чаус, 2019), Ашкадар, Селеук, Инзер, Зилаир, Большой Ик (Чаус, 2018б)
2609. *Siphlonurus lacustris* Eaton, 1870

Отряд Odonata – Стрекозы

Подотряд Zygoptera – Равнокрылые стрекозы

Семейство Calopterygidae – Красотки

2610. *Calopteryx splendens* (Harris, 1780) – Блестящая красотка – обычна
2611. *Calopteryx virgo* (Linnaeus, 1758) – Красотка-девушка – нередко

Семейство Coenagrionidae – Стрелки

2612. *Coenagrion armatum* (Charpentier, 1840) – Зеленоватая или вооруженная стрелка
2613. *Coenagrion ecornutum* (Selys, 1872) – Рогатая стрелка
2614. *Coenagrion glaciale* (Hagen, 1872) – Байм 2010 (Яныбаева, 2011)
2615. *Coenagrion hastulatum* (Charpentier, 1825) – Копьеносная стрелка
2616. *Coenagrion johanssoni* (Wallengren, 1894) – Стройная стрелка
2617. *Coenagrion lunulatum* (Charpentier, 1840) – Весенняя стрелка
2618. *Coenagrion puella* (Linnaeus, 1758) – Стрелка-девушка
2619. *Coenagrion pulchellum* (Vander Linden, 1825) – Красивая стрелка
2620. *Enallagma cyathigerum* (Charpentier, 1840) – Голубая стрелка
2621. *Erythromma najas* (Hansemann, 1823) – Красноглазая стрелка
2622. *Erythromma viridulum* (Charpentier, 1840) – Учлн (Попова, Харитонов, 2008)
2623. *Ischnura aralensis* Haritonov, 1979 – Аральский тонкохвост
2624. *Ischnura elegans* (Vander Linden, 1820) – Изящная стрелка
2625. *Ischnura pumilio* (Charpentier, 1825) – Маленькая стрелка
2626. *Nehalennia speciosa* (Charpentier, 1840) – Красивая стрелка
2627. *Pyrrhosoma nymphula* (Sulzer, 1776) – Нимфальная огнетелка

Семейство Lestidae – Лютки

2628. *Lestes barbarus* (Fabricius, 1798) – Лютка-иноземка – Аскн 2022
2629. *Lestes dryas* Kirby, 1890 – Лютка-дриада
2630. *Lestes macrostigma* (Eversmann, 1836) – Лютка-крупноглазка
2631. *Lestes sponsa* (Hansemann, 1823) – Лютка-невеста
2632. *Lestes temporalis* Selys, 1883 – Байм (Яныбаева, 2011)
2633. *Lestes virens* (Charpentier, 1825) – Зеленоватая лютка – Мишк 2022
2634. *Sympecma fusca* (Vander Linden, 1820) – Рыжая (тусклая) лютка
2635. *Sympecma paedisca* (Brauer, 1877) – Сибирская лютка или серая – Крдл 2022 (Онишко, Валуев, 2023).

Семейство Platycnemididae – Плосконожки

2636. *Platycnemis pennipes* (Pallas, 1771) – Обыкновенная плосконожка – обычна

Подотряд Anisoptera – Разнокрылые стрекозы

Семейство Aeshnidae – Коромысла

2637. *Aeshna affinis* Vander Linden, 1820 – Зеленобокое коромысло
2638. *Aeshna caerulea* (Strom, 1783) – Голубое коромысло или чешуйчатое
2639. *Aeshna crenata* Hagen, 1856 – Сибирское коромысло
2640. *Aeshna cyanea* (Muller, 1764) – Синее коромысло
2641. *Aeshna grandis* (Linnaeus, 1758) – Большое коромысло
2642. *Aeshna isoceles* (Muller, 1767) – Учлн, Крмс
2643. *Aeshna juncea* (Linnaeus, 1758) – Камышовое коромысло
2644. *Aeshna mixta* Latreille, 1805 – Маленькое коромысло

2645. *Aeshna serrata* Hagen, 1856 – Зубчатое коромысло
2646. *Aeshna soneharai* Asahina, 1988 – Давл 2018, Уфа 2023, Гафр 2024, Ишимбай 2025
2647. *Aeshna subarctica* Walker, 1908 – Блрц (Харитонов и др., 2014)
2648. *Aeshna viridis* Eversmann, 1836 – Зеленое коромысло
2649. *Anax imperator* Leach, 1815 – Дозорщик-император – локально
2650. *Anax parthenope* (Selys, 1839) – Темнолобый дозорщик
2651. *Brachytron pratense* (Muller, 1764) – Луговой короткобрюх или беловолосое коромысло

Семейство Cordulegastridae

2652. *Cordulegaster boltonii* (Donovan, 1807)

Семейство Corduliidae – Бабки или патрульщики

2653. *Cordulia aenea* (Linnaeus, 1758) – Бронзовая бабка – обычна
2654. *Epitheca bimaculata* (Charpentier, 1825) – Двупятнистая бабка
2655. *Somatochlora alpestris* (Selys, 1840) – Альпийская зеленотелка
2656. *Somatochlora arctica* (Zetterstedt, 1840) – Арктическая зеленотелка (бабка)
2657. *Somatochlora flavomaculata* (Vander Linden, 1825) – Желтопятнистая бабка
2658. *Somatochlora graeseri* Selys, 1887 – Грезера зеленотелка
2659. *Somatochlora metallica* (Vander Linden, 1825) – Металлическая бабка – обычна
2660. *Somatochlora sahlbergi* Trybom, 1889 – Байм 2004 (Яныбаева, 2011)

Семейство Gomphidae – Дедки или речники

2661. *Gomphus vulgatissimus* (Linnaeus, 1758) – Обыкновенный дедка – обычен
2662. *Onychogomphus forcipatus* (Linnaeus, 1758) – Европейский дедка или хвостатый
2663. *Ophiogomphus cecilia* (Fourcroy, 1785) – Рогатый дедка
2664. *Stylurus flavipes* (Charpentier, 1825) – Желтоногий дедка

Семейство Libellulidae – Настоящие стрекозы

2665. *Leucorrhinia albifrons* (Burmeister, 1839) – Белолобая стрекоза
2666. *Leucorrhinia caudalis* (Charpentier, 1840) – Хвостатая стрекоза – Нурм 2022
2667. *Leucorrhinia dubia* (Vander Linden, 1825) – Стрекоза-белонос
2668. *Leucorrhinia pectoralis* (Charpentier, 1825) – Болотная стрекоза
2669. *Leucorrhinia rubicunda* (Linnaeus, 1758) – Красная стрекоза
2670. *Libellula depressa* Linnaeus, 1758 – Плоская стрекоза
2671. *Libellula fulva* Muller, 1764 – Рыжая стрекоза
2672. *Libellula quadrimaculata* Linnaeus, 1758 – Четырёхпятнистая стрекоза – обычна
2673. *Orthetrum albistylum* (Selys, 1848) – Кгрч 2021, Кумертау 2023
2674. *Orthetrum brunneum* (Fonscolombe, 1837) – Блрц 2022, Гафр 2022
2675. *Orthetrum cancellatum* (Linnaeus, 1758) – Решётчатая стрекоза
2676. *Orthetrum coerulescens* (Fabricius, 1798) – Крмс 2024
2677. *Pantala flavescens* (Fabricius, 1798) – Октябрьский 2024
2678. *Selysiothemis nigra* (Vander Linden, 1825) – Чёрная селисия

2679. *Stylurus flavipes* (Charpentier, 1825) – Уфмс 2022, Илиш 2024, Кушн 2024, Уфа 2025
2680. *Sympetrum danae* (Sulzer, 1776) – Черная стрекоза – Дувн 2022
2681. *Sympetrum flaveolum* (Linnaeus, 1758) – Желтоватая стрекоза – обычна
2682. *Sympetrum fonscolombii* (Selys, 1840) – Мелз 2020, Давл 2020, Салават 2020, Ишмб 2023, Уфа 2023, Октябрьский 2024
2683. *Sympetrum meridionale* (Selys, 1841) – Предуралье
2684. *Sympetrum pedemontanum* (Müller, 1766) – Перевязанная стрекоза – Слвт и Дувн 2022 (Онишко, Валуев, 2023).
2685. *Sympetrum sanguineum* (Muller, 1764) – Кроваво-красная стрекоза
2686. *Sympetrum striolatum* (Charpentier, 1840) – Байм (Яныбаева, 2011)
2687. *Sympetrum tibiale* (Ris, 1897)
2688. *Sympetrum vulgatum* (Linnaeus, 1758) – Обыкновенная стрекоза

Семейство Macrimiidae

2689. *Macromia amphigena* Selys, 1871 – Учлн (Попова, Харитонов, 2008)

Отряд Phthiraptera – Пухоеды и власоеды

Подотряд Amblycera

Семейство Colpocephalidae

2690. *Colpocephalum flavescens* (Haan, 1829) – на осоеде

Семейство Gliricolidae

2691. *Gliricola porcelli* (Schrank, 1781) – на морской свинке

Семейство Gyropidae

2692. *Gyropus ovalis* Burmeister, 1838 – на морской свинке

Семейство Laemobothriidae

2693. *Laemobothrion maximum titan* Piaget, 1880 – на луговом луне

Семейство Menoponidae

2694. *Eomenacanthus stramineus* (Nitzsch, 1818) – на курице
2695. *Menacanthus pici* (Denny, 1842) – на большом (пестром) дятле
2696. *Menacanthus pusillus* (Nitzsch, 1866) – на трясогузке
2697. *Menopon gallinae* (Linnaeus, 1758) – Куриный пухоед
2698. *Myrsidea cornicis* (De Geer, 1778) – на вороне
2699. *Myrsidea indivisa* (Nitzsch, 1866) – на сойке
2700. *Myrsidea quadrifasciata* (Piaget, 1880) – на домовом воробье

Семейство Trinotonidae

2701. *Trinoton anserinum* (J. C. Fabricius, 1805) – Гусиный пухоед
2702. *Trinoton querquedulae* (Linnaeus, 1758) – Утиный пухоед

Подотряд Ischnocera

Семейство Philopteridae

2703. *Anaticola anseris* (Linnaeus, 1758) – на гусе
2704. *Anaticola crassicorne* (Scopoli, 1763) – на утке
2705. *Brueelia biocellata* (Piaget, 1880) – на сороке

2706. *Campanulotes bidentatus* (Scopoli, 1763) – Двузубый пухоед (на голубе)
2707. *Columbicola columbae* (Linnaeus, 1758) – Голубиный пероед
2708. *Craspedorrhynchus platystomus* (Burmeister, 1838) – на канюке
2709. *Cuclotogaster heterographus* (Nitzsch, 1866) – Куриный пероед
2710. *Degeeriella rufa* (Burmeister, 1838) – на луговом луне
2711. *Goniodes dissimilis* (Denny, 1842) – на курице
2712. *Goniodes gigas* (Taschenberg, 1879) – на курице
2713. *Lipeurus caponis* (Linnaeus, 1758) – на курах, цесарке и др.
2714. *Meropoecus meropis* (Denny, 1842) – на золотистой щурке
2715. *Mulcticola hypoleucus* (Denny, 1842) – на козодое
2716. *Paragoniocotes fulvofasciatus* (Picaglia, 1885) – на кобчике
2717. *Penenirmus auritus* (Scopoli, 1763) – на большом пестром дятле
2718. *Penenirmus pici* (Fabricius, 1798) – на большом пестром дятле
2719. *Philopterus crassipes* (Burmeister, 1838) – на сороке
2720. *Philopterus excisus* Nitzsch, 1818 var *major* Kellogg, 1896 – на золотистой щурке
2721. *Philopterus guttatus* (Denny, 1842) – на галке
2722. *Strigiphilus ceblebrachys* (Denny, 1842) – на сове

Семейство Trichodectidae

2723. *Bovicola bovis* (Linnaeus, 1758) – Воловий власоед
2724. *Bovicola caprae* (Gurlt, 1843) – на козах
2725. *Bovicola ovis* (Schrank, 1781) – Овечий власоед
2726. *Felicola subrostratus* (Burmeister, 1838) – на кошке и др.
2727. *Trichodectes canis* (De Geer, 1778) – Собачий власоед
2728. *Werneckiella equi* (Denny, 1842) – Лошадиный власоед

Подотряд Anoplura – Вши

Семейство Haematopinidae

2729. *Haematopinus eurysternus* Denny, 1842 – Бычья вошь
2730. *Haematopinus suis* (Linnaeus, 1758) – Свиная вошь

Семейство Hoplopleuridae

2731. *Hoplopleura affinis* (Burmeister, 1839) – на домовой мыши

Семейство Leptopsyllidae

2732. *Amphipsylla rossica* Wagner, 1912

Семейство Linognathidae

2733. *Linognathus ovillus* (Neumann, 1907) – на овце
2734. *Linognathus setosus* (von Olfers, 1816) – на собаке
2735. *Linognathus stenopsis* (Burmeister, 1838) – на козе
2736. *Linognathus vituli* (Linnaeus, 1758) – Коровья вошь

Семейство Pediculidae

2737. *Pediculus humanus capitis* de Geer, 1778 – Головная вошь человека
Pediculus humanus humanus Linnaeus, 1758 – Платяная вошь человека

Семейство Polyplacidae

2738. *Haemodipsus lyriocephalus* (Burmeister, 1839) – на зайце
2739. *Haemodipsus ventricosus* (Denny, 1842) – на кролике
2740. *Polyplax spinulosa* (Burmeister, 1839) – на крысе

Семейство Pthiridae

2741. *Pthirus pubis* (Linnaeus, 1758) – Лобковая вошь или площица

Отряд Hemiptera – Полужесткокрылые

Подотряд Aleyrodinea

Семейство Aleyrodidae – Белокрылки

2742. *Trialeurodes vaporariorum* (Westwood, 1856) – Оранжерейная белокрылка – в оранжереях Уфы

Подотряд Sternorrhyncha

Семейство Adelgidae – Хермесы

2743. *Adelges laricis* Vallot, 1836 – Елово-лиственничный хермес
2744. *Adelges pectinatae* (Cholodkovsky, 1888) – Бурый елово-пихтовый хермес
2745. *Adelges viridanus* (Cholodkovsky, 1896)
2746. *Adelges viridis* (Ratzeburg, 1843) – Зеленый хермес
2747. *Pineus cembrae* (Cholodkovsky, 1888) – Сибирский хермес

Семейство Aphalaridae

2748. *Aphalara polygoni* Foerster, 1848 – Блрц
2749. *Craspedolepta aberrantis* Loginova, 1962 – Блрц
2750. *Craspedolepta nebulosa* (Zetterstedt, 1828) – Блрц
2751. *Craspedolepta subpunctata* (Foerster, 1848) – Блрц

Семейство Aphididae – Тли

2752. *Acyrthosiphon caraganae* (Cholodkovsky, 1908) – Акациевая тля – Нефтекамск
2753. *Acyrthociphon pisum* (Harris, 1776) – Гороховая тля
2754. *Anoecia corni* (Fabricius, 1775) – Крмс 2019, Нефтекамск 2019, Бурз 2022
2755. *Aphis craccae* Linnaeus, 1758 – Крмс 2019, Уфа 2020
2756. *Aphis craccivora* Koch, 1854 – Люцерновая тля
2757. *Aphis euphorbiae* Walker, 1849
2758. *Aphis fabae* Scopoli, 1763 – Свекольная тля
2759. *Aphis gossypii* Glover, 1877 – Бахчевая тля
2760. *Aphis grossulariae* Kaltenbach, 1843 – Крыжовниковая тля
2761. *Aphis idaei* van der Goot, 1912 – Малинная тля
2762. *Aphis pomi* Vallot, 1802 – Зеленая яблоневая тля
2763. *Aphis viburni* Scopoli, 1763 – Альш
2764. *Aulacorthum solani* (Kaltenbach, 1843) – Пеларгониевая тля – оранжереи Уфа
2765. *Brachycaudus prunicola* (Kaltenbach, 1843) – Терновая тля
2766. *Brevicoryne brassicae* (Linnaeus, 1758) – Капустная тля
2767. *Calaphis flava* Mordvilko, 1928 – Березовая листовая тля
2768. *Chaitophorus populialbae* (Boyer de Fonscolombe, 1841) – Белый хетофор
2769. *Cinara laricis* (Börner, 1942) – Лиственничная тля

2770. *Cinara piceae* (Panzer, 1801) – Елово-блестящая тля
2771. *Cinara pineum* (Mordvilko, 1895) – Большая сосновая тля
2772. *Colopha compressa* (Koch, 1856) – Вязово-осоковая тля
2773. *Corylobium avellanae* (Schrank, 1801) – Лещинная тля
2774. *Cryptomyzus ribis* (Linnaeus, 1758) – Смородинная тля
2775. *Cryptosiphum artemisiae* Buckton, 1879 – Ишмб 2024
2776. *Diuraphis noxia* (Mordvilko, 1913) – Ячменная тля
2777. *Drepanosiphum acerinum* (Walker, 1848) – Кленовая одиночная тля
2778. *Drepanosiphum aceris* Koch, 1855 – Кленовая тля
2779. *Dysaphis crataegi* (Kaltenbach, 1843) – Лютиково-боярышниковая тля
2780. *Dysaphis pyri* (Boyer de Fonscolombe, 1841) – на груше, смородине
2781. *Dysaphis sorbi* (Kaltenbach, 1843) – Альш
2782. *Elatobium abietinum* (Walker, 1849) – Еловая игловая тля
2783. *Eriosoma ulmi* (Linnaeus, 1758) – Вязово-смородинная тля
2784. *Eucallipterus tiliae* (Linnaeus, 1758) – Нефтекамск, Уфа
2785. *Euceraphis punctipennis* (Zetterstedt, 1828) – Туймазы
2786. *Forda marginata* Koch, 1857 – Корневая тля
2787. *Glyphina betulae* (Linnaeus, 1758) – Березовая глифина
2788. *Hormaphis betulae* (Mordvilko, 1901) – Березовая кружковая тля
2789. *Hyalopterus pruni* (Geoffroy, 1762) – Сливовая опыленная тля – Иглн
2790. *Lachnus roboris* (Linnaeus, 1758) – Дубовая пестрая тля
2791. *Macrosiphum (Macrosiphum) rosae* (Linnaeus, 1758) – Зеленая розанная тля
2792. *Metopolophium dirhodum* (Walker, 1849) – Розанно-злаковая тля
2793. *Myzocallis coryli* (Goeze, 1778) – на орешнике
2794. *Myzus cerasi* (Fabricius, 1775) – Вишневая тля
2795. *Myzus persicae* (Sulzer, 1776) – Зеленая персиковая тля
2796. *Paracletus cimiciformis* von Heyden, 1837 – Крмс 2023
2797. *Pemphigus borealis* Tullgren, 1909 – Дальневосточный пемфиг
2798. *Pemphigus bursarius* (Linnaeus, 1758) – Обыкновенный черешковый пемфиг
2799. *Pemphigus fuscicornis* (Koch, 1857) – Корневая свекловичная тля
2800. *Pemphigus spyrothecae* Passerini, 1860 – Поздний спиральногалловый пемфиг
2801. *Periphyllus testudinaceus* (Fernie, 1852) – Кленовая жилковая тля
2802. *Phloeomyzus passerinii* (Signoret, 1875) – в трещинах коры тополей
2803. *Phorodon cannabis* Passerini, 1860 – Конопляная тля
2804. *Prociphilus pini* (Burmeister, 1835) – Боярышниковая мохнатая тля
2805. *Rhopalosiphum maidis* (Fitch, 1856)
2806. *Rhopalosiphum padi* (Linnaeus, 1758) – Черемуховая тля
2807. *Schizaphis graminum* (Rondani, 1852) – Обыкновенная злаковая тля
2808. *Schizolachnus pineti* (Fabricius, 1781)
2809. *Sitobion avenae* (Fabricius, 1775) – Овсяная тля
2810. *Symydobius oblongus* (von Heyden, 1837) – Березовая побеговая тля
2811. *Tetraneura ulmi* (Linnaeus, 1758) – Вязово-злаковая тля

2812. *Thecabius affinis* (Kaltenbach, 1843) – Тополево-лютиковая тля
2813. *Thelaxes dryophila* (Schrank, 1801) – Полосатая дубовая тля
2814. *Tinocallis platani* (Kaltenbach, 1843) –Зеленоватая вязовая тля
2815. *Tuberculatus annulatus* (Hartig, 1841)
2816. *Tuberolachnus salignus* (Gmelin, 1790) – Уфа 2023

Семейство Asterolecaniidae

2817. *Asterodiaspis variolosa* (Ratzeburg, 1870)

Семейство Coccidae – Подушечницы и ложнощитовки

2818. *Coccus hesperidum* Linnaeus, 1758 – оранжереи Уфа
2819. *Eulecanium caraganae* Borchsenius, 1953 – Чилиговая ложнощитовка
2820. *Eulecanium douglasi* (Sulc, 1895) – Ивовая ложнощитовка
2821. *Eulecanium tiliae* (Linnaeus, 1758) – Липовая ложнощитовка
2822. *Parthenolecanium corni* (Bouche, 1844)
2823. *Pulvinaria vitis* (Linnaeus, 1758) – Виноградная (березовая) подушечница

Семейство Diaspididae – Щитовки

2824. *Chionaspis salicis* (Linnaeus, 1758) – Европейская ивовая щитовка
2825. *Comstockaspis perniciosa* (Comstock) 1881 – Уфа 2023
2826. *Diaspidiotus alni* (Marchal, 1909) – Ольховая круглая щитовка
2827. *Diaspidiotus ostreaeformis* (Curtis, 1843) – Устрицевидный червец
2828. *Lepidosaphes ulmi* (Linnaeus, 1758) – Яблоневая запятовидная щитовка
2829. *Leucaspis pini* (Hartig, 1839) – Сосновая щитовка

Семейство Eriococcidae

2830. *Eriococcus spurius* (Modeer, 1778) – Уфа 2024

Семейство Kermesidae – Кермесы

2831. *Kermes quercus* (Linnaeus, 1758) – Северный кермес

Семейство Ortheziidae – Пластинчатые червецы

2832. *Arctorthezia cataphracta* (Olafsen, 1772)
2833. *Orthezia urticae* (Linnaeus, 1758) – Крапивный червец

Семейство Phylloxeridae – Филлоксеры

2834. *Acanthochermes quercus* Kollar, 1848 – Дубовая выпуклая тля
2835. *Phylloxera coccinea* (von Heyden, 1837) – Дубовая листовая филлоксера

Семейство Pseudococcidae – Мучнистые червецы и войлочники

2836. *Coccura comari* (Kunow, 1880) – Ежевичный червец
2837. *Heliococcus bohemicus* Sulc, 1912 – Европейский солнечный червец
2838. *Phenacoccus aceris* (Signoret, 1875)
2839. *Phenacoccus piceae* (Low, 1883)

Семейство Psyllidae – Листоблошки, или Медяницы

2840. *Cacopsylla abdominalis* (Meyer-Dur, 1871)
2841. *Cacopsylla mali* (Schmidberger, 1836) – Яблонная медяница
2842. *Cacopsylla pyri* (Linnaeus, 1761)
2843. *Psylla alni* (Linnaeus, 1758)

Семейство Triozidae

2844. *Trioza flavipennis* Foerster, 1848 – Кркм 2020-2021, Уфмс 2022
2845. *Trioza urticae* (Linnaeus, 1758) – Блрц
2846. *Trioza viridula* (Zetterstedt, 1828)

Подотряд Cicadomorpha

Семейство Aphrophoridae – Пенницы

2847. *Aphrophora alni* (Fallen, 1805) – Ольховая пенница – обычна
2848. *Aphrophora salicina* (Goeze, 1778) – Ивовая пенница – обычна
2849. *Lepyronia coleoptrata* (Linnaeus, 1758) – Жесткокрылая пенница – степи, массово
2850. *Neophilaenus lineatus* (Linnaeus, 1758)
2851. *Omalophora costalis* (Matsumura, 1903)
2852. *Omalophora pectoralis* (Matsumura, 1903)
2853. *Philaenus spumarius* (Linnaeus, 1758) – Слюнявая пенница – всюду, массово
Philaenus spumarius leucophthalmus (Linnaeus, 1758)

Семейство Cicadellidae – Цикадки

Подсемейство Agaliinae

2854. *Agallia brachyptera* (Bohemann, 1847)
2855. *Anaceratagallia estonica* Vilbaste, 1959

Подсемейство Aphrodinae

2856. *Anoscopus serratulae* (Fabricius, 1775)
2857. *Aphrodes bicincta* (Schrank, 1776)
2858. *Planaphrodes bifasciata* (Linnaeus, 1758)
2859. *Planaphrodes laeva* (Rey, 1891)

Подсемейство Cicadellinae

2860. *Cicadella viridis* (Linnaeus, 1758) – Зеленая цикадка
2861. *Evacanthus acuminatus* (Fabricius, 1794)

Подсемейство Deltocephalinae

2862. *Adarrus bellevoyei* (Puton, 1877)
2863. *Adarrus multinotatus* (Boheman, 1847)
2864. *Allygidius commutatus* (Fieber, 1872)
2865. *Allygus commutatus* Fieber, 1872
2866. *Anoscopus flavostriatus flavostriatus* (Donovan, 1799)
2867. *Arocephalus lacteus* Emeljanov, 1962
2868. *Arocephalus languidus* (Flor, 1861)
2869. *Arthaldeus pascuellus* (Fallen, 1826)
2870. *Arthaldeus striifrons* (Kirschbaum, 1868)
2871. *Athysanus quadrum* Boheman, 1845
2872. *Balclutha confluens* (Rey, 1894)
2873. *Chloothea zonata* Emeljanov, 1959
2874. *Cicadula persimilis* (Edwards, 1920)
2875. *Cicadula quadripunctata* (de Villers, 1789)
2876. *Cicadula saturata* (Edwards, 1915)

2877. *Coelestinus kasakhstanicus* Emeljanov, 1964
2878. *Cosmotettix aurantiacus* (Forel, 1859)
2879. *Cosmotettix costalis* (Fallen, 1826)
2880. *Cosmotettix caudatus* (Flor, 1861)
2881. *Cosmotettix edwardsi* (Lindberg, 1924)
2882. *Deltocephalus pulicaris* (Fallen, 1806)
2883. *Diplocolenus abdominalis* (Fabricius, 1803)
2884. *Diplocolenus bensoni* (China, 1933)
2885. *Diplocolenus bohemani* (Zetterstedt, 1840)
2886. *Diplocolenus frauenfeldi* (Fieber, 1869)
2887. *Doratura exilis* Horvath, 1903
2888. *Doratura homophyla* (Flor, 1861)
2889. *Doratura impudica* Horvath, 1897
2890. *Doratura stylata* (Boheman, 1847)
2891. *Ebarrius vilbastei* Nast, 1977
2892. *Elymana kozhevnikovi* (Zakhvatkin, 1938)
2893. *Elymana sulphurella* (Zetterstedt, 1828)
2894. *Emeljanovianus medius* (Mulsant & Rey, 1855)
2895. *Enantiocephalus cornutus* (Herrich-Schäffer, 1838)
2896. *Errastunus daedaleus* (Logvinenko, 1966)
2897. *Errastunus ocellaris* (Fallen, 1806)
2898. *Erzaleus metrius* (Flor, 1861)
2899. *Euscelis distinguenda* (Kirschbaum, 1858)
2900. *Euscelis incisa* (Kirschbaum, 1858)
2901. *Euscelis venosa* (Kirschbaum, 1868)
2902. *Evacanthus interruptus* (Linnaeus, 1758)
2903. *Graphocraerus ventralis* (Fallen, 1806)
2904. *Handianus flavovarius* (Herrich-Schaffer, 1835)
2905. *Handianus ignoscus* (Fieber, 1869)
2906. *Handianus potanini* (Melichar, 1900) – Крмс 1934 (Tishechkin, 2022)
2907. *Handianus procerus* (Herrich-Schäffer, 1835)
2908. *Hardya burjata* (Kusnezov, 1931)
2909. *Henschia acuta* (Löw, 1885)
2910. *Hesium domino* (Reuter, 1880)
2911. *Idiodonus cruentatus* (Panzer, 1799)
2912. *Jassargus alpinus* (Then, 1896)
2913. *Jassargus repletus* (Fieber, 1869)
2914. *Laburrus handlirschi* (Matsumura, 1908)
2915. *Laburrus impictifrons* (Boheman, 1852)
2916. *Laburrus pellax* (Horvath, 1903)
2917. *Limotettix striola* (Fallen, 1806)
2918. *Macrosteles alpinus* (Zetterstedt, 1828) – Блрц
2919. *Macrosteles laevis* (Ribaut, 1927) – Шеститочечная цикадка на злаках

2920. *Macrosteles septemnotatus* (Fallen, 1806)
2921. *Macrosteles sexnotatus* (Fallen, 1806) – Иремель Блрц (Ольшванг, 1986)
2922. *Macrosteles variatus* (Fallen, 1806)
2923. *Macrosteles viridigriseus* (Edwards, 1924)
2924. *Mendrausus pauxillus* (Fieber, 1869)
2925. *Metalimnus formosus* (Boheman, 1845)
2926. *Metalimnus steini* (Fieber, 1869)
2927. *Mogangina bromi* Emeljanov, 1962
2928. *Mongolojassus bicuspidatus* (Sahlberg, 1871)
2929. *Neoaliturus fenestratus* (Herrich-Schaffer, 1834)
2930. *Neoaliturus guttulatus* (Kirschbaum, 1868)
2931. *Neoaliturus opacipennis* (Lethierry, 1876)
2932. *Ophiola identica* (Tischetshkin, 2003)
2933. *Ophiola russeola* (Fallén, 1826)
2934. *Ophiola transversa* (Fallen, 1826)
2935. *Ophiolix paludosus* (Boheman, 1845)
2936. *Orientus ishidae* (Matsumura, 1902) – Уфа 2024-2025
2937. *Paluda agropyri* Emeljanov, 1962
2938. *Paluda flaveola* (Boheman, 1845)
2939. *Pinumius areatus* (Stal, 1858)
2940. *Pithyotettix sp.*
2941. *Platymetopius guttatus* Fieber, 1869
2942. *Platymetopius henribauti* Diabola, 1961
2943. *Platymetopius major* (Kirschbaum, 1868)
2944. *Platymetopius rostratus* (Herrich-Schaffer, 1834)
2945. *Platymetopius undatus* (De Geer, 1773)
2946. *Pleargus pygmaeus* (Horvath, 1897)
2947. *Psammotettix cephalotes* (Herrich-Schaffer, 1834)
2948. *Psammotettix confinis* (Dahlbom, 1850)
2949. *Recilia coronifer* (Marshall, 1866)
2950. *Rhopalopyx preyssleri* (Herrich-Schaffer, 1838)
2951. *Sagatus punctifrons* (Fallen, 1826)
2952. *Sonronius maculipes* (Zetterstedt, 1840)
2953. *Speudotettix subfusculus* (Fallen, 1806)
2954. *Stictocoris picturatus* (Sahlberg, 1842)
2955. *Streptanus aemulans* (Kirschbaum, 1868)
2956. *Streptanus sordidus* (Zetterstedt, 1828)
2957. *Thamnotettix confinis* Zetterstedt, 1828
2958. *Turrutus socialis* (Flor, 1861)

Подсемейство Dorycephalinae

2959. *Eupelix cuspidata* (Fabricius, 1775)

Подсемейство Iassinae

2960. *Batracomorphus allionii* (Turton, 1802)

2961. *Batracomorphus irroratus* Lewis, 1834
2962. *Iassus lanio* (Linnaeus, 1761)

Подсемейство Idiocerinae

2963. *Acericerus ribauti* Nickel & Remane, 2002 – Уфа 2022-2025
2964. *Idiocerus herrichii* Kirchbaum, 1868 – обычен
2965. *Metidiocerus poecilus* (Herrich-Schäffer, 1835) – Иглн 2025
2966. *Podulmorinus vitticollis* (Matsumura, 1905)
2967. *Populicerus confusus* (Flor, 1861)
2968. *Populicerus laminatus* (Flor, 1861) – Крмс 2025
2969. *Populicerus nitidissimus* (Herrich-Schaffer, 1835)
2970. *Populicerus populi* (Linnaeus, 1761)
2971. *Rhytidodus decimusquartus* (Schrank, 1776)
2972. *Tremulicerus tremulae* (Estlund, 1796)

Подсемейство Macropsinae

2973. *Hephathus sp.*
2974. *Macropsidius duuschulus* Dlabola, 1965
2975. *Macropsis cerea* (Germar, 1837)
2976. *Macropsis fuscinervis* (Boheman, 1845)
2977. *Macropsis fuscula* (Zetterstedt, 1828)
2978. *Macropsis graminea* (Fabricius, 1798)
2979. *Macropsis megerlei* (Fieber, 1868)
2980. *Macropsis prasina* (Boheman, 1852)
2981. *Macropsis scutellata* (Boheman, 1845)
2982. *Oncopsis alni* (Schrank, 1801)
2983. *Oncopsis flavicollis* (Linnaeus, 1761)
2984. *Oncopsis tristis* (Zetterstedt, 1840)
2985. *Pediopsis tiliae* (Germar, 1831)

Подсемейство Typhlocybinae

2986. *Aguriahana stellulata* (Burmeister, 1841) – Иглн 2025
2987. *Alnetoidea alneti* (Dahlbom, 1850)
2988. *Arboridia erecta* (Ribaut, 1931)
2989. *Arboridia expansa* (Zachvatkin, 1946)
2990. *Arboridia loginovae* (Emeljanov, 1964)
2991. *Arboridia parvula* (Boheman, 1845)
2992. *Arboridia velata* (Ribaut, 1952)
2993. *Austroasca vittata* (Lethierry, 1884)
2994. *Chlorita dumosa* (Ribaut, 1933)
2995. *Chlorita mendax* (Ribaut, 1933)
2996. *Chlorita paolii* (Ossiannilsson, 1939)
2997. *Dikraneura variata* Hardy, 1850
2998. *Edwardsiana flavescens* (Fabricius, 1794) – Желтоватая цикада – оранжереи Уфа
2999. *Edwardsiana frustrator* (Edwards, 1908)

3000. *Edwardsiana geometrica* (Schrank, 1801)
3001. *Edwardsiana plebeja* (Edwards, 1914)
3002. *Edwardsiana prunicola* (Edwards, 1914)
3003. *Edwardsiana rosae* (Linnaeus, 1758) – Розанная цикада – Уфа (Зей-Нечаева, Сибиряк, 1970)
3004. *Edwardsiana sociabilis* (Ossiannilsson, 1936)
3005. *Emelyanoviana mollicula* (Boheman, 1845)
3006. *Eupteryx adspersa* (Herrich-Schäffer, 1838)
3007. *Eupteryx atropunctata* (Goeze, 1778)
3008. *Eupteryx aurata* (Linnaeus, 1758)
3009. *Eupteryx calcarata* Ossiannilsson, 1936
3010. *Eupteryx cyclops* Matsumura, 1906
3011. *Eupteryx lelievrei* (Lithierry, 1874)
3012. *Eupteryx notata* Curtis, 1837
3013. *Eupteryx signatipennis* (Boheman, 1847)
3014. *Eupteryx vittata* (Linnaeus, 1758)
3015. *Eurhadina pulchella* (Fallen, 1806)
3016. *Forcipata citrinella* (Zetterstedt, 1828)
3017. *Forcipata forcipata* (Flor, 1861)
3018. *Hauptidia cretacea* (Moravskaja, 1948)
3019. *Hebata affinis* (Nast, 1937)
3020. *Hebata decipiens* (Paoli, 1930)
3021. *Hebata kontkaneni* (Ossiannilsson, 1949)
3022. *Hebata ossiannilssoni* (Nuorteba, 1948)
3023. *Hebata serrata* (Vilbaste, 1965)
3024. *Hebata sibirica* (Vilbaste, 1965)
3025. *Hebata solani* (Curtis, 1846)
3026. *Hebata vitis* (Gothe, 1875)
3027. *Kyboasca bipunctata* (Oshanin, 1871)
3028. *Kybos abstrusus* (Linnavuori, 1950)
3029. *Kybos lindbergi* (Linnavuori, 1951)
3030. *Kybos populi* (Edwards, 1908)
3031. *Kybos smaragdula* (Fallen, 1806)
3032. *Kybos strigilifer* (Ossiannilsson, 1941)
3033. *Kybos volgensis* Vilbaste, 1961
3034. *Linnavuoriana decempunctata* (Fallen, 1806)
3035. *Linnavuoriana sexmaculata* (Hardy, 1850)
3036. *Micantulina micantula* (Zetterstedt, 1840)
3037. *Notus flavipennis* (Zetterstedt, 1828)
3038. *Ribautiana tenerrima* (Herrich-Schaffer, 1834)
3039. *Ribautiana ulmi* (Linnaeus, 1758)
3040. *Typhlocyba quercus* (Fabricius, 1777)
3041. *Wagneriala minima* (Sahlberg, 1871)

3042. *Ziczacella heptapotamica* (Kusnezov, 1928)
3043. *Zygina hyperici* (Herrich-Schaffer, 1836)
3044. *Zygina flammigera* (Fourcroy, 1785)

Подсемейство Ulopinae

3045. *Utecha trivia* (Germar, 1821)

Семейство Cicadidae

3046. *Cicadetta concinna* (Germar, 1821) – Степная цикада – Куюр 1983, 1992 (Мигранов, 2022)
3047. *Cicadetta montana* (Scopoli, 1772) – Горная цикада – локально
3048. *Lyristes plebejus* (Scopoli, 1763) – Обыкновенная цикада
3049. *Tettigetta prasina* (Pallas, 1773) – Зеленая цикада – Мияк 2022 (Мигранов, 2023)

Семейство Membracidae – Горбатки

3050. *Centrotus cornuta* (Linnaeus, 1758) – обычен
3051. *Gargara stepposa* Tishechkin, 2005 – степи, локально
3052. *Stictocephala bisonia* Kopp et Yonke, 1977 – Хайб 2021, Ишмб 2021, Зиан 2022, Аург 2023, Октябрьский 2024, Уфмс 2024, Иглн 2024, Мелз 2024

Подотряд Fulgoromorpha

Семейство Caliscelidae

3053. *Ommatidiotus inconspicuus* Stal, 1863

Семейство Cixiidae

3054. *Cixius cambricus* China, 1935
3055. *Cixius cunicularius* (Linnaeus, 1767)
3056. *Cixius distinguendus* Kirschbaum, 1868
3057. *Cixius nervosus* (Linnaeus, 1758)
3058. *Cixius stigmaticus* (Germar, 1818)
3059. *Pentastiridius sp.*

Семейство Delphacidae – Свинушки

Подсемейство Asiracinae

3060. *Asiraca clavicornis* (Fabricius, 1794) – Уфа 2020-2024, Туйм 2023, Крмс 2019-2023, Иглн 2024-2025

Подсемейство Delphacinae

3061. *Delphax crassicornis* (Panzer, 1796)
3062. *Dicranotropis beckeri* Fieber, 1866
3063. *Dicranotropis hamata* (Boheman, 1847)
3064. *Hyledelphax elegantulus* (Boheman, 1847)
3065. *Javesella dubia* (Kirschbaum, 1868)
3066. *Javesella forcipata* (Boheman, 1847)
3067. *Javesella pellucida* (Fabricius, 1794)
3068. *Laodelphax striatellus* (Fallen, 1826)
3069. *Megamelus notulus* (Germar, 1830)
3070. *Muellerianella brevipennis* (Boheman, 1847)

3071. *Ribautodelphax albostriata* (Fieber, 1866)
3072. *Ribautodelphax collinus* (Boheman, 1847)
3073. *Stiroma affinis* Fieber, 1866
3074. *Stiroma bicarinata* (Herrich-Schaffer, 1835)
3075. *Xanthodelphax flaveolus* (Flor, 1861)
3076. *Xanthodelphax straminea* (Stål, 1858)

Подсемейство Kelisiinae

3077. *Anakelisia perspicillata* (Boheman, 1845)
3078. *Kelisia pallidula* (Boheman, 1847)

Подсемейство Stenocraninae

3079. *Stenocranus fuscovittatus* (Stål, 1858)

Семейство Dictyopharidae

3080. *Dictyophara europaea* (Linnaeus, 1767) – Носатка европейская – локально
3081. *Dictyophara pannonica* (Germar, 1830) – Байм 2022, Сибай 2022 (Кривошеев, Герасимов, 2022), Кушн 2024, Мияк 2024

Семейство Tettigometridae

3082. *Tettigometra angulata* Lindberg, 1948 – Уфмс 2022 (Хабибуллин, 2023б)
3083. *Tettigometra baranii* Signoret, 1866
3084. *Tettigometra griseola* Fieber, 1865
3085. *Tettigometra macrocephala* Fieber, 1865

Подотряд Heteroptera

Инфраотряд Dipsocoromorpha

Семейство Ceratocombidae

3086. *Ceratocombus brevipennis* Poppius, 1910 – ЮУГПЗ 2014 (Голуб и др., 2017)

Инфраотряд Nepomorpha

Семейство Aphelocheiridae

3087. *Aphelocheirus aestivalis* (Fabricius, 1794) – Летний плавт

Семейство Corixidae – Гребляки

3088. *Callicorixa praeusta* (Fieber, 1848)
3089. *Corixa dentipes* (Thomson, 1869) – Зубчатоногий гребляк
3090. *Cymatia coleoptrata* (Fabricius, 1777)
3091. *Cymatia rogenhoferi* (Fieber, 1864)
3092. *Hesperocorixa sahlbergi* (Fieber, 1848)
3093. *Paracorixa concinna* (Fieber, 1848)
3094. *Sigara distincta* (Fieber, 1848)
3095. *Sigara falleni* (Fieber, 1848) – Гребляк Фаллена
3096. *Sigara lateralis* (Leach, 1818)
3097. *Sigara limitata* (Fieber, 1848)
3098. *Sigara nigrolineata* (Fieber, 1848) – Черный полосатый гребляк
3099. *Sigara semistriata* (Fieber, 1848)
3100. *Sigara striata* (Linnaeus, 1758) – Штриховатый гребляк

Семейство Micronectidae

3101. *Micronecta griseola* Horvath, 1899

Семейство Naucoridae – Плавты

3102. *Ilyocoris cimicoides* (Linnaeus, 1758) – Обыкновенный плавт – локален

Семейство Nepidae – Водяные скорпионы

3103. *Nepa cinerea* Linnaeus, 1758 – Водяной скорпион – обычен
3104. *Ranatra linearis* (Linnaeus, 1758) – Палочник

Семейство Notonectidae – Гладыши

3105. *Notonecta glauca* Linnaeus, 1758 – Обыкновенный гладыш – обычен
3106. *Notonecta lutea* Muller, 1776 – Светлощитковый гладыш – локален

Семейство Pleidae – Плеи

3107. *Plea cryptica* Raupach, Charzinski et Hendrich, 2024 – Гладыш-крошка

Инфраотряд Gerromorpha

Семейство Gerridae – Водомерки

3108. *Aquarius paludum* (Fabricius, 1794) – Болотная водомерка – обычна
3109. *Gerris argentatus* Schummel, 1832 – Серебристая водомерка
3110. *Gerris costae* (Herrich-Schäffer, 1850)

Gerris costae fieberi Stichel, 1938 – ЮУГПЗ

3111. *Gerris lacustris* (Linnaeus, 1758) – Прудовая водомерка – обычна
3112. *Gerris lateralis* Schummel, 1832
3113. *Gerris odontogaster* (Zetterstedt, 1828)
3114. *Gerris thoracicus* Schummel, 1832 – Панцирная водомерка – локален
3115. *Limnoporus rufoscutellatus* (Latreille, 1807) – Рыжая водомерка – локален

Семейство Hebridae

3116. *Hebrus ruficeps* Thomson, 1871

Семейство Hydrometridae – Прудовые бегуны

3117. *Hydrometra gracilenta* Horvath, 1899

Семейство Mesoveliidae

3118. *Mesovelia furcata* Mulsant & Rey, 1852

Семейство Veliidae

3119. *Microvelia buenoi* Drake, 1920
3120. *Microvelia reticulata* (Burmeister, 1835)

Инфраотряд Leptopodomorpha

Семейство Saldidae – Прибрежники

3121. *Chartoscirta cincta* (Herrich-Schäffer, 1841) (Винокуров, 2007)
3122. *Chartoscirta cocksii* (Curtis, 1835) – Блрц 2015 (Винокуров и др., 2019)
3123. *Chartoscirta elegantula* (Fallen, 1807) – Блрц 2014, 2015 (Винокуров и др., 2019)

Chartoscirta elegantula longicornis (Jakovlev, 1882) – Блрц 2014, 2015

3124. *Macrosaldula scotica* (Curtis, 1833) – Бурз 1899 (Винокуров, 2014)
3125. *Saldula arenicola arenicola* (Scholtz, 1847) (Винокуров, 2004)
3126. *Saldula c-album* (Fieber, 1859) – БГПЗ (Винокуров и др., 2019
3127. *Saldula fucicola* (Sahlberg, 1871) (Винокуров, 2004)

3128. *Saldula melanoscela* (Fieber, 1859) (Винокуров, 2004)
3129. *Saldula opacula* (Zetterstedt, 1838) (Винокуров, 2004)
3130. *Saldula orthochila* (Fieber, 1859) (Винокуров, 2004)
3131. *Saldula pallipes* (Fabricius, 1794) (Винокуров, 2004)
3132. *Saldula palustris* (Douglas, 1874) (Винокуров, 2004)
3133. *Saldula saltatoria* (Linnaeus, 1758) (Винокуров, 2004)

Инфраотряд Cimicomorpha

Семейство Anthocoridae – Хищники-крошки (Цветочные клопы)

3134. *Acompocoris pygmaeus* (Fallén, 1807) – Блрц (Винокуров и др., 2014).
3135. *Amphiareus obscuriceps* (Poppius, 1909) – Блрц 2015 (Zinovyeva, 2022).
3136. *Anthocoris confusus* Reuter, 1884 – ЮУГПЗ
3137. *Anthocoris limbatus* Fieber, 1836 – Блрц 2015 (Винокуров и др., 2014).
3138. *Anthocoris nemorum* (Linnaeus, 1761) – Блрц
3139. *Elatophilus nigrellus* (Zetterstedt, 1838) – Блрц 2015 (Zinovyeva, 2022).
3140. *Elatophilus stigmatellus* (Zetterstedt, 1838) – Блрц (Дюжаева, 2002)
3141. *Orius minutus* (Linnaeus, 1758) – ЮУГПЗ (Дюжаева, 2002)
3142. *Orius niger* (Wolff, 1811) – ЮУГПЗ
3143. *Temnostethus gracilis* Horváth, 1907 – Блрц (Винокуров и др., 2014).
3144. *Tetraphleps aterrima* (J. Sahlberg, 1878) – Блрц (Винокуров и др., 2014).
3145. *Xylocoris galactinus* (Fieber, 1836) (Козьминых, 2017а)

Семейство Cimicidae – Постельные клопы

3146. *Cimex lectularius* Linnaeus, 1758 – Постельный клоп (синантроп)

Семейство Microphysidae

3147. *Loricula exilis* (Fallen, 1807) – ЮУГПЗ 2014; Архг 2015 (Голуб и др., 2017)

Семейство Miridae – Слепняки

Подсемейство Bryocorinae

3148. *Bryocoris pteridis* (Fallen, 1807)
3149. *Dicyphus constrictus* (Boheman, 1852)
3150. *Dicyphus errans* (Wolff, 1804)
3151. *Dicyphus globulifer* (Fallen, 1829)
3152. *Dicyphus stachydis* J. Sahlberg, 1878 – Нурм 1933 (Козьминых, 2021а)
3153. *Monalocoris filicis* (Linnaeus, 1758)

Подсемейство Deraeocorinae

3154. *Bothynotus pilosus* (Boheman, 1852) – единично
3155. *Deraeocoris lutescens* (Schilling, 1837) – Салават 2025, Иглн 2025
3156. *Deraeocoris olivaceus* (Fabricius, 1777) – редко
3157. *Deraeocoris ruber* (Linnaeus, 1758) – обычен
3158. *Deraeocoris serenus* (Douglas & Scott, 1868) – Салават 2025, Иглн 2025
3159. *Deraeocoris ventralis* Reuter, 1904 – Белб 1908, Блрц 1925, Бурз 1899 (Константинов, Зиновьева, 2017а)

Подсемейство Mirinae

3160. *Acetropis carinata* (Herrich- Schäffer, 1841) – ЮУГПЗ (Винокуров и др., 2017), Чишм 2025
3161. *Acetropis longirostris* Puton, 1875 – Шарн 2024
3162. *Adelphocoris lineolatus* (Goeze, 1778) – Люцерновый клоп – всюду, массово
3163. *Adelphocoris quadripunctatus* (Fabricius, 1794) – обычен
3164. *Adelphocoris reicheli* (Fieber, 1836) – Бурз 1899, редок
3165. *Adelphocoris seticornis* (Fabricius, 1775) – локален
3166. *Adelphocoris ticinensis* (Meyer-Dur, 1843)
3167. *Agnocoris rubicundus* (Fallén, 1807) – ЮУГПЗ (Винокуров и др., 2017)
3168. *Allorhinocoris flavus* J. Sahlberg, 1878
3169. *Apolygus lucorum* (Meyer-Dur, 1843) – Уфа 2019, Иглн 2025
3170. *Apolygus spinolae* (Meyer-Dür, 1841) – ЮУГПЗ (Дюжаева, 2002)
3171. *Brachycoleus decolor* Reuter, 1887 – Белебей 1907, Белб 1908, Блрц 1925, Альш 1907, Уфмс 1899 (Константинов, Зиновьева, 2017а)
3172. *Brachycoleus pilicornis* (Panzer, 1805) – Белебей 1907, Белб 1908 (Константинов, Зиновьева, 2017а)
3173. *Calocoris roseomaculatus* (De Geer, 1773)
3174. *Camptozygum aequale* (Villers, 1789)
3175. *Capsodes gothicus gothicus* (Linnaeus, 1758)
3176. *Capsus ater* (Linnaeus, 1758) – Уфа, Чшмн, Блрц, Стмк
3177. *Capsus wagneri* (Remane, 1950)
3178. *Charagochilus gyllenhalii* (Fallen, 1807)
3179. *Closterotomus biclavatus biclavatus* (Herrich-Schaffer, 1835)
3180. *Closterotomus samojedorum* (J. Sahlberg, 1878) – ЮУГПЗ (Дюжаева, 2002)
3181. *Deraeocoris flavilinea* (A.Costa, 1862) – Уфа 2020
3182. *Dichrooscytus rufipennis* (Fallén, 1807) – ЮУГПЗ (Винокуров и др., 2017)
3183. *Dryophilocoris flavoquadrimaculatus* (De Geer, 1773) – Уфа 2021-2024, Ишмб 2020
3184. *Grypocoris sexguttatus* (Fabricius, 1777) – ЮУГПЗ (Дюжаева, 2002), горно-лесная зона
3185. *Leptopterna albescens* (Reuter, 1891) – степи, редок
3186. *Leptopterna dolobrata* (Linnaeus, 1758) – степи, локально
3187. *Liocoris tripustulatus* (Fabricius, 1781) – локален
3188. *Lygocoris pabulinus* (Linnaeus, 1761)
3189. *Lygocoris rugicollis* (Fallén, 1807)
3190. *Lygus adspersus* (Schilling, 1837) – редко
3191. *Lygus gemellatus* (Herrich-Schaffer, 1835) – Полынный лигус – степи, обычен
3192. *Lygus pratensis* (Linnaeus, 1758) – Полевой клопик – степи, массово
3193. *Lygus punctatus* (Zetterstedt, 1838) – Пунктированный лигус – степи, редко
3194. *Lygus rugulipennis* Poppius, 1911 – степи, обычен
3195. *Lygus wagneri* Remane, 1955 – степи, обычен
3196. *Megacoelum infusum* (Herrich-Schaeffer, 1837) – Уфмс 2020, Иглн 2020, Уфа 2020-2022

3197. *Megaloceroea recticornis* (Geoffroy, 1785)
3198. *Mesopsallus mali* (Meyer-Dür, 1843) – Уфа 2016
3199. *Myrmecoris gracilis* (R. F. Sahlberg, 1848)
3200. *Neolygus contaminatus* (Fallen, 1807) – ЮУГПЗ (Дюжаева, 2002)
3201. *Neolygus viridis* (Fallén, 1807) – ЮУГПЗ (Винокуров и др., 2017), Уфа
3202. *Notostira elongata* (Geoffroy, 1785) – ЮУГПЗ
3203. *Notostira erratica* (Linnaeus 1758) – Странствующий клопик
3204. *Orthops basalis* (A. Costa, 1853)
3205. *Orthops campestris* (Linnaeus, 1758)
3206. *Orthops kalmii* (Linnaeus, 1758) – Уфа, Иглн 2025, Крмс
3207. *Pantilius tunicatus* (Fabricius, 1781) – Уфа 2024-2025
3208. *Phytocoris insignis* Reuter, 1876
3209. *Phytocoris intricatus* Flor, 1861
3210. *Phytocoris longipennis* Flor, 1861
3211. *Phytocoris pini* Kirschbaum, 1856
3212. *Phytocoris populi* (Linnaeus, 1758) – Октябрьский 2023
3213. *Phytocoris tiliae* (Fabricius, 1777) – Уфа 2020-2025, Блгщ
3214. *Phytocoris varipes* Boheman, 1852
3215. *Pinalitus cervinus* (Herrich-Schäffer, 1841) – Кгрч 2020 (Хабибуллин, 2021б)
3216. *Pinalitus rubricatus* (Fallen, 1807)
3217. *Pithanus maerkelii* (Herrich-Schaffer, 1838)
3218. *Polymerus asperulae* (Fieber, 1861)
3219. *Polymerus brevicornis* (Reuter, 1879) – ЮУГПЗ (Винокуров и др., 2015), Стмк, Шарн
3220. *Polymerus carpathicus* (Horvath, 1882)
3221. *Polymerus cognatus* (Fieber, 1858) – Свекловичный клопик – Уфа
3222. *Polymerus holosericeus* Hahn, 1831
3223. *Polymerus nigritus* (Fallen, 1807) – локален
3224. *Polymerus palustris* (Reuter, 1907) – Уфа 2015, 2019 – локален
3225. *Polymerus unifasciatus* (Fabricius, 1794) – обычен
3226. *Polymerus vulneratus* (Panzer, 1806)
3227. *Rhabdomiris striatellus* (Fabricius, 1794) – Полосатый стриателлус
3228. *Stenodema calcarata* (Fallen, 1807) – Шиповатая стенодема
3229. *Stenodema holsata* (Fabricius, 1787)
3230. *Stenodema laevigata* (Linnaeus, 1758) – Гладкая стенодема
3231. *Stenodema pilosa* (Jakovlev, 1889)
3232. *Stenodema trispinosa* Reuter, 1904
3233. *Stenodema virens* (Linnaeus, 1767)
3234. *Stenotus binotatus* (Fabricius, 1794) – Уфа, ЮУГПЗ, локально
3235. *Teratocoris viridis* Douglas & Scott, 1867 – горная тундра (Ольшванг, Малозёмов, 1987)
3236. *Trigonotylus caelestialium* (Kirkaldy, 1902) – Хлебный клопик – обычен
3237. *Trigonotylus fuscitarsis* Lammes, 1987

Подсемейство Orthotylinae

3238. *Anapus rugicollis* (Jakovlev, 1877) – Белебей 1907 (Константинов, Зиновьева, 2017б)
3239. *Blepharidopterus angulatus* (Fallén, 1807) – ЮУГПЗ, Уфа, Иглн 2025, Салават 2025
3240. *Cyllecoris histrionius* (Linnaeus, 1767) – Белебей 1907, Белб 1908, (Константинов, Зиновьева, 2017б), Уфа, Блрц
3241. *Euryopicoris nitidus* (Meyer-Dür, 1843) – ЮУГПЗ, степи, локален
3242. *Globiceps flavomaculatus* (Fabricius, 1794) – ЮУГПЗ (Дюжаева, 2002; Винокуров и др., 2017)
3243. *Globiceps fulvicollis* Jakovlev, 1877 – Уфа, Крмс
3244. *Globiceps sphaegiformis* (Rossi, 1790) – РБ (Кириченко, 1951)
3245. *Halticus apterus* (Linnaeus, 1758)
3246. *Heterocordylus cytisi* Josifov, 1958 – ЮУГПЗ (Винокуров и др., 2017)
3247. *Heterocordylus genistae* (Scopoli, 1763) – Уфмс (Кириченко, 1951)
3248. *Heterocordylus leptocerus* (Kirschbaum, 1856)
3249. *Heterocordylus tumidicornis* (Herrich-Schäffer, 1835) – ЮУГПЗ (Дюжаева, 2002)
3250. *Labops sahlbergii* (Fallen, 1829) – ЮУГПЗ, Чишм, Туйм, Кгрч, Зиан, Абзл
3251. *Mecomma ambulans* (Fallén, 1807) – ЮУГПЗ (Винокуров и др., 2017), Нурм
3252. *Myrmecophyes alboornatus* (Stál, 1858) – ЮУГПЗ, Предуралье (Уфа, Ишмб, Крмс, Чишм, Иглн)
3253. *Orthocephalus bivittatus* Fieber, 1864 (Namyatova, Konstantinov, 2009)
3254. *Orthocephalus brevis* (Panzer, 1798) – ЮУГПЗ (Винокуров и др., 2017)
3255. *Orthocephalus saltator* (Hahn, 1835) – ЮУГПЗ (Винокуров и др., 2017)
3256. *Orthocephalus vittipennis* (Herrich-Schäffer, 1835) – ЮУГПЗ (Дюжаева, 2002; Винокуров и др., 2017)
3257. *Orthotylus bilineatus* (Fallén, 1807) – ЮУГПЗ (Винокуров и др., 2017)
3258. *Orthotylus flavosparsus* (C.R. Sahlberg, 1841) – ЮУГПЗ (Винокуров и др., 2017)
3259. *Orthotylus interpositus* Schmidt, 1938– ЮУГПЗ (Винокуров и др., 2017)
3260. *Orthotylus marginalis* Reuter, 1883 – ЮУГПЗ (Дюжаева, 2002; Винокуров и др., 2017)
3261. *Orthotylus nassatus* (Fabricius, 1787) – ЮУГПЗ (Винокуров и др., 2017)
3262. *Orthotylus oschanini* Reuter, 1883 – ЮУГПЗ (Винокуров и др., 2017)
3263. *Strongylocoris leucocephalus* (Linnaeus, 1758) – Блрц, Чишм 2025
3264. *Strongylocoris niger* (Herrich-Schäffer, 1835) – Бурз 1899 (Константинов, Зиновьева, 2017б)

Подсемейство Phylinae

3265. *Amblytylus nasutus* (Kirschbaum, 1856)
3266. *Atractotomus magnicornis* (Fallén, 1807) – ЮУГПЗ (Винокуров и др., 2017)
3267. *Atractotomus mali* (Meyer-Dür, 1843)
3268. *Campylomma verbasci* (Meyer-Dür, 1843) – ЮУГПЗ (Дюжаева, 2002), Уфмс

3269. *Chlamydatus pulicarius* (Fallen, 1807) – ЮУГПЗ (Дюжаева, 2002; Винокуров и др., 2017)
3270. *Chlamydatus pullus* (Reuter, 1870) – ЮУГПЗ (Дюжаева, 2002; Винокуров и др., 2017)
3271. *Criocoris crassicornis* (Hahn, 1834) – ЮУГПЗ (Дюжаева, 2002; Винокуров и др., 2017)
3272. *Criocoris quadrimaculatus* (Fallén, 1807) – ЮУГПЗ (Винокуров и др., 2017)
3273. *Dacota nigritarsis* (Jakovlev, 1882) (Константинов, Зиновьева, 2017б)
3274. *Europiella albipennis* (Fallen, 1829) – Блрц
3275. *Europiella artemisiae* (Becker, 1864) – ЮУГПЗ (Винокуров и др., 2017)
3276. *Hallodapus rufescens* (Burmeister, 1835) – ЮУГПЗ (Винокуров и др., 2017)
3277. *Hallodapus suturalis* (Herrich-Schäffer, 1837) (Кириченко, 1951)
3278. *Hoplomachus thunbergii* (Fallen, 1807) – ЮУГПЗ (Дюжаева, 2002; Винокуров и др., 2017), Уфа, Нурм
3279. *Lopus decolor* (Fallen, 1807) – ЮУГПЗ (Дюжаева, 2002; Винокуров и др., 2017)
3280. *Macrotylus cruciatus* (R. F. Sahlberg, 1848) – ЮУГПЗ (Винокуров и др., 2017)
3281. *Macrotylus herrichi* (Reuter, 1873) – Чишм 1908; Белебей 1907, Белб 1908 (Константинов, Зиновьева, 2017б)
3282. *Megalocoleus molliculus* (Fallén, 1807) – ЮУГПЗ (Винокуров и др., 2017)
3283. *Megalocoleus tanaceti* (Fallén, 1807)
3284. *Monosynamma bohemanni* (Fallén, 1829) – ЮУГПЗ (Винокуров и др., 2017)
3285. *Oncotylus punctipes* Reuter, 1875 – Бурз 1899 (Константинов, Зиновьева, 2017б)
3286. *Oncotylus viridiflavus* (Goeze, 1778) – ЮУГПЗ (Винокуров и др., 2017), Блвщ
3287. *Orthonotus rufifrons* (Fallén, 1807) – ЮУГПЗ (Винокуров и др., 2017)
3288. *Phoenicocoris modestus* (Meyer-Dür, 1843) – ЮУГПЗ (Винокуров и др., 2017)
3289. *Phoenicocoris obscurellus* (Fallén, 1829) – ЮУГПЗ (Винокуров и др., 2017)
3290. *Phylus melanocephalus* (Linnaeus, 1767) – Белб 1908 (Константинов, Зиновьева, 2017б), Уфа, Ишмб
3291. *Pilophorus cinnamopterus* (Kirschbaum, 1856) – ЮУГПЗ (Винокуров и др., 2017), Уфа, Кугч
3292. *Pilophorus clavatus* (Linnaeus, 1767) – ЮУГПЗ (Винокуров и др., 2017)
3293. *Pilophorus confusus* (Kirschbaum, 1856) – ЮУГПЗ (Дюжаева, 2002; Винокуров и др., 2017)
3294. *Pilophorus perplexus* Douglas et Scott, 1875 – обычен
3295. *Pilophorus simulans* Josifov, 1989– ЮУГПЗ (Винокуров и др., 2017)
3296. *Placochilus seladonicus* (Fallén, 1807) – ЮУГПЗ (Винокуров и др., 2017)
3297. *Plagiognathus arbustorum* (Fabricius, 1794) – ЮУГПЗ (Дюжаева, 2002; Винокуров и др., 2017), Иглн
3298. *Plagiognathus chrysanthemi* (Wolff, 1804) – ЮУГПЗ (Винокуров и др., 2017), Уфа, Уфмс

3299. *Plagiognathus fulvipennis* (Kirschbaum, 1856) – ЮУГПЗ (Дюжаева, 2002 ; Винокуров и др., 2017)
3300. *Psallus ambiguus* (Fallen, 1807) – ЮУГПЗ (Дюжаева, 2002)
3301. *Psallus anticus* (Reuter, 1876) – ЮУГПЗ (Дюжаева, 2002)
3302. *Psallus betuleti* (Fallén, 1826)
3303. *Psallus graminicola* (Zetterstedt, 1828) – ЮУГПЗ (Дюжаева, 2002)
3304. *Psallus salicis* (Kirschbaum, 1856) – ЮУГПЗ (Винокуров и др., 2017)
3305. *Psallus vittatus* (Fieber, 1861) – ЮУГПЗ (Винокуров и др., 2017)
3306. *Sacculifer picticeps* Kerzhner, 1959 – ЮУГПЗ (Винокуров и др., 2017)
3307. *Salicarus roseri* (Herrich- Schäffer, 1838) – ЮУГПЗ (Винокуров и др., 2017)
3308. *Systellonotus triguttatus* (Linnaeus, 1767) – ЮУГПЗ (Винокуров и др., 2017), Крмс

Семейство Nabidae – Клопы-охотники

3309. *Nabis brevis* Scholtz, 1847
3310. *Nabis ferus* (Linnaeus, 1758) – Свирепый (дикий) охотник – обычен
3311. *Nabis flavomarginatus* Scholtz, 1847 – ЮУГПЗ, Бжбл 1982 (Дюжаева, 2002)
3312. *Nabis limbatus* Dahlbom, 1851 (Козьминых, 2017а)
3313. *Nabis pseudoferus* Remane, 1949 – ЮУГПЗ (Винокуров и др., 2018)
3314. *Nabis punctatus* A. Costa, 1847 – ЮУГПЗ (Винокуров и др., 2018)
3315. *Nabis rugosus* (Linnaeus, 1758) – ЮУГПЗ (Дюжаева, 2002
3316. *Himacerus apterus* (Fabricius, 1798) – Бескрылый охотник – обычен
3317. *Himacerus boops* (Schiødte, 1870) – Иглн 2025
3318. *Himacerus mirmicoides* (O. Costa, 1834) – Уфа 2020 (Хабибуллин, 2021а), локален
3319. *Prostemma aeneicolle* Stein, 1857 – Стмк 2016, Уфа, Октябрьский, Блгщ, Куюр, Кгрч
3320. *Prostemma sanguineum* (Rossi, 1790) – Стмк, Уфа, Октябрьский

Семейство Reduviidae – Хищнецы

3321. *Coranus subapterus* (De Geer, 1773) – Байм (Козьминых, 2018а)
3322. *Coranus woodroffei* P.Putshkov, 1982
3323. *Empicoris culiciformis* (De Geer, 1773) – ЮУГПЗ 2014 (Голуб и др., 2017), Уфа
3324. *Empicoris vagabundus* (Linnaeus, 1758) – ЮУГПЗ 2014 (Голуб и др., 2017)
3325. *Phymata crassipes* (Fabricius, 1775) – Уфа, Крмс, Кушн, Байм, Давл
3326. *Pygolampis bidentata* (Goeze, 1778) – Стерлитамак
3327. *Reduvius personatus* (Linnaeus, 1758) – Уфа 2020, Уфмс 2020, локален
3328. *Rhynocoris annulatus* (Linnaeus, 1758) – локально
3329. *Rhynocoris iracundus* (Poda, 1761) – Уфа и южнее 2019-2025, редко

Семейство Tingidae – Кружевницы

3330. *Acalypta carinata* (Panzer, 1806) – ЮУГПЗ 2014 (Голуб и др., 2017)
3331. *Acalypta nigrina* (Fallen, 1807) – Блрц 2014 (Голуб и др., 2017)
3332. *Agramma fallax* (Horvath, 1906) (Голуб и др., 2017)
3333. *Agramma femorale* (Thomson, 1871) – ЮУГПЗ 2014-2015 (Голуб и др., 2017)

3334. *Catoplatus carthusianus* (Goeze, 1778) – Куюр 2023, Стбш 2024
3335. *Catoplatus fabricii* (Stål, 1873) (Голуб и др., 2017)
3336. *Derephysia foliacea foliacea* (Fallen, 1807) – ЮУГПЗ 2014-2015 (Голуб и др., 2017)
3337. *Derephysia longispina* Golub, 1974 (Голуб и др., 2017)
3338. *Dictyla echii* (Schrank, 1782) – ЮУГПЗ 2014-2015 (Голуб и др., 2017); Архн 2015, Крмс
3339. *Dictyla humuli* (Fabricius, 1794) – ЮУГПЗ 2014-2015(Голуб и др., 2017), Иглн
3340. *Dictyla platyoma* (Fieber, 1861) – ЮУГПЗ 2015 (Голуб и др., 2017)
3341. *Dictyla rotundata* (Herrich-Schaeffer, 1835) – Крмс 2023, Ишмб 2023
3342. *Dictyonota strichnocera* Fieber, 1844 – ЮУГПЗ 2015, М.Ямантау 2014 (Голуб и др., 2017);
3343. *Dictyonota tricornis* (Schrank, 1801) – ЮУГПЗ 2014 (Голуб и др., 2017); Иглн 2025
3344. *Elasmotropis testacea testacea* (Herrich-Schäffer, 1830) – Архнг 2014
3345. *Lasiacantha hermani* Vasarhelyi, 1977 – ЮУГПЗ 2014-2015
3346. *Onchochila simplex* (Herrich-Schäffer, 1830) – ЮУГПЗ 2014; Архнг 2014
3347. *Physatocheila costata* (Fabricius, 1794) – ЮУГПЗ (Дюжаева, 2002)
3348. *Physatocheila smreczynskii* China, 1952 – ЮУГПЗ 2014 (Голуб и др., 2017)
3349. *Stephanitis pyri* (Fabricius, 1775) – Предуралье, обычен
3350. *Tingis ampliata* (Herrich-Schaeffer, 1838) – Уфа, Уфмс
3351. *Tingis cardui* (Linnaeus, 1758) – ЮУГПЗ 2014; Архг 2014 (Голуб и др., 2017)
3352. *Tingis crispata* (Herrich-Schaeffer, 1838) – Крмс 2020
3353. *Tingis pilosa* Hummel, 1825 – Архнг 2014; ЮУГПЗ 2015 (Голуб и др., 2017), Уфа, Гафр
3354. *Tingis reticulata* Herrich-Schäffer, 1835 – ЮУГПЗ (Дюжаева, 2002)

Инфраотряд Pentatomomorpha

Семейство Aradidae – Подкорники

3355. *Aneurus avenius* (Dufour, 1833) – Уфа 2025
3356. *Aradus betulae* (Linnaeus, 1758) – локален
3357. *Aradus cinnamomeus* Panzer, 1806 – Сосновый подкорный клоп
3358. *Aradus corticalis* (Linnaeus, 1758) (Козьминых, 2017а)
3359. *Aradus truncatus* Fieber, 1860 – Иглн 2025
3360. *Mezira tremulae* (Germar, 1822) – Хайб 2019, Иглн 2025

Семейство Artheneidae

3361. *Chilacis typhae* (Perris, 1857) – Уфа 2025
3362. *Holcocranum saturejae* (Kolenati, 1845) – Уфа 2024

Семейство Berytidae

3363. *Berytinus sp.* – Крмс 2023, Кушн 2023
3364. *Metacanthus lineatus* (Jakovlev, 1875) – Иглн 2025
3365. *Neides tipularius* (Linnaeus, 1758) – Комаровидный клопик – локален

Семейство Blissidae

3366. *Dimorphopterus spinolae* (Signoret, 1857) – Ишмб 2022, Крмс 2023, Гафр 2024
3367. *Ischnodemus sabuleti* (Fallén, 1826) – Уфа (Козьминых, 2018а), Уфмс

Семейство Coreidae – Краевики

3368. *Bathysolen nubilus* (Fallen, 1807) – Ишмб 2016 (Хабибуллин, 2021б)
3369. *Ceraleptus gracilicornis* (Herrich-Schäffer, 1835) – Уфа 2022-2024, Ишмб 2023-2024, Мелз 2022, Нурм 2024
3370. *Coreus marginatus* (Linnaeus, 1758) – Щавелевый клоп – всюду, массово
3371. *Coriomeris denticulatus* (Scopoli, 1763) – Уфа, Кушн, Стмк, Кгрч
3372. *Coriomeris hirticornis* (Fabricius, 1794) – Архн 1983
3373. *Coriomeris scabricornis scabricornis* (Panzer, 1805)
3374. *Enoplops scapha* (Fabricius, 1794) – Чишм 2017, Иглн 2024-2025, обычен
3375. *Gonocerus acuteangulatus* (Goeze, 1778) – Уфа 2019, Ермк 2022, локален
3376. *Nemocoris fallenii* R.F. Sahlberg, 1848 – Белебей (Козьминых, 2018а)
3377. *Spathocera laticornis* (Schilling, 1829) – Ишмб 2024
3378. *Syromastus rhombeus* (Linnaeus, 1767) – Уфа и южнее, локален
3379. *Ulmicola spinipes* (Fallen, 1807) – Кушн

Семейство Cymidae

3380. *Cymus aurescens* Distant, 1883
3381. *Cymus glandicolor* Hahn, 1832

Семейство Geocoridae

3382. *Geocoris ater* (Fabricius, 1787) – Давл 2010
3383. *Geocoris dispar* (Waga, 1839)

Семейство Heterogastridae

3384. *Heterogaster artemisiae* Schilling, 1829
3385. *Heterogaster cathariae* (Geoffroy, 1785) – Крмс 2017, Кушн, Туйм
3386. *Heterogaster urticae* (Fabricius, 1775) – Айдас на р. Уфа 1925
3387. *Platyplax salviae* (Schilling, 1829) – Чишм, Белебей, Мелз, Альш (Винокуров и др., 2019), Туйм

Семейство Lygaeidae – Земляные клопы

3388. *Arocatus melanocephalus* (Fabricius, 1798) – Уфа, Салават, Октябрьский
3389. *Arocatus roeselii* (Schilling, 1829) – Уфа 2018-2024, Октябрьский 2024
3390. *Eremocoris plebejus* (Fallen, 1807)
3391. *Horvathiolus superbus* (Pollich, 1779) – Ишмб 2019
3392. *Kleidocerys resedae* (Panzer, 1797) – ЮУГПЗ, Нурм, Иглн, Уфа; массово
3393. *Lygaeus equestris* (Linnaeus, 1758) – открытые биотопы, обычен
3394. *Lygaeus simulans* Deckert, 1985 – Чишм 2024 – единично
3395. *Metopoplax origani* (Kolenati, 1845)
3396. *Nithecus jacobaeae* (Schilling, 1829) – ЮУГПЗ, Нурм, Кушн, Крмс, Давл
3397. *Nysius cymoides* (Spinola, 1837)
3398. *Nysius ericae ericae* (Schilling, 1829)
3399. *Nysius helveticus* (Herrich-Schaffer, 1850) – Уфа, Нурм, Куюр, Зиан
3400. *Nysius thymi thymi* (Wolff, 1804)

3401. *Ortholomus punctipennis* (Herrich-Schaffer, 1850)
3402. *Spilostethus saxatilis* (Scopoli, 1763) – Стмк 1976
3403. *Tropidothorax leucopterus* (Goeze, 1778) – Уфа и Предуралье, редок

Семейство Oxycarenidae

? Macroplax preyssleri (Fieber, 1837)
3404. *Metopoplax origani* (Kolenati, 1845)
3405. *Oxycarenus modestus* (Fallen, 1829)
3406. *Oxycarenus pallens* (Herrich-Schäffer, 1850) – ЮУГПЗ (Дюжаева, 2002)

Семейство Rhyparochromidae

3407. *Acompus rufipes* (Wolff, 1802) – Крмс (Козьминых, 2018а)
3408. *Aellopus atratus* (Goeze, 1778)
3409. *Aphanus rolandri* (Linnaeus, 1758) – Бузд 2024, Бирс 2023, Уфа 2023
3410. *Drymus brunneus brunneus* (R. F. Sahlberg, 1848)
3411. *Drymus ryeii* Douglas & Scott, 1865
3412. *Emblethis denticollis* Horvath, 1878 – Уфа 2016 (Хабибуллин, 2021а)
3413. *Emblethis dilaticollis* (Jakovlev, 1874)
3414. *Emblethis griseus* (Wolff, 1802) – Уфа, 2021 (Хабибуллин, 2021а)
3415. *Eremocoris abietis* (Linnaeus, 1758) – ЮУГПЗ (Дюжаева, 2002), Уфа
3416. *Eremocoris plebejus* (Fallen, 1807)
3417. *Gastrodes grossipes grossipes* (De Geer, 1773) – Уфа, Туйм
3418. *Graptopeltus lynceus* (Fabricius, 1775) – Уфа, Архн, Ермк, Давл
3419. *Ischnocoris hemipterus* (Schilling, 1829)
3420. *Ischnocoris punctulatus* Fieber, 1861
3421. *Ligyrocoris sylvestris* (Linnaeus, 1758)
3422. *Megalonotus antennatus* (Schilling, 1829) – Уфа 2021 (Хабибуллин, 2021а)
3423. *Megalonotus chiragra* (Fabricius, 1794)
3424. *Megalonotus dilatatus* (Herrich-Schaffer, 1840)
3425. *Megalonotus hirsutus* Fieber, 1861
3426. *Megalonotus sabulicola* (Thomson, 1870) – Уфа 2021 (Хабибуллин, 2021а), Туйм, Иглн 2025
3427. *Panaorus adspersus* (Mulsant & Rey, 1852) – Уфа, Иглн, Крмс, Туйм
3428. *Peritrechus geniculatus* (Hahn, 1832)
3429. *Peritrechus nubilus* (Fallen, 1807)
3430. *Plinthisus pusillus* (Scholtz, 1847)
3431. *Pterotmetus staphyliniformis* (Schilling, 1829) – степи, обычен
3432. *Raglius alboacuminatus* (Goeze, 1778) – Уфа, Туйм, Стбш, Ишмб
3433. *Rhyparochromus phoeniceus* (Rossi, 1794) – Водяной палочник
3434. *Rhyparochromus pini* (Linnaeus, 1758) – повсеместно, обычен
3435. *Rhyparochromus vulgaris* (Schilling, 1829) – Кгрч 2020, Ишмб 2016, Октябрьский, Шарн, Мелз
3436. *Scolopostethus affinis* (Schilling, 1829)
3437. *Scolopostethus lethierryi* Jakovlev, 1877
3438. *Scolopostethus pictus* (Schilling, 1829) – Туйм 2023

3439. *Scolopostethus puberulus* Horvath, 1887
3440. *Scolopostethus thomsoni* Reuter, 1874
3441. *Sphragisticus nebulosus* (Fallen, 1807) – локален
3442. *Stygnocoris cimbricus* (Gredler, 1870)
3443. *Stygnocoris rusticus* (Fallen, 1807)
3444. *Stygnocoris sabulosus* (Schilling, 1829)
3445. *Trapezonotus anorus* (Flor, 1860)
3446. *Trapezonotus arenarius arenarius* (Linnaeus, 1758) – Уфа, Туйм, Иглн 2025
3447. *Trapezonotus desertus* Siedenstucker, 1951
3448. *Tropistethus holosericus* (Scholtz, 1846)
3449. *Xanthochilus quadratus* (Fabricius, 1798) – Уфа 2020, Стбш 2024, Туйм 2024

Семейство Stenocephalidae – Узкоглавы

3450. *Dicranocephalus agilis* (Scopoli, 1763) – Белб, локален
3451. *Dicranocephalus albipes* (Fabricius, 1781) – Ермк 2017, Чишм 2017, обычен
3452. *Dicranocephalus medius* (Mulsant & Rey, 1870) – ЮУГПЗ, Ишмб, Ермк, редок

Семейство Pyrrhocoridae – Красноклопы

3453. *Pyrrhocoris apterus* (Linnaeus, 1758) – Клоп-солдатик – повсеместно, массово

Семейство Alydidae

3454. *Alydus calcaratus* (Linnaeus 1758) – Уфа, Уфмс, Иглн, Крмс, Архн, Туйм, Шарн

Семейство Rhopalidae – Булавники

3455. *Brachycarenus tigrinus* (Schilling, 1829) (Пучков, 1986) – Уфа, Байм, Давл, Стмк, Блвщ
3456. *Chorosoma schillingii* (Schilling, 1829) (Пучков, 1986) – Чишм, Давл, Туйм
3457. *Corizus hyoscyami* (Linnaeus, 1758) – Беленовый булавник – обычен
3458. *Liorhyssus hyalinus* (Fabricius, 1794) – единично
3459. *Myrmus miriformis* (Fallen, 1807) – Узкий краевик – степи, массово
3460. *Rhopalus conspersus* (Fieber, 1837) – Ермк 2018 (Хабибуллин, 2021б)
3461. *Rhopalus maculatus* (Fieber, 1837) – Уфмс, Иглн 2025, Чишм 2024
3462. *Rhopalus parumpunctatus* Schilling, 1829 – редко
3463. *Rhopalus subrufus* (Gmelin, 1790) – Уфа 2018, Иглн, Крмс, Давл, Ишмб, Блрц, Кгрч
3464. *Stictopleurus abutilon* (Rossi, 1790) – Уфа, Чишм, Кгрч
3465. *Stictopleurus crassicornis* (Linnaeus, 1758) – Уфа
3466. *Stictopleurus punctatonervosus* (Goeze, 1778) – Стбш, Ишмб, Уфа
3467. *Stictopleurus sericeus* (Horvath, 1896)

Семейство Thyreocoridae – Землекопы

3468. *Thyreocoris scarabaeoides* (Linnaeus, 1758) – Уфа, локален

Семейство Plataspidae – Полушаровидные щитники

3469. *Coptosoma scutellatum* (Geoffroy, 1785) – Клеверный клоп – степи, обычен

Семейство Acanthosomatidae – Древесные щитники

3470. *Acanthosoma denticaudum* Jakovlev, 1880 – Уфа 2022-2024, Крмс 2023, Октябрьский 2023-2024
3471. *Acanthosoma haemorrhoidale* (Linnaeus, 1758) – Краснозадый килевик – всюду, обычен
3472. *Cyphostethus tristriatus* (Fabricius, 1787)
3473. *Elasmostethus interstinctus* (Linnaeus, 1758) – Испещренный краевик – всюду, обычен
3474. *Elasmostethus minor* Horváth, 1899 – Уфа 1971
3475. *Elasmucha ferrugata* (Fabricius, 1787) – Ржавый щитник – редко
3476. *Elasmucha fieberi* (Jakovlev, 1865) – единично
3477. *Elasmucha grisea* (Linnaeus, 1758) – Серый (=березовый) щитник – обычен

Семейство Cydnidae – Земляные щитники

3478. *Byrsinus flavicornis* (Fabricius, 1794) – Уфа 2018
3479. *Canthophorus melanopterus* (Herrich-Schäffer, 1835) – Кгрч 2020, Гафр 2020, Кушн 2024, Октябрьский 2023-2024
3480. *Canthophorus mixtus* Asanova, 1964 – Ермк (Хабибуллин, 2018а)
3481. *Cydnus aterrimus* (Forster, 1771) – Бузд 2011, Уфа 2023
3482. *Geotomus punctulatus* (A. Costa, 1847) – Уфа 2018 (Хабибуллин, 2018б)
3483. *Legnotus picipes* (Fallen, 1807)
3484. *Microporus nigrita* (Fabricius, 1794) – РБ (Винокуров и др., 2016), Уфа
3485. *Sehirus luctuosus* Mulsant & Rey, 1866 – Уфа 2020-2023, Ишмб 2023, Туйм 2023
3486. *Sehirus morio* (Linnaeus, 1761)
3487. *Sehirus ovatus* (Herrich-Schaeffer, 1840) (Винокуров и др., 2016)
3488. *Tritomegas bicolor* (Linnaeus, 1758) – Ермк (Хабибуллин, 2018а)

Семейство Scutelleridae – Щитники-черепашки

3489. *Eurygaster austriaca* (Schrank, 1776) – Австрийский клоп – единично
3490. *Eurygaster dilaticollis* (Dohrn, 1860) – единично
3491. *Eurygaster integriceps* Puton, 1881 – Вредная черепашка – редко
3492. *Eurygaster maura* (Linnaeus, 1758) – Маврский клоп – обычен
3493. *Eurygaster testudinaria* (Geoffroy, 1785) – степи, массово
3494. *Odontoscelis fuliginosa* (Linnaeus, 1761) – Октябрьский 2021
3495. *Odontotarsus purpureolineatus* (Rossi, 1790) – Краснополосая черепашка – Туйм, Зиан, Давл, Бузд
3496. *Phimodera flori* Fieber, 1863 – Альш (Козьминых, 2018а)
3497. *Psacasta exanthematica* (Scopoli, 1763) – Обыкновенная псакаста – Бузд 2012
Psacasta exanthematica conspersa Germar, 1839

Семейство Pentatomidae – Настоящие щитники

Подсемейство Asopinae

3498. *Arma custos* (Fabricius, 1794) – Ольховая арма – локально
3499. *Jalla dumosa* (Linnaeus, 1758) – Нурм 2023
3500. *Picromerus bidens* (Linnaeus, 1758) – Двузубчатый щитник – Дюрт, Кушн, Мелз

3501. *Pinthaeus sanguinipes* (Fabricius, 1781) – Уфа, Уфмс, Ишмб, Мелз, Бурз, Хайб
3502. *Rhacognathus punctatus* (Linnaeus, 1758) – Ивовый щитник
3503. *Troilus luridus* (Fabricius, 1775) – РБ (Винокуров и др., 2016)
3504. *Zicrona caerulea* (Linnaeus, 1758) – Синий щитник

Подсемейство Pentatominae

3505. *Aelia acuminata* (Linnaeus, 1758) – Остроголовая элия – степи, массово
3506. *Aelia klugii* Hahn, 1833 – Остроголовый клоп – степи, единично
3507. *Aelia rostrata* Boheman, 1852 – Носатая элия – степи, редко
3508. *Antheminia lunulata* (Goeze, 1778) – Молочайный щитник – Уфа, Чишм, редко
3509. *Antheminia pusio* (Kolenati, 1846) – Сибай 2022
3510. *Carpocoris coreanus* Distant, 1899 – Хайб 2014 (Хабибуллин, 2024б)
3511. *Carpocoris fuscispinus* (Boheman, 1850) – Черноусый щитник – обычен
3512. *Carpocoris pudicus* (Poda, 1761) – редко
3513. *Carpocoris purpureipennis* (De Geer, 1773) – Пурпурнокрылый щитник – всюду, обычен
3514. *Chlorochroa juniperina* (Linnaeus, 1758) – Зилр, Бурз
3515. *Chlorochroa pinicola* (Mulsant & Rey, 1852) – Сосновый щитник – локально
3516. *Dolycoris baccarum* (Linnaeus, 1758) – Ягодный клоп – всюду, массово
3517. *Eurydema dominulus* (Scopoli, 1763) – Уфа 2017, редко
3518. *Eurydema gebleri* Kolenati, 1846 – Сибирский крестоцветный клоп, единично
3519. *Eurydema oleracea* (Linnaeus, 1758) – Рапсовый клоп – всюду, массово
3520. *Eurydema ornata* (Linnaeus, 1758) – Горчичный клоп – степи, обычен
3521. *Eurydema ventralis* Kolenati, 1846 – Капустный клоп – степи, обычен
3522. *Eysarcoris aeneus* (Scopoli, 1763) – Ермк 2022, Уфа, Иглн, Чишм
3523. *Holcostethus strictus* (Fabricius, 1803) – Весенний щитник – локален
3524. *Neottiglossa leporina* (Herrich-Schäffer, 1830) – степи, обычен
3525. *Neottiglossa pusilla* (Gmelin, 1789) – степи, локален
3526. *Palomena prasina* (Linnaeus, 1761) – Зеленый щитник – всюду, обычен
3527. *Palomena viridissima* (Poda, 1761) – Ярко-зелёная паломена – единичен
3528. *Pentatoma rufipes* (Linnaeus, 1758) – Красноногий щитник – локален
3529. *Piezodorus lituratus* (Fabricius, 1794) – Люцерновый щитник – локален
3530. *Rhaphigaster nebulosa* (Poda, 1761) – Архн 2016, Уфа 2020 (Хабибуллин, 2024г)
3531. *Rubiconia intermedia* (Wolff, 1811) – Мелз, Кгрч
3532. *Sciocoris cursitans* (Fabricius, 1794) – Уфа
3533. *Sciocoris distinctus* Fieber, 1851 – Уфа 2024
3534. *Sciocoris homalonotus* Fieber, 1851
3535. *Sciocoris umbrinus* (Wolff, 1804)
3536. *Stagonomus amoenus* (Brulle, 1832) – 2016, Белб, Туйм, Стбш
3537. *Stagonomus bipunctatus* (Linnaeus, 1758) – Абзл
Stagonomus bipunctatus pusillus (Herrich-Schaeffer, 1830)

3538. *Staria lunata* (Hahn, 1835) – Крмс, Стмк, Ишмб, Кгрч, Ермк, Туйм, Давл

Подсемейство Podopinae

3539. *Graphosoma lineatum* (Linnaeus, 1758) – Линейчатый щитник – всюду, массово
3540. *Tholagmus flavolineatus* (Fabricius, 1798) – Зилр 2023 (Хабибуллин, 2024б)
3541. *Ventocoris halophilum* (Jakovlev, 1874)
3542. *Vilpianus galii* (Wolff, 1802) – Ишмб 2022 (Хабибуллин, 2024б), Кушн, Крмс, Туйм

Отряд Thysanoptera – Трипсы, или Пузыреногие

Подотряд Terebrantia

Семейство Aeolothripidae

3543. *Aeolothrips albicinctus* Haliday, 1836
3544. *Aeolothrips collaris* Priesner, 1919 – Желтогрудый трипс
3545. *Aeolothrips ericae* Bagnall, 1920
3546. *Aeolothrips fasciatus* (Linnaeus, 1758) – на клевере и люцерне
3547. *Aeolothrips intermedius* Bagnall, 1934
3548. *Aeolothrips melaleucus* Haliday, 1852 – на тополе
3549. *Aeolothrips priesneri* Knechtel, 1923
3550. *Aeolothrips propinquus* Bagnall, 1924
3551. *Aeolothrips versicolor* Uzel, 1895 – Красно-бурый трипс
3552. *Aeolothrips vittatus* Haliday, 1836
3553. *Rhipidothrips elegans* Pelikan, 1961
3554. *Rhipidothrips gratiosus* Uzel, 1895 – Полевой трипс

Семейство Melanthripidae

3555. *Ankothrips niezabitowskii* Schille, 1911
3556. *Melanthrips ficalbii* Buffa, 1907 – Фикальбиевый трипс
3557. *Melanthrips fuscus* (Sulzer, 1776) – Тонкогрудый трипс
3558. *Melanthrips pallidior* Priesner, 1919 – Бледночлениковый трипс

Семейство Thripidae

3559. *Anaphothrips atroapterus* Priesner, 1920 – Короткокрылый трипс
3560. *Anaphothrips euphorbiae* Uzel, 1895 – Молочайный трипс
3561. *Anaphothrips obscurus* (Muller, 1776) – Злаковый трипс
3562. *Apterothrips secticornis* (Trybom, 1896) – Расчлененный трипс
3563. *Aptinothrips elegans* Priesner, 1924
3564. *Aptinothrips rufus* (Haliday, 1836)
3565. *Aptinothrips stylifer* Trybom, 1894
3566. *Baliothrips dispar* (Haliday, 1836) – Неравнокрылый трипс
3567. *Baliothrips kroli* (Schille, 1911) – Аирниковый трипс
3568. *Belothrips acuminatus* (Haliday, 1836) – Трубкобрюхий трипс
3569. *Ceratothrips ericae* (Haliday, 1836) – Ежевый трипс
3570. *Chirothrips hamatus* Trybom, 1895 – Лисохвостный трипс
3571. *Chirothrips manicatus* (Haliday, 1836)

3572. *Chirothrips molestus* Priesner, 1926
3573. *Chirothrips pallidicornis* Priesner, 1925
3574. *Chirothrips ruptipennis* Priesner, 1938
3575. *Dendrothrips degeeri* Uzel, 1895 – Предуралье
3576. *Dictyothrips betae* Uzel, 1895 – Свекловичный трипс
3577. *Drepanothrips reuteri* Uzel, 1895
3578. *Firmothrips firmus* (Uzel, 1895) – Могучегрудый трипс
3579. *Frankliniella intonsa* (Trybom, 1895)
3580. *Frankliniella pallida* (Uzel, 1895)
3581. *Frankliniella tenuicornis* (Uzel, 1895)
3582. *Heliothrips haemorrhoidalis* (Bouché, 1833) – Тепличный трипс
3583. *Hemianaphothrips articulosus* Priesner, 1925
3584. *Hercinothrips femoralis* (O. M. Reuter, 1891)
3585. *Kakothrips dentatus* Knechtel, 1938
3586. *Kakothrips robustus* (Uzel, 1895) – Гороховый трипс
3587. *Limothrips angulicornis* Jablonowski, 1894
3588. *Limothrips denticornis* (Haliday, 1836)
3589. *Limothrips schmutzi* Priesner, 1919
3590. *Mycterothrips albidicornis* (Knechtel, 1923) – Белоусый трипс
3591. *Mycterothrips consociatus* (Targioni-Tozzetti, 1886) – Березовый трипс
3592. *Mycterothrips latus* (Bagnall, 1912) – Широкий трипс
3593. *Mycterothrips salicis* (O. M. Reuter, 1879) – Ивовый трипс
3594. *Neohydatothrips abnormis* (Karny, 1910)
3595. *Neohydatothrips gracilicornis* (Williams, 1916) – Стройноусый трипс
3596. *Odontothrips confusus* Priesner, 1926
3597. *Odontothrips intermedius* (Uzel, 1895) – Бобовый трипс
3598. *Odontothrips loti* (Haliday, 1852) – Эспарцетный трипс – повсеместно в Предуралье
3599. *Odontothrips meridionalis* Priesner, 1919 – Полуденный трипс
3600. *Odontothrips phaleratus* (Haliday, 1836)
3601. *Oxythrips ajugae* Uzel, 1895 – Игольчатый трипс
3602. *Oxythrips bicolor* (O. M. Reuter, 1879) – на хвойных
3603. *Oxythrips cannabensis* Knechtel, 1923 – Конопляный трипс
3604. *Oxythrips ulmifoliorum* (Haliday, 1836) – Жасминный трипс
3605. *Parthenothrips dracaenae* (Heeger, 1854) – Драценовый трипс
3606. *Pezothrips frontalis* (Uzel, 1895) – Лобастый трипс
3607. *Platythrips tunicatus* (Haliday, 1852) – Широкоовальный трипс
3608. *Prosopothrips vejdovskyi* Uzel, 1895
3609. *Pseudoxythrips dentatus* (Knechtel, 1923) – Бухарниковый трипс
3610. *Rubiothrips ferrugineus* (Uzel, 1895) – Темнобрюхий трипс
3611. *Rubiothrips silvarum* (Priesner, 1920) – Лесной трипс
3612. *Rubiothrips sordidus* (Uzel, 1895) – Неопрятный трипс
3613. *Scolothrips longicornis* Priesner, 1926 – Длинноусый трипс

3614. *Scirtothrips longipennis* (Bagnall, 1909)
3615. *Scolothrips sexmaculatus* (Pergande, 1890)
3616. *Scolothrips uzeli* (Schille, 1911) – Шестипятнистый трипс
3617. *Sericothrips bicornis* (Karny, 1910) – повсеместно в Предуралье
3618. *Sminyothrips biuncatus* Uzel, 1895 – Валериановый трипс
3619. *Stenothrips graminum* Uzel, 1895 – Овсяный трипс
3620. *Taeniothrips inconsequens* (Uzel, 1895)
3621. *Taeniothrips picipes* (Zetterstedt, 1828) – Лютиковый трипс
3622. *Tenothrips frici* (Uzel, 1895) – Полынный трипс
3623. *Thrips albopilosus* Uzel, 1895
3624. *Thrips alni* Uzel, 1895 – Хмелевый трипс
3625. *Thrips angusticeps* Uzel, 1895 – Луговой трипс
3626. *Thrips atratus* Haliday, 1836
3627. *Thrips calcaratus* Uzel, 1895 – Однообразный трипс
3628. *Thrips difficilis* Priesner, 1920 – Подольский трипс
3629. *Thrips dilatatus* Uzel, 1895
3630. *Thrips discolor* Haliday, 1836 – Посконниковый трипс
3631. *Thrips euphorbiae* Knechtel, 1923
3632. *Thrips flavus* Schrank, 1776
3633. *Thrips fulvipes* Bagnall 1923 – Пролесковый трипс
3634. *Thrips fuscipennis* Haliday, 1836 – на розе, яблонях
3635. *Thrips juniperinus* Linnaeus 1758 – Можжевельниковый трипс
3636. *Thrips linarius* Uzel, 1895 – Льняной трипс
3637. *Thrips major* Uzel, 1895 – Большеголовый трипс
3638. *Thrips minutissimus* Linnaeus, 1758 – Миниатюрный трипс – повсеместно в Предуралье
3639. *Thrips nigropilosus* Uzel, 1895 – Черноволосистый трипс
3640. *Thrips physapus* Linnaeus, 1758
3641. *Thrips sambuci* Heeger, 1854 – Бузиновый трипс
3642. *Thrips tabaci* Lindeman, 1889 – на вишне, яблоне, груше
3643. *Thrips validus* Uzel, 1895
3644. *Thrips verbasci* (Priesner, 1920) – Норичниковый трипс
3645. *Thrips viminalis* Uzel, 1895
3646. *Thrips vulgatissimus* Haliday, 1836 – Чемерициевый трипс
3647. *Tmetothrips subapterus* (Haliday, 1836) – Очеретниковый трипс

Подотряд Tubulifera

Семейство Phlaeothripidae

3648. *Acanthothrips albovittatus* (Schille, 1911)
3649. *Acanthothrips nodicornis* (O. M. Reuter, 1880)
3650. *Bolothrips bicolor* (Heeger, 1852)
3651. *Bolothrips dentipes* (O. M. Reuter, 1880) – Зубчатоногий трипс
3652. *Bolothrips icarus* (Uzel, 1895) – Икарусный трипс
3653. *Cephalothrips monilicornis* (O. M. Reuter, 1885) – Четкоусый трипс

3654. *Cryptothrips nigripes* (O. M. Reuter, 1880) – Широкогрудый трипс
3655. *Eurytrichothrips affinis* (Reuter, 1901) – Подкоровый трипс – Уфа 1959
3656. *Hapedothrips angusticornis* (Priesner, 1921) – Ромашковый трипс
3657. *Haplothrips acanthoscelis* (Karny, 1810)
3658. *Haplothrips aculeatus* (Fabricius, 1803) – обычный
3659. *Haplothrips alpester* Priesner, 1814 – Альпийский трипс
3660. *Haplothrips corticinus* Priesner, 1964 – на коре деревьев
3661. *Haplothrips distinguendus* (Uzel, 1895) – Козлобородниковый трипс
3662. *Haplothrips juncorum* Bagnall, 1913 – Ожиковый трипс
3663. *Haplothrips kurdjumovi* Karny, 1913
3664. *Haplothrips lederi* (Priesner, 1924)
3665. *Haplothrips leucanthemi* (Schrank, 1781) – повсеместно
3666. *Haplothrips minutus* (Uzel, 1895) – Малый трипс
3667. *Haplothrips mordvilkovi* John, 1925 – Мордвилкова трипс
3668. *Haplothrips niger* (Osborn, 1883)
3669. *Haplothrips phyllophilus* Priesner, 1914 – Крушиновый трипс – в Предуралье обычный вид
3670. *Haplothrips reuteri* (Karny, 1907) – повсеместно
3671. *Haplothrips setiger* Priesner, 1921 – Цикориевый трипс – в Предуралье обычный вид
3672. *Haplothrips statices* (Haliday, 1836) – Статный трипс – в Предуралье: обычный вид
3673. *Haplothrips subtilissimus* (Haliday, 1852) – на лещине, березе, иве, тополе, лиственнице
3674. *Haplothrips tritici* (Kurdjumov, 1912) – Пшеничный трипс
3675. *Haplothrips verbasci* (Osborn, 1897) – Коровяковый трипс
3676. *Holothrips schaubergeri* (Priesner, 1920)
3677. *Hoplandrothrips bidens* (Bagnall, 1910) – в Предуралье обычный вид
3678. *Hoplandrothrips hungaricus* Priesner, 1961 – Длиннохоботный трипс
3679. *Hoplothrips corticis* (De Geer, 1773) – в Предуралье обычный вид
3680. *Hoplothrips fungi* (Zetterstedt, 1828) – Неуклюжий трипс – Кгрч 1961
3681. *Hoplothrips pedicularius* (Haliday, 1836) – Стволовый трипс
3682. *Hoplothrips ulmi* (Fabricius, 1781) – Вязовый трипс
3683. *Liophloeothrips hungaricus* (Priesner, 1924)
3684. *Liothrips pragensis* Uzel, 1895 – Пражский трипс
3685. *Liothrips setinodis* (O. M. Reuter, 1880) – Лобазниковый трипс
3686. *Lispothrips crassipes* (Jablonowski, 1894) – Толстобрюхий трипс
3687. *Phlaeothrips coriaceus* Haliday, 1836
3688. *Poecilothrips albopictus* Uzel, 1895 – Пятнистый трипс
3689. *Priesneriella tubversicolor* (Djadetchko, 1961) – Желтохвостый трипс
3690. *Xylaplothrips fuliginosus* (Schille, 1911) – Чернобрюхий трипс

Насекомые с полным превращением – Holometabola

Отряд Megaloptera – Вислокрылые (Большекрылые)

Семейство Sialidae

3691. *Sialis lutaria* (Linnaeus, 1758) – Вислокрылка

Отряд Raphidioptera – Верблюдки (Костин И.Н.)

Семейство Raphidiidae

3692. *Dichrostigma flavipes* (Stein, 1863)
3693. *Phaeostigma notatum* (Fabricius, 1781) – Бурз 2015, Блрц 2022, Мелз 2022
3694. *Raphidia ophiopsis* Linnaeus, 1758 – Обыкновенная верблюдка
3695. *Xanthostigma xanthostigma* (Schummel, 1832) – Уфа 2024, Мелз 2022, БГПЗ 2013

Семейство Inocelliidae

3696. *Inocellia crassicornis* (Schummel, 1832) – Абзл 2021

Отряд Neuroptera – Сетчатокрылые (Костин И.Н.)

Подотряд Hemerobiiformia

Семейство Coniopterygidae

3697. *Semiadalis aleyrodiformis* (Stephens, 1836)

Семейство Sisyridae

3698. *Sisyra nigra* (Retzius, 1783) – Предуралье, юг 2018-2025
3699. *Sisyra terminalis* Curtis, 1854

Семейство Mantispidae – Мантиспиды

3700. *Mantispa styriaca* (Poda, 1761) – Мантиспа – Ермк 2019 (Красная книга РБ)

Семейство Hemerobiidae

3701. *Drepanepteryx phalaenoides* (Linnaeus, 1758) – Нефтекамск 2021
3702. *Hemerobius humulinus* Linnaeus, 1758 – Уфа 2019
? Hemerobius lutescens Fabricius, 1793
3703. *Hemerobius marginatus* Stephens, 1836 – Уфа
3704. *Hemerobius nitidulus* Fabricius, 1777 – Уфа 2019-2024, Байм 2025, Иглн 2025
3705. *Micromus angulatus* (Stephens, 1836) – Уфа и южнее
3706. *Micromus paganus* (Linnaeus, 1767) – Крмс
3707. *Micromus variegatus* (Fabricius, 1793) – Уфмс 2020, Уфа 2024, Иглн 2025
3708. *Psectra diptera* (Burmeister, 1839) – Уфа 2022
? Sympherobius elegans (Stephens, 1836) – Уфа 2021
? Sympherobius pygmaeus (Rambur, 1842) – Уфа 2019 2024

Семейство Chrysopidae – Златоглазки

3709. *Apertochrysa flavifrons* (Brauer, 1851)) – Мелз 2023
3710. *Apertochrysa prasina* (Burmeister, 1839), s.l. – Салават 2025, Нефтекамск 2025
3711. *Apertochrysa ventralis* (Curtis, 1834)
3712. *Chrysopa abbreviata* Curtis, 1834
3713. *Chrysopa commata* Kis & Újhelyi, 1965 – Чишм 2025
3714. *Chrysopa dasyptera* McLachlan, 1872
3715. *Chrysopa formosa* Brauer, 1850
? Chrysopa hummeli Tjeder, 1936 – Уфа 2021

? Chrysopa pallens (Rambur, 1838)
3716. *Chrysopa perla* (Linnaeus, 1758)
3717. *Chrysopa phyllochroma* Wesmael, 1841
3718. *Chrysopa walkeri* McLachlan, 1893 – Уфа и южнее 2009-2025
3719. *Chrysoperla carnea* (Stephens, 1836), s.l. – обычна
3720. *Chrysotropia ciliata* (Wesmael, 1841) – Нефтекамск 2019, Уфа 2021
3721. *Nineta alpicola* Kuwayama, 1956 – Нурм 2023
3722. *Nineta flava* (Scopoli, 1763) – Уфа
3723. *Nineta vittata* (Wesmael, 1841) – Уфа, Ишмб, Блвщ
3724. *Nothochrysa fulviceps* (Stephens, 1836)

Подотряд Myrmeleontiformia

Семейство Myrmeleontidae – Муравьиные львы

3725. *Deutoleon lineatus* (Fabricius, 1798) – Уфа
3726. *Distoleon tetragrammicus* (Fabricius 1798)
3727. *Libelloides macaronius* (Scopoli, 1763) – Пестрый аскалаф – Байм, Зилр (Красная книга РБ)
3728. *Myrmecaelurus trigrammus* (Pallas, 1771)
3729. *Myrmeleon bore* (Tjeder, 1941) – Уфа 2023
3730. *Myrmeleon formicarius* Linnaeus, 1767 – Муравьиный лев – локален
3731. *Myrmeleon immanis* Walker, 1853

Отряд Mecoptera – Скорпионницы

Семейство Boreidae – Ледничники

3732. *Boreus hyemalis* (Linnaeus, 1767)
3733. *Boreus westwoodi* Hagen, 1866 – Обыкновенный ледничник

Семейство Panorpidae – Скорпионницы

3734. *Panorpa alpina* Rambur, 1842 – Белорецк 2020
3735. *Panorpa communis* Linnaeus, 1758 – Обыкновенная скорпионница – обычна
3736. *Panorpa germanica* Linnaeus, 1758
3737. *Panorpa vulgaris* Imhoff & Labram, 1845 – Абзл 2018, Туйм 2018, Бурз 2020, Кгрч 2020, Калт 2020, Кушн 2020, Ишмб 2024, Блрц 2024, Ермк 2021

Отряд Strepsiptera – Веерокрылые

Семейство Xenidae

3738. *Xenos vesparum* Rossius, 1793 – Ишмб 2023

Отряд Coleoptera – Жесткокрылые

Подотряд Adephaga – Плотоядные жуки

Семейство Carabidae – Жужелицы

Подсемейство Brachininae

3739. *Brachinus crepitans* (Linnaeus, 1758) – Трескучий бомбардир
3740. *Brachinus explodens* Duftschmied, 1812 – Малый бомбардир
3741. *Brachinus hamatus* Fischer von Waldheim, 1828

3742. *Brachinus quadriguttatus* Gebler, 1830 – Хайб

Подсемейство Broscinae – Жужелицы-головачи

3743. *Broscus cephalotes* (Linnaeus, 1758)

Подсемейство Cicindelinae – Скакуны

3744. *Cicindela campestris* Linnaeus, 1758 – Полевой скакун
3745. *Cicindela hybrida* Linnaeus, 1758 – Скакун-межняк
3746. *Cicindela littoralis conjunctaepustulata* Dokhtouroff, 1887 – Байм 2024
3747. *Cicindela maritima* Dejean, 1822
3748. *Cicindela soluta* Dejean, 1822
3749. *Cicindela sylvatica* Linnaeus, 1758 – Лесной скакун
3750. *Cylindera germanica* (Linnaeus, 1758)

Подсемейство Carabinae – Настоящие жужелицы

3751. *Calosoma denticolle* Gebler, 1833 – Степной красотел
3752. *Calosoma inquisitor* (Linnaeus, 1758) – Бронзовый красотел
3753. *Calosoma investigator* (Illiger, 1798) – Красотел- исследователь
3754. *Calosoma maderae* (Fabricius, 1775) – Бурз 2023, Уфа 2023, Хайб 2016-2017
3755. *Calosoma reticulatum* (Fabricius, 1787) – Давл 2020
3756. *Calosoma sycophanta* (Linnaeus, 1758) – Пахучий красотел
3757. *Carabus aeruginosus* Fischer von Waldheim, 1820 – Ржавая жужелица
3758. *Carabus arcensis* Herbst, 1784
3759. *Carabus bessarabicus* Fischer von Waldheim, 1823 – горно-таежные леса (Коробейников, 1992).
Carabus bessarabicus concretus Fischer von Waldheim, 1823
3760. *Carabus cancellatus* Illiger, 1798 – Решётчатая жужелица – обычна
3761. *Carabus clatratus* Linnaeus, 1760 – Золотоямчатая жужелица
3762. *Carabus convexus* Fabricius, 1775 – Выпуклая жужелица
3763. *Carabus cribellatus* M.Adams, 1812 – Кавказская жужелица
3764. *Carabus estreicheri* Fischer von Waldheim, 1820
3765. *Carabus glabratus* Paykull, 1790 – Гладкая жужелица – локально
3766. *Carabus granulatus* Linnaeus, 1758 – Зернистая жужелица
3767. *Carabus haeres* Fischer von Waldheim, 1823
3768. *Carabus henningi* Fischer von Waldheim, 1817
3769. *Carabus hortensis* Linnaeus, 1758 – Садовая жужелица
3770. *Carabus hungaricus cribellatus* M.Adams, 1812
3771. *Carabus karpinskii* Kryzhanovskij & Matveev, 1993 – Жужелица Карпинского – Блрц (Mikhailov, 2025)
3772. *Carabus nemoralis* O. F. Müller, 1764 – Лесная жужелица
3773. *Carabus nitens* Linnaeus, 1758 – Блестящая жужелица
3774. *Carabus regalis* Fischer-Waldheim, 1820
3775. *Carabus schoenherri* Fischer von Waldheim, 1822 – леса
3776. *Carabus sibiricus* Fischer von Waldheim, 1820
Carabus sibiricus kolosovi Zinoviev, 1997 – Дувн (Зиновьев, 1997)
3777. *Carabus stscheglowi* Mannerheim, 1827

3778. *Carabus varians janthinus* (Ganglbauer, 1887) – горно-таежные леса
3779. *Carabus violaceus* Linnaeus, 1758
3780. *Cychrus caraboides* (Linnaeus, 1758)

Подсемейство Dryptinae

3781. *Polistichus connexus* (Geoffroy, 1785) – Ермк

Подсемейство Elaphrinae – Тинники

3782. *Blethisa multipunctata* (Linnaeus, 1758) – Уфа
3783. *Elaphrus cupreus* Duftschmid, 1812 – Медный тинник
3784. *Elaphrus riparius* (Linnaeus, 1758) – Береговой тинник
3785. *Elaphrus uliginosos* Fabricius, 1792

Подсемейство Harpalinae

3786. *Acupalpus exiguus* Dejean, 1829
3787. *Acupalpus flavicollis* (Sturm, 1825)
3788. *Acupalpus meridianus* (Linnaeus, 1760)
3789. *Agonum dolens* (C. R. Sahlberg, 1827)
3790. *Agonum duftschmidi* J. Schmidt, 1994
3791. *Agonum ericeti* (Panzer, 1809)
3792. *Agonum fuliginosum* (Panzer, 1809)
3793. *Agonum gracile* Sturm, 1824
3794. *Agonum gracilipes* (Duftschmid, 1812)
3795. *Agonum impressum* (Panzer, 1796)
3796. *Agonum lugens* (Duftschmid, 1812)
3797. *Agonum marginatum* (Linnaeus, 1758) – Окаймлённый быстряк
3798. *Agonum micans* (Nicolai, 1822)
3799. *Agonum muelleri* (Herbst, 1784)
3800. *Agonum piceum* (Linnaeus, 1758)
3801. *Agonum sexpunctatum* (Linnaeus, 1758) – Шестиямчатый быстряк
3802. *Agonum thoreyi* Dejean, 1828 – реки Сим и Ай (Козырев и др., 2000)
3803. *Agonum versutum* Sturm, 1824
3804. *Agonum viduum* (Panzer, 1796)
3805. *Amara aenea* (De Geer, 1774) – Бронзовый тускляк
3806. *Amara apricaria* (Paykull, 1790) – Солнцелюбивый тускляк
3807. *Amara aulica* (Panzer, 1797) – Большой тускляк
3808. *Amara bifrons* (Gyllenhall, 1810)
3809. *Amara brevicollis* (Chaudoir, 1850)
3810. *Amara brunnea* (Gyllenhal, 1810) – ЮУГПЗ (Козырев и др., 2000)
3811. *Amara communis* (Panzer, 1796)
3812. *Amara consularis* (Duftschmid, 1812)
3813. *Amara convexior* Stephens, 1828
3814. *Amara convexiuscula* (Marsham, 1802)
3815. *Amara curta* Dejean, 1828
3816. *Amara equestris* (Duftschmid, 1812)
3817. *Amara erratica* (Duftschmid, 1812)

3818. *Amara eurynota* (Panzer, 1796)
3819. *Amara famelica* Zimmermann, 1832
3820. *Amara familiaris* (Duftschmid, 1812)
3821. *Amara fodinae* Mannerheim, 1825
3822. *Amara fulva* (O. F. Muller, 1776)
3823. *Amara gebleri* Dejean, 1831
3824. *Amara infima* (Duftschmid, 1812)
3825. *Amara ingenua* (Duftschmid, 1812)
3826. *Amara lunicollis* Schiodte, 1837
3827. *Amara majuscula* (Chaudoir, 1850)
3828. *Amara montivaga* Sturm, 1825
3829. *Amara municipalis* (Duftschmid, 1812)
3830. *Amara nitida* Sturm, 1825
3831. *Amara ovata* (Fabricius, 1792)
3832. *Amara plebeja* (Gyllenhall, 1810)
3833. *Amara similata* (Gyllenhall, 1810)
3834. *Amara spreta* Dejean, 1831
3835. *Amara taurica* (Motschulsky, 1844)
3836. *Amara tibialis* (Paykull, 1798)
3837. *Anchomenus dorsalis* (Pontoppidan, 1763) – Желтокрылый быстряк
3838. *Anisodactylus binotatus* (Fabricius, 1787) – Двуточечный краснолоб
3839. *Anisodactylus nemorivagus* (Duftschmid, 1812)
3840. *Anisodactylus signatus* (Panzer, 1796) – Выразительный краснолоб
3841. *Anthracus consputus* (Duftschmid, 1812)
3842. *Badister bullatus* (Schrank, 1798)
3843. *Badister dilatatus* Chaudoir, 1837
3844. *Badister lacertosus* Sturm, 1815
3845. *Badister meridionalis* Puel, 1925
3846. *Badister peltatus* (Panzer, 1796)
3847. *Badister sodalis* (Duftschmid, 1812) – реки Сим и Ай (Козырев и др., 2000)
3848. *Badister unipustulatus* Bonelli, 1813
3849. *Bradycellus caucasicus* (Chaudoir, 1846)
3850. *Bradycellus curtulus* (Motschulsky, 1860)
3851. *Calathus ambiguus* (Paykull, 1790)
3852. *Calathus erratus* (C. Sahlberg, 1827)
3853. *Calathus melanocephalus* (Linnaeus, 1758) – Черноголовый моховик
3854. *Calathus micropterus* (Duftschmied, 1812)
3855. *Callistus lunatus* (Fabricius, 1775) – Лунный каллистус
3856. *Chlaenius nigricornis* (Fabricius, 1787) – Черноусая жужелица
3857. *Chlaenius nitidulus* (Schrank, 1781) – Зелёный слизнеед
3858. *Chlaenius spoliatus* (P.Rossi, 1792) – Ермк 2022, Салават 2025
3859. *Chlaenius tristis* (Schaller, 1783)
3860. *Chlaenius vestitus* (Paykull, 1790) – Каемчатый слизнеед

3861. *Cymindis angularis* Gyllenhall, 1810
3862. *Cymindis vaporariorum* (Linnaeus, 1758)
3863. *Demetrias imperialis* (Germar, 1823) – Кушн 2022
3864. *Demetrias monostigma* Samouelle, 1819
3865. *Dicheirotrichus mannerheimii* (R.F.Sahlberg, 1944)
3866. *Dicheirotrichus ustulatus* (Dejean, 1829) – реки Сим и Ай (Козырев и др., 2000)
3867. *Dolichus halensis* (Schaller, 1783) – обычен
3868. *Dromius agilis* (Fabricius, 1787)
3869. *Dromius angusticollis* J.R. Sahlberg, 1880
3870. *Dromius fenestratus* (Fabricius, 1794)
3871. *Dromius quadraticollis* Morawitz, 1862
3872. *Harpalus affinis* (Schrank, 1781) – Золотистый бегун – обычный
3873. *Harpalus anxius* (Duftschmid, 1812) – Уфа, Белб, Чишм
3874. *Harpalus brevis* Motschulsky, 1844 – Альш, БГПЗ
3875. *Harpalus calathoides* Motschulsky, 1844
3876. *Harpalus calceatus* (Duftschmid, 1812) – Просяная жужелица – Уфа, ЗШТ
3877. *Harpalus cisteloides* Motschulsky, 1844 – ЗШТ
3878. *Harpalus distinguendus* (Duftschmid, 1812) – Обыкновенный бегун – Уфа
3879. *Harpalus flavescens* (Piller & Mitterpacher, 1783) – Рыжий харпалус
3880. *Harpalus froelichii* Sturm, 1818 – Уфа
3881. *Harpalus fuscipalpis* Sturm, 1818 – ЗШТ, Чшмн
3882. *Harpalus griseus* (Panzer, 1796) – Предуралье
3883. *Harpalus hirtipes* (Panzer, 1796) – ЗШТ, Ермк
3884. *Harpalus laevipes* Zetterstedt, 1828 – ЗШТ, ЮУГПЗ
3885. *Harpalus latus* (Linnaeus, 1758) – Широкий бегунчик – Уфа, БГПЗ, ЗШТ
3886. *Harpalus luteicornis* (Dufischmid, 1812) – ЗШТ
3887. *Harpalus modestus* Dejean, 1829
3888. *Harpalus optabilis* Dejean, 1829
3889. *Harpalus pumilus* Sturm, 1818
3890. *Harpalus pygmaeus* Dejean, 1828
3891. *Harpalus rubripes* (Duftschmid, 1812)
3892. *Harpalus rufipes* (De Geer, 1774) – Волосистая жужелица – массово
3893. *Harpalus serripes* (Quensel, 1806) – Салават
3894. *Harpalus smaragdinus* (Duftschmid, 1812) – Изумрудный бегун – Уфа, ЗШТ
3895. *Harpalus solitaris* Dejean, 1829 – Нрмн
3896. *Harpalus subcylindricus* Dejean, 1829 – Белб
3897. *Harpalus tardus* (Panzer, 1796) – ЗШТ, ЮУГПЗ
3898. *Harpalus xanthopus* Gemminger & Harold, 1868
Harpalus xanthopus winkleri Schauberger, 1923 – Уфа, ЗШТ, ЮУГПЗ
3899. *Harpalus zabroides* Dejean, 1829 – Уфа, Альш, Белб, Ермк
3900. *Laemostenus terricola* (Herbst, 1784)
3901. *Lebia chlorocephala* (J. J. Hoffmann, 1803)

3902. *Lebia cruxminor* (Linnaeus, 1758) – Лебия малый крестоносец
3903. *Lebia cyanocephala* (Linnaeus, 1758)
3904. *Licinus cassideus* (Fabricius, 1792)
3905. *Licinus depressus* (Paykull, 1790)
3906. *Microderes brachypus* (Steven, 1809) – Уфа 2020
3907. *Microlestes maurus* (Sturm, 1827)
3908. *Microlestes minutulus* (Goeze, 1777)
3909. *Odacantha melanura* (Linnaeus, 1767)
3910. *Olisthopus sturmii* (Duftschmid, 1812)
3911. *Ophonus azureus* (Fabricius, 1775) – Салават
3912. *Ophonus cordatus* (Duftschmid, 1812)
3913. *Ophonus diffinis* (Dejean, 1829)
3914. *Ophonus laticollis* Mannerheim, 1825 – ЗШТ, Гафр, ЮУГПЗ
3915. *Ophonus puncticollis* (Paykull, 1798) – Ермк
3916. *Ophonus rufibarbis* (Fabricius, 1792) – ЗШТ, ЮУГПЗ
3917. *Ophonus schaubergerianus* (Puel, 1937) – ЗШТ
3918. *Ophonus stictus* Stephens, 1828
3919. *Ophonus subquadratus* (Dejean, 1829)
3920. *Ophonus transversus* Motschulsky, 1844 – Абзл, Белб
3921. *Oxypselaphus obscurus* (Herbst, 1784)
3922. *Panagaeus bipustulatus* (Fabricius, 1775)
3923. *Panagaeus cruxmajor* (Linnaeus, 1758) – Большой крестоносец
3924. *Paradromius linearis* (Olivier, 1795)
3925. *Philorhizus sigma* (P. Rossi, 1790)
3926. *Platynus assimilis* (Paykull, 1790)
3927. *Platynus krynickii* (Sperk, 1835)
3928. *Platynus livens* (Gyllenhal, 1810)
3929. *Platynus longiventris* (Mannerheim, 1825)
3930. *Platynus mannerheimii* (Dejean, 1828)
3931. *Poecilus crenuliger* Chaudoir, 1876
3932. *Poecilus cupreus* (Linnaeus, 1758) – Медная жужелица
3933. *Poecilus koyi koyi* Germar, 1823
3934. *Poecilus lepidus* (Leske, 1785)
3935. *Poecilus punctulatus* (Schaller, 1783)
3936. *Poecilus striatopunctatus* (Duftschmid, 1812)
3937. *Poecilus subcoeruleus* (Quensel, 1806)
3938. *Poecilus versicolor* (Sturm, 1824)
3939. *Pterostichus adstrictus* Eschscholtz, 1823 – в лесной зоне (Козырев, 1997)
3940. *Pterostichus anthracinus* (Illiger, 1798)
3941. *Pterostichus diligens* (Sturm, 1824)
3942. *Pterostichus gracilis* (Dejean, 1828)
3943. *Pterostichus kaninensis* (Poppius, 1906)
3944. *Pterostichus kokeilii* L. Miller, 1850

3945. *Pterostichus macer* (Marsham, 1802)
3946. *Pterostichus magus* (Mannerheim, 1825)
3947. *Pterostichus mannerheimii* (Dejean, 1831) – локален
3948. *Pterostichus melanarius* (Illiger, 1798) – обычен
3949. *Pterostichus minor* (Gyllenhall, 1827)
3950. *Pterostichus niger* (Schaller, 1783) – Чёрный птеростих – обычен
3951. *Pterostichus nigrita* (Paykull, 1790)
3952. *Pterostichus oblongopunctatus* (Fabricius, 1787)
3953. *Pterostichus quadrifoveolatus* Letzner, 1852
3954. *Pterostichus rhaeticus* Heer, 1837
3955. *Pterostichus strenuus* (Panzer, 1796)
3956. *Pterostichus uralensis* (Motschulsky, 1850) – Уральский птеростих
3957. *Pterostichus urengaicus* Jurecek, 1924
3958. *Pterostichus vernalis* (Panzer, 1796)
3959. *Sericoda quadripunctata* (De Geer, 1774)
3960. *Stenolophus discophorus* (Fischer von Waldheim, 1823)
3961. *Stenolophus mixtus* (Herbst, 1784)
3962. *Stenolophus teutonus* (Schrank, 1781)
3963. *Stomis pumicatus* (Panzer, 1796) – Уфа 2024
3964. *Syntomus truncatellus* (Linnaeus, 1761)
3965. *Synuchus vivalis* (Illiger, 1798)
3966. *Zabrus tenebrioides* (Goeze, 1777) – Хлебная жужелица – Дюртюли 1993

Подсемейство Loricerinae

3967. *Loricera pilicornis* (Fabricius, 1775)

Подсемейство Nebriinae – Плотинники

3968. *Leistus ferrugineus* (Linnaeus, 1758)
3969. *Leistus terminatus* (Panzer, 1793)
3970. *Nebria livida* (Linnaeus, 1758) – Желтый (хищный) плотинник
3971. *Nebria rufescens* (Strom, 1768)
3972. *Nebria uralensis* Glasunov, 1901 – Уральская небрия
3973. *Notiophilus aquaticus* (Linnaeus, 1758)
3974. *Notiophilus biguttatus* (Fabricius, 1779)
3975. *Notiophilus fasciatus* Mäklin, 1855 – Блрц (Михайлов, Ермаков, 2016)
3976. *Notiophilus germinyi* Fauvel, 1863
3977. *Notiophilus laticollis* Chaudoir, 1850
3978. *Notiophilus palustris* (Duftschmid, 1812)

Подсемейство Omophroninae – Омофроны

3979. *Omophron limbatum* (Fabricius, 1776)

Подсемейство Oodinae

3980. *Oodes helopioides* (Fabricius, 1792)

Подсемейство Scaritinae – Скариты

3981. *Clivina fossor* (Linnaeus, 1758) – Кливина-землекоп

3982. *Dyschirius aeneus* (Dejean, 1825)
? *Dyschirius bonellii* Putzeys, 1846
3983. *Dyschirius globosus* (Herbst, 1783)
3984. *Dyschirius nitidus* (Dejean, 1825)
3985. *Dyschirius politus* (Dejean, 1825)
3986. *Dyschirius salinus striatopunctatus* Putzeys, 1846
3987. *Dyschirius thoracicus* (P. Rossi, 1790)
3988. *Dyschirius tristis* Stephens, 1827

Подсемейство Trechinae

3989. *Asaphidion flavipes* (Linnaeus, 1760)
3990. *Asaphidion pallipes* (Duftschmid, 1812) – Уфа 2025
3991. *Bembidion andreae* (Fabricius, 1787)
3992. *Bembidion argenteolum* Ahrens, 1812
3993. *Bembidion articulatum* (Panzer, 1796) – Членистый бегунчик
3994. *Bembidion azurescens* Dalla-Torre, 1877
3995. *Bembidion biguttatum* (Fabricius, 1779)
3996. *Bembidion bruxellense* Wesmael, 1835
3997. *Bembidion bualei polonicum* G.Müller, 1930
3998. *Bembidion crenulatum* R.F.Sahlberg, 1844 – высокогорья (Коробейников, 1986)
3999. *Bembidion deletum* Audinet-Serville, 1821
4000. *Bembidion dentellum* (Thunberg, 1787)
4001. *Bembidion difficile* (Motschulsky, 1844)
4002. *Bembidion doris* (Panzer, 1797)
4003. *Bembidion fellmanni* (Mannerheim, 1823)
4004. *Bembidion femoratum* Sturm, 1825
4005. *Bembidion guttula* (Fabricius, 1792)
4006. *Bembidion hirmocoelum* Chaudoir, 1850
4007. *Bembidion hyperboraeorum* Munster, 1923
4008. *Bembidion infuscatum* Dejean, 1831
4009. *Bembidion lampros* (Herbst, 1784) – Блестящий бегунчик
4010. *Bembidion laticolle* (Duftschmid, 1812)
? Bembidion latiplaga Chaudoir, 1850
4011. *Bembidion litorale* (Olivier, 1790)
4012. *Bembidion lunatum* (Duftschmid, 1812)
4013. *Bembidion mannerheimii* C.R. Sahlberg, 1827
4014. *Bembidion menetriesii* (Kolenati, 1845)
4015. *Bembidion minimum* (Fabricius, 1792)
4016. *Bembidion obliquum* Sturm, 1825
4017. *Bembidion obscurellum* (Motschulsky, 1845) – пещеры
4018. *Bembidion octomaculatum* (Goeze, 1777)
4019. *Bembidion petrosum* Gebler, 1833
4020. *Bembidion prasinum* (Duftschmid, 1812)

4021. *Bembidion properans* (Stephens, 1828)
4022. *Bembidion punctulatum* Drapiez, 1820
4023. *Bembidion pygmaeum* (Fabricius, 1792) – Маленький бегунчик
4024. *Bembidion quadrimaculatum* (Linnaeus, 1760) – Четырёхпятнистый бегунчик
4025. *Bembidion quadripustulatum* Audinet-Serville, 1821 – ЮУГПЗ (Козырев и др., 2000)
4026. *Bembidion ruthenum* Tschitscherine, 1895
4027. *Bembidion saxatile* Gyllenhal, 1827 – реки Сим и Ай (Козырев и др., 2000)
4028. *Bembidion schueppelii* Dejean, 1831
4029. *Bembidion semipunctatum* (Donovan, 1806)
4030. *Bembidion striatum* (Fabricius, 1792) – Бороздчатый бегунчик
4031. *Bembidion tetracolum* Say, 1823
Bembidion tetracolum uralense Fassati, 1944 – ЗШТ, реки Сим и Ай
4032. *Bembidion tinctum* Zetterstedt, 1828
4033. *Bembidion varium* (Olivier, 1795)
4034. *Bembidion velox* (Linnaeus, 1760)
? Bembidion virens Gyllenhal, 1827
4035. *Blemus discus* (Fabricius, 1792)
4036. *Epaphius rivularis* (Gyllenhal, 1810)
4037. *Epaphius secalis* (Paykull, 1790)
4038. *Patrobus assimilis* Chaudoir, 1844
4039. *Patrobus atrorufus* (Strom, 1768)
4040. *Perileptus areolatus* (Creutzer, 1799)
4041. *Pogonus luridipennis* (Germar, 1822) – Бурокрылая жужелица-борода
4042. *Princidium punctulatum* (Drapiez, 1821)
4043. *Tachys bistriatus* (Duftschmid, 1812)
4044. *Tachys micros* (Fischer von Waldheim, 1828)
4045. *Tachyta nana* (Gyllenhal, 1810)
4046. *Trechoblemus micros* (Herbst, 1784) – реки Сим и Ай (Козырев и др., 2000)
4047. *Trechus rubens* (Fabricius, 1792)

Семейство Dytiscidae – Плавунцы

Подсемейство Agabinae

4048. *Agabus bipustulatus* (Linnaeus, 1767)
4049. *Agabus congener* (Thunberg, 1794)
4050. *Agabus guttatus* (Paykull, 1798)
4051. *Agabus labiatus* (Brahm, 1790)
4052. *Agabus paludosus* (Fabricius, 1801)
4053. *Agabus sturmii* (Gyllenhal, 1808) (Козьминых, 2017б)
4054. *Ilybius aenescens* Thomson 1870
4055. *Ilybius ater* (De Geer, 1774)
4056. *Ilybius fenestratus* (Fabricius, 1781) – Крмс 2020 (Сажнев и др., 2021).
4057. *Ilybius fuliginosus* (Fabricius, 1792)
4058. *Ilybius guttiger* (Gyllenhal, 1808) (Козьминых, 2019)

4059. *Ilybius neglectus* (Erichson, 1837) (Козьминых, 2017б)
? Ilybius similis Thomson, 1856
4060. *Ilybius subaeneus* Erichson, 1837
4061. *Platambus maculatus* (Linnaeus, 1758)

Подсемейство Colymbetinae

4062. *Colymbetes fuscus* (Linnaeus, 1758) – Бурый прудовик
4063. *Colymbetes paykulli* Erichson, 1837
4064. *Colymbetes striatus* (Linnaeus, 1758)
4065. *Rhantus exsoletus* (Forster, 1771)
4066. *Rhantus frontalis* (Marsham, 1802) – Точечный ильник
4067. *Rhantus latitans* Sharp, 1882 – Нефтекамск, пойма р. Буй 2018

Подсемейство Copelatinae

4068. *Copelatus haemorrhoidalis* Régimbart, 1883

Подсемейство Dytiscinae

4069. *Acilius canaliculatus* (Nicolai, 1822)
4070. *Acilius sulcatus* (Linnaeus, 1758) – Бороздчатый полоскун
4071. *Cybister lateralimarginalis* (De Geer, 1774) – Обыкновенный скоморон – Уфа
4072. *Dytiscus circumcinctus* Ahrens, 1811 – Каемчатый плавунец
4073. *Dytiscus circumflexus* Fabricius, 1801
4074. *Dytiscus lapponicus* Gyllenhal, 1808
4075. *Dytiscus latissimus* Linnaeus, 1758
4076. *Dytiscus marginalis* Linnaeus, 1758 – Окаймленный плавунец
4077. *Graphoderus austriacus* (Sturm, 1834)
4078. *Graphoderus bilineatus* (De Geer, 1774) – Двухполосый поводень – Кркм (Сажнев и др., 2021).
4079. *Graphoderus cinereus* (Linnaeus, 1758) – Серый поводень
4080. *Graphoderus zonatus* (Hoppe, 1795)
4081. *Graptodytes bilineatus* (Sturm, 1835) – Крмс 2020
4082. *Hydaticus aruspex* Clark, 1864
4083. *Hydaticus continentalis* J. Balfour-Browne, 1944
4084. *Hydaticus seminiger* (De Geer, 1774) – Уфа, Уфмс
4085. *Hydaticus transversalis* (Pontoppidan, 1763) – Поперечнополосый ильник
4086. *Liopterus haemorrhoidalis* (Fabricius, 1787)

Подсемейство Hydroporinae

4087. *Bidessus nasutus* Sharp, 1887
4088. *Clemnius decoratus* (Gyllenhal, 1810) – Иглн 2025
4089. *Graptodytes bilineatus* (Sturm, 1835) – Нефтекамск, пойма р. Буй 2018
4090. *Graptodytes pictus* (Fabricius, 1787)
4091. *Hydroglyphus geminus* (Fabricius, 1792) – Иглн 2025
4092. *Hydroporus angustatus* Sturm, 1835 – Уфа 2017
4093. *Hydroporus erythrocephalus* (Linnaeus, 1758)
4094. *Hydroporus nigrita* (Fabricius, 1792)
4095. *Hydroporus palustris* (Linnaeus, 1761) – Крмс 2020 (Сажнев и др., 2021)

4096. *Hydroporus planus* (Fabricius, 1782)
4097. *Hygrotus impressopunctatus* (Schaller, 1783)
4098. *Hygrotus inaequalis* (Fabricius, 1777)
4099. *Hygrotus quinquelineatus* (Zetterstedt, 1828) – Нефтекамск, пойма р. Буй 2018 (Сажнев и др., 2019)
4100. *Hygrotus versicolor* (Schaller, 1783)
4101. *Hyphydrus ovatus* (Linnaeus, 1761) – Овальный пузанчик
4102. *Nebrioporus airumlus* (Kolenati, 1845) – Ермк 2017
4103. *Nebrioporus assimilis* (Paykull, 1798)
4104. *Nebrioporus depressus* (Fabricius, 1775)
4105. *Porhydrus lineatus* (Fabricius, 1775)
4106. *Porhydrus obliquesignatus* (Bielz, 1852) – Ермк

Подсемейство Laccophilinae

4107. *Laccophilus biguttatus* Kirby, 1837
4108. *Laccophilus hyalinus* (De Geer, 1774)
4109. *Laccophilus minutus* (Linnaeus, 1758)

Семейство Gyrinidae – Вертячки

4110. *Gyrinus marinus* Gyllenhal, 1808 – Темноголовая вертячка
4111. *Gyrinus minutus* Fabricius, 1798 – Вертячка-крошка
4112. *Gyrinus natator* (Linnaeus, 1758) – Вертячка-поплавок
4113. *Orectochilus villosus* (O. F. Muller, 1776)

Семейство Haliplidae – Плавунчики, или водобродки

4114. *Haliplus flavicollis* Sturm, 1834 – Нефтекамск, пойма р. Буй 2018 (Сажнев и др., 2019)
4115. *Haliplus fluviatilis* Aube, 1836 – Водяной плавунчик
4116. *Haliplus fulvus* (Fabricius, 1801) – Желтый плавунчик
4117. *Haliplus immaculatus* Gerhardt, 1877 – Нефтекамск, пойма р. Буй, 2018 (Сажнев и др., 2019)
4118. *Haliplus ruficollis* (De Geer, 1774)
4119. *Haliplus sibiricus* Motschulsky, 1860 – Нефтекамск, пойма р. Буй, 2018 (Сажнев и др., 2019)
4120. *Haliplus varius* Nicolai, 1822 – Крмс, старица в пойме р. Буй, 2020 (Сажнев и др., 2021)
4121. *Peltodytes caesus* (Duftschmid, 1805) – Нефтекамск, пойма р. Буй, 2018 (Сажнев и др., 2019)

Семейство Noteridae – Нырялки

4122. *Noterus clavicornis* (De Geer, 1774)
4123. *Noterus crassicornis* (O. F. Muller, 1776)

Подотряд Polyphaga – Разноядные жуки

Инфраотряд Staphyliniformia

Надсемейство Hydrophiloidea

Семейство Helophoridae

4124. *Helophorus brevipalpis* Bedel, 1881 – Крмс, старица в пойме р. Буй, 2020 (Сажнев и др., 2021)
4125. *Helophorus aquaticus* (Linnaeus, 1758)
4126. *Helophorus granularis* (Linnaeus, 1761)
4127. *Helophorus obscurus* Mulsant, 1844

Семейство Hydrochidae

4128. *Hydrochus ignicollis* Motschulsky, 1860 – Нефтекамск, пойма р. Буй, 2018 (Сажнев и др., 2019)

Семейство Hydrophilidae

4129. *Anacaena sp.*
4130. *Berosus sp.*
4131. *Cercyon laminatus* Sharp, 1873 – Уфа 2017-2020, Крмс 2015-2016, Иглн 2025
4132. *Cercyon lateralis* (Marsham, 1802) – Бурз 1899 (Козьминых, 2019)
4133. *Cercyon marinus* Thomson, 1853 – Нефтекамск, пойма р. Буй 2018 (Сажнев и др., 2019)
4134. *Cercyon quisquilius* (Linnaeus, 1760) – Крмск 2023
4135. *Cercyon tristis* (Illiger, 1801) – Нефтекамск, пойма р. Буй, 2018 (Сажнев и др., 2019)
4136. *Coelostoma orbiculare* (Fabricius, 1775) – Уфа 2020
4137. *Cryptopleurum sp.* – Иглн 2025
4138. *Cymbiodyta marginella* (Fabricius, 1792) – Нефтекамск, пойма р. Буй, 2018 (Сажнев и др., 2019)
4139. *Enochrus affinis* (Thunberg, 1794) – Нефтекамск, пойма р. Буй, 2018 (Сажнев и др., 2019)
4140. *Enochrus coarctatus* (Gredler, 1863) – Нефтекамск, пойма р. Буй, 2018 (Сажнев и др., 2019)
4141. *Enochrus ochropterus* (Marsham, 1802)
4142. *Enochrus quadripunctatus* (Herbst, 1797)
4143. *Helochares obscurus* (O.F. Müller, 1776) – Нефтекамск, пойма р. Буй, 2018 (Сажнев и др., 2019)
4144. *Hydrobius fuscipes* (Linnaeus, 1758)
4145. *Hydrochara caraboides* (Linnaeus, 1758)
4146. *Hydrochara flavipes* (Steven, 1808)
4147. *Hydrophilus aterrimus* Eschscholtz, 1822
4148. *Hydrophilus piceus* (Linnaeus, 1758) – Черный большой водолюб
4149. *Laccobius gracilis* Motschulsky, 1855
4150. *Laccobius minutus* (Linnaeus, 1758)
4151. *Laccobius striatulus* (Fabricius, 1801)
4152. *Sphaeridium marginatum* Fabricius, 1787 – Крмс 2023, Давл 2023
4153. *Sphaeridium scarabaeoides* (Linnaeus, 1758) – Ермк 2018

Надсемейство Histeroidea

Семейство Histeridae – Жуки-карапузики

Подсемейство Abraeinae

4154. *Chaetabraeus globulus* (Creutzer, 1799) – Бурз (Козьминых, 2018б)

Подсемейство Dendrophilinae

4155. *Dendrophilus punctatus* (Herbst, 1791)
4156. *Paromalus flavicornis* (Herbst, 1791) – Уфа 2024
4157. *Platylomalus complanatus* (Panzer, 1797) – Октябрьский 2024

Подсемейство Histerinae

4158. *Atholus duodecimstriatus* (Schrank, 1781) – Двенадцатибороздчатый карапузик
4159. *Eurosomides minor* (Rossi, 1792)
4160. *Hister bissexstriatus* Fabricius, 1801
4161. *Hister illigeri* Duftschmid, 1805
4162. *Hister funestus* Erichson, 1834 **–** Белб 1907 (Козьминых, 2018б)
4163. *Hister quadrimaculatus* Linnaeus, 1758 – Четырехпятнистый карапузик
4164. *Hister quadrinotatus* Scriba, 1790
4165. *Hister unicolor* Linnaeus, 1758 – Одноцветный карапузик
4166. *Hololepta plana* (Sulzer, 1776) **–** Уфа, Уфмс 2010, Калт 2020, Кгрч 2020, Октябрьский 2023-2024
4167. *Margarinotus bipustulatus* (Schrank, 1781) – юг
4168. *Margarinotus brunneus* (Fabricius, 1775) – ЗШТ, борти (Бакалова, 2011)
4169. *Margarinotus obscurus* (Kugelann, 1792) **–** Белб 1907 (Козьминых, 2018б)
4170. *Margarinotus purpurascens* (Herbst, 1792) – Пурпурный карапузик
4171. *Margarinotus silantjevi* (Shirjajev, 1903) – берег р. Демы (Крыжановский, Рейхардт, 1976)
4172. *Margarinotus striola* (Sahlberg, 1819)
Margarinotus striola succicola (C.G.Thomson, 1862) – Иглн 2025
4173. *Margarinotus ventralis* (Marseul, 1854)
4174. *Pachylister inaequalis* (A.G.Olivier, 1789) – Хайб 2018
4175. *Platysoma angustatum* (Hoffmann, 1803) – Бурз (Козьминых, 2018б)
4176. *Platysoma deplanatum* (Gyllenhal, 1808) – Бурз
4177. *Platysoma elongatum* (Thunberg, 1787) – Бурз
4178. *Platysoma lineare* Erichson, 1834 – Бурз (Козьминых, 2018б)

Подсемейство Saprininae

4179. *Chalcionellus decemstriatus* (Rossi, 1792)
4180. *Haeterius ferrugineus* (A.G. Olivier, 1789) – Уфмс 2024, Крмс 2019-2023
4181. *Saprinus aeneus* (Fabricius, 1775) – Бронзовый трупник – Предуралье
4182. *Saprinus caerulescens* (Hoffmann, 1803)
4183. *Saprinus immundus* (Gyllenhal, 1827) – Мелз 1990
4184. *Saprinus maculatus* (Rossi, 1792)
4185. *Saprinus semistriatus* (Scriba, 1790) – Полубороздчатый трупник – Бурз 1989
4186. *Saprinus tenuistrius sparsutus* Solsky, 1876 – Бирск 2025
4187. *Saprinus turcomanicus* Ménétriés, 1847
4188. *Saprinus virescens* (Paykull, 1798) – Ишмб 1926

Семейство Sphaeritidae

4189. *Sphaerites glabratus* (Fabricius, 1792)

Надсемейство Staphylinoidea

Семейство Hydraenidae

? Limnebius parvulus (Herbst, 1797) – Крмс, старица в пойме р. Буй, 2020 (Сажнев и др., 2021)

Семейство Leiodidae

4190. *Agathidium pisanum* Brisout de Barneville, 1872
4191. *Anisotoma sp*. – Учлн
4192. *Catops sp*. – Слвт 2020
4193. *Choleva glauca* Britten, 1918 – пещера Шульган-Таш (Капралов, 2010)
4194. *Leiodes sp.* – ЗШТ, Уфа 2024
4195. *Ptomaphagus sp.* – Уфа 2024
4196. *Sciodrepoides watsoni* (Spence, 1813) – пещера Шульган-Таш (Капралов, 2010)

Семейство Silphidae – Мертвоеды

Подсемейство Nicrophorinae

4197. *Nicrophorus antennatus* (Reitter, 1884)
4198. *Nicrophorus germanicus* (Linnaeus, 1758)
4199. *Nicrophorus humator* (Gleditsch, 1767) – Черный могильщик
4200. *Nicrophorus interruptus* Stephens, 1830 – Могильщик-землекоп
4201. *Nicrophorus investigator* Zetterstedt, 1824– Могильщик-исследователь
4202. *Nicrophorus sepultor* Charpentier, 1825
4203. *Nicrophorus vespillo* (Linnaeus, 1758) – Рыжебулавый могильщик
4204. *Nicrophorus vespilloides* Herbst, 1783 – Чернобулавый могильщик
4205. *Nicrophorus vestigator* Herschel, 1807 – Могильщик-изыскатель

Подсемейство Silphinae

4206. *Dendroxena quadrimaculata* (Scopoli, 1771) – Четырехточечный мертвоед – обычен
4207. *Necrodes littoralis* (Linnaeus, 1758) – Черный трупоед – обычен
4208. *Oiceoptoma thoracicum* (Linnaeus, 1758) – Красногрудый мертвоед
4209. *Phosphuga atrata* (Linnaeus, 1758)
4210. *Silpha carinata* Herbst, 1783 – Ребристый мертвоед – обычен
4211. *Silpha obscura* (Linnaeus, 1758) – Темный мертвоед – обычен
4212. *Silpha tristis* Illiger, 1798 – редок
4213. *Thanatophilus dispar* (Herbst, 1793)
4214. *Thanatophilus rugosus* (Linnaeus, 1758) – Черный падальщик
4215. *Thanatophilus sinuatus* (Fabricius, 1775)
4216. *Thanatophilus terminatus* (Hummel, 1825)
4217. *Thanatophilus uralensis* Kozminykh, 1994 – ЗШТ

Семейство Staphylinidae – Стафилины, или Коротконадкрылые жуки

Подсемейство Aleocharinae

4218. *Aleochara bilineata* Gyllenhal, 1810
4219. *Aleochara binotata Kraatz, 1856*
4220. *Aleochara curtula* (Goeze, 1777)
4221. *Aleochara moerens* Gyllenhal, 1827
4222. *Anomognathus cuspidatus* (Erichson, 1839) – пещера Шульган-Таш (Капралов, 2010)
4223. *Atheta bashkirica* Paśnik, 1999 – НП «Башкирия» 1997 (Paśnik, 1999)
4224. *Atheta basicornis* (Mulsant & Rey, 1851)
4225. *Bolitochara obliqua* Erichson, 1837
4226. *Drusilla canaliculata* (Fabricius, 1787)
4227. *Falagrioma thoracica* (Stephens, 1832) – Гафр, в пещере
4228. *Geodromicus sp.*
4229. *Geostiba circellaris* (Gravenhorst, 1806)
4230. *Gyrophaena bihamata* C.G.Thomson, 1867
4231. *Gyrophaena boleti* (Linnaeus, 1758) – Уфа 2020
4232. *Gyrophaena fasciata* (Marsham, 1802)
4233. *Holobus sp.* – Уфа 2020
4234. *Mocyta orphana* (Erichson, 1837)
4235. *Olophrum sp.*
4236. *Oxypoda sp.*
4237. *Pella limbata* (Paykull, 1789) – Уфа 2020

Подсемейство Mycetoporinae

4238. *Lordithon pulchellus* (Mannerheim, 1830) – Кркм 2020
4239. *Lordithon trinotatus* (Erichson, 1839) – Уфа 2024

Подсемейство Omaliinae

4240. *Acidota crenata* (Fabricius, 1792) – Уфа 2021-2024
4241. *Anthobium atrocephalum* (Gyllenhal, 1827) – Уфа 2024
4242. *Anthophagus alpinus* (Paykull, 1790)
4243. *Arpedium quadrum* (Gravenhorst, 1806) – Уфа 2019
4244. *Eusphalerum luteum luteum* (Marsham, 1802) – Кмск 2023
4245. *Phloeonomus minimus* (Erichson, 1839) – пещера Шульган-Таш (Капралов, 2010)

Подсемейство Oxyporinae

4246. *Oxyporus mannerheimii* Gyllenhal, 1827
4247. *Oxyporus maxillosus* Fabricius, 1792 – Уфа 2024
4248. *Oxyporus rufus* (Linnaeus, 1758) – Рыжий пятнач (в грибах)

Подсемейство Oxytelinae

4249. *Anotylus insecatus* (Gravenhorst, 1806) – Крмс 2023
4250. *Anotylus rugosus* (Fabricius, 1775)
4251. *Bledius dissimilis* Erichson, 1840 – Уфа 2023
4252. *Carpelimus sp.* – Уфа
4253. *Coprophilus sp.*
4254. *Deleaster dichrous* (Gravenhorst, 1802) – Уфа 2020-2024

4255. *Manda mandibularis* (Gyllenhal, 1827) – Уфа 2016-2020, Иглн 2025
4256. *Oxytelus piceus* (Linnaeus, 1767) – Туйм 2023
4257. *Platystethus capito* Heer, 1839

Подсемейство Paederinae

4258. *Achenium sp.* – Уфа 2019
4259. *Lathrobium brunnipes* (Fabricius, 1792)
4260. *Lathrobium geminum* Kraatz, 1857
4261. *Lithocharis sp.* – Уфа 2024
4262. *Paederus littoralis* Gravenhorst, 1802
4263. *Paederus melanurus* Aragona, 1830 – Желтый паниск
4264. *Paederus riparius* (Linnaeus, 1758) – Береговой стафилин
4265. *Rugilus rufipes* Germar, 1836
4266. *Rugilus similis* (Erichson, 1839) – Иглн 2025
4267. *Sunius melanocephalus* (Fabricius, 1792) – Иглн 2025
4268. *Tetartopeus sp.* – Уфа 2021

Подсемейство Proteinae

4269. *Megarthrus hemipterus* (Illiger, 1794)

Подсемейство Pselaphinae

4270. *Brachygluta sp.* – Уфа
4271. *Euplectus punctatus* Mulsant & Rey, 1861 – пещера Шульган-Таш (Капралов, 2010)

Подсемейство Scaphidiinae

4272. *Scaphidium quadrimaculatum* A.G.Olivier, 1790 – Чишм 2024, Уфа 2021-2024

Подсемейство Staphylininae

4273. *Acylophorus sp.*
4274. *Atrecus sp.*
4275. *Bisnius fimetarius* (Gravenhorst, 1802)
4276. *Bisnius puella* (Nordmann, 1837)
4277. *Creophilus maxillosus* (Linnaeus, 1758) – Серый стафилин
4278. *Emus hirtus* (Linnaeus, 1758)
4279. *Gabrius osseticus* (Kolenati, 1846)
4280. *Gyrohypnus fracticornis* (O. Muller, 1776)
4281. *Heterothops dissimilis* (Gravenhorst, 1802)
4282. *Leptacinus sp.*
4283. *Ocypus fuscatus* (Gravenhorst, 1802)
4284. *Ocypus nitens* (Schrank, 1781) – Иглн, Уфмс 2016, Ермк
4285. *Ocypus ophthalmicus* (Scopoli, 1763) – Уфа 2021 (Хабибуллин, 2022a)
4286. *Ontholestes murinus* (Linnaeus, 1758)
4287. *Ontholestes tessellatus* (Geoffroy, 1785) – Аскн 2024, Бурз 2025
4288. *Othius punctulatus* (Goeze, 1777)
4289. *Philonthus addendus* Sharp, 1867
4290. *Philonthus albipes* (Gravenhorst, 1802)

4291. *Philonthus binotatus* (Gravenhorst, 1806) – Крмс 2016
4292. *Philonthus carbonarius* (Gravenhorst, 1802)
4293. *Philonthus chalceus* Stephens, 1832
4294. *Philonthus cognatus* Stephens, 1832
4295. *Philonthus cruentatus* (Gmelin, 1790)
4296. *Philonthus cyanipennis* (Fabricius, 1792)
4297. *Philonthus decorus* (Gravenhorst, 1802)
4298. *Philonthus ebeninus* (Gravenhorst, 1802)
4299. *Philonthus intermedius* (Lacordaire, 1835)
4300. *Philonthus lepidus* (Gravenhorst, 1802)
4301. *Philonthus mannerheimi* Fauvel, 1869 – Уфа 2021
4302. *Philonthus marginatus* (O. Muller, 1764)
4303. *Philonthus nitidicollis* (Lacordaire, 1835)
4304. *Philonthus nitidus* (Fabricius, 1787)
4305. *Philonthus parvicornis* (Gravenhorst, 1802)
4306. *Philonthus punctus* (Gravenhorst, 1802) – Абзл 2016
4307. *Philonthus quisquiliarius* (Gyllenhal, 1810)
4308. *Philonthus rectangulus* – Уфа 2022
4309. *Philonthus rotundicollis* (Ménétriés, 1832) – Уфа 2020
4310. *Philonthus sanguinolentus* (Gravenhorst, 1802)
4311. *Philonthus spinipes* Sharp, 1874 – Уфа 2018
4312. *Philonthus splendens* (Fabricius, 1792)
4313. *Philonthus varians* (Paykull, 1789)
4314. *Platydracus fulvipes* Scopoli, 1763 – Уфа 2020, Ишимбай 2025
4315. *Platydracus latebricola* (Gravenhorst, 1806) – Уфа 2016
4316. *Platydracus stercorarius* (Olivier, 1795)
4317. *Platyprosopus sp.*
4318. *Quedius dilatatus* (Fabricius, 1787) – Ишмб 2014, Октябрьский 2021, Иглн 2021
4319. *Quedius fuliginosus* (Gravenhorst, 1802)
4320. *Quedius puncticollis* (Thomson, 1867) – Уфа 2021
4321. *Rabigus sp.* – Гафр 2020
4322. *Staphylinus caesareus* Cederhjelm, 1798 – Великолепный стафилин
4323. *Staphylinus dimidiaticornis* Gemminger, 1851 – Уфа 2019-2023
4324. *Staphylinus erythropterus* Linnaeus, 1758
4325. *Xantholinus tricolor* (Fabricius, 1787)

Подсемейство Steninae

4326. *Stenus bimaculatus* Gyllenhal, 1810
4327. *Stenus cicindeloides* (Schaller, 1783)
4328. *Stenus clavicornis* (Scopoli, 1763) – Стбш 2024
4329. *Stenus comma comma* LeConte, 1863

Подсемейство Tachyporinae

4330. *Bobitobus lunulatus* (Linnaeus, 1760) – Мохнатый стафилин

4331. *Cilea silphoides* (Linnaeus, 1767) – Кмск 2023
4332. *Sepedophilus sp.* – ЗШТ борти, Уфа 2024
4333. *Tachinus rufipes* (Linnaeus, 1760)
4334. *Tachinus subterraneus* (Linnaeus, 1758) – Уфа 2019, Крмс 2023
4335. *Tachyporus abdominalis* (Fabricius, 1782)

Инфраотряд Scarabaeiformia

Надсемейство Scarabaeoidea

Семейство Aegialiidae

4336. *Psammoporus abdita* Nikritin, 1975

Семейство Geotrupidae – Навозники (жуки-землерои)

4337. *Anoplotrupes stercorosus* (Hartmann, 1791) – Лесной навозник
4338. *Geotrupes baicalicus* Reitter, 1892
4339. *Geotrupes stercorarius* (Linnaeus, 1758) – Обыкновенный навозник
4340. *Odonteus armiger* (Scopoli, 1772)
4341. *Trypocopris vernalis* (Linnaeus, 1758) – Весенний навозник

Семейство Lucanidae – Жуки-олени

4342. *Ceruchus chrysomelinus* (Hochenwart, 1785) – Березовый рогач
4343. *Dorcus parallelipipedus* (Linnaeus, 1758) – Обыкновенный оленек – запад (Бжбл, 2013; Ермк 2014-2022)
4344. *Lucanus cervus* (Linnaeus, 1758*)* – Жук-олень – в дубравах Предуралья
4345. *Platycerus caprea* (De Geer, 1774) – Ивовый рогачик
4346. *Platycerus caraboides* (Linnaeus, 1758) – Жужелицевидный рогачик
4347. *Sinodendron cylindricum* (Linnaeus, 1758) – Однорогий рогач – обычен

Семейство Ochodaeidae – Жуки-пескорои

4348. *Codocera ferruginea* (Eschscholtz, 1818) – Октябрьский 2019, Сибай 2022, Шарн 2023, Туйм 2024, Кушн 2024, Стбш 2025

Семейство Scarabaeidae – Пластинчатоусые

Подсемейство Aphodiinae

4349. *Acanthobodilus immundus* (Creutzer, 1799) – Белб 1898, Чишм 1908 (Ахметова, 2019)
4350. *Acrossus bimaculatus* (Laxmann, 1770) (Козьминых, 2017б)
4351. *Acrossus depressus* (Kugelann, 1792) – Туйм 2020
4352. *Acrossus luridus* (Fabricius, 1775) – Желтоватый афодий
4353. *Acrossus rufipes* (Linnaeus, 1758) – обычен
4354. *Agoliinus lapponum* (Gyllenhal, 1808) – ЮУГПЗ (Дюжаева, Трофимова, 2004)
4355. *Agrilinus ater* (De Geer, 1774)
4356. *Aphodius fimetarius* (Linnaeus, 1758) – Краснокрылый (обыкновенный) афодий
4357. *Aphodius pedellus* (Degeer, 1774) – Крмск 2023, Шарн 2024
4358. *Bodilopsis rufus* (Moll, 1782) – Бурз 1899 (Ахметова, 2019), Кмск 2016, Иглн 2025

4359. *Bodilopsis sordidus* (Fabricius, 1775) – Белб 1907 (Ахметова, 2019); Учлн 1896, Стбш 2025
4360. *Bodilus caspius* (Ménétriés, 1832) – Бирск 1918 (Ахметова, 2019).
4361. *Bodilus gregarius* (Harold, 1871) – Бирск 1918 (Ахметова, 2019).
4362. *Bodilus lugens* (Creutzer, 1799) – Блгщ 2020 (Хабибуллин, 2021в).
4363. *Bodilus punctipennis* (Erichson, 1848) – Белб 1907 (Ахметова, 2019).
4364. *Calamosternus granarius* (Linnaeus, 1767)
4365. *Chilothorax distinctus* (O. F. Müller, 1776)
4366. *Chilothorax melanostictus* (Schmidt, 1840)
4367. *Chilothorax planus* (Koshantschikov, 1894)
4368. *Colobopterus erraticus* (Linnaeus, 1758)
4369. *Esymus merdarius* (Fabricius, 1775) (Ахметова, Фролов, 2014).
4370. *Esymus pusillus* (Herbst, 1789)
4371. *Eudolus quadriguttatus* (Herbst, 1783) – Октябрьский 2019, Туйм 2023
? Euorodalus paracoenosus (Balthasar & Hrubant, 1960) – Крмс 2023
4372. *Euheptaulacus sus* (Herbst, 1783)
4373. *Eupleurus subterraneus* (Linnaeus, 1758)
4374. *Liothorax plagiatus* (Linnaeus, 1767)
4375. *Melinopterus prodromus* (Brahm, 1790)
4376. *Neagolius montanus* (Erichson, 1848) – БГПЗ 1959 (Зинченко, 2011)
4377. *Nialus varians* (Duftschmid, 1805) – Иглн 2025
4378. *Otophorus haemorrhoidalis* (Linnaeus, 1758)
4379. *Phaeaphodius rectus* (Motschulsky, 1866)
4380. *Rhodaphodius foetens* (Fabricius, 1787)
4381. *Rhyssemus germanus* (Linnaeus, 1767) – Гафр 2020
4382. *Subrinus sturmi* (Harold, 1870) – Туйм 2023
4383. *Teuchestes fossor* (Linnaeus, 1758)
4384. *Volinus sticticus* (Panzer, 1798) (Ахметова, Фролов, 2014).

Подсемейство Cetoniinae

4385. *Cetonia aurata* (Linnaeus, 1761) – Золотистая бронзовка – обычна
4386. *Oxythyrea funesta* (Poda, 1761) – Вонючая бронзовка – обычна
4387. *Protaetia cuprea* (Fabricius, 1775) – Медная бронзовка
Protaetia cuprea metallica (Herbst, 1782) – Металлическая бронзовка
4388. *Protaetia fieberi* (Kraatz, 1880) – Ишмб, Ермк, Блвщ, Давл, Блрц, Зилр, Крмс, Кушн 2009-2025, Уфа Уфмс, Туйм, Иглн, Абзл 2016-2020
4389. *Protaetia marmorata* (Fabricius, 1792) – Мраморная бронзовка
4390. *Protaetia speciosissima* (Scopoli, 1786) – Иглн 2019, Блкт 2020, Шарн 2020-2024, Туйм 2021, Блвщ 2022, Уфмс 2024, Уфа 2019-2024 Ермк
4391. *Tropinota hirta* (Poda, 1761) – Мохнатая оленка
4392. *Valgus hemipterus* (Linnaeus, 1758) – Уфа 2023-2025, Ишмб 2024

Подсемейство Dynastinae

4393. *Oryctes nasicornis* (Linnaeus, 1758) – Жук-носорог – обычен

Подсемейство Hopliinae

4394. *Hoplia parvula* Krynicki, 1832 – Иглн 2023, Уфа 2020, Уфмс, Слвт 2020, Крмс, Брск 2021, Крск, Дюрт 2020, Нефтекамск 2021

Подсемейство Melolonthinae

4395. *Amphimallon altaicum* (Mannerheim, 1825) – Кгрч 2007, Хайб 2017, Иглн 2022, Уфа 2017, Уфмс 2020
4396. *Amphimallon solstitiale* (Linnaeus, 1758) – Июньский хрущ – обычен
? Amphimallon volgense (Fisscher von Waldheim, 1823) – Волжский нехрущ – Дюртюли 1993
4397. *Anoxia pilosa* (Fabricius, 1792) – Байм
4398. *Melolontha hippocastani* Fabricius, 1801 – Восточный майский хрущ – обычен
4399. *Omaloplia spireae* (Pallas, 1773) – Чишм 2024-2025 (Хабибуллин, 2025а)
4400. *Polyphylla fullo* (Linnaeus, 1758) – Июльский, или мраморный хрущ

Подсемейство Rutelinae

4401. *Anisoplia agricola* (Poda, 1761) – Кузька-крестоносец – на злаках
4402. *Anisoplia austriaca* (Herbst, 1783) – Хлебный жук, кузька – обычен
4403. *Anisoplia brenskei* Reitter, 1889 – Белебей
4404. *Anisoplia campicola* Ménétriés, 1832 – Уфа
4405. *Anisoplia deserticola* Fischer von Waldheim, 1824
4406. *Anisoplia lata* Erichson, 1848
4407. *Anomala dubia* (Scopoli, 1763)
4408. *Chaetopteroplia segetum* (Herbst, 1783) – Полевой хрущ, красун
4409. *Mimela holosericea* (Fabricius, 1787) – восток, леса
4410. *Phyllopertha horticola* (Linnaeus, 1758) – Садовый хрущик

Подсемейство Scarabaeinae

4411. *Caccobius schreberi* (Linnaeus, 1767) – Калоед Шребера
4412. *Copris lunaris* (Linnaeus, 1758) – Лунный копр
4413. *Euoniticellus fulvus* (Goeze, 1777) – Рыжеватый навозничек
4414. *Gymnopleurus geoffroyi* (Fuessly, 1775)
4415. *Gymnopleurus mopsus* (Pallas, 1781) – Зиан 2025
4416. *Onthophagus fracticornis* (Preyssler, 1790)
4417. *Onthophagus gibbulus* (Pallas, 1781) – Австрийский калоед
4418. *Onthophagus nuchicornis* (Linnaeus, 1758) – Короткорогий калоед
4419. *Onthophagus ovatus* (Linnaeus, 1767) – Овальный калоед
4420. *Onthophagus semicornis* (Panzer, 1798) – Полурогий калоед
4421. *Onthophagus taurus* (Schreber, 1759) – Калоед-бык, или калоед двурогий
4422. *Onthophagus vacca* (Linnaeus, 1767) – Калоед-корова
4423. *Onthophagus vitulus* (Fabricius, 1776) – Кгрч 2020

Подсемейство Sericinae

4424. *Serica brunnea* (Linnaeus, 1758) – Рыжий хрущик

Подсемейство Trichiinae

4425. *Gnorimus variabilis* (Linnaeus, 1758) – Уфа 2020, Бирс 2020, Гафр 2022

4426. *Osmoderma barnabita* Motschulsky, 1845 – Пахучий отшельник – Предуралье
4427. *Trichius fasciatus* (Linnaeus, 1758) – Перевязанный восковик – обычен

Семейство Trogidae – Троксы

4428. *Trox cadaverinus* Illiger, 1802 – Кушн 2020, Крмс 2022
4429. *Trox sabulosus* (Linnaeus, 1758) – Крмс 2008-2022
4430. *Trox scaber* (Linnaeus, 1767) – Уфа 2017-2024

Инфраотряд Elateriformia

Надсемейство Scirtoidea

Семейство Eucinetidae – Кувыркалки

4431. *Eucinetus haemorrhoidalis* (Germar, 1818) – Иглн 2025

Семейство Scirtidae – Трясинники

4432. *Contacyphon punctipennis* (Sharp, 1872)
4433. *Cyphon padi* (Linnaeus, 1758) – Уфа 2024

Надсемейство Dascilloidea

Семейство Dascillidae – Лопастники

4434. *Dascillus cervinus* (Linnaeus, 1758)

Надсемейство Buprestoidea

Семейство Buprestidae – Златки

Подсемейство Agrilinae

4435. *Agrilus angustulus* (Illiger, 1803) – Дубовая узкотелая златка
4436. *Agrilus ater* (Linnaeus, 1767) – Осиновая шестипятнистая узкотелая златка
4437. *Agrilus auricollis* Kiesenwetter, 1857 – Липовая узкотелая златка
4438. *Agrilus betuleti* (Ratzeburg, 1837) – Березовая узкотелая златка
4439. *Agrilus hyperici* (Creutzer, 1799) – Чишм 2024
4440. *Agrilus integerrimus* (Ratzeburg, 1837) – Чишм 2024 (Хабибуллин, 2025a)
4441. *Agrilus sulcicollis* Lacordaire, 1835
4442. *Agrilus suvorovi* Obenberger, 1935 – Кушн 2013
4443. *Agrilus viridis* (Linnaeus, 1758) – Зеленая златка
4444. *Coraebus elatus* (Fabricius, 1797) – Нурм 2023-2024
4445. *Cylindromorphus filum* (Gyllenhal, 1817) – Кушн 2022, Уфа 2024
4446. *Meliboeus amethystinus* (Olivier, 1790)
4447. *Trachys minutus* (Linnaeus, 1758) – Златка-крошка – Предуралье, обычна
4448. *Trachys sp.*

Подсемейство Buprestinae

4449. *Anthaxia funerula* (Illiger, 1803)
4450. *Anthaxia manca* (Linnaeus, 1767) – Вязовая златка
4451. *Anthaxia morio* (Fabricius, 1793)
4452. *Anthaxia nigrojubata* Roubal, 1913 – Черная 4-пятнистая златка
4453. *Anthaxia quadripunctata* (Linnaeus, 1758) – Четырехточечная черная антаксия – Чишм 2024
4454. *Buprestis haemorrhoidalis* Herbst, 1780 – Желтопятнистая златка
4455. *Buprestis novemmaculata* Linnaeus, 1767 – Пятнистая хвойная златка

4456. *Buprestis octoguttata* Linnaeus, 1758 – Восьмиточечная златка
4457. *Buprestis rustica* Linnaeus, 1758 – Обыкновенная хвойная златка
4458. *Buprestis strigosa* Gebler, 1830 – Тощая хвойная златка
4459. *Chalcophora mariana* (Linnaeus, 1758) – Большая сосновая златка
4460. *Eurythyrea aurata* (Pallas, 1776) – Ермк, Уфа, Уфмс, Блвщ, Чишм, Иглн, Ишмб, Куюр, Кгрч, Зилр
4461. *Lamprodila rutilans* (Fabricius, 1777) – Мелз 2022
4462. *Melanophila acuminata* (De Geer, 1774) – Златка пожарищ
4463. *Phaenops cyanea* (Fabricius, 1775) – Синяя сосновая златка
4464. *Phaenops guttulata* Gebler, 1830 – Лиственничная златка
4465. *Trachypteris picta* (Pallas, 1773)

Подсемейство Chrysobothrinae

4466. *Chrysobothris affinis* (Fabricius, 1794)
4467. *Chrysobothris chrysostigma* (Linnaeus, 1758)

Подсемейство Chrysochroinae

4468. *Capnodis miliaris* (Klug, 1829) – Куюр 1975
4469. *Capnodis tenebricosa* (Olivier, 1790) – Хайб 2017
4470. *Dicerca aenea* (Linnaeus, 1767) – Предуралье и юг
4471. *Dicerca alni* (Fischer von Waldheim, 1824) – Ольховая златка
4472. *Dicerca furcata* (Thunberg, 1787) – Березовая златка
4473. *Dicerca moesta* (Fabricius, 1793) – БГПЗ 2025
4474. *Poecilonota variolosa* (Paykull, 1799) – Хайб 2015

Надсемейство Byrrhoidea

Семейство Byrrhidae – Пилюльщики

4475. *Byrrhus fasciatus* (Forster, 1771) – горы Б. и М. Иремель (Михайлов, Ермаков, 2016)
4476. *Byrrhus pilula* (Linnaeus, 1758) – Давл 2016, Уфа, Ишмб, Иглн, Кушн

Семейство Elmidae – Прицепыши

4477. *Elmis aenia* (Muller, 1806)

Семейство Heteroceridae – Пилоусы

4478. *Heterocerus fenestratus* (Thunberg, 1784) – Зилр 2014, Крмс 2016, Иглн 2025
4479. *Heterocerus fossor* Kiesenwetter, 1843 – Уфа 2020
4480. *Heterocerus fusculus* Kiesenwetter, 1843 – Зилр 2014 (Сажнев, Козьминых, 2019), Уфа
4481. *Heterocerus marginatus* (Fabricius, 1787) – Уфа 2009 (Сажнев, Козьминых, 2019)
4482. *Heterocerus obsoletus* Curtis, 1828 – Зилр 2014 (Сажнев, Козьминых, 2019), Уфа
4483. *Heterocerus parallelus* Gebler, 1830 – Блрц

Надсемейство Elateroidea

Семейство Cerophytidae

4484. *Cerophytum elateroides* (Latreille, 1804) – Уфа 2024

Семейство Elateridae – Щелкуны

4485. *Actenicerus sjaelandicus* (O. F. Muller, 1764)
4486. *Adrastus pallens* (Fabricius, 1792) – Уфа 2023
4487. *Agriotes gurgistanus* (Faldermann, 1835) – Степной щелкун
4488. *Agriotes lineatus* (Linnaeus, 1767) – Полосатый щелкун
4489. *Agriotes obscurus* (Linnaeus, 1758) – Темный щелкун
4490. *Agriotes sputator* (Linnaeus, 1758) – Посевной щелкун
4491. *Agrypnus murinus* (Linnaeus, 1758) – Серый щелкун
4492. *Ampedus balteatus* (Linnaeus, 1758)
4493. *Ampedus cinnabarinus* (Eschscholtz, 1829)
4494. *Ampedus elongatulus* (Fabricius, 1787) – Ермк (Хабибуллин, 2018б)
4495. *Ampedus nigroflavus* (Goeze, 1777)
4496. *Ampedus pomonae* (Stephens, 1830) – Ермк
4497. *Ampedus pomorum* (Herbst, 1784) – локален
4498. *Ampedus sanguineus* (Linnaeus, 1758) – Янул 2020, Уфа, Бурз
4499. *Ampedus sanguinolentus* (Schrank, 1776) – Кровавый щелкун
4500. *Anostirus castaneus* (Linnaeus, 1758) – Стмк 2020, Кгрч 2022, Уфа 2025
4501. *Athous haemorrhoidalis* (Fabricius, 1801) – Картофельный щелкун
4502. *Athous subfuscus* (O. F. Muller, 1764)
4503. *Athous vittatus* (Fabricius, 1792)
4504. *Cardiophorus discicollis* (Herbst, 1806) – Бурз 2022
4505. *Cardiophorus ebeninus* (Germar, 1824)
? Cardiophorus vestigialis Erichson, 1840 – Ишмб 2025
4506. *Cidnopus aeruginosus* (Olivier, 1790)
4507. *Cidnopus pilosus* (Leske, 1785) – Опушенный щелкун
4508. *Ctenicera pectinicornis* (Linnaeus, 1758) – Гребнеусый щелкун
4509. *Dalopius marginatus* (Linnaeus, 1758)
4510. *Danosoma fasciatum* (Linnaeus, 1758) – Бурз 2016, Иглн 2019-2022
4511. *Denticollis linearis* (Linnaeus, 1758)
4512. *Drapetes mordelloides* (Host, 1789) – Ишмб 2024
4513. *Elater ferrugineus* Linnaeus, 1758 – Кирпично-красный щелкун
4514. *Hemicrepidius hirtus* (Herbst, 1784)
4515. *Hemicrepidius niger* (Linnaeus, 1758) – Черный щелкун
4516. *Hypnoidus rivularius* (Gyllenhal, 1827) – Блрц: г. Мал. Иремель (Михайлов, Ермаков, 2016)
4517. *Lacon lepidopterus* (Panzer, 1800) – Нефтекамск 2020, Кркм 2022
4518. *Limonius minutus* (Linnaeus, 1758)
4519. *Liotrichus affinis* (Paykull, 1800)
4520. *Melanotus brunnipes* (Germar, 1824) – Буроногий щелкун
4521. *Melanotus castanipes* (Paykull, 1800) – Крмс 2016, Кушн 2023, Чишм 2024
4522. *Melanotus crassicollis* (Erichson, 1841)
4523. *Melanotus villosus* (Geoffroy, 1785) – Давл 2017, Абзл 2020, Крмс
4524. *Nothodes parvulus* (Panzer, 1799)

4525. *Oedostethus quadripustulatus* (Fabricius, 1792)
4526. *Prosternon tessellatum* (Linnaeus, 1758) – Мозаичный щелкун. Локален
4527. *Selatosomus aeneus* (Linnaeus, 1758) – Блестящий щелкун – обычен
4528. *Selatosomus cruciatus* (Linnaeus, 1758) – Щелкун-крестоносец – Давл 2015, Ишмб 2020, Нефтекамск 2021, Мелз 2023, Крск
4529. *Selatosomus latus* (Fabricius, 1801) – Широкий щелкун
4530. *Selatosomus spretus* (Mannerheim, 1852) – Сибирский щелкун
4531. *Synaptus filiformis* (Fabricius, 1781) – Гафр 2020, Ишмб 2023-2024, Уфа 2024

Семейство Eucnemidae – Древоеды

4532. *Dirrhagofarsus attenuatus* (Mäklin, 1845) – РБ (Ковалев, 2014)
4533. *Otho sphondyloides* (Germar, 1818) – Уфа 2024
4534. *Rhacopus sahlbergi* (Mannerheim, 1823) – Ермк 2018

Семейство Throscidae – Лжещелкуны

4535. *Trixagus atticus* Reitter, 1921 – Уфа 2023
4536. *Trixagus dermestoides* (Linnaeus 1767) – Нурм

Надсемейство Cantharoidea

Семейство Cantharidae – Мягкотелки

4537. *Ancistronycha tigurina* Dietrich, 1857 – Синяя мягкотелка
4538. *Autosilis olschwangi* (Kazantsev, 1994) – гора Б.Иремель (Михайлов, Ермаков, 2016)
4539. *Cantharis annularis* Menetriez, 1836 – Глазчатая мягкотелка
4540. *Cantharis figurata* Mannerheim, 1843 – Бирс 2019, Давл 2020, Ермк, Гафр 2020
4541. *Cantharis fusca* Linnaeus, 1758 – Бурая мягкотелка – локально
4542. *Cantharis lateralis* Linnaeus, 1758 – Крмс 2019-2025, Уфа 2021-2024, Чишм 2024-2025
4543. *Cantharis livida* Linnaeus, 1758 – повсеместно, обычный вид
4544. *Cantharis nigricans* (O.F. Müller, 1776) – Нурм, Крск
4545. *Cantharis obscura* Linnaeus, 1758 – Темная мягкотелка
4546. *Cantharis pellucida* Fabricius, 1792 – Яркая мягкотелка
4547. *Cantharis rufa* Linnaeus, 1758 – Уфа, Уфмс, Клтс, Ермк, Гафр, Стмк, Абзл, Туйм
4548. *Cantharis rustica* Fallen, 1807 – Деревенская мягкотелка – обычна
4549. *Malthinus flaveolus* (Herbst, 1786) – Ишмб 2019, Ермк 2019, Чекм 2019, Уфа 2021, Блрц 2022
4550. *Malthodes minimus* (Linnaeus, 1758) – Нурм
4551. *Malthodes uralicus* Kazantsev, 1995 – Иремель (Kazantsev, Makarov, 2024)
4552. *Podabrus alpinus* (Paykull, 1798)
4553. *Rhagonycha atrovaria* Wittmer, 1971 – М.Иремель (Kazantsev, Makarov, 2024)
4554. *Rhagonycha fulva* (Scopoli, 1763) – Зонтичная мягкотелка – обычна
4555. *Rhagonycha lignosa* (Muller, 1764) – Кустарниковая мягкотелка

Семейство Lampyridae – Светляки

4556. *Lampyris noctiluca* (Linnaeus, 1767) – Обыкновенный светляк

Семейство Lycidae – Краснокрылы

4557. *Dictyoptera aurora* (Herbst, 1874) – Дюрт 2017 (Хабибуллин, 2021г).
4558. *Lopheros rubens* (Gyllenhal, 1817) – Дюрт 2017, Уфа 2025, Мелз 2025
4559. *Lygistopterus sanguineus* (Linnaeus, 1758) – Давл 2020, повсеместно редок
4560. *Platycis minutus* (Fabricius, 1787) – Туйм 2025
4561. *Pyropterus nigroruber* (De Geer, 1774)

Инфраотряд Cucujiformia

Надсемейство Bostrichoidea

Семейство Anobiidae – Точильщики

4562. *Anobium punctatum* (De Geer, 1774) – Обыкновенный точильщик
4563. *Dorcatoma lomnickii* Reitter, 1903
4564. *Dorcatoma robusta* Strand, 1938 – Уфа 2021
4565. *Ernobius abietinus* (Gyllenhal, 1808) – Сосновый шишкоед-точильщик
4566. *Ernobius abietis* (Fabricius, 1792) – Еловый шишкоед-точильщик
4567. *Ernobius explanatus* (Mannerheim, 1843)
4568. *Ernobius nigrinus* (Sturm, 1837) – Сосновый побеговый точильщик
4569. *Hadrobregmus confusus* (Kraatz, 1881)
4570. *Hadrobregmus pertinax* (Linnaeus, 1758) – Домовый точильщик
4571. *Lasioderma redtenbacheri* (Bach, 1852) – Уфа (Хабибуллин, 2021в)
4572. *Lasioderma serricorne* Fabricius, 1792 – Уфа 2023
4573. *Lasioderma thoracicum* (Morawitz, 1861) – Ишмб 2024
4574. *Priobium carpini* (Herbst, 1793) – Уфа 2021-2023
4575. *Stegobium paniceum* (Linnaeus, 1758) – Хлебный точильщик
4576. *Xyletinus ater* (Creutzer, 1796) – 1908 (Логвиновский, 1985)

Семейство Bostrychidae – Лжекороеды, или Капюшонники

4577. *Bostrichus capucinus* (Linnaeus, 1758) – Уфа, Иглн, Бклн, Бурз
4578. *Lichenophanes varius* (Illiger, 1801) – Уфа 2019-2024
4579. *Lyctus linearis* (Goeze, 1777) – Бороздчатый древогрыз
4580. *Stephanopachys linearis* (Kugelann, 1792) – Сосновый лжекороед
4581. *Stephanopachys substriatus* (Paykull, 1800)

Семейство Dermestidae – Кожееды

4582. *Anthrenus coloratus* Reitter, 1881 – Уфа 2020-2024
4583. *Anthrenus flavidus* Solskij, 1876 – Уфа 2020-2025
4584. *Anthrenus fuscus* Olivier, 1789 – Уфа
4585. *Anthrenus museorum* (Linnaeus, 1761) – Музейный кожеед
4586. *Anthrenus picturatus* Solsky, 1876 – Уфа 2017-2024, Октябрьский 2023, Ишмб 2022-2023, Салават 2020
4587. *Anthrenus scrophulariae* (Linnaeus, 1758) – Норничниковый кожеед – обычен
4588. *Anthrenus verbasci* (Linnaeus, 1767) – Уфа
4589. *Attagenus pellio* (Linnaeus, 1758) – Шубный кожеед
4590. *Attagenus schaefferi* (Herbst, 1792) – Уфа
4591. *Attagenus smirnovi* Zhantiev, 1973 – Уфа, в помещениях, обычен

4592. *Attagenus unicolor* (Brahm, 1791) – Ковровый кожеед
4593. *Ctesias sp.* – Уфа 2025
4594. *Dermestes ater* De Geer, 1774 – 1899
4595. *Dermestes coronatus* Steven, 1808
4596. *Dermestes dimidiatus* Steven, 1808 – Ишмб 2020
4597. *Dermestes erichsoni* Ganglbauer, 1904
4598. *Dermestes gyllenhalii* Laporte de Castelnau, 1840 – Уфа 2022
4599. *Dermestes laniarius* Illiger, 1801 – Уфа, Давл 2020, Иглн 2024-2025
4600. *Dermestes lardarius* Linnaeus, 1758 – Ветчинный кожеед – обычен
4601. *Dermestes murinus* Linnaeus, 1758 – Рябой кожеед – локально
4602. *Dermestes undulatus* Brahm, 1790
4603. *Megatoma graeseri* (Reitter, 1887) – Ермк
4604. *Megatoma tianschanica* Sokolov, 1972 – Складская мегатома – Уфа, Иглн 2025 (обычна)
4605. *Megatoma undata* (Linnaeus, 1758)
4606. *Reesa vespulae* (Milliron, 1939) – Уфа 2022 (Хабибуллин, 2023а)
4607. *Trogoderma variabile* Ballion, 1878 – Изменчивая трогодерма (Ганиев и др., 2007)
4608. *Trogoderma versicolor* (Creutzer, 1799)

Семейство Ptinidae – Притворяшки

4609. *Cacotemnus rufipes* (Fabricius, 1792) – Уфа 2025
4610. *Niptus hololeucus* (Faldermann, 1835) – Шелковистый притворяшка
4611. *Pseudoptilinus fissicollis* (Reitter, 1877) – Уфа 2024
4612. *Ptinus fur* (Linnaeus, 1758) – Притворяшка-вор
4613. *Ptinus raptor* Sturm, 1837 – Крмс 2014
4614. *Ptinus villiger* (Reitter, 1884) – Волосистый притворяшка (Ганиев и др., 2007)

Надсемейство Lymexyloidea

Семейство Lymexylidae – Сверлилы

4615. *Elateroides flabellicornis* (Schneider, 1791) – Хвойное сверлило
4616. *Hylecoetus dermestoides* (Linnaeus, 1761) – Лиственное сверлило

Надсемейство Cleroidea

Семейство Cleridae – Пестряки

4617. *Clerus mutillarius* Fabricius, 1775 – Уфмс 2025
4618. *Korynetes caeruleus* (De Geer, 1775) – Стерлитамак
4619. *Necrobia violacea* (Linnaeus, 1758) – Уфа, Блвщ, Иглн
4620. *Thanasimus formicarius* (Linnaeus, 1758) – Муравьежук – Ермк, Ишмб, Гафр, Бурз
4621. *Tillus elongatus* (Linnaeus, 1758) – Уфа 2024, Крмс 2019
4622. *Trichodes apiarius* (Linnaeus, 1758) – Пчелиный пестряк (пчеложук) – обычен
4623. *Trichodes quadriguttatus* Adams, 1817 – Мелз 2023

Семейство Dasytidae

4624. *Dolichosoma lineare* (Rossi, 1792) – степи

Семейство Malachiidae – Малашки

4625. *Apalochrus femoralis* Erichson, 1840 – Шарн 2019, Чишм 2024, Кушн 2023-2024, Куюр 2023, Туйм 2023-2024
4626. *Clanoptilus geniculatus* (Germar, 1823) – Нурм, Туйм, Кушн, Ишмб
4627. *Clanoptilus marginellus* (Olivier, 1790) – Дувн 2025
4628. *Cordylepherus viridis* (Fabricius, 1787) – локален
4629. *Malachius aeneus* (Linnaeus, 1761) – Медная малашка
4630. *Malachius bipustulatus* (Linnaeus, 1758) **–** Двупятнистая малашка – обычна

Семейство Melyridae

4631. *Dasytes niger* (Linnaeus, 1760) – Уфа 1994, Абзл 2016
4632. *Dasytes plumbeus* (Müller, 1776) – Уфа
4633. *Dasytes subaeneus* Schönherr, 1817 – Крмс 2022-2024
4634. *Anthocomus equestris* (Fabricius, 1781) – Уфа 2017-2024, Иглн 2025
4635. *Anthocomus rufus* (Herbst, 1784) – Уфа 2016-2024

Семейство Trogositidae – Темнотелки

4636. *Grynocharis oblonga* (Linnaeus, 1758) – Уфа 2024-2025
4637. *Peltis ferruginea* (Linnaeus, 1758) – Слвт 2020, Уфа 2020-2025, Ишмб 2024
4638. *Peltis grossa* (Linnaeus, 1758) – Стерлитамак
4639. *Tenebroides mauritanicus* (Linnaeus, 1758) – Мавританский жук

Надсемейство Cucujoidea

Семейство Byturidae – Малинные жуки, малинники

4640. *Byturus ochraceus* (Scriba, 1790) – Ишмб 2024, Уфа 2024
4641. *Byturus tomentosus* (De Geer, 1774) – Малинный жук

Семейство Cryptophagidae – Скрытноеды

4642. *Atomaria linearis* Stephens, 1830 – Свекловичная крошка
4643. *Cryptophagus acutangulus* Gyllenhall, 1827 – Ишимбай, 1935 (Справочник…, 2019)
4644. *Cryptophagus distinguendus* Sturm, 1845 – Бурз, пещера Шульган-Таш (Турбанов и др., 2016)
4645. *Cryptophagus scanicus* (Linnaeus, 1758)
4646. *Henoticus serratus* (Gyllenhal, 1808) – пещера Шульган-Таш (Капралов, 2010)
4647. *Micrambe abietis* (Paykull, 1798)
4648. *Micrambe nigricollis* Reitter, 1876 – Бурз, пещера Шульган-Таш (Турбанов и др., 2016)
4649. *Telmatophilus sp.* – Ермк 2021

Семейство Cucujidae – Плоскотелки

4650. *Cucujus cinnaberinus* (Scopoli, 1763) – Крмс 2021, Уфа 2022-2024
4651. *Cucujus haematodes* Erichson, 1845 – Туйм 2020

Семейство Erotylidae – Грибовики

4652. *Dacne bipustulata* (Thunberg, 1781) – Уфа 2024
4653. *Dacne notata* (Gmelin, 1790)

4654. *Dacne rufifrons* (Fabricius, 1775) – Уфа 2024
4655. *Triplax aenea* (Schaller, 1783) – Ермк, Уфа, Зилр
4656. *Triplax collaris* (Schaller, 1783) – Нурм, Уфа, Мелз
4657. *Triplax lepida* (Faldermann, 1837) – Уфа 2022
4658. *Triplax rufipes* (Fabricius, 1787) – Абзл 2016
4659. *Triplax russica* (Linnaeus, 1758) – Мелз 2021, Октябрьский 2023, Уфа 2023-2025
4660. *Zavaljus brunneus* (Gyllenhal, 1808)

Семейство Kateretidae – Цветочные блестянки

4661. *Brachypterolus pulicarius* (Linnaeus, 1758)
4662. *Brachypterus glaber* (Newman, 1834)
4663. *Kateretes pusillus* (Thunberg, 1794)

Семейство Laemophloeidae – Ложноплоскотелки

4664. *Cryptolestes ferrugineus* (Stephens, 1831) – Короткоусый мукоед – Уфа
4665. *Placonotus testaceus* (Fabricius, 1787) – Рыжий мукоед

Семейство Monotomidae – Долготелки

4666. *Monotoma sp*. – Уфа 2025
4667. *Rhizophagus bipustulatus* (Fabricius, 1792) – Уфа 2020, Блвщ 2022
4668. *Rhizophagus nitidulus* (Fabricius, 1798)

Семейство Nitidulidae – Блестянки

4669. *Brassicogethes aeneus* (Fabricius, 1775)
4670. *Carpophilus dimidiatus* (Fabricius, 1792) – Бурая блестянка (Ганиев и др., 2007)
4671. *Carpophilus hemipterus* (Linnaeus, 1758) – Октябрьский 2021
4672. *Cryptarcha strigata* (Fabricius, 1787) – Уфа 2023
4673. *Cychramus luteus* (Fabricius, 1787)
4674. *Cychramus variegatus* (Herbst, 1792)
4675. *Cyllodes ater* (Herbst, 1792) – Уфа 2023
4676. *Epuraea aestiva* (Linnaeus, 1758) – Крмс 2025
4677. *Epuraea binotata* Reitter, 1873
4678. *Epuraea limbata* (Fabricius, 1787)
4679. *Epuraea melanocephala* (Marsham, 1802) – Уфа 2024
4680. *Epuraea muehli* Reitter, 1908
4681. *Epuraea silesiaca* Reitter, 1872
4682. *Glischrochilus grandis* (Tournier, 1872) – Уфмс 2016, Уфа, Иглн, Крмс, Слвт, Ишмб, Туйм; обычен
4683. *Glischrochilus quadripunctatus* (Linnaeus, 1758) – Кушн 2020, Крмс 2023
4684. *Glischrochilus quadrisignatus* (Say, 1835) – Кгрч 2020, Уфа 2022
4685. *Meligethes sp.* – Блестянка-пыльцеед
4686. *Mesauletobius pubescens* (Kiesenwetter, 1851) – Бурз, БГПЗ 1959 (Зинченко, 2011).
4687. *Nitidula bipunctata* (Linnaeus, 1758) – Двуточечная травянка
4688. *Nitidula carnaria* (Schaller, 1783) – Уфа 2022

4689. *Omosita colon* (Linnaeus, 1758) – Уфа 2022
4690. *Omosita discoidea* (Fabricius, 1775) – Уфа 2020-2024
4691. *Phenolia limbata* (Fabricius, 1787)
4692. *Soronia sp.* – Блвщ 2022, Хайб 2021

Семейство Phalacridae – Гладыши

4693. *Olibrus aeneus* (Fabricius, 1792) – Крмс 2018
4694. *Olibrus bicolor* (Fabricius, 1792) – Иглн 2025
? Olibrus millefolii (Paykull, 1800) – Уфа
4695. *Phalacrus sp.* – Уфа

Семейство Silvanidae

4696. *Ahasverus advena* (Waltl, 1834)
4697. *Oryzaephilus surinamensis* (Linnaeus, 1758) – Суринамский мукоед (в зернохранилищах и помещениях)
4698. *Silvanoprus angusticollis* (Reitter, 1876) – Уфа 2021-2022
4699. *Silvanus bidentatus* (Fabricius, 1792)
4700. *Silvanus unidentatus* (Olivier, 1790) – Уфа 2024
4701. *Uleiota planatus* (Linnaeus, 1760) – Уфа 2007-2024, Октябрьский 2023-2024, Блвщ 2018, Гафр 2024

Семейство Sphindidae – Трутовщики

4702. *Aspidiphorus orbiculatus* (Gyllenhal, 1808)
4703. *Sphindus dubius* (Gyllenhal, 1808)

Надсемейство Coccinelloidea

Семейство Cerylonidae – Шароусы

4704. *Cerylon fagi* Brisout de Barneville, 1867
? Cerylon histeroides (Fabricius, 1792)

Семейство Coccinellidae – Божьи коровки

Подсемейство Chilocorinae

4705. *Chilocorus bipustulatus* (Linnaeus, 1758) – Двупятнистый хилокорус
4706. *Chilocorus renipustulatus* (Scriba, 1791) – Почковидно-пятнистый хилокорус
4707. *Exochomus octosignatus* (Gebler, 1830) – Восьмиточечный брумус
4708. *Exochomus quadripustulatus* (Linnaeus, 1758) – Четырехпятнистый экзохомус
4709. *Parexochomus nigromaculatus* (Goeze, 1777) – Чёрно-пятнистый экзохомус
4710. *Platynaspis luteorubra* (Goeze, 1777) – Волосистая коровка

Подсемейство Coccidulinae

4711. *Coccidula rufa* (Herbst, 1783) – Розовая коровка

Подсемейство Coccinellinae

4712. *Adalia bipunctata* (Linnaeus, 1758) – Двуточечная коровка – массово
4713. *Adalia decempunctata* (Linnaeus, 1758) – Десятиточечная коровка – локально
4714. *Anatis ocellata* (Linnaeus, 1758) – Глазчатая коровка – на хвойных
4715. *Anisosticta novemdecimpunctata* (Linnaeus, 1758) – 19-точечная коровка
4716. *Aphidecta obliterata* (Linnaeus, 1758)
4717. *Bulaea lichatschovi* (Hummel, 1827) – Булея Лихачова

4718. *Calvia decemguttata* (Linnaeus, 1767) – Десятипятнистая кальвия
4719. *Calvia quatuordecimguttata* (Linnaeus, 1758) – 14-пятнистая кальвия – обычна
4720. *Calvia quindecimguttata* (Fabricius, 1777) – 15-пятнистая кальвия
4721. *Ceratomegilla notata* (Laicharting, 1781)
4722. *Ceratomegilla undecimnotata* (D.H.Schneider, 1792) – обычна
4723. *Coccinella hieroglyphica* Linnaeus, 1758 – Значковая коровка
4724. *Coccinella magnifica* Redtenbacher, 1843 – Великолепная коровка
4725. *Coccinella quinquepunctata* Linnaeus, 1758 – Пятиточечная коровка
4726. *Coccinella septempunctata* Linnaeus, 1758 – Семиточечная коровка – обычна
4727. *Coccinella undecimpunctata* Linnaeus, 1758 – 11-точечная коровка
4728. *Coccinula quatuordecimpustulata* (Linnaeus, 1758) – луга, обычна
4729. *Coccinula sinuatomarginata* (Faldermann, 1837)
4730. *Halyzia sedecimguttata* (Linnaeus, 1758) – обычна
4731. *Harmonia axyridis* (Pallas, 1773) – Уфа, Иглн 2019-2025
4732. *Harmonia quadripunctata* (Pontoppidan, 1763) – Четырехточечная хармония
4733. *Hippodamia septemmaculata* De Geer, 1775
4734. *Hippodamia tredecimpunctata* (Linnaeus, 1758) – у воды
4735. *Hippodamia variegata* (Goeze, 1777) – массово
4736. *Myrrha octodecimguttata* (Linnaeus, 1758)
4737. *Myzia gebleri* (Crotch, 1874) – Блрц 1982
4738. *Myzia oblongoguttata* (Linnaeus, 1758) – Продолговато-пятнистая коровка
4739. *Oenopia conglobata* (Linnaeus, 1758) – обычна
4740. *Oenopia lyncea* (Olivier, 1808)
4741. *Propylaea quatuordecimpunctata* (Linnaeus, 1758) – 14-точечная коровка – обычна
4742. *Psyllobora vigintiduopunctata* (Linnaeus, 1758) – 22-точечная коровка – массово
4743. *Sospita vigintiguttata* (Linnaeus, 1758) – 20-пятнистая коровка
4744. *Tytthaspis gebleri* (Mulsant, 1850)
4745. *Tytthaspis sedecimpunctata* (Linnaeus, 1761) – степи
4746. *Vibidia duodecimguttata* (Poda, 1761) – локально

Подсемейство Epilachninae

4747. *Cynegetis impunctata* (Linnaeus, 1767) – Бесточечная коровка
4748. *Subcoccinella vigintiquatuorpunctata* (Linnaeus, 1758) – 24-точечная коровка

Подсемейство Scymninae

4749. *Hyperaspis campestris* (Herbst, 1783)
4750. *Hyperaspis pseudopustulata* Mulsant, 1853 – Древесный гипераспис
4751. *Nephus quadrimaculatus* (Herbst, 1783) – Ишмб 2023
4752. *Nephus redtenbacheri* (Mulsant, 1846)
4753. *Scymnus ferrugatus* (Moll, 1785) – Иглн 2025
4754. *Scymnus frontalis* (Fabricius, 1787) – Желтолобый сцимнус – обычен
4755. *Scymnus nigrinus* Kugelann, 1794 – Черный сцимнус
4756. *Scymnus rubromaculatus* (Goeze, 1777) – Иглн 2025

4757. *Scymnus subvillosus* (Goeze, 1777) – Ворсистый сцимнус
4758. *Stethorus pusillus* (Herbst, 1797) – Крошечный стеторус

Семейство Endomychidae – Плеснееды

4759. *Mycetina cruciata* (Schaller, 1783) – Бурз; Уфа, Туйм

Семейство Latridiidae – Скрытники

4760. *Corticaria lapponica* (Zetterstedt, 1838)
4761. *Corticarina latipennis* (Sahlberg, 1871)
4762. *Corticarina minuta* (Fabricius, 1792)
4763. *Cortinicara gibbosa* (Herbst, 1793)
4764. *Enicmus fungicola* Thomson, 1868
4765. *Enicmus transversus* (Olivier, 1790)
4766. *Latridius hirtus* Gyllenhal, 1827 – Уфа 2018
4767. *Latridius minutus* (Linnaeus, 1767) – Кумертау (Справочник…, 2019).
4768. *Metophthalmus sp.* – ЗШТ, борти (Бакалова, 2011)

Надсемейство Tenebrionoidea

Семейство Aderidae

4769. *Aderus populneus* (Creutzer, 1796) – Уфа 2017-2022

Семейство Anthicidae – Быстрянки

4770. *Anthicus antherinus* (Linnaeus, 1761)
4771. *Anthicus ater* (Thunberg, 1787) – Уфа 2022
4772. *Notoxus binotatus* (Gebler, 1829) – Шарн 2019, Кушн 2018-2024
4773. *Notoxus monoceros* (Linnaeus, 1760)
4774. *Notoxus trifasciatus* Rossi, 1792 – Ишмб 2022, Уфа 2022, Чишм 2024
? Omonadus floralis (Linnaeus, 1758)

Семейство Ciidae – Трутовиковые жуки

4775. *Cis castaneus* (Herbst, 1793) – Уфа 2024
4776. *Ennearthron cornutum* (Gyllenhal, 1827)

Семейство Melandryidae – Тенелюбы

4777. *Diraea quadriguttata* (Paykull, 1798)
4778. *Hypulus quercinus* (Quensel, 1790) – Уфа 2024-2025
4779. *Melandrya dubia* (Schaller, 1783)
4780. *Osphya bipunctata* (Fabricius, 1775) – Уфа 2019
4781. *Serropalpus barbatus* (Schaller, 1783)
4782. *Wanachia triguttata* (Gyllenhal, 1810)

Семейство Meloidae – Нарывники

4783. *Alosimus syriacus* (Linnaeus, 1758) – запад
4784. *Cerocoma schreberi* Fabricius, 1781 – степи
4785. *Cerocoma schaefferi* (Linnaeus, 1758) – степи
4786. *Epicauta erythrocephala* (Pallas, 1781)
4787. *Epicauta flabellicornis* (Germar, 1817)
4788. *Eurymeloe scabriusculus* (Brandt & Erichson, 1832) – Ермк
4789. *Hycleus atratus* (Pallas, 1773) – Чшмн 2016

4790. *Hycleus polymorphus* (Pallas, 1771) – обычен
4791. *Hycleus quatuordecimpunctatus* (Pallas, 1781)
4792. *Lytta vesicatoria* (Linnaeus, 1758) – Шпанская мушка – обычна
4793. *Meloe brevicollis* Panzer, 1793 – Ермк 2019
4794. *Meloe proscarabaeus* Linnaeus, 1758 – Бижб 2011 (Валуев, Мулдашев, 2020)
4795. *Meloe uralensis* Pallas, 1777 – Ишмб 2020, Хайб 2021, Уфа 2021
4796. *Meloe variegatus* Donovan, 1793 – Хайб 2015-2021
4797. *Meloe violaceus* Marsham, 1802 – Ишмб 2022
4798. *Muzimes collaris* (Fabricius, 1787) – Туйм (Валуев, Мулдашев, 2020), Шарн
4799. *Mylabris fabricii* Soumacov, 1924
4800. *Mylabris geminata* Fabricius, 1798 – юг
4801. *Mylabris pusilla* Olivier, 1811 – Маленький нарывник – Чишм
4802. *Mylabris quadripunctata* (Linnaeus, 1767) – юг
4803. *Mylabris sibirica* Fischer von Waldheim, 1823
4804. *Mylabris variabilis* (Pallas, 1781) – Изменчивый нарывник – обычен
4805. *Schizotus pectinicornis* (Linnaeus, 1758) – Уфа, Крск, Бурз, Абзл

Семейство Mordellidae – Шипоноски

4806. *Curtimorda maculosa* (Neazen, 1794)
4807. *Mordella aculeata* Linnaeus, 1758
4808. *Mordellistena micans* (Germar, 1817) – Конопляная шипоноска
4809. *Mordellistena parvula* (Gyllenhal, 1827) – Подсолнечниковая шипоноска
4810. *Mordellistena pumila* (Gyllenhal, 1810)
4811. *Mordellistena variegata* (Fabricius, 1798) – Абзл 2016
4812. *Mordellochroa abdominalis* (Fabricius, 1775) – Ишмб 2024, Уфа 2024
4813. *Tomoxia bucephala* (Costa, 1854) – Шарн 2024, Байм 2022
4814. *Variimorda villosa* (Schrank, 1781) – Перевязання шипоноска

Семейство Mycetophagidae – Грибоеды

4815. *Litargus connexus* (Geoffroy, 1785) – Уфа 2021-2024
4816. *Mycetophagus multipunctatus* Fabricius, 1792 – Уфа 2019
4817. *Mycetophagus piceus* (Fabricius, 1777) – Ишмб 2023
4818. *Mycetophagus quadriguttatus* P.W.J.Muller, 1821 – Четырехпятнистый грибоед (Ганиев и др., 2007)
4819. *Mycetophagus quadripustulatus* (Linnaeus, 1761) – Ермк (Хабибуллин, 2018б)
4820. *Mycetophagus tschitscherini* (Reitter, 1897)
4821. *Typhaea stercorea* (Linnaeus, 1758) – Бархатистый грибоед (Ганиев и др., 2007)

Семейство Mycteridae

4822. *Mycterus tibialis* Kuster, 1850 – Куюр 2023, Стбш 2024

Семейство Oedemeridae – Узконадкрылки

4823. *Anogcodes melanurus* (Fabricius, 1787) – Октябрьский 2023, Туйм 2023
4824. *Anogcodes ruficollis* (Fabricius, 1781) – Нурм 2022 (Хабибуллин, 2024а).
4825. *Anogcodes rufiventris* (Scopoli, 1763) – Уфмс 2016 (Хабибуллин, 2022а).
4826. *Anogcodes ustulatus* (Scopoli, 1763) – Уфмс 2020 (Хабибуллин, 2022а).

4827. *Chrysanthia geniculata* Heyden, 1877
4828. *Chrysanthia viridissima* (Linnaeus, 1758) – Уфа 2020, Кушн, Крмс, Давл, Туйм, Крск, Ишмб, Мияк
4829. *Oedemera croceicollis* (Gyllenhal, 1827) – Давл 2020, Чишм 2024
4830. *Oedemera femorata* (Scopoli, 1763) – массово
4831. *Oedemera flavipes* (Fabricius, 1792) – Кумертау 2023
4832. *Oedemera lurida* (Marsham, 1802) – Ермк, Уфа, Туйм, Кгрч
4833. *Oedemera podagrariae* (Linnaeus, 1767) – Ермк, Чишм 2016, Уфа, Предуралье
4834. *Oedemera virescens* (Linnaeus, 1767) – степи

Семейство Pyrochroidae – Огнецветки

4835. *Pyrochroa coccinea* (Linnaeus, 1761) – Слвт 2021
4836. *Pyrochroa serraticornis* (Scopoli, 1763)
4837. *Schizotus pectinicornis* (Linnaeus, 1758) – НП «Башкирия», Уфа, Абзл, Бурз

Семейство Ripiphoridae – Веероносцы

4838. *Pelecotoma fennica* (Paykull, 1799) – Ермк 2020

Семейство Salpingidae – Трубачи

4839. *Lissodema cursor* (Gyllenhal, 1813) – Уфа 2025

Семейство Scraptiidae

4840. *Anaspis frontalis* (Linnaeus, 1758)

Семейство Tenebrionidae – Чернотелки

Подсемейство Alleculinae

4841. *Cteniopus sulphureus* (Linnaeus, 1758) – Уфа 2024, Ермк 2018, локально
4842. *Isomira murina* (Linnaeus, 1758) – Чишм 2025
4843. *Mycetochara axillaris* (Paykull, 1799) – Уфа
4844. *Omophlus lividipes* Mulsant, 1856 – юго-запад до Уфы (Оглоблин, Знойко, 1950)
4845. *Omophlus proteus* Kirsch, 1869 – Пыльцеед-протей
4846. *Podonta daghestanica* Reitter, 1885 – южное Предуралье
4847. *Prionychus ater* (Fabricius, 1775) – Уфа 2024
4848. *Pseudocistela ceramboides* (Linnaeus, 1758) – Крмс 2016 и 2022, Блрц 2024, Кушн 2024, Абзл 2022

Подсемейство Diaperinae

4849. *Alphitophagus bifasciatus* (Say, 1824)
4850. *Blapstinus metallicus* (Fabricius, 1801) – Уфа 2020
4851. *Corticeus bicolor* (Olivier, 1790) – Уфа 2017-2024, Крмс 2022
4852. *Crypticus quisquilis* (Linnaeus, 1760) – Дерновый медляк
4853. *Diaperis boleti* (Linnaeus, 1758) – обычна
4854. *Neomida haemorrhoidalis* (Fabricius, 1787) – Ермк 2017, Уфа 2022
4855. *Pentaphyllus testaceus* (Hellwig, 1792) – Уфа 2020
4856. *Platydema violaceum* (Fabricius, 1790)
4857. *Ulomoides dermestoides* (Fairmaire, 1893) – Жук-знахарь, в культуре

Подсемейство Lagriinae – Мохнатки

4858. *Belopus procreus* (Mulsant, 1854)
4859. *Lagria hirta* (Linnaeus, 1758) – Обыкновенная мохнатка – обычна
? Lagria laticollis Motschulsky, 1860

Подсемейство Pimeliinae

4860. *Pimelia subglobosa* (Pallas, 1781) – Шаровидная чернотелка
4861. *Tentyria nomas* (Pallas, 1781) – Бродячая чернотелка

Подсемейство Tenebrioninae

4862. *Blaps halophila* Fischer de Waldheim, 1820 – Степной медляк – степи
4863. *Blaps lethifera* Marsham, 1802
4864. *Blaps mortisaga* (Linnaeus, 1758) – Подвальный медляк (медляк-вещатель)
4865. *Blaps parvicollis* Zoubkoff, 1829 – РБ (Абдурахманов, Набоженко, 2011)
4866. *Bolitophagus reticulatus* (Linnaeus, 1767)
4867. *Gonocephalum granulatum* (Fabricius, 1791) – Хайб 2016-2021
Gonocephalum granulatum pusillum (Fabricius, 1791)
4868. *Melanimon tibialis* (Fabricius, 1781) – Песчаная чернотелка-крошка
4869. *Nalassus brevicollis* (Krynicky, 1832) – локально
4870. *Odocnemis perplexus* (Ménétriés, 1849) – РБ (Абдурахманов, Набоженко, 2011)
4871. *Oodescelis melas* (Fischer de Waldheim, 1823) – Абзл 2022
4872. *Oodescelis polita* (Sturm, 1807) – Уфа 2016, Хайб 2016
4873. *Opatrum riparium* Scriba, 1865
4874. *Opatrum sabulosum* (Linnaeus, 1761) – Песчаный медляк – обычен
4875. *Pedinus femoralis* (Linnaeus, 1767) – Кукурузный медляк
4876. *Platyscelis gages* (Fischer de Waldheim, 1823) – Черный медляк
4877. *Platyscelis hypolithos* (Pallas, 1781)
4878. *Prosodes obtusa* (Fabricius, 1798) – РБ (Абдурахманов, Набоженко, 2011)
4879. *Tenebrio molitor* Linnaeus, 1758 – Мучной хрущак – обычен
4880. *Tenebrio obscurus* Fabricius, 1792 – Темный мучной хрущак – обычен
4881. *Tribolium castaneum* (Herbst, 1797)
4882. *Tribolium confusum* Jacquelin du Val, 1868 – Малый мучной хрущак
4883. *Tribolium madens* (Charpentier, 1825)
4884. *Uloma culinaris* (Linnaeus, 1758) – Иглн 2024-2025, Уфа 2024-2025
4885. *Upis ceramboides* (Linnaeus, 1758) – Лесная, или усачевидная чернотелка – леса, лесостепи, обычна

Семейство Tetratomidae

4886. *Hallomenus binotatus* (Quensel, 1790) – Уфа 2018

Семейство Zopheridae

4887. *Aulonium trisulcum* (Geoffroy, 1785) – Уфа 2021-2024, Туйм 2023, Иглн 2022
4888. *Bitoma crenata* (Fabricius, 1775) – Блвщ 2018, Уфа 2024

Надсемейство Chrysomeloidea

Семейство Cerambycidae – Жуки-дровосеки, или усачи

Подсемейство Cerambycinae

4889. *Aromia moschata* (Linnaeus, 1758) – Мускусный усач
4890. *Callidium aeneum* (De Geer, 1775)
4891. *Callidium chlorizans* (Solsky, 1870) – БГПЗ (Мозолевская, 1964)
4892. *Callidium coriaceum* Paykull, 1800 – Плоский бронзовый усач
4893. *Callidium violaceum* (Linnaeus, 1758) – Плоский фиолетовый усач – обычен
4894. *Cerambyx scopolii* Fuesslins, 1775 – Малый дубовый усач
4895. *Chlorophorus figuratus* (Scopoli, 1763) – Блвщ, Кгрч 2020
4896. *Chlorophorus herbstii* (Brahm, 1790) – Усач-хлорофорус Гербста
4897. *Chlorophorus varius* (Muller, 1766)
4898. *Clytus arietis* (Linnaeus, 1758) – Многоядный клит
4899. *Clytus arietoides* Reitter, 1900 – Сибирский хвойный клит
4900. *Cyrtoclytus capra* (Germar, 1824) – Козерогий клит
4901. *Deilus fugax* (Olivier, 1790) – Уфа, БГПЗ
4902. *Hylotrupes bajulus* (Linnaeus, 1758) – Черный домовый дровосек
4903. *Leioderes kollari kollari* Redtenbacher, 1849 – Уфа 2008 (Шаповалов, 2012)
4904. *Molorchus minor* (Linnaeus, 1758) – Короткокрылый еловый усач
4905. *Obrium cantharinum* (Linnaeus, 1767) – Предуралье, редок
4906. *Oplosia cinerea* (Mulsant, 1839) – Уфа 2016
4907. *Phymatodes testaceus* (Linnaeus, 1758) – Плоский дубовый усач
4908. *Plagionotus arcuatus* (Linnaeus, 1758) – Дубовый желтополосый усач
4909. *Plagionotus detritus* (Linnaeus, 1758) – Дубовый пестрый усач
4910. *Plagionotus floralis* (Pallas, 1773) – Люцерновый усач – Стмк
4911. *Poecilium alni* (Linnaeus, 1767) – Уфа, Крмс
4912. *Purpuricenus globulicollis* (Dejean in Mulsant, 1839) – Мелз
4913. *Purpuricenus kaehleri* (Linnaeus, 1758) – Усач краснокрыл Келлера – локально
4914. *Pyrrhidium sanguineum* (Linnaeus, 1758) – Плоский красный усач
4915. *Rhaphuma gracilipes* (Faldermann, 1835) – Уфа 2025
4916. *Ropalopus clavipes* (Fabricius, 1775) – Уфмс, Давл, Чишм, Зилр
4917. *Ropalopus macropus* (Germar, 1824) – Уфа, Стмк
4918. *Rosalia alpina* (Linnaeus, 1758) – Альпийский усач – Уфа, Ишмб, Гафр
4919. *Semanotus undatus* (Linnaeus, 1758) – Поперечнополосатый еловый дровосек
4920. *Trichoferus campestris* (Faldermann, 1835) – повсеместно, обычен
4921. *Xylotrechus altaicus* (Gebler, 1836) – Алтайский лиственничный дровосек – БГПЗ (Шаповалов, 2012)
4922. *Xylotrechus antilope* (Schonherr, 1817) – Крмс 2005, Кушн 2014 (Герасимов, 2017а), Уфа
4923. *Xylotrechus arvicola* (Olivier, 1795) – Европейско-уральский усач
4924. *Xylotrechus capricornus* (Gebler, 1830)
4925. *Xylotrechus ibex* (Gebler, 1825) – БГПЗ 1982 (Герасимов, 2017а)
4926. *Xylotrechus rusticus* (Linnaeus, 1758) – Осиновый усач

Подсемейство Lamiinae

4927. *Acanthocinus aedilis* (Linnaeus, 1758) – Серый длинноусый усач
4928. *Acanthocinus carinulatus* (Gebler, 1833)
4929. *Acanthocinus griseus* (Fabricius, 1793) – Малый серый длинноусый дровосек
4930. *Aegomorphus clavipes* (Schrank, 1781) – Вишневый усач
4931. *Agapanthia boeberi* (Fischer von Waldheim, 1806) – Чишм 2025
4932. *Agapanthia cynarae* (Germar, 1817) – Зиан 1973, Зилр 1977 (Герасимов, 2017a)
4933. *Agapanthia dahlii* (Richter, 1820) – Подсолнечниковый усач
4934. *Agapanthia intermedia* Ganglbauer, 1884 – Байм 1978 (Герасимов, 2017a), Стмк
4935. *Agapanthia kirbyi* (Gyllenhal, 1817)
4936. *Agapanthia villosoviridescens* (De Geer, 1775) – Зонтичный усач – обычен
4937. *Agapanthia violacea* (Fabricius, 1775) – Синий усач
4938. *Anaesthetis testacea* (Fabricius, 1781)
4939. *Dorcadion glicyrrhizae* (Pallas, 1773)
4940. *Dorcadion carinatum* (Pallas, 1771) – Кумертау 1969
4941. *Eodorcadion carinatum carinatum* (Fabricius, 1781) – Уфмс 1982; Блрц 1986 (Шаповалов, 2012)
4942. *Exocentrus lusitanus* (Linnaeus, 1767) – Уфа, Уфмс, Блвщ
4943. *Exocentrus punctipennis* Mulsant & Guillebeau, 1856 – Уфа
4944. *Lamia textor* (Linnaeus, 1758) – Ивовый толстяк
4945. *Leiopus linnei* Wallin, Nylander et Kvamme, 2009 – Чишм 2025
4946. *Mesosa myops* (Dalman, 1817) – Желтопятнистый усач
4947. *Menesia bipunctata* (Zoubkoff, 1829) – Предуралье, редок
4948. *Monochamus galloprovincialis* (Olivier, 1795) – Черный сосновый усач
4949. *Monochamus saltuarius* (Gebler, 1830) – Чёрный бархатисто-пятнистый усач
4950. *Monochamus sartor* (Fabricius, 1787) – Большой черный еловый усач
4951. *Monochamus sutor* (Linnaeus, 1758) – Малый черный еловый усач
4952. *Monochamus urussovii* (Fischer-Waldheim, 1806)
4953. *Oberea erythrocephala* (Schrank, 1776)
4954. *Oberea euphorbiae* (Germar, 1813) – Альш
4955. *Oberea oculata* (Linnaeus, 1758) – Ивовый красногрудый усач
4956. *Opsilia coerulescens* (Scopoli, 1763)
4957. *Phytoecia affinis* (Harrer, 1784) – Уфа 1956, Белб 1959 (Герасимов, 2017a), Бгвщ
4958. *Phytoecia coerulescens* (Scopoli, 1763)
4959. *Phytoecia cylindrica* (Linnaeus, 1758)
4960. *Phytoecia icterica* (Schaller, 1783) – Уфа 1983, Давл 1965, Бирск 1983 (Герасимов, 2017a), Ермк 2018, Стмк
4961. *Phytoecia nigricornis* (Fabricius, 1782) – Травяной черноусый усач
4962. *Phytoecia pustulata* (Schrank, 1776) – Уфа, Крмс, Иглн, Стмк
4963. *Phytoecia virgula* (Charpentier, 1825) – Блтч
4964. *Pogonocherus fasciculatus* (De Geer, 1775) – Сосновый вершинный усачик

4965. *Pogonocherus hispidulus* (Piller & Mitterpacher, 1783)
4966. *Politodorcadion politum* (Dalman, 1823) – Желтый усач-корнеед
4967. *Saperda carcharias* (Linnaeus, 1758) – Тополевый усач, или большой осиновый скрипун
4968. *Saperda perforata* (Pallas, 1773) – Продырявленный скрипун
4969. *Saperda populnea* (Linnaeus, 1758) – Малый осиновый скрипун
4970. *Saperda scalaris* (Linnaeus, 1758) – Мраморный скрипун
Saperda scalaris hieroglyphica (Pallas, 1773) (Шаповалов, 2012)
4971. *Saperda similis* Laicharting, 1784 – Мелз
4972. *Stenostola ferrea* (Schrank, 1776) – Илиш
4973. *Tetrops praeustus* (Linnaeus, 1758) – Уфа, Крмс (Герасимов, 2017а), Кгрч, Кушн, Стмк
4974. *Theophilea subcylindricollis* Hladil, 1988 – Уфа, Уфмс, Стмк, Ермк 2018, Чишм

Подсемейство Lepturinae

4975. *Acmaeops marginatus* (Fabricius, 1781) – Зауралье
4976. *Acmaeops smaragdulus* (Fabricius, 1793)
4977. *Alosterna ingrica* (Baeckmann, 1902) – Уфа 2024, Туйм 2022, Ермк 2022
4978. *Alosterna tabacicolor* (De Geer, 1775) – Бурый усач
4979. *Anastrangalia dubia* (Scopoli, 1763)
4980. *Anastrangalia reyi* (Heyden, 1889)
4981. *Anastrangalia sanguinolenta* (Linnaeus, 1761)
4982. *Anisorus quercus* Goeze, 1783
4983. *Anoplodera rufipes* (Schaller, 1783) – Зилр 1972 (Герасимов, 2017а)
4984. *Anoplodera sexguttata* (Fabricius, 1775) – Бурз 2023
4985. *Brachyta interrogationis* (Linnaeus, 1758) – Цветочный усач
4986. *Brachyta variabilis* (Gebler, 1817) – Абзл 1973 (Герасимов, 2017а)
4987. *Cortodera femorata* (Fabricius, 1787) – Бурз 1980 (Герасимов, 2017а)
4988. *Cortodera kiesenwetteri milaenderi* Danilevsky, 2001 – Уфмс (Шаповалов, 2012)
4989. *Cortodera villosa.major* Miroshnikov, 2007 – ЗШТ 2007 (Шаповалов, 2012)
4990. *Dinoptera collaris* (Linnaeus, 1758) – Ошейниковый усач
4991. *Etorofus pubescens* (Fabricius, 1787) – Зауралье
4992. *Gaurotes virginea* (Linnaeus, 1758) – Черногрудый усач
4993. *Gnathacmaeops pratensis* (Laicharting, 1784)
4994. *Judolia erratica* Mulsant 1863
4995. *Judolia sexmaculata* (Linnaeus, 1758)
4996. *Leptura aethiops* Poda, 1761 – Стерлитамак 1935 (Шаповалов, 2012)
4997. *Leptura annularis* Fabricius, 1801
4998. *Leptura quadrifasciata* (Linnaeus, 1758) – Четырехполосый усач
4999. *Leptura thoracica* (Creutzer, 1799)
5000. *Lepturalia nigripes* (De Geer, 1775) – Черноногий усач
5001. *Lepturobosca virens* (Linnaeus, 1758) – Зеленая лептура

5002. *Nivellia sanguinosa* (Gyllenhal, 1827) – Кроваво-красный усач
5003. *Oedecnema gebleri* (Ganglbauer, 1889) – Зилр 1969 (Герасимов, 2017а)
5004. *Oxymirus cursor* (Linnaeus, 1758) – Кгрч 2003
5005. *Pachyta lamed* (Linnaeus, 1758) – Блрц 2010 (Шаповалов, 2012)
5006. *Pachyta quadrimaculata* (Linnaeus, 1758) – Четырехпятнистый усач
5007. *Pachytodes erraticus* (Dalman, 1817) – Зилр 1979 (Герасимов, 2017а); Крмс 1999
5008. *Paracorymbia maculicornis* (Degeer, 1775) – Уфа, Чишм, Ишмб, Гафр
5009. *Pseudovadonia livida* (Fabricius, 1776)
5010. *Rhagium bifasciatum* Fabricius, 1775 – Двухполосый рагий
5011. *Rhagium inquisitor* Linnaeus, 1758 – Ребристый рагий
5012. *Rhagium mordax* (De Geer, 1775) – Чернопятнистый рагий
5013. *Rhagium sycophanta* (Schrank, 1781) – Рыжий рагий
5014. *Rhamnusium bicolor* (Schrank, 1781) – Двухцветный усач
5015. *Rutpela maculata* (Poda, 1761) – Пятнистый усач
5016. *Stenocorus meridianus* (Linnaeus, 1758) – Европейский усач
5017. *Stenocorus quercus* (Götz, 1783)
5018. *Stenurella bifasciata* (Muller, 1776)
5019. *Stenurella melanura* (Linnaeus, 1758) – Чернозадый усач
5020. *Stictoleptura maculicornis maculicornis* (De Geer, 1775) – Блрц 2010 (Шаповалов, 2012)
5021. *Stictoleptura rubra* (Linnaeus, 1758)
5022. *Stictoleptura variicornis* (Dalman, 1817)
5023. *Strangalia attenuata* (Linnaeus, 1758)
5024. *Vadonia unipunctata* (Fabricius, 1787) – Стерлитамак 1972, Зилр 1972 (Герасимов, 2017а)

Подсемейство Necydalinae

5025. *Necydalis major* Linnaeus, 1758 – Большой неполнокрыл – локален

Подсемейство Prioninae

5026. *Prionus coriarius* (Linnaeus, 1758) – Усач-кожевник – обычен
5027. *Tragosoma depsarium* (Linnaeus, 1767) – Косматогрудый дровосек

Подсемейство Spondylidinae

5028. *Arhopalus ferus* (Mulsant, 1839) – Дюрт 1993, Хайб
5029. *Arhopalus rusticus* (Linnaeus, 1758) – Бурый сосновый усач
5030. *Asemum striatum* (Linnaeus, 1758) – Черный дровосек
5031. *Spondylis buprestoides* (Linnaeus, 1758) – Короткоусый усач
5032. *Tetropium castaneum* (Linnaeus, 1758) – Еловый дровосек
5033. *Tetropium fuscum* (Fabricius, 1787) – Матовогрудый еловый дровосек
5034. *Tetropium gracilicorne* Reitter, 1889 – Уфмс

Семейство Bruchidae – Зерновки (С.В. Дедюхин)

5035. *Acanthoscelides obtectus* Say, 1831 – Фасолевая зерновка. Адвентивный вид. Встречается иногда в массе в запасах семян фасоли.

5036. *Bruchidius cinerascens* (Gyllenhal, 1833). Остепнённые луга, прирусловые валы в поймах. На синеголовнике (*Eryngium planum*). Редок.

– *Bruchidius holosericeus* (Schoenherr, 1832). Указание для РБ (Дедюхин, 2015) основано на ошибочном определении.

5037. *Bruchidius mordelloides* (Baudi di Selve, 1886). Петрофитные степи. Вероятно, на маревых. Очень редок.

5038. *Bruchidius pusillus* (Germar, 1823). Разнотравные степи, опушки дубрав. На вязеле. Обычен.

5039. *Bruchidius unicolor* (Olivier, 1800) (= *olivaceus* (Germar, 1824)). Петрофитные степи. На копеечниках. Локален, но местами обычен.

5040. *Bruchidius villosus* (Fabricius, 1792). В РБ пока известен только с шихана Тратау. На ракитнике.

5041. *Bruchus affinis* Frölich, 1799. Степи, луга, опушки. На чинах и горошках. Обычен.

5042. *Bruchus atomarius* (Linnaeus, 1761). Леса, опушки. Многочислен весной на чине весенней, летом жуки изредка встречаются на других чинах.

5043. *Bruchus loti* Paykull, 1800. Луга, рудеральные биотопы. Монофаг на чине луговой.

5044. *Bruchus occidentalis* Lukjanovitch & Ter-Minassian, 1957 (= *sibiricus occidentalis* Lukjanovitch & Ter-Minassian, 1957). Луга и разнотравные степи. На горошках. Местами нередок.

– *Bruchus rufimanus* Bohemann, 1833. Все указания для РБ вида основаны на одном ошибочно определенном экземпляре.

5045. *Bruchus viciae* Olivier, 1795. Разнотравные степи. На чине бледноватой (*Lathyrus pallescens*). Локален и редок.

5046. *Kytorhinus quadriplagiatus* (Motschulsky, 1839). Петрофитно-кустарниковые степи. На карагане (*Caragana frutex*). Локален и редок.

5047. *Spermophagus sericeus* (Geoffroy, 1785). Открытые биотопы. Многочислен в степях. Развивается в семенах вьюнка. Жуки часто встречаются весной в степях на цветах крестоцветных.

Семейство Chrysomelidae – Листоеды (С.В.Дедюхин)

Подсемейство Donaciinae – Радужницы

5048. *Donacia antiqua* Kunze, 1818 – Античная радужница – Бурз, хутор Акбулатово-Муратово, дол. р. Белая, 05.06.2000, Е. Захарова, Д. Подгорбунских, П. Рудоискатель (Беньковский, Орлова-Беньковская, 2017).

5049. *Donacia aquatica* (Linnaeus, 1758) – Водная радужница. Водоёмы. На осоках. Обычен

5050. *Donacia bicolora* Zschach, 1788 – Двуцветная радужница. Водоёмы. На ежеголовнике. Обычен

5051. *Donacia brevitarsis* Thomson, 1884. Указан для РБ (Баянов и др., 2015).

5052. *Donacia cinerea* Herbst, 1784. Водоёмы. В основном на рогозах. Обычен

5053. *Donacia clavipes* Fabricius, 1793. Заросшие водоёмы. На тростнике (*Phragmites australis*). Редок.

5054. *Donacia crassipes* Fabricius, 1775 – Толстоногая радужница. Водоёмы. Обычен на кувшинках и кубышках
5055. *Donacia dentata* Hoppe, 1795 – Зубчатая радужница. На заросших старицах на стрелолисте (*Sagittaria sagittifolia*). Нечасто.
5056. *Donacia impressa* Paykull, 1799. Мелководные старицы. На камыше озерном (*Schoenoplectus lacustris*).
5057. *Donacia malinovskyi* Ahrens, 1810. В РБ известен по одной находке (Уфа, пруд, на *Typha latifolia*) (Беньковский, Орлова-Беньковская, 2017).
5058. *Donacia marginata* Hoppe, 1795. Водоёмы. На осоках и ежеголовнике. Обычен.
5059. *Donacia obscura* Gyllenhal, 1813 – в РБ известен по одной находке (Белебей, 01.07.1907, А. Григорьев) (Беньковский, Орлова-Беньковская, 2017).
5060. *Donacia semicuprea* Panzer, 1796 – Бронзово-медная радужница. Водоёмы. На маннике (*Glyceria maxima*). Обычен
5061. *Donacia sparganii* Ahrens, 1810. В РБ известен по одному указанию (Белебей, 05–06.07.1908, А. Григорьев) (Беньковский, Орлова-Беньковская, 2017).
5062. *Donacia thalassina* Germar, 1811. Водоёмы. На болотнице (*Eleocharis palustris*). Обычен.
5063. *Donacia tomentosa* Ahrens, 1819. Водоёмы. На сусаке (*Butomus umbellatus*). Местами часто.
5064. *Donacia vulgaris* Zschach, 1788 – Обыкновенная радужница. Заросшие водоёмы. На рогозе (*Typha*).
5065. *Plateumaris sericea* (Linnaeus, 1761) Болота, берега водоёмов. На камыше (*Scyrpus*) и осоках (*Carex*).

Подсемейство Criocerinae – Трещалки

? Crioceris asparagi (Linnaeus, 1758) Обитание вида в РБ требует подтверждения.

5066. *Crioceris duodecimpunctata* (Linnaeus, 1758) – Двенадцатиточечная трещалка. Степи, населённые пункты. На спарже. Обычен.
5067. *Crioceris quatuordecimpunctata* (Scopoli, 1763) – Четырнадцатиточечная трещалка. Степи, населённые пункты. На спарже. Обычен.
5068. *Crioceris quinquepunctata* (Scopoli, 1763) – Пятиточечная трещалка. Пойменные луга. На спарже. Редок.
5069. *Lema cyanella* (Linnaeus, 1758) – Синяя пьявица. Открытые биотопы. На бодяках и чертополохах. Обычен.
5070. *Lilioceris lilii* (Scopoli, 1763) – Лилейная трещалка. Леса, населённые пункты. На диких и культивируемых лилиях и рябчиках. Местами вредит цветоводству.
5071. *Lilioceris merdigera* (Linnaeus, 1758) – Луковая трещалка. Пойменные луга, опушки. В основном на луках.
5072. *Oulema erichsonii* (Suffrian, 1841) Разные биотопы. На злаках. Обычен.
5073. *Oulema melanopus* (Linnaeus, 1758) Открытые биотопы. На злаках. Нечасто.

5074. *Oulema obscura* (Stephens, 1831) (= *gallaeciana* (Heyden, 1870)) – Леса, опушки, болота. На злаках. Обычен.
5075. *Oulema septentrionis* (Weise, 1880). Леса, болота. На злаках. Нечасто.

Подсемейство Synetinae

5076. *Syneta betulae* (Fabricius, 1792). Леса в горных районах. На подлеске. Локален. Бореомонтанный вид.

Подсемейство Zeugophorinae

5077. *Zeugophora scutellaris* Suffrian, 1840. Указан для РБ (Баянов и др., 2015)
5078. *Zeugophora subspinosa* (Fabricius, 1781) – леса. На осине. Нечасто.

Подсемейство Orsodacninae – Пыльцееды

5079. *Orsodacne cerasi* (Linnaeus, 1758) – Желтый листоед. Леса, опушки. На цветах. Обычен

Подсемейство Cryptpcephalinae – Скрытоглавы

Триба Clytrini

5080. *Cheilotoma erythrostoma* Faldermann, 1837. В РБ известен по одному указанию (заповедник «Шульган-Таш», Ю.Е. Михайлов) (Муравицкий, Хабабуллин, 2015). Степной вид.
5081. *Cheilotoma musciformis* (Goeze, 1777). В РБ известен на шихане Тратау (Дедюхин, 2020а; 2025а). Локален и редок.
5082. *Clytra laeviuscula* (Ratzeburg, 1837) – Блестящая клитра. Поймы, опушки дубрав. Местами обычен.
5083. *Clytra quadripunctata* (Linnaeus, 1758) – Четырехточечная клитра. Леса, луга, опушки. Обычен.
5084. *Coptocephala chalybaea apicalis* Lacordaire, 1848. Петрофитные степи. Локален и редок.
5085. *Coptocephala rubicunda rossica* L. Medvedev, 1977. Известен в НП «Башкирия» (Иргизлы) (Бакалова, 2016; Беньковский, Орлова-Беньковская, 2017). Редкий степной вид на границе ареала.
5086. *Coptocephala unifasciata* (Scopoli, 1763) – Четырехпятнистая скрытоголовка. Суходольные луга, степи. Жуки на цветах зонтичных и сложноцветных. Обычен.
5087. *Labidostomis axillaris* (Lacordaire, 1848) (= *lucida axillaris* (Lacordaire, 1848)). Петрофитные степи Белебеевской возвышенности. Отмечен также в Стмк (шихан Юрактау) (Дедюхин, 2025а) и Учлн (Муравицкий, Хабибуллин, 2015). Локален.
5088. *Labidostomis cyanicornis* Germar, 1822. Берега рек. На ивах. Нечасто.
5089. *Labidostomis humeralis* (D. H. Schneider, 1792). Широколиственные леса и опушки. Местами обычен.
5090. *Labidostomis lepida* Lefèvre, 1872. Берега водоёмов. На ивах. Обычен.
5091. *Labidostomis longimana* (Linnaeus, 1761). Луга, степи. На клеверах, шалфеях и др. Обычен.

5092. *Labidostomis pallidipennis* (Gebler, 1830). По берегам водоёмов и в степях. Спорадичен.
5093. *Labidostomis sibirica* (Germar, 1824). Сибирский вид. В РБ известен только на Урале (заповедник «Шульган-Таш») (Mikhailov, 2000).
5094. *Labidostomis tridentata* (Linnaeus, 1758). Леса. На березе. Редок.
5095. *Smaragdina affinis* (Illiger, 1794). Пойменные леса. На ольхе. Редок.
5096. *Smaragdina flavicollis* (Charpentier, 1825). Пойменные леса. На ольхе. Редко.
5097. *Smaragdina salicina* (Scopoli, 1763). Пойменные луга, опушки лесов. Местами обычен.

Триба Cryptocephalini

5098. *Cryptocephalus* (*Sopidus*) *apicalis* Gebler, 1830. Степи и пустыри. На *Artemisia austriaca*.
5099. *Cryptocephalus* (*Sopidus*) *flavicollis* Fabricius, 1781. Петрофитные и петрофитно-кустарниковые степи. Локален, но местами обычен. Только в южной половине РБ.
5100. *Cryptocephalus* (*Sopidus*) *quatuordecimmaculatus* D. H. Schneider, 1792. Заросли степных кустарников. Редок. Известен по немногим находкам на Урале (ЗШТ) и в Предуралье (Альш, пос. Аксеново) (Bieńkowski, 2004; Муравицкий, Хабибуллин, 2015).
5101. *Cryptocephalus* (*Lamellosus*) *laevicollis* Gebler, 1830 – Блестящий скрытоглав. Кустарниковые степи и опушки широколиственных лесов. Нередок.
5102. *Cryptocephalus* (*Protophysus*) *schaefferi* Schrank, 1789. Кустарниковые степи и опушки широколиственных лесов. Обычен.
5103. *Cryptocephalus* (*Disopus*) *pini* (Linnaeus, 1758) – Сосновый скрытоглав. Очень редок. Приведен для НП «Башкирия» (Бакалова, 2016).
5104. *Cryptocephalus* (*Homalopus*) *coryli* (Linnaeus, 1758) – Лещинный скрытоглав. Леса. На лещине, реже на березе и ольхе.
5105. *Cryptocephalus* (*Cryptocephalus*) *anticus* Suffrian, 1848. Открытые биотопы. Обычен.
5106. *Cryptocephalus* (*Cryptocephalus*) *aureolus* Suffrian, 1847. Луга. Редок.
5107. *Cryptocephalus* (*Cryptocephalus*) *bameuli* Duhaldeborde, 1999. Степи, луга. Обычен.
5108. *Cryptocephalus* (*Cryptocephalus*) *biguttatus* (Scopoli, 1763) – Двупятнистый скрытоглав. Луга. Редок.
5109. *Cryptocephalus* (*Cryptocephalus*) *biguttulatus* (Gebler, 1841) – Лиственничный скрытоглав. Учлн (гора Калкантау) (Дедюхин, 2020б, Красная книга, 2025).
5110. *Cryptocephalus* (*Cryptocephalus*) *bipunctatus* (Linnaeus, 1758) – Двухточечный скрытоглав. Опушки, луга, дубравы. Обычен.
5111. *Cryptocephalus* (*Cryptocephalus*) *caerulescens* C. R. Sahlberg, 1839. Леса. На березах. Редок.
5112. *Cryptocephalus* (*Cryptocephalus*) *cordiger* (Linnaeus, 1758). Широколиственые леса. Нередок.

5113. *Cryptocephalus* (*Cryptocephalus*) *flavipes* Fabricius, 1781. В основном леса и опушки. Обычен.
5114. *Cryptocephalus* (*Cryptocephalus*) *janthinus* Germar, 1823. Поймы рек. Локален. На дербеннике (*Lythrum*).
5115. *Cryptocephalus* (*Cryptocephalus*) *krutovskyi krutovskyi* Jacobson, 1900. Арктоальпийский вид. Реликт. Гора Большой Иремель (Guśkova, 2008).
5116. *Cryptocephalus* (*Cryptocephalus*) *laetus* Fabricius, 1792. Луга, степи. Летом на цветах.
5117. *Cryptocephalus* (*Cryptocephalus*) *moraei* (Linnaeus, 1758). Открытые биотопы. На зверобое (*Hypericum*).
5118. *Cryptocephalus* (*Cryptocephalus*) *nitidulus* Fabricius, 1787. В РБ известен в ЗШТ (сбор Ю.Е. Михайлова) (Муравицкий, Хабибуллин, 2015).
5119. *Cryptocephalus* (*Cryptocephalus*) *nitidus* (Linnaeus, 1758). "Уфа, берег р. Белой, на иве, редок" (Муравицкий, Хабибуллин, 2015).
5120. *Cryptocephalus* (*Cryptocephalus*) *octopunctatus* (Scopoli, 1763) – Восьмиточечный скрытоглав. Леса. На лиственных деревьях. Обычен.
5121. *Cryptocephalus* (*Cryptocephalus*) *parvulus* O. F. Muller, 1776. "Уфа, побережье р.Белая, на шиповнике" (Муравицкий, Хабибуллин, 2015). По нашим данным, связан преимущественно с березой.
5122. *Cryptocephalus* (*Cryptocephalus*) *quadriguttatus* C. F. W. Richter, 1820 – Четырехпятнистый скрытоглав. Луга. На клевере. Редок.
5123. *Cryptocephalus* (*Cryptocephalus*) *quinquepunctatus* (Scopoli, 1763) – Пятиточечный скрытоглав. Поймы рек. Указан для Уфы (долина р. Белой) и ЗШТ (Муравицкий, Хабибуллин, 2015). В основном, на ивах и тополе. Локален.
5124. *Cryptocephalus* (*Cryptocephalus*) *sericeus* (Linnaeus, 1758) – Шелковистый скрытоглав. Открытые биотопы. На цветах. Обычен.
5125. *Cryptocephalus* (*Cryptocephalus*) *sexpunctatus* (Linnaeus, 1758) – Шеститочечный скрытоглав. Леса, поймы. На ивах и березах. Редок.
5126. *Cryptocephalus* (*Cryptocephalus*) *solivagus* Leonardi & Sassi, 2001. Открытые биотопы. На цветах. Нередок.
5127. *Cryptocephalus* (*Cryptocephalus*) *violaceus* Laicharting, 1781 – Синий скрытоглав. Степи. Обычен.
5128. *Cryptocephalus* (*Cryptocephalus*) *virens* Suffrian, 1847 – Зеленоватый скрытоглав. Степи. Нередко.
5129. *Cryptocephalus* (*Burlinius*) *bilineatus* (Linnaeus, 1767) – Двуполосый скрытоглав. Открытые биотопы. На сложноцветных. Обычен.
5130. *Cryptocephalus* (*Burlinius*) *elegantulus* Gravenhorst, 1807. Степи. На полынях (*Artemisia*). Обычен
5131. *Cryptocephalus* (*Burlinius*) *frontalis* Marsham, 1802. Поймы, опушки лесов. Редок.
5132. *Cryptocephalus* (*Burlinius*) *fulvus* (Goeze, 1777). Открытые биотопы. Обычен.
5133. *Cryptocephalus* (*Burlinius*) *labiatus* (Linnaeus, 1761). Леса. Редок.

5134. *Cryptocephalus* (*Burlinius*) *ocellatus* Drapiez, 1819 – Глазчатый скрытоглав. Поймы. На ивах. Местами обычен.
5135. *Cryptocephalus* (*Burlinius*) *planifrons* Weise, 1882. Луга, кустарниковые степи. Локален.
5136. *Cryptocephalus* (*Burlinius*) *populi* Suffrian, 1848 – Тополёвый скрытоглав. На подросте тополя и осины. Редок.
5137. *Cryptocephalus* (*Burlinius*) *pusillus* Fabricius, 1777 – Крошечный скрытоглав. Пойменные и заболоченные леса. На ивах и ольхе. Нередок.
5138. *Cryptocephalus* (*Burlinius*) *pygmaeus vittula* Suffrian, 1848. Петрофитные степи на шихане Тратау (Дедюхин, 2020a, 2025a). Редок.
5139. *Cryptocephalus* (*Burlinius*) *querceti* Suffrian, 1848. Широколиственные леса. Нечасто.

Триба Pachybrachini

5140. *Pachybrachis fimbriolatus* (Suffrian, 1848). Степи и рудеральные биотопы. Обычен.
5141. *Pachybrachis hieroglyphicus* (Laicharting, 1781). Берега рек. На ивах.
5142. *Pachybrachis scriptidorsum* Marseul, 1875. Пойменные луга. Редок.
5143. *Pachybrachis tesselatus* (Olivier, 1792). Опушки лесов и кустарниковые заросли. На жостере (*Rhamnus*) и подросте дуба. Местами обычен.

Подсемейство Eumolpinae

5144. *Bromius obscurus* (Linnaeus, 1758). Нарушенные местообитания. На иван-чае. Обычен.
5145. *Pachnephorus pilosus* (P. Rossi, 1790). Обнажения, пустыри. На сложноцветных.
5146. *Pachnephorus tessellatus* (Duftschmid, 1825). Склоны, берега рек. На сложноцветных. Местами обычен.

? *Chrysochares asiaticus* (Pallas, 1771). Жуки без географических этикеток из коллекции зоологического музея БашГУ и БГАУ (Муравицкий, Хабибуллин, 2015), поэтому отнесение этих сборов к РБ некорректно. Ближайшие достоверные находки вида относятся к Саратовской, Волгоградской и Самарской (Жигули) областям.

5147. *Chrysochus asclepiadeus* (Pallas, 1773). Петрофитные степи, каменистые осыпи. На ластовнях. Локален

Подсемейство Chrysomelinae

Триба Chrysolinini

5148. *Chrysolina* (*Anopachys*) *asclepiadis bohemica* J. Müller, 1948. Разнотравные и кустарниковые степи. Редок и локален.
5149. *Chrysolina* (*Anopachys*) *aurichalcea* (Gebler, 1825). Рудеральные места. На чернобыльнике (*Artemisia vulgaris*). Редок.
5150. *Chrysolina* (*Anopachys*) *relucens* (Rosenhauer, 1847). В РБ этот арктоальпийский вид известен из высокогорий Большого и Малого Иремеля (Михайлов, Ермаков, 2016), а также указан по одной находке в Уфе (Муравицкий, Хабибуллин, 2015).

5151. *Chrysolina* (*Arctolina*) *poretzkyi* (Jacobson, 1897) – Высокогорно-предгорный реликт и субэндемик Южного Урала. В РБ представлен двумя подвидами. Номинативный подвид известен по единичным находкам на петрофитно-степных участках в предгорьях и низкогорьях: в ЗШТ (Иргизлы), в Нурм и близ пос. Магинск.

Ch. p. olschwangi Mikhailov, 2018 – высокогорный подвид известен с вершин Малого и Большого Иремеля (Михайлов, 2018). Включен в Красную книгу РБ (2025).

5152. *Chrysolina* (*Chalcoidea*) *marginata* (Linnaeus, 1758). Открытые биотопы. На сложноцветных. Обычен.

5153. *Chrysolina* (*Chalcoidea*) *songarica* (Gebler, 1842) (=*circumducta* Ménétriés, 1848). Как *Ch. circumducta* был описан по сборам А.А. Лемана 1840–1841 гг. с этикеткой "Bashkiria". Точное типовое местонахождение не известно. В настоящее время в сопредельных регионах достоверно известен только в Оренбургской обл. (Дедюхин, 2016а).

5154. *Chrysolina* (*Chrysolina*) *staphylaea* (Linnaeus, 1758) – Рыжий листоед. Тенистые влажные биотопы. Обычен.

5155. *Chrysolina* (*Chrysomorpha*) *cerealis* (Linnaeus, 1767) – Радужный листоед. Степи (в основном петрофитные). Преимущественно на тимьянах. Локален, но местами нередок.

5156. *Chrysolina* (*Colaphosoma*) *sturmi* (Westhoff, 1882). Поймы, влажные леса, опушки. Связан с будрой (*Glechoma*). Обычен.

5157. *Chrysolina* (*Crositops*) *roddi* (Jacobson, 1897) – реликт и субэндемик Южного Урала. Представлен предгорной (ЗШТ, Иргизлы) и высокогорной (гора Большой Иремель) формами (Михайлов, 2018). Включен в Красную книгу РБ (2025).

5158. *Chrysolina* (*Erythrochrysa*) *polita* (Linnaeus, 1758). Поймы, окраины болот. На губоцветных (мята, зюзник). Обычен.

5159. *Chrysolina* (*Euchrysolina*) *graminis* (Linnaeus, 1758) – Травяной листоед. Высокотравные поймы. Локален, но местами обычен.

5160. *Chrysolina* (*Fasta*) *fastuosa* (Scopoli, 1763). Леса и открытые биотопы (кроме степей). На яснотке, пикульнике, пустырнике. Обычен.

5161. *Chrysolina* (*Hypericia*) *cuprina* (Duftschmid, 1825). Остепнённые луга, на зверобое. Приведен для НП «Башкирия» (Беньковский, 2011) и Уфы (Муравицкий, Хабибуллин, 2015).

5162. *Chrysolina* (*Hypericia*) *geminata* (Paykull, 1799). Луга, опушки. На зверобое. Нередок.

5163. *Chrysolina* (*Hypericia*) *hyperici* (Forster, 1771) – Зверобойный листоед. Открытые биотопы. На зверобое. Очень редок.

5164. *Chrysolina* (*Ovosoma*) *susterai* Bechyne, 1950. Степи. Связан с полынями, но жуки обычно попадаются на почве. Редок.

5165. *Chrysolina* (*Pleurosticha*) *lagunovi* Mikhailov, 2006. Эндемик высокогорий Урала. В РБ обитает только на горах Большой и Малый Иремель. Связан с

ветреницей пермской (Михайлов, Ермаков, 2016). Включен в Красную книгу РБ (2025).

5166. *Chrysolina* (*Sphaeromela*) *varians* (Schaller, 1783). Опушки лесов, влажные луга. На зверобое. Локален, но местами обычен.

5167. *Chrysolina* (*Stichoptera*) *sanguinolenta* (Linnaeus, 1758). Открытые биотопы. На льнянке. Нередок.

? *Chrysolina* (*Sulcicollis*) *oricalcia* (O. F. Müller, 1776). Старое указание для "Уфы" (Линдеман, 1871: цит. по Козьминых, 2017) следует считать ошибочным.

5168. *Chrysolina* (*Synerga*) *herbacea* (Dutfschmid, 1825). Берега водоёмов, ольшаники. На мяте.

5169. *Chrysolina* (*Thaeniosticha*) *pseudolurida* (Roubal, 1917). Степи и остепнённые луга. Редок.

5170. *Chrysolina* (*Zeugotaenia*) *limbata limbata* (Fabricus, 1775). Открытые биотопы. На подорожниках. В регионе этот подвид указан для Зауралья (Учлн) (Беньковский, Орлова-Беньковская, 2017).

Chrysolina (*Zeugotaenia*) *limbata russiella* Bieńkowski & Orlova-Bienkowskaya, 2011. Лесостепной подвид. Отмечен на шихане Юрактау (Дедюхин, 2025а).

5171. *Leptinotarsa decemlineata* (Say, 1824) – Колорадский жук. Адвентивный вид. Первостепенный вредитель картофеля.

5172. *Oreina caerulea* (Olivier, 1791). Реликтовый европейский вид. На васильках в низкогорных и предгорных ландшафтах. Локален.

Триба Entomoscelini

5173. *Colaphellus hoeftii* (Ménétriés, 1832). Рудеральные места, выгоны в степях. На крестоцветных. Обычен.

5174. *Entomoscelis adonidis* (Pallas, 1771) – Рапсовый листоед. Рудеральные биотопы, нарушенные степи. Обычен.

5175. *Entomoscelis dorsalis bashkiriae* Kippenberg, 2020. Степи. Монофаг на горицвете (*Adonis vernalis*). Локален. Южноуральский подвид евро-сибиро-центральноазиатского вида с разорванным ареалом. В РБ лесостепь Предуралья и Зауралья (Kippenberg, Mikhailov, 2020).

5176. *Entomoscelis sacra* Linnaeus, 1758 (= *suturalis* Weise, 1882). Открытые биотопы. Редок. Указан для Уфы и Туйм (Хабибуллин, 2025б).

Триба Chrysomelini

5177. *Chrysomela* (*Chrysomela*) *populi* (Linnaeus, 1758) – Тополёвый листоед. Леса, поймы, населённые пункты. На подросте тополя и осины. Обычен.

5178. *Chrysomela* (*Chrysomela*) *saliceti* Suffrian, 1851 – Ивовый листоед. Леса, берега. На ивах.

5179. *Chrysomela* (*Chrysomela*) *tremulae* Fabricius, 1787 – Осиновый листоед. Леса. На осине.

5180. *Chrysomela* (*Strickerus*) *cuprea* Fabricius, 1775 – Медный листоед. Очень редок. На тополе.

5181. *Chrysomela* (*Strickerus*) *lapponica* (Linnaeus, 1758) – Лапландский листоед. Локален и редок. Известен только на Урале: НП «Башкирия» (Иргизлы) и гора Большой Иремель. На березе (в высокогорьях) и иве (Беньковский, Орлова-Беньковская, 2017; Михайлов, 2020).
5182. *Chrysomela* (*Strickerus*) *vigintipunctata* Scopoli, 1763 – Двадцатиточечный листоед. Берега рек. На ивах. Местами обычен.
5183. *Gastrophysa polygoni* (Linnaeus, 1758). Открытые биотопы. На горце (*Polygonum*). Обычен.
5184. *Gastrophysa viridula* (De Geer, 1775). Пойменные луга. На конском щавеле. Местами обычен.
5185. *Hydrothassa marginella* (Linnaeus, 1758). Сырые луга. На лютиках. Местами нередок.
5186. *Phaedon armoraciae* (Linnaeus, 1758). Берега водоёмов. На околоводных вероникax. Указан также на подорожнике (Муравицкий, Хабибуллин, 2015).
5187. *Phaedon cochleariae* (Fabricius, 1792). Влажные травянистые биотопы, огороды. На крестоцветных. Обычен.
5188. *Phaedon laevigatus* (Duftschmid, 1825). Тенистые берега рек. Редок.
5189. *Phratora atrovirens* (Cornelius, 1857). Леса. На осине и ивах. Редок.
5190. *Phratora laticollis* (Suffrian, 1851). Леса, берега рек. На осине. Нечасто.
5191. *Phratora vitellinae* (Linnaeus, 1758). Берега рек. На ивах. Обычен.
5192. *Phratora vulgatissima* (Linnaeus, 1758). Берега рек, леса. На ивах. Обычен.
5193. *Plagiodera versicolora* (Laicharting, 1781). Берега рек, леса. На ивах и ольхе. Обычен.
5194. *Plagiosterna aenea* (Linnaeus, 1758). Урёмные леса. На ольхе. Обычен.
5195. *Prasocuris phellandrii* (Linnaeus, 1758). Водоёмы и их берега. На зонтичных и водных лютиках. Нечасто.

Триба Gonioctenini

5196. *Cercyonops caraganae* (Gebler, 1823) – Арктоальпийский вид. Плейстоценовый реликт. Приведен с горных тундр Большого Иремеля (Ольшванг, 1986).
5197. *Gonioctena* (*Gonioctena*) *decemnotata* (Marsham, 1802). Леса. На осине. Нечасто.
5198. *Gonioctena* (*Gonioctena*) *flavicornis* (Suffrian, 1851). Бореомонтанный вид. В РБ известен только на Урале (заповедник «Шульган-Таш») (Mikhailov, 2000).
5199. *Gonioctena* (*Gonioctena*) *linnaeana* (Schrank, 1781). Берега рек. На узколистных ивах. Местами обычен.
5200. *Gonioctena* (*Gonioctena*) *viminalis* (Linnaeus, 1758). Опушки лесов. На ивах. Нечаст.
5201. *Gonioctena* (*Goniomena*) *pallida* (Linnaeus, 1758) – Бледный листоед. Указан для РБ (Баянов и др., 2015).
5202. *Gonioctena* (*Goniomena*) *quinquepunctata* (Fabricius, 1787). Леса. На рябине и черемухе. Обычен. Местами дает очаги массового размножения.

Подсемейство Galerucinae – Козявки

Надтриба Galerucitae – Козявки

Триба Sermylini

5203. *Agelastica alni* (Linnaeus, 1758) – Ольховая козявка. Урёмные леса, берега рек. На ольхе. Обычен.
5204. *Sermylassa halensis* (Linnaeus, 1767). Степи. Очень редок. Известны единичные находки в НП «Башкирия», на шихане Юрактау и близ Уфы (Муравицкий, Хабибуллин, 2015; Беньковский, Орлова-Беньковская, 2017; Дедюхин, 2025а).

Триба Galerucini

5205. *Galeruca dahlii* (Joannis, 1866). Луга. На васильках. Спорадичен (Муравицкий, Хабибуллин, 2015).
5206. *Galeruca jucunda* (Faldermann, 1837) (= *interrupta circumdata* Duftschmid, 1825). Петрофитные степи и скалы, прирусловые пески. В подходящих местообитаниях – по всей территории РБ
5207. *Galeruca laticollis* Sahlberg, 1837. Высокотравные луга, заболоченные места, на василистнике.
5208. *Galeruca pomonae* (Scopoli, 1763). Открытые биотопы. Обычен.
5209. *Galeruca tanaceti* (Linnaeus, 1758). Эврибионт. Полифаг. Очень обычен.
5210. *Galerucella* (*Galerucella*) *grisescens* (Joannis, 1865). Болота, заболоченные леса. На вербейнике. Локален
5211. *Galerucella* (*Galerucella*) *nymphaeae* (Linnaeus, 1758) – Кувшинковая козявка. Водоёмы. На кувшинках и кубышках. Обычен.
5212. *Galerucella* (*Neogalerucella*) *calmariensis* (Linnaeus, 1767). Поймы. На дербеннике.
5213. *Galerucella* (*Neogalerucella*) *lineola* (Fabricius, 1781). Леса, поймы. На ивах. Обычен.
5214. *Galerucella* (*Neogalerucella*) *pusilla* (Duftschmid, 1825). Поймы. На дербеннике. Обычен.
5215. *Galerucella* (*Neogalerucella*) *tenella* (Linnaeus, 1761). Луга, опушки. На розоцветных. Часто.
5216. *Lochmaea caprea* (Linnaeus, 1758) – Ивовая козявка. Леса, болота, берега. На ивах. Обычен.
5217. *Pallasiola absinthii* (Pallas, 1773) – Полынная козявка. Степи, каменистые осыпи. На полыни. Локален. Только на востоке и юге РБ.
5218. *Pyrrhalta viburni* (Paykull, 1799) – Калиновая козявка. Леса, приусадебные участки. Местами сильно повреждает калину.
5219. *Xanthogaleruca luteola* (O. F. Müller, 1766). Широколиственные леса. На вязах. Нечасто.

Триба Luperini

5220. *Calomicrus pinicola* (Duftschmid, 1825). Единожды собран на опушке соснового леса на окраине Уфы (Муравицкий, Хабибуллин, 2015).
5221. *Exosoma collare* (Hummel, 1825). Локален. Собран на шихане Тратау (Дедюхин, 2025а).

5222. *Luperus flavipes* (Linnaeus, 1767). Леса и опушки. Обычен.
5223. *Luperus kiesenwetteri* Joannis, 1865. Петрофитные степи на Стерлитамакских шиханах (Дедюхин, 2025а).
5224. *Luperus longicornis* (Fabricius, 1781). Собран близ Уфы на вязе (Муравицкий, Хабибуллин, 2015).
5225. *Luperus luperus* (Sulzer, 1776). Отмечен на Стерлитамакских шиханах (Дедюхин, 2025а).
5226. *Luperus viridipennis* Germar, 1824. Указан для Уфы (Хабибуллин, 2022).
5227. *Luperus xanthopoda* (Schrank, 1781). Берега рек, урёмные леса. На вязах, реже на ивах.
5228. *Phyllobrotica quadrimaculata* (Linnaeus, 1758). Болота, берега водоёмов. На шлемнике. Локален.
5229. *Theone silphoides* (Dalman, 1823). Отмечен только в Зауралье на юго-востоке РБ (Хайб, М.Д. Каскинова) (Хабибуллин, 2018б). Степной вид.

Надтриба Alticitae – Блошки

5230. *Altica aenescens* (Weise, 1888). Леса. На молодых березах. Локально.
5231. *Altica brevicollis* Foudras, 1860. Широколиственные леса. На лещине. В Предуралье и на западном макросклоне Урала местами обычен.
5232. *Altica carduorum* Guerin-Meneville, 1858. “Уфа, обочины дорог, на чертополохах, май-июнь, обычна.” (Муравицкий, Хабибуллин, 2015).
5233. *Altica helianthemi* (Allard, 1859). Пойменные луга. На кровохлебке. Местами обычен.
5234. *Altica lythri* Aube, 1843. Заболоченные биотопы, берега ручьев. На кипрее (*Lythrum*).
5235. *Altica oleracea* (Linnaeus, 1758). Эвритопный вид. В основном на кипрейных. Часто.
5236. *Altica palustris* (Weise, 1888). Влажные луга. На дербейнике. Местами в массе.
5237. *Altica quercetorum* Foudras, 1860 – Дубовая блошка. Дубравы, городские парки. На дубе, редко на ивах. Обычен.
5238. *Altica tamaricis* Schrank, 1785. Берега рек. На подросте ив и тополя черного. Многочислен.
5239. *Aphthona abdominalis* (Duftschmid, 1825). Открытые биотопы. На молочаях (*Euphorbia*).

– *Aphthona aeneomicans* Allard, 1875. Указание для РБ (Дедюхин, 2015) основано на ошибочном определении.

5240. *Aphthona beckeri* Jacobson, 1896. Степи, остепнённые луга, рудеральные места. На *Euphorbia virgata*.
5241. *Aphthona czwalinai* Weise, 1888. Степи, остепнённые луга, обочины дорог, опушки дубрав. В основном на *Euphorbia virgata*, изредка – на *E. semivillosa*. Обычен.
5242. *Aphthona euphorbiae* (Schrank, 1781). Остепнённые луга, опушки лесов. На молочае (*Euphorbia*).

5243. *Aphthona franzi* Heikertinger, 1944. Локально в петрофитных и каменисто-песчаниковых степях Бугульминской возвышенности и Предуралья. На *Euphorbia seguieriana*.
5244. *Aphthona gracilis* Faldermann, 1837. На степных склонах, редко в рудеральных местах. На *Euphorbia virgata*.
5245. *Aphthona kuntzei* Roubal, 1931. Степные склоны. На *Asparagus*. Локален и редок.
5246. *Aphthona lutescens* (Gyllenhal, 1808). Сырые луга, берега водоёмов, болота. На дербеннике (*Lythrum salicaria*), лабазнике (*Filipendula ulmaria*) и сабельнике (*Comarum palustre*). Обычен.
5247. *Aphthona nigriscutis* Foudras, 1860. Луга, степи, обнажения. На *Euphorbia virgata*. Обычен.
5248. *Aphthona nonstriata* Goeze, 1777. Влажные луга, берега стариц, населённые пункты, редко – степи. На ирисах. Обычен.
5249. *Aphthona ovata* Foudras, 1860. Опушки лесостепных дубрав и разнотравно-ковыльные степи. В основном на *Euphorbia semivillosum*. Редок.
5250. *Aphthona pallida* (Bach, 1856). Луга, опушки и луговые степи. На геранях. Обычен.
5251. *Aphthona placida* (Kutschera, 1864). На обнажениях известняка и в каменистых степях на *Linum flavum* и *L. uralense*. Локален.
5252. *Aphthona pygmaea* (Kutschera, 1861). Степные склоны, рудеральные места. На *Euphorbia virgata*.
5253. *Aphthona tolli* Ogloblin, 1926. Сибирский степной вид, найден в петрофитной степи в Давлекановском р-не (Уртатау) (Дедюхин, 2014).
5254. *Aphthona violacea* (Koch, 1803). Единожды в пойме р. Дёмы (Раевский) серия экземпляров собрана на открытом низинном болоте на *Euphorbia palustris* (Дедюхин, 2014).
5255. *Batophila fallax* Weise, 1888. Луга, опушки, агроценозы. На малине, землянике, ежевике, гравилате, шиповнике. Обычен.
5256. *Batophila rubi* (Paykull, 1799). Леса, заболоченные луга, агроценозы. В основном на малине, но также на других розоцветных. Обычен.
5257. *Chaetocnema aerosa* (Letzner, 1846). Берега водоёмов, низинные болота. На болотнице (*Eleocharis*). Редок.
5258. *Chaetocnema aridula* (Gyllenhal, 1827) – Большая стеблевая хлебная блошка. Открытые биотопы. На злаках. Часто.
5259. *Chaetocnema breviuscula* (Faldermann, 1837) – Южная свекловичная блошка. Открытые биотопы. На маревых. Часто.
5260. *Chaetocnema compressa* (Letzner, 1847). Луга, луговые степи, редко околоводная растительность. В основном встречается на чертополохах, изредка – на *Eleocharis palustris*.
5261. *Chaetocnema concinna* (Marsham, 1802) – Гречишная блошка. Открытые биотопы. На гречишных. Часто.

5262. *Chaetocnema hortensis* (Geoffroy, 1785) – Стеблевая хлебная блошка. Открытые биотопы. На злаках. Многочислен.
5263. *Chaetocnema mannerheimii* (Gyllenhal, 1827). Берега водоёмов. На околоводных злаках, в частности, на тростнике. Обычна.
? Chaetocnema montenegrina Heikertinger,1912. Все указания для Башкирии (Константинов, 1988; Bieńkowski, 2004; Чащина, 2008) этого вида требуют подтверждения, так как основаны на недостоверных данных из диссертации В.И. Шутака (1975). Ближайшие достоверные находки относятся к Пензенской и югу Саратовской областей (Беньковский, Орлова-Беньковская, 2017).
5264. *Chaetocnema obesa* (Boieldieu, 1859). Берега водоёмов. На *Eleocharis palustris*. Нередко.
5265. *Chaetocnema picipes* Stephens, 1831 (= *laevicollis* (C. G. Thomson, 1866)). Влажные биотопы. На гречишных. Обычен.
5266. *Chaetocnema sahlbergii* (Gyllenhal, 1827). ЗШТ и НП «Башкирия» (Чащина, 2008). Бореальный вид.
5267. *Chaetocnema semicoerulea* (Koch, 1803). Берега водоёмов. На ивах. Обычен.
5268. *Crepidodera aurata* (Marsham, 1802) – Золотистая блошка. Разные биотопы. На ивах. Обычен.
5269. *Crepidodera aurea* (Geoffroy, 1785). Указан для РБ (Баянов и др., 2015).
5270. *Crepidodera fulvicornis* (Fabricius, 1792). Разные биотопы. На ивах. Обычен.
5271. *Crepidodera lamina* (Bedel, 1901). Разреженные леса на склонах. На подросте осины. Локален и редок.
5272. *Crepidodera nitidula* (Linnaeus, 1758) – Осокоревая блошка. Поймы рек, населённые пункты. На тополях, реже – на осинах и ивах. Обычен.
5273. *Crepidodera plutus* (Latreille, 1804). Берега крупных рек. На ивах, реже тополях. Локален, но местами обычен.
5274. *Derocrepis rufipes* (Linnaeus, 1758). Леса, поляны. На бобовых. Многочислен весной на *Lathyrus vernus*.
5275. *Dibolia* (*Dibolia*) *cryptocephala* (Koch, 1803). Степи. На тимьянах. Локален и редок. В РБ пока известен только на Стерлитамакских шиханах.
5276. *Dibolia* (*Dibolia*) *cynoglossi* (Koch, 1803). Отмечен на петрофитном склоне шихана Тратау на зопнике (*Phlomoides tuberosa*) (Дедюхин, 2025a).
5277. *Dibolia* (*Dibolia*) *depressiuscula* Letzner, 1847. Указан на опушках на веронике широколиственной (*Veronica teucrium*) (Муравицкий, Хабибуллин, 2015).
5278. *Dibolia* (*Dibolia*) *foersteri* Bach, 1859. Отмечен по берегам водоёмов, на губоцветных (Муравицкий, Хабибуллин, 2015).
5279. *Dibolia* (*Dibolia*) *rugulosa* L. Redtenbacher, 1848. Степи, опушки дубрав. На чистеце прямом (*Stachys recta*). Местами нередок.
5280. *Dibolia* (*Eudibolia*) *carpathica* Weise, 1893. Степи, обнажения известняка. На котовниках (*Nepeta nuda*, *N. cataria*). Местами обычен.

5281. *Dibolia* (*Eudibolia*) *femoralis* Redtenbacher, 1849. Приведен для территории НП «Башкирия»: “Иргизлы, Лысая гора, травяной склон под камнями 29.07.2000” (Беньковский, Орлова-Беньковская, 2017).
5282. *Dibolia* (*Eudibolia*) *metallica* (Motschulsky, 1845). Степи, опушки. На шалфеях. Нередко.
5283. *Epitrix caucasica* (Heikertinger, 1950). Замусоренные места в черте Уфы, луга, в местах произрастания белены. Обычен (Муравицкий, Хабибуллин, 2015).
5284. *Epitrix pubescens* (Koch, 1803). Берега водоёмов, болота. На пасленах. Обычен.
5285. *Hippuriphila modeeri* (Linnaeus, 1761). Берега водоёмов, болота. На хвощах. Обычен.
5286. *Longitarsus albineus* (Foudras, 1860). Указан для Уфы. На пустырнике в августе (Муравицкий, Хабибуллин, 2015).
5287. *Longitarsus alfierii furthi* Gruev, 1982. Склоны, скальные известняковые обнажения. На котовниках. Локален. В РБ известен только на Стерлитамакских шиханах.
5288. *Longitarsus anchusae* (Paykull, 1799). Открытые биотопы. На бурачниковых. Обычен.
5289. *Longitarsus aphthonoides* Weise, 1887. Берега водоёмов. На мяте. Локален и редок.
5290. *Longitarsus apicalis* (Beck, 1817). Суходольные луга, разнотравные степи. На васильках.
5291. *Longitarsus atricillus* (Linnaeus, 1761). Открытые биотопы. Нечасто.
5292. *Longitarsus ballotae* (Marsham, 1802). Указан для Уфы. Луга, на зопнике (Муравицкий, Хабибуллин, 2015).
5293. *Longitarsus brunneus* (Duftschmid, 1825). Луга, разнотравные степи. На лютиковых. Обычен.
5294. *Longitarsus celticus* Leonardi, 1975. Степи. На чистеце прямом (*Stachys recta*). Локален.
5295. *Longitarsus curtus* (Allard, 1861). В РБ известен только в каменистой степи на шихане Юрактау (Дедюхин, 2025a).
5296. *Longitarsus exsoletus* (Linnaeus, 1758). Степные склоны, рудеральные биотопы. На бурачниковых. Нередок.
5297. *Longitarsus fulgens* (Foudras, 1860). Влажные места. На мяте (Муравицкий, Хабибуллин, 2015).
5298. *Longitarsus ganglbaueri* Heikertinger, 1912. Луга, опушки, каменистые степи. На крестовниках. Спорадичен.
5299. *Longitarsus holsaticus* (Linnaeus, 1758). Сырые луга, низинные болота. На вероникax. Редок.
5300. *Longitarsus jacobaeae* (C. R. Waterhouse, 1861). Луга, разнотравные и ковыльные степи. на крестовнике Якова (*Senecio jacobaea*).
5301. *Longitarsus lewisii* (Baly, 1874). Луга, обочины. На подорожнике. Обычен.

5302. *Longitarsus longiseta* Weise, 1889. Пойменные луга. На вероника длиннолистной (*Veronica longifolia*). Редко.
5303. *Longitarsus luridus* (Scopoli, 1763). Открытые биотопы. На лютиковых, сложноцветных и др. Обычен.
5304. *Longitarsus lycopi* (Foudras, 1860). Берега водоёмов. На мяте и зюзнике. Обычен.
5305. *Longitarsus medvedevi* Shapiro, 1956. Луга, опушки дубрав, разнотравные степи. На вероникаx. Обычен.
5306. *Longitarsus melanocephalus* (De Geer, 1775). Рудеральные места, обнажения. На подорожнике. Нередко.
5307. *Longitarsus minimus* Kutschera, 1863. Указан для Уфы. Луга, на кровохлебке, обычен (Муравицкий, Хабибуллин, 2015).
5308. *Longitarsus monticola* Kutschera, 1864. Нагорные леса. В РБ известен на шихане Куштау и НП «Башкирия». Локален и редок.
5309. *Longitarsus nasturtii* (Fabricius, 1792). Открытые биотопы. На бурачниковых. Обычен.
5310. *Longitarsus nigrofasciatus* (Goeze, 1777). Луга, степи. На коровяках. Нередко.
5311. *Longitarsus noricus* Leonardi, 1976. Поймы, рудеральные места. В основном, на пижме. Обычен.
5312. *Longitarsus obliteratus* (Rosenhauer, 1847). Степи, скальные выходы, остепнённые луга. На душице и тимьянах. Местами обычен.
5313. *Longitarsus parvulus* (Paykull, 1799). Опушки сосняков, агроценозы. На *Euphorbia* и *Linum*.
5314. *Longitarsus pellucidus* (Foudras, 1860). Берега водоёмов и степные склоны. На повое и вьюнке. Редко.
5315. *Longitarsus pratensis* (Panzer, 1794). Рудеральные места. На подорожниках. Обычен.
5316. *Longitarsus quadriguttatus* (Pontoppidan, 1763). В РБ отмечен только на осыпи шихана Тратау на чернокорне (Дедюхин, 2025a).
5317. *Longitarsus rubiginosus* (Foudras, 1860). Берега водоёмов, склоны, рудеральные и сегетальные биотопы. На вьюнке и повое. Обычен.
5318. *Longitarsus salviae* Gruev, 1975. Степи, остепнённые опушки дубрав. На *Salvia tesquicola*. Локален, но местами на кормовом растении бывает обычен.
5319. *Longitarsus* sp. Известняковые обнажения шихана Тратау. На оносме.
5320. *Longitarsus succineus* (Foudras, 1860). Степи, суходолы, рудеральные места. На полынях и других сложноцветных. Обычен.
5321. *Longitarsus suturellus* (Duftschmid, 1825). Берега рек, рудеральные биотопы, газоны. На белокопытнике, мать-и-мачехе, одуванчике и др. Обычен.
5322. *Longitarsus symphyti* Heikertinger, 1912. Указан для Уфы. Пойма в местах произрастания окопника (*Symphytum officinale*) (Муравицкий, Хабибуллин, 2015).
5323. *Longitarsus tabidus* (Fabricius, 1775). Открытые биотопы. На коровяках. Часто.

5324. *Longitarsus violentus* Weise, 1893. Петрофитные степи, обнажения известняка. На оносме. Локален.
5325. *Longitarsus weisei* Guillebeau, 1895. Собран во влажном лесу на медунице (Дедюхин, 2025а). Редок.
5326. *Lythraria salicariae* (Paykull, 1800). Поймы, болота. На вербейнике. Обычен.
5327. *Mantura rustica* (Linnaeus, 1767). В РБ известен по одной находке: Зилр, с. Петровка, луг в пойме р. Зилаир (Чащина, 2008).
5328. *Mantura chrysanthemi* (Koch, 1903). Собран в НП «Башкирия» (Бенькорвский, Орлова-Беньковская, 2017).
5329. *Neocrepidodera crassicornis* (Faldermann, 1837). Степи. Нечасто.
5330. *Neocrepidodera ferruginea* (Scopoli, 1763). Открытые биотопы. Нечасто.
5331. *Neocrepidodera motschulskii* (Konstantinov, 1991). Открытые биотопы. Обычен.
5332. *Neocrepidodera transversa* (Marsham, 1802). Высокотравье по берегам водоёмов. Локален.
5333. *Phyllotreta armoraciae* (Koch, 1803) – Земляная хреновая блошка. Населённые пункты. На хрене. Обычен.
5334. *Phyllotreta astrachanica* Lopatin, 1977. Рудеральные биотопы, скалы. На крестоцветных.
5335. *Phyllotreta atra* (Fabricius, 1775) – Земляная черная блошка. Эвритопный вид. Многочислен.
5336. *Phyllotreta* sp. aff. *balcanica* Heikertinger, 1909. Еще не описанный вид. Известен только со скальных обнажений шихана Тратау. Жуки собраны на вайде и бурачках (Дедюхин, 2025а).
5337. *Phyllotreta cruciferae* (Goeze, 1777). Открытые биотопы. На разных крестоцветных. Многочислен.
5338. *Phyllotreta erysimi* Weise, 1900. Рудеральные биотопы в степных ландшафтах и петрофитные степи на юге РБ.
5339. *Phyllotreta misella* Jacobson, 1901. Петрофитные степи и осыпи Стерлитамакских шиханов. Реликт сибирского происхождения. (Дедюхин, 2025а).
5340. *Phyllotreta nemorum* (Linnaeus, 1758) – Земляная светлоногая блошка. Эвритопный немногочисленный вид.
5341. *Phyllotreta nigripes* (Fabricius, 1775) – Синяя крестоцветная блошка. Открытые биотопы. Обычен.
5342. *Phyllotreta nodicornis* (Marsham, 1802). Степные останцы на Белебеевской возвышенности. На резеде (*Reseda lutea*).
5343. *Phyllotreta ochripes* (Curtis, 1837) – Земляная желтоногая блошка. Влажные биотопы, агроценозы. Обычен.
5344. *Phyllotreta pallidipennis* Reitter, 1891. Петрофитные степи юга РБ. Самая северная точка – Стерлитамакские шиханы.
5345. *Phyllotreta praticola* Weise, 1887. Рудеральные биотопы в степных ландшафтах. Обычен.

5346. *Phyllotreta procera* (Redtenbacher, 1849). Степные останцы на Белебеевской возвышенности. На резеде (*Reseda lutea*).
5347. *Phyllotreta striolata* (Fabricius, 1803). Влажные биотопы, агроценозы. Нечасто.
5348. *Phyllotreta undulata* (Kutschera, 1860) – Земляная волнистая блошка. Эвритопный вид. Обычен.
5349. *Phyllotreta vittula* (L. Redtenbacher, 1848) – Полосатая хлебная блошка. Эврибионт. На злаках и крестоцветных. Многочислен.
5350. *Phyllotreta weiseana* Jacobson, 1901. Петрофитные степи юга РБ. На крестоцветных. Редок.
5351. *Podagrica menetriesii* (Falderman, 1837). Поймы крупных рек. На алтее. Локален.
5352. *Psylliodes affinis* (Paykull, 1799) – Картофельная блошка. Берега водоёмов, агроценозы. На пасленовых.
5353. *Psylliodes attenuata* (Koch, 1803) – Конопляная блошка. Урёмные леса и рудеральные места. На хмеле и конопле. Обычен.
5354. *Psylliodes chalcomera* (Illiger, 1807). Открытые биотопы. На чертополохах и бодяках. Обычен.
5355. *Psylliodes cucullata* (Illiger, 1807). Луга. На гвоздичных. Обычен.
5356. *Psylliodes cuprea* (Koch, 1803) – Бронзовая светлоногая блошка. Луга, рударальные места (противопожарные полосы), на крестоцветных (Муравицкий, Хабибуллин, 2015).
5357. *Psylliodes dulcamarae* (Koch, 1803). Тенистые берега рек, заболоченные ольшаники. На паслене.
5358. *Psylliodes hyoscyami* (Linnaeus, 1758). Рудеральные места. На белене. Часто.
5359. *Psylliodes isatidis* Heikertinger, 1912. Каменистые степи. На рогачке (*Erucastrum armoracioides*) и вайде (*Isatis costata*). На кормовых растениях – обычен.
5360. *Psylliodes napi* (Fabricius, 1792) – Брюквенная блошка. Открытые биотопы. Обычен.
5361. *Psylliodes picina* (Marsham, 1802). Луга, поймы. Редок.
5362. *Psylliodes reitteri* Weise, 1888. Указан близ Уфы. Один экземпляр собран на заболоченном участке берега р. Уфы (Муравицкий, Хабибуллин, 2015).
5363. *Psylliodes saulcyi* Allard, 1867. Петрофитные степи Белебеевской возвышенности. На степных маревых, в особенности на терескене. Локален.
5364. *Psylliodes tricolor* Weise, 1888. Рудеральные биотопы, нарушенные степи, склоны. На крестоцветных. Местами обычен.

Подсемейство Cassidinae – Щитоноски

Триба Hispini – Шипоноски

5365. *Hispa atra* Linnaeus, 1767 – Черная шипоноска. Луга, степи. На злаках. Редко.

Триба Cassidini – Щитоноски

5366. *Cassida azurea* Fabricius, 1801 – Розовая щитоноска. Пустоши, берега рек, луга. На смолевке-хлопушке (*Oberna behen*).
5367. *Cassida canaliculata* Laicharting, 1781 – Шалфейная щитоноска. Степи. На шалфее. В РБ известен в заповеднике «Шульган-Таш» (Муравицкий, Хабибуллин, 2015) и на шихане Тратау (Дедюхин, 2014, 2025а).
5368. *Cassida denticollis* Suffrian, 1844 . Открытые биотопы. На полыни. Нередко.
5369. *Cassida elongata* Weise, 1893. В РБ вид известен только на шихане Куштау. На васильке русском (Дедюхин, 2019).
5370. *Cassida ferruginea* Goeze, 1777 – Ржавая щитоноска. Остепнённые луга, опушки дубрав. На девясиле иволистном. Очень редко.
5371. *Cassida flaveola* Thunberg, 1794 – Желтоватая щитоноска. Сырые леса, заболоченные участки пойм. На звездчатках. Нечасто.
– *Cassida leucanthemi* Bordy, 1995. Вид указан по сборам жуков с нивяника близ Уфы (Муравицкий, Хабибуллин, 2015). По нашим данным, жуки с нивяника, чихотника и пижмы равнозначно питаются на пижме и чихотнике; с другой стороны, жуки, собранные с чихотника и пижмы, способны питаться на *Leucanthemum vulgare*. Морфологических различий между ними нет. Поэтому считать жуков, питающихся на нивянике, особым видом у нас нет оснований. Все они относятся к *C. sanguinosa* Suffrian, 1844 (Дедюхин, 2018).
5372. *Cassida lineola* Creutzer, 1799. Известен по единственной находке в петрофитной степи на шихане Юрактау на полыни Маршалла (Дедюхин, Мартынеко, 2020).
5373. *Cassida margaritacea* Schaller, 1783. Степи, сухие луга. На гвоздичных. Редко.
5374. *Cassida murraea* Linnaeus, 1767. Пойменные луга, опушки дубрав. На девясилах. Нечасто
5375. *Cassida nebulosa* Linnaeus, 1758 – Свекловичная щитоноска. Открытые биотопы. На маревых. Нередко.
5376. *Cassida nobilis* Linnaeus, 1758. Рудеральные биотопы, берега рек. Преимущественно на маревых. Нечасто.
5377. *Cassida pannonica* Suffrian, 1844. Остепнённые луга. На васильке шероховатом. Довольно редко.
5378. *Cassida panzeri* Weise, 1907. Березняки, опушки дубрав, луга, обочины. На латуке и ястребинке, указан также на васильках. Нечасто.
5379. *Cassida prasina* Illiger, 1798. Открытые биотопы. В основном на тысячелистнике, полыни высокой и пижме. Часто.
5380. *Cassida rubiginosa* O. F. Müller, 1776. Луга, низинные болота, степи. На васильках, чертополохах и бодяках. Обычен.
5381. *Cassida sanguinolenta* O. F. Müller, 1776. Открытые места. На пижме. Редко.
5382. *Cassida sanguinosa* Suffrian, 1844. Луга, берега водоёмов. На пижме, птармике (чихотнике) и нивянике. Обычен.
5383. *Cassida seladonia* Gyllenhal, 1827. Указан с НП «Башкирия» (Бакалова, 2016; Беньковский, Орлова-Беньковская, 2017).

5384. *Cassida* sp. cf. *berolinensis* Suffrian, 1844. Луга на склонах. На василистнике. Локален Известен с остепнённых склонов у д. Новомусино и шихана Тратау.
5385. *Cassida stigmatica* Suffrian, 1844. Пустоши, обочины, прирусловые валы. В основном на пижме и полыни высокой. Обычен.
5386. *Cassida subreticulata* Suffrian, 1844. Сухие луга, степи. На гвоздичных. Редко.
5387. *Cassida vibex* Linnaeus, 1767. Эвритопный вид. На васильках, горькушах, лопухах и бодяках. Обычен.
5388. *Cassida viridis* Linnaeus, 1758 – Зеленая щитоноска. Сырые леса, берега водоёмов, приусадебные участки. На чистецах, мятах, зюзниках. Обычен.
5389. *Cassida vittata* Villers, 1789. Рудеральные места. На маревых. Редко.
5390. *Hypocassida subferruginea* (Schrank, 1776). Открытые биотопы. На вьюнке и повое. Часто.
5391. *Pilemostoma fastuosum* (Schaller, 1783). Остепнённые луга, опушки дубрав. На девясилах. Редко.

Из состава фауны РБ следует исключить ряд видов листоедов, приводимых в публикациях (Баянов и др., 2015; Guśkova, 2010; Чащина, 2008) только на основании указаний из рукописи кандидатской диссертации В.И. Шутака (1975): *Aphthona cyparissiae* (Koch, 1803), *A. flaviceps* Allard, 1859, *L. asperifoliarum* Weise, 1887, *L. gracilis* Kutschera, 1864, *L. longipennis* Kutschera, 1863, *L. pulmonariae* Weise, 1893, *L. scutellaris* (Mulsant & Rey, 1874), *L. suturatus* (Foudras, 1860), *Neocrepidodera impressa* (Fabricius, 1801), *N. femorata* (Gyllenhal, 1813), *N. interpunctata* (Motschulsky, 1859), *Psylliodes agropyri* Paliy, 1961, *P. chrysocephala* (Linnaeus, 1758), *P. thlaspis* Foudras, 1860, *Ph. balcanica* Heikertinger, 1909, *Ph. diadematа* Foudras, 1860. Многие из них имеют западноевропейские или средиземноморские ареалы и, несомненно, отсутствуют на Урале. Некоторые могут быть здесь найдены, но обитание их в Башкирии требует подтверждения. На недопустимость некритического учета данных из этой диссертации в связи с их недостоверностью обращалось внимание и ранее (Михайлов, 2006).

Надсемейство Curculionoidea (С.В.Дедюхин)

Семейство Nemonychidae – Цветожилы

5392. *Nemonyx lepturoides* (Fabricius, 1801). Рудеральные места, осыпи. На живокости полевой. Редок.

Семейство Anthribidae – Ложнослоники

Подсемейство Anthribinae

5393. *Anthribus scapularis* Gebler, 1833. Леса, заросли степных кустарников. Редко.
5394. *Dissoleucas niveirostris* (Fabricius, 1798). Сосняки, дубравы. Редок.
5395. *Platyrhinus resinosus* (Scopoli, 1763). Ольшаники, сырые дубравы. Очень редок.
5396. *Platystomos albinus* (Linnaeus, 1758) – Беловатый ложнослоник. Леса. На сухих лиственных деревьях. Нередко.
5397. *Trigonorhinus dolgovi* (Korotyaev, 1977). Петрофитно-кустарниковые степи. На карагане. Локален и редок.
5398. *Tropideres albirostris* (Schaller, 1783) – Дубовый ложнослоник. Леса. На дубе и осине. Редок.

Подсемейство Urodontinae

5399. *Bruchela kaszabi* (Strejček, 1973). Открытые биотопы. На гулявниках. Обычен.
5400. *Bruchela rufipes* (Olivier, 1790). Склоновые степи (преимущественно петрофитные) и прилегающие к ним рудеральные участки. На *Reseda lutea*. Локален.
5401. *Bruchela suturalis* (Fabricius, 1792). Петрофитные степи, обнажения и рудеральные места в степных ландшафтах. На резеде. Чаще, чем предыдущий вид.
5402. *Bruchela* ?*concolor* (Fåhraeus, 1839). Степные останцы, в том числе Стерлитамакские шиханы. На желтушниках. Локален и редок.

Семейство Attelabidae – Трубковерты

Подсемейство Apoderinae

5403. *Apoderus* (*Apoderus*) *coryli* (Linnaeus, 1758) – Орешниковый трубковерт. Леса. На лещине, березе, ольхе. Обычный немногочисленный вид.
5404. *Apoderus* (*Compsapoderus*) *erythropterus* (Gmelin, 1790). Поймы рек. На кровохлебке и шиповнике. Нередко.

Подсемейство Attelabinae

5405. *Attelabus nitens* (Scopoli, 1763). В РБ известен из дубрав в Уфмс (Нагаево, Юматово) (Легалов, 2007) и на Стерлитамакских шиханах (Дедюхин, Мартынеко, 2020; Дедюхин, 2025а). На подросте дуба. Очень редок.

Подсемейство Rhynchitinae

5406. *Auletobius sanguisorbae* (Schrank, 1798). Влажные луга. На кровохлебке. Местами обычен.
5407. *Byctiscus betulae* (Linnaeus, 1758) – Березовый трубковерт. Леса. На березах, осинах, ольхе. Нечасто.
5408. *Byctiscus populi* (Linnaeus, 1758) – Тополевый трубковерт. Леса. На молодых осинах и тополях. Обычен.
5409. *Caenorhinus megacephalus* Germar, 1823 (= *mannerheimi* (Hummel, 1823)). Указан для РБ (Баянов и др., 2015).
5410. *Deporaus betulae* (Linnaeus, 1758) – Черный березовый трубковерт. Леса с участием березы. На молодых березах. Обычен.
5411. *Involvulus cupreus* (Linnaeus, 1758) – Медная казарка. Указан для горы Малый Ямантау (Блрц). На плодах рябины (Легалов, 2007).
5412. *Involvulus pubescens* (Fabricius, 1775) – Волостый ринхит. Пойменные луга, высокотравные опушки. На василистнике. Обычен.
5413. *Mecorhis aethiops* (Bach, 1854). Песчаные пустоши, луга. На лапчатках. Редок.
5414. *Neocoenorhinus pauxillus* (Germar, 1823) – Плодовая букарка. Леса, заросли кустарников. На терне, вишне, миндале и др. Обычен.
5415. *Neocoenorrhinus germanicus* (Herbst, 1797). Луга, разнотравные степи. На розоцветных. Обычен.
5416. *Neocoenorrhinus minutus* (Herbst, 1797). Шихан Куштау. На спирее. Очень редок. (Дедюхин, 2019).

5417. *Rhynchites auratus* (Scopoli, 1763) – Вишневая букарка. Заросли степных кустарников, опушки дубрав. На миндале, вишне, терне. Обычен.
5418. *Rhynchites bacchus* (Linnaeus, 1758). Уфа (Легалов, 2007).
? Rhynchites giganteus (Schoenherr, 1832) – Большой грушевый слоник. Указан для РБ (Баянов и др., 2015), что требует подтверждения.
5419. *Tatianaerhynchites aequatus* (Linnaeus, 1767). Леса, населённые пункты (кроме восточных районов РБ). На рябине, черемухе, яблони. Обычен.
5420. *Temnocerus caeruleus* (Fabricius, 1798). Берега рек, влажные леса. На ивах, осине, ольхе, тополе. Обычен.
5421. *Temnocerus longiceps* (Thomson, 1888). Блрц, окр. п. Реветь (Легалов, 2007).
5422. *Temnocerus nanus* (Paykull, 1792). Берега рек, ольшаники. На ивах, ольхе, осине. Редок.
5423. *Temnocerus subglaber* (Desbrochers des Loges, 1897). Петрофитно-кустарниковые степи. На спирее. Локален и редок.

Семейство Brentidae – Брентиды

Подсемейство Apioninae – Семяеды

5424. *Aizobius sedi* (Germar, 1818). Скальные обнажения, луга. На очитках (степном, пурпурном, гибридном). На кормовых растениях встречается регулярно.
5425. *Apion frumentarium* (Linnaeus, 1758). Луга в поймах. На конском щавеле. На приусадебных участках, на ревене. Нередко.
5426. *Apion haematodes* Kirby, 1808. Луга, пустоши. На щавелях.
5427. *Apion rubiginosum* Grill, 1893. Луга, пустоши. На щавелях.
5428. *Aspidapion* (*Aspidapion*) *radiolus* (Marsham, 1802). Открытые биотопы. На мальвовых. Обычен.
5429. *Aspidapion* (*Aspidapion*) *soror* (Rey, 1895). Луговые степи, остепнённые луга. На хатьме.
5430. *Aspidapion* (*Koestlinia*) *aeneum* (Fabricius 1775). Населённые пункты, пустыри. На *Malva pusilla*.
5431. *Aspidapion* (*Koestlinia*) *chalceus* (Marsham, 1802). Луговые степи, остепнённые луга. На хатьме.
5432. *Betulapion simile* (Kirby, 1811). Леса. Населённые пункты. На березе. Многочислен.
5433. *Catapion seniculus* (Kirby, 1808). Открытые биотопы. На клеверах. Обычен.
5434. *Ceratapion* (*Acanephodus*) *onopordi* (Kirby, 1808). Открытые биотопы. На сложноцветных. Обычен.
5435. *Ceratapion* (*Angustapion*) *decolor* (Desbrochers des Loges, 1875). Шихан Тратау, степи, на васильке русском (Дедюхин, 2025а).
5436. *Ceratapion* (*Angustapion*) *transsylvanicum* (Schilsky, 1906). Поймы рек, степи. На мордовнике шароголовом. Редок.
5437. *Ceratapion* (*Ceratapion*) *gibbirostre* (Gyllenhal, 1813). Открытые биотопы. В основном на чертополохах. Обычен.
? Ceratapion (*Ceratapion*) *carduorum* (W. Kirby, 1808). Указан для РБ (Баянов

и др., 2025). Ошибочное определение *Ceratapion gibbirostre.*

5438. *Ceratapion* (*Echinostroma*) *basicorne* (Illiger, 1808). Дюртюлинский р-н, с. Новобиктово, залежь, на васильке синем (Дедюхин, 2014).

5439. *Ceratapion* (*Echinostroma*) *penetrans* (Germar, 1817). Нарушенные степи, пустоши. На васильке ложнопятнистом. Обычен.

5440. *Cyanapion* (*Bothryorrhynchapion*) *gyllenhalii* (Kirby, 1808). Луга, пустоши. На горошках. Редок.

5441. *Cyanapion* (*Cyanapion*) *alcyoneum* (Germar, 1817). Остепнённые луга, разнотравные степи. На чинах. Редок.

5442. *Cyanapion* (*Cyanapion*) *columbinum* (Germar, 1817). Остепнённые луга, опушки дубрав, придорожная растительность. На чине лесной и чине клубненосной. Местами обычен.

5443. *Diplapion detritum* (Mulsant & Rey, 1859). Открытые биотопы. На пижме и пупавке. Обычен.

5444. *Diplapion sareptanum* (Desbrochers des Loges, 1867). Петрофитные степи и осыпи Стерлитамакских шиханов. На пижме уральской. Ксеротермический реликт (Дедюхин, 2025а).

5445. *Diplapion stolidum* (Germar, 1817). Луга. На нивянике. Нечасто.

5446. *Eutrichapion ervi* (Kirby, 1808). Открытые биотопы, леса. На горошках и чинах. Обычен.

5447. *Eutrichapion facetum* (Gyllenhal, 1839). Открытые биотопы. На горошках. Обычен.

5448. *Eutrichapion melancholicum* (Wencker, 1864). Влажные луга, опушки. На чине лесной. Редко.

5449. *Eutrichapion viciae* (Paykull, 1800). Открытые биотопы. На горошках и чинах. Часто.

5450. *Exapion corniculatum* (Germar, 1817). Кустарниковые и луговые степи. На ракитнике. Местами обычен.

5451. *Exapion difficile* (Herbst, 1797). Кустарниковые и луговые степи. На дроке, редко на ракитнике. Местами обычен.

5452. *Exapion elongatulum* (Desbrochers des Loges, 1891). Остепнённые опушки лесов (сосняки, дубравы), кустарниковые степи. На ракитнике. На севере РБ – обычен, на юге – локален.

5453. *Hemitrichapion pavidum* (Germar, 1817). Разнотравные степи, опушки дубрав. На вязеле. Обычен.

5454. *Hemitrichapion plicatum* (Faust, 1887). Казахстано-туранский пустынно-степной вид. В РБ известен только из природного парка «Аслы-Куль», где собран на ксеротермных песчаниковых обнажениях на люцерне (Дедюхин, 2024а).

5455. *Hemitrichapion reflexum* (Gyllenhal, 1833). Разнотравные степи. На эспарцете. Нечасто.

5456. *Ischnopterapion loti* (Kirby, 1808). Разнотравные степи, берега рек, рудеральные места. На лядвенце. Обычен.

5457. *Loborhynchapion amethystinum* (Miller, 1857). Степи, остепнённые опушки. На астрагалах. Редок.
5458. *Melanapion minimum* (Herbst, 1797). Леса, ивняки по берегам водоёмов. На ивах. Нередко.
5459. *Mesotrichapion punctirostre* (Gyllenhal, 1839). Степи. На астрагалах. Локален, но местами обычен.
5460. *Omphalapion hookerorum* (Kirby, 1808). Открытые биотопы, особенно нарушенные. На трехребернике. Обычен.
5461. *Oxystoma cerdo* (Gerstaecker, 1854). Луга, пустыри. На горошках. Нередко.
5462. *Oxystoma craccae* (Linnaeus, 1767). В РБ известен только на шихане Юрактау (Дедюхин, 2025а).
5463. *Perapion connexum* (Schilsky, 1902). Поймы. На крупных щавелях. Нечасто.
5464. *Perapion violaceum* (Kirby, 1808) – Фиолетовый семеяд. Открытые биотопы. На щавелях. Обычен.
5465. *Perapion oblongum* (Gyllenhal, 1839). Луга. На щавеле кислом и близких видах. Нечасто.
5466. *Protapion apricans* (Herbst, 1797). Открытые биотопы. На клевере красном. Многочислен.
5467. *Protapion assimile* (Kirby, 1808). Опушки лесов, балки. На клевере среднем. Нечасто.
5468. *Protapion filirostre* (Kirby, 1808). Открытые биоторы. На люцернах. Обычен, но немногочислен.
5469. *Protapion fulvipes* (Geoffroy, 1785). Открытые биотопы. В основном на клевере белом (ползучем) и гибридном. Многочислен.
5470. *Protapion gracilipes* (Dietrich, 1857). Луга, луговые степи. На клевере среднем. Нечасто.
5471. *Protapion interjectum* (Desbrochers des Loges, 1895). Луговые степи, суходольные луга. На клевере горном. На кормовом растении – обычен.
5472. *Protapion ruficrus* (Germar, 1817). Стерлитамакские шиханы, разнотравные степи на известняках, на клевере горном (Дедюхин, 2025а).
5473. *Protapion varipes* (Germar, 1817). Леса и опушки. На клеверах. Нечасто.
5474. *Pseudoperapion brevirostre* (Herbst, 1797). Открытые биотопы. На зверобоях. Обычен.
5475. *Pseudoprotapion elegantulum* (Germar, 1818). Разнотравные степи. На эспарцете. Нередко.
5476. *Pseudoprotapion ergenense* (Becker, 1864). Петрофитные степи. На астрагалах. Локален.
5477. *Pseudostenapion simum* (Germar, 1817). Склоны, обнажения. На зверобоях. Редок.
5478. *Rhopalapion longirostre* (Olivier, 1807). Склоновые разнотравные степи. На хатьме. Возможен также на алтее в поймах рек и в городах на шток-розе. Редок.
5479. *Squamapion elongatum* (Germar, 1817). Степи. На шалфеях. Обычен.

5480. *Squamapion flavimanum* (Gyllenhal, 1833). Остепнённые луга и опушки, разнотравные степи. На душице. Нечасто.
5481. *Squamapion lukjanovitshi* (Korotyaev, 1988). Степи (ковыльные, петрофитные). На тимьянах, преимущественно на тимьяне Маршалла. Местами обычен.
5482. *Squamapion oblivium* (Schilsky, 1902). Петрофитные степи и обнажения известняка. На тимьянах. Локален.
5483. *Squamapion samarense* (Faust, 1891). Луговые степи. На котовнике (*Nepeta nuda*). Локален и редок.
5484. *Squamapion vicinum* (W. Kirby, 1808). Кушнаренково, берег р. Белой, на мяте (Дедюхин, 2025в).
5485. *Stenopterapion intermedium* (Eppelsheim, 1875). Разнотравные степи. На эспарцете. Редок.
5486. *Stenopterapion meliloti* (Kirby, 1808). Открытые биотопы. На донниках. Обычен.
5487. *Stenopterapion tenue* (Kirby, 1808). Открытые биотопы. На люцерне. Обычен.
5488. *Taeniapion urticarium* (Herbst, 1784). Эврибионт. На крапиве. Нередок, но немногочислен.

Подсемейство Nanophiinae

5489. *Dieckmanniellus nitidulus* (Gyllenhal, 1838). Кушн, д. Чирша-Тартыш (Дедюхин, 2025в).
5490. *Nanomimus circumscriptus* (Aube, 1864). Открытые берега водоёмов. На дербеннике. Редок.
5491. *Nanophyes brevis* Boheman, 1845. Открытые берега водоёмов. На дербеннике. Нечасто.
5492. *Nanophyes globiformis* Kiesenwetter, 1864. Открытые берега водоёмов. На дербеннике. Редок.
5493. *Nanophyes marmoratus* (Goeze, 1777). Берега водоёмов. На дербеннике. Многочислен.

Семейство Curculionidae – Долгоносики

Подсемейство Erirhininae

5494. *Lepidonotaris petax* (C. R. Sahlberg, 1823). Берега солоноватых водоёмов южной половины РБ. На тростнике. Редок.
5495. *Notaris acridulus* (Linnaeus, 1758). Заболоченные берега водоёмов. На злаках. Редок.
5496. *Notaris scirpi* (Fabricius, 1793). Заросшие берега стариц. На злаках. Местами обычен.
5497. *Tanysphyrus lemnae* (Fabricius, 1792). Старицы, пруды. На рясковых. Местами обычен.
5498. *Thryogenes festucae* (Herbst, 1795). Берега рек. На *Eleocharis palustris*. Локально.

5499. *Tournotaris bimaculata* (Fabricius, 1787) – Двухточечный нотарис. Берега водоёмов, редко пустыри. На злаках. Обычен.

Подсемейство Dryophthorinae

5500. *Sitophilus granarius* (Linnaeus, 1768) – Амбарный долгоносик. Адвентивный синантропный вид. Повреждает запасы зерна.

5501. *Sitophilus oryzae* (Linnaeus, 1763) – Рисовый долгоносик. Адвентивный синантропный вид. Повреждает запасы зерна.

5502. *Sphenophorus abbreviatus* (Fabricius, 1787). Отмечен на юго-востоке РБ (Хайб, М.Д. Каскинова) (Хабибуллин, 2018б).

5503. *Sphenophorus striatopunctatus* (Goeze, 1777). Берега стариц. На тростнике. Известно несколько находок под Уфой (Хабибуллин, 2025б).

Подсемейство Cossoninae

5504. *Cossonus linearis* (Fabricius, 1775). Пойменные леса. Ксилофаг на лиственных. Указан для Уфы (Хабибуллин, 2025б).

Подсемейство Molytinae

5505. *Hylobius abietis* (Linnaeus, 1758) – Большой сосновый долгоносик. В естественных и искусственных сосновых насаждениях. Обычен.

5506. *Hylobius excavatus* (Laicharting, 1781) – Лиственничный слоник. Указан для РБ (Баянов и др., 2015). Вероятно, в горных лесах Урала.

5507. *Liparus coronatus* (Goeze, 1777). Найден в высокотравье на берегу р. Демы у с. Кипчак-Аскарово (Альш).

5508. *Lepyrus palustris* (Scopoli, 1763). Ивняки по берегам рек (Белая и Дёма) (Дедюхин, 2025б).

5509. *Pissodes castaneus* (DeGeer, 1775) – Точечная смолевка. Сосняки жерднякового возраста. На сосне. Обычен.

5510. *Pissodes harcyniae* (Herbst, 1795) – Еловая смолевка. Указан для РБ (Животный мир …, 1949).

5511. *Pissodes pini* (Linnaeus, 1758) – Сосновая смолевка. Сосняки и сосновые посадки. Обычен.

5512. *Pissodes piniphilus* (Herbst, 1797) – Сосновая жердяковая смолевка. Указан для РБ (Баянов и др., 2015).

5513. *Pissodes validirostris* (C. R. Sahlberg, 1834) – Шишковая смолевка. Указан для РБ (Баянов и др., 2015).

Подсемейство Mesoptiliinae

5514. *Magdalis* (*Edo*) *ruficornis* (Linnaeus, 1758). Леса, заросли кустарников. На розоцветных. Обычен.

5515. *Magdalis* (*Odontomagdalis*) *armigera* (Geoffroy, 1785). Леса. На вязах. Редок.

5516. *Magdalis* (*Porrothus*) *cerasi* (Linnaeus, 1758). Дубравы. Известен из Альш (гора Сатыртау) и Стмк (шихан Юрактау). На дубе. Очень редок.

5517. *Magdalis* (*Magdalis*) *duplicata* Germar, 1819. Сосняки и лиственничники. На ветках хвойных. Обычен.

5518. *Magdalis* (*Magdalis*) *frontalis* (Gyllenhal, 1827) – Синий сосновый долгоносик. На соснах. Нередко.

5519. *Magdalis* (*Magdalis*) *linearis* Gyllenhal, 1827. Указан для РБ (Баянов и др., 2015).
5520. *Magdalis* (*Magdalis*) *phlegmatica* (Herbst, 1797). Указан для РБ (Баянов и др., 2015).

Подсемейство Lixinae

Триба Cleonini

5521. *Adosomus roridus* (Pallas, 1781). Указан для РБ (Баянов и др., 2015).
5522. *Asproparthenis foveocollis* (Gebler, 1834). Ксеротермные склоны останцов. На *Kochia prostrata*. Локален.
5523. *Asproparthenis punctiventris* (Germar, 1824). Указан для РБ (Баянов и др., 2015). Вероятно, из южных районов.
5524. *Bothynoderes affinis* (Schrank, 1781). Степи, рудеральные места. На маревых. Нечасто.
5525. *Cleonis pigra* (Scopoli, 1763) – Клеон-свинушка. Открытые биотопы. На сложноцветных. Обычен.
5526. *Conorhynchus nigrivittis* (Pallas, 1781). Южностепной вид. Локален. Найден на степном увале «Гора Уртатау» (Давл) (Дедюхин, 2020б).
5527. *Cyphocleonus altaicus* Gebler, 1829 (= *adumbratus* (Gebler, 1830)). Поймы рек. На полыни высокой (*Artemsia abrotanum*). Локален.
5528. *Cyphocleonus dealbatus* (Gmelin, 1790) – Тигровый долгоносик. Открытые биотопы. На полынях, пижме и др. Обычен.
5529. *Cyphocleonus trisulcatus* (Herbst, 1795). Луга. На нивянике и полыни высокой. Редок.
5530. *Leucomigus candidatus* (Pallas, 1771). В РБ известен только в степном Зауралье (Хайб, М.Д. Каскинова) (Хабибуллин, 2018б).
5531. *Pachycerus segnis* (Germar, 1823). Степи, обнажения. На бурачниковых. Нередко.
5532. *Pleurocleonus quadrivittatus* (Zoubkoff, 1829). Ксеротермные останцы на Белебеевской возвышенности. На белой полыни. Локален и редок.
5533. *Pseudocleonus* (*Asiacleonus*) *dauricus* (Gebler, 1829). В РБ известен только на Стерлитамакских шиханах (Дедюхин, 2025а). Как реликтовый вид включен в Красную книгу РБ (2025).
5534. *Pseudocleonus* (*Pseudocleonus*) *cinereus* (Schrank, 1781). Степи. На васильках. Обычен.
5535. *Rhabdorrhynchus karelinii* (Fåhraeus, 1842). В РБ известен только на Стерлитамакских шиханах (Дедюхин, 2025а). Рекомендован к включению в Красную книгу РБ (Дедюхин, 2020б).
5536. *Stephanocleonus* (*Sanzia*) *microgrammus* (Gyllenhal, 1834). Указан для РБ (Баянов и др., 2015).
5537. *Stephanocleonus* (*Stephanocleonus*) *ignobilis* Faust, 1883. Ксеротермные осыпи и петрофитные степи на Стерлитамакских шиханах и хребта Ирендык. На луках. Как реликтовый вид включен в Красную книгу РБ (2025).

Триба Lixini

5538. *Lachnaeus crinitus* Schoenherr, 1826. Луга и луговые степи. На девясилах. Локален.
5539. *Larinus* (*Larinomesius*) *canescens* Gyllenhal, 1835 (= *lederi* Faust, 1889). Указан для РБ (Баянов и др., 2015), что требует подтверждения.
5540. *Larinus* (*Larinomesius*) *impressus* Gebler, 1829 (= *ruber* Motschulsky, 1845). Петрофитные степи. На розетковидных васильках. Локален и очень редок.
5541. *Larinus* (*Larinomesius*) *obtusus* Gyllenhal, 1835. Степи, ксерофитные пустоши. На васильке ложнопятнистом. Часто.
5542. *Larinus* (*Larinomesius*) *serratulae* Becker, 1864. Степи, опушки дубрав. На серпухах. Редко.
5543. *Larinus* (*Larinus*) *pollinis* (Laicharting, 1781). Кушн (д. Старые Камышлы, К. Абдрахманова) (Хабибуллин, 2025б).
5544. *Larinus* (*Larinus*) *vulpes* (Olivier, 1807). Степи. На мордовниках. Обычен.
5545. *Larinus* (*Phyllonomeus*) *carlinae* (Olivier, 1807) (= *rusticanus* Gyllenhal, 1835). Открытые биотопы. На сложноцветных. Обычен.
5546. *Larinus* (*Phyllonomeus*) *iaceae volgensis* Becker, 1864. Степи, пустыри. На наголовatках и чертополохах. Локально.
5547. *Larinus* (*Phyllonomeus*) *sturnus* (Schaller, 1783). Открытые биотопы. На лопухах, васильках и др. Обычен.
5548. *Larinus* (*Phyllonomeus*) *turbinatus* Gyllenhal, 1835. Открытые биотопы. На сложноцветных. Обычен.
5549. *Larinus* (*Phyllonomeus*) *centaurii* (Olivier, 1807) (= *beckeri* Petri, 1907). Башкирия (Тер-Минасян, 1967).
5550. *Lixus* (*Compsolixus*) *linnei* Faust, 1888. Давл, д. Калиновка (Хабибуллин, 2024в).
5551. *Lixus* (*Compsolixus*) *albomarginatus* Boheman, 1842. Степи. На крестоцветных (Дедюхин, 2024а).
5552. *Lixus* (*Callistolixus*) *cylindrus* (Fabricius 1781). Степи. На степных зонтичных (Дедюхин, 2024а, 2025а).
5553. *Lixus* (*Dilixellus*) *bardanae* (Fabricius, 1787). Луга, берега водоёмов. На крупных щавелях и таране (Дедюхин, 2024а, 2025а).
5554. *Lixus* (*Dilixellus*) *fasciculatus* Boheman, 1835. Рудеральные места в степных ландшафтах. На полыни обыкновенной и полыни высокой. Редок.
5555. *Lixus* (*Dilixellus*) *pulverulentus* (Scopoli, 1763). Рудеральные места, осыпи. Редок.
5556. *Lixus* (*Epimeces*) *cardui* Olivier, 1807. Рудеральные места в степных ландшафтах. На татарнике. На кормовом растении – регулярен.
5557. *Lixus* (*Epimeces*) *filiformis* (Fabricius, 1781). Открытые биотопы. На чертополохах. Обычен.
5558. *Lixus* (*Eulixus*) *iridis* Olivier, 1807. Луга, берега водоёмов, леса. На крупных зонтичных. Обычен.
5559. *Lixus* (*Eulixus*) *myagri* Olivier, 1807. Берега степных рек. На крестоцветных. Локален.

5560. *Lixus* (*Lixus*) *paraplecticus* (Linnaeus, 1758) – Стеблеед-лисичка. Старицы. На водных зонтичных. Локален и редок. Рекомендован к включению в Красную книгу РБ (Дедюхин, 2020б).
5561. *Lixus* (*Phillixus*) *brevipes* C. N. F. Brisout de Barneville, 1866. Степи. На смолевочках. Очень редок.
5562. *Lixus* (*Phillixus*) *subtilis* Boheman, 1835. Рудеральные места. На лебеде татарской и других маревых. Редок.
5563. *Lixus* (*Phillixus*) *incanescens* Boheman, 1835. Абзл, Октябрьский (Хабибуллин, 2025б). Ксеротермные рудеральные местообитания. Связан с маревыми.

Подсемейство Baridinae

? Aulacobaris coerulescens (Scopoli, 1763) – Брюквенный барид. Указание для РБ (Животный мир …, 1949) требует подтверждения.
5564. *Aulacobaris janthina* (Boheman, 1836). Открытые биотопы. На крестоцветных. Обычен.
5565. *Aulacobaris lepidii* (Germar, 1823). Луга, берега рек, рудеральные места. На крестоцветных.
5566. *Aulacobaris picicornis* (Marsham, 1802). Ксеротермные останцы и рудеральные места. На резеде. Редок.
5567. *Aulacobaris violaceomicans* (A. Solari & F. Solari, 1905). Петрофитные степи и осыпи. На крестоцветных. Локален и редок.
5568. *Baris artemisiae* (Panzer, 1794). Рудеральные места. На *Artemisia vulgaris*. Обычен.
5569. *Labiaticola sibiricus* (Faust, 1890). Стбш, кустарниковая степь, на зопнике клубненосном (Дедюхин, 2024а).
5570. *Malvaevora timida* (Rossi, 1792). Луговые степи. На хатьме тюренгейской. Нередко.
5571. *Melanobaris carbonaria* (Boheman 1836). Петрофитные степи, возможен в агроценозах. На корнях крупных крестоцветных. Локален.
5572. *Melanobaris hochhuthi* (Faust, 1882). Рудеральные места и петрофитные степи. На крестоцветных. Редко.
5573. *Melanobaris nigritarsis* (Boheman, 1844). Петрофитные степи. На степных крестоцветных. Локален, но местами обычен.

Подсемейство Conoderinae

5574. *Coryssomerus capucinus* (Beck, 1817). Рудеральные места, степные склоны. Редок.

Подсемейство Ceutorhynchinae

Триба Mononychini

5575. *Mononychus punctumalbum* (Herbst, 1784). Берега водоёмов, пойменные луга. На ирисах. Локален, но местами обычен.

Триба Phytobiini

5576. *Amalorrhynchus melanarius* (Stephens, 1831). Берега водоёмов. На жерушнике земноводном. Локально.
5577. *Amalus scortillum* (Herbst, 1795). Рудеральные места. На горце птичьем и близких видах. Нечасто.
5578. *Marmaropus besseri* Gyllenhal, 1837. Дюрт, с. Новобиктово (Дедюхин, 2024а).
5579. *Neophytobius quadrinodosus* (Gyllenhal, 1813). Степные склоны. Очень редок.
5580. *Pelenomus quadricorniger* (Colonnelli, 1986). Старицы. На горце земноводном. Локален.
5581. *Phytobius leucogaster* (Marsham, 1802). Гидробионт. Уфмс, д. Алексеевка (Д. Володин) (Хабибуллин, 2025б).
5582. *Rhinoncus bosnicus* Schultze, 1900. Кушнаренково, правый берег р. Белой, на *Rumex ucranicus*, несколько экземпляров (Дедюхин, 2025в).
5583. *Rhinoncus inconspectus* (Herbst, 1795). Старицы. На горце земноводном. Локален.
5584. *Rhinoncus leucostigma* (Marsham, 1802). Открытые биотопы. На щавелях. Обычен.
5585. *Rhinoncus pericarpius* (Linnaeus, 1758). Суходольные и псаммофитные луга, опушки сосняков. На щавельке. Местами обычен.
5586. *Rhinoncus perpendicularis* (Reich, 1797). Берега водоёмов, заболоченные участки. На горцах.

Триба Scleropterini

5587. *Rutidosoma graminosum* (Gistel, 1857). Леса. На подросте осины. Очень редок.
5588. *Tapinotus sellatus* (Fabricius, 1794). Берега водоёмов, пойменные луга. Обычен на вербейнике.

Триба Ceutorhynchini

5589. *Ceutorhynchus assimilis* (Paykull, 1792). Рудеральные места. На крестоцветных. Нечасто.
5590. *Ceutorhynchus barbareae* Suffrian, 1847. Луга. На сурепке. Обычен.
5591. *Ceutorhynchus canaliculatus* C. N. F. Brisout de Barneville, 1869. Сухие биотопы. На икотнике. Редок.
5592. *Ceutorhynchus chalybaeus* Germar, 1823. Рудеральные места, склоны. На гулявнике Лёзеля. Обычен.
5593. *Ceutorhynchus coarctatus* Gyllenhal, 1837. Степи, склоны. На рыжике. Нечасто.
5594. *Ceutorhynchus cochleariae* (Gyllenhal, 1813). Сырые леса. На сердечниках. Редок.
5595. *Ceutorhynchus contractus* (Marsham, 1802). Открытые биотопы. На резушкее Таля и других крестоцветных. Местами обычен.
5596. *Ceutorhynchus erysimi* (Fabricius, 1787). Рудеральные места, иногда каменистые степи. Широкий олигофаг на крестоцветных. Обычен.

5597. *Ceutorhynchus fabrilis* Faust, 1887. Петрофитные степи, осыпи. На бурачках. Локален.
5598. *Ceutorhynchus gallorhenanus* A. Hoffmann, 1955. Рудеральные и сегетальные биотопы. На крестоцветных.
5599. *Ceutorhynchus* sp. aff. *gallorhenanus* A. Hoffmann, 1955. Петрофитные степи, склоны. На рогачке (*Erucastrum armoracioides*).
5600. *Ceutorhynchus granulicollis* C. G. Thomson, 1865. Степи, обнажения, пустыри. На ярутке полевой. Обычен.
5601. *Ceutorhynchus hampei* C. N. F. Brisout de Barneville, 1869. Открытые биотопы. На икотнике. Часто.
5602. *Ceutorhynchus ignitus* Germar, 1823. Открытые биотопы. В основном на икотнике. Нередко.
5603. *Ceutorhynchus interjectus* Schultze, 1903. Широколиственный лес на восточном склоне шихана Тратау, на гулявнике прямом. Неморальный реликт (Дедюхин, Коротяев, 2021; Дедюхин, 2025а).
5604. *Ceutorhynchus kaszabi* Korotyaev, 1980. Петрофитные степи и опушки на Стерлитамакских шиханах. На вайде ребристой. Перигляциальный реликт (Дедюхин, 2025а).
5605. *Ceutorhynchus kipchak* Korotyaev, 1996. Остепнённые склоны, обнажения. На крупке дубравной. Локален.

? Ceutorhynchus pallidactylus (Marsham, 1802) – Стеблевой капустный скрытнохоботник. Приведен для РБ (Животный мир …, 1949 – как *C. quadridens* Panzer 1795). Указание требует подтверждения.

5606. *Ceutorhynchus potanini* Korotyaev, 1980. Петрофитные степи, известняковые обнажения. На бурачке ленском, реже на бурачке извилистом. Перигляциальный реликт.
5607. *Ceutorhynchus pulvinatus* Gyllenhal, 1837. Открытые биотопы. На гулявнике и дескурайнии. Многочислен.
5608. *Ceutorhynchus querceti* (Gyllenhal, 1813). Шихан Куштау, сырой лес, 1 экземпляр (Е.В. Комиссаров) (Дедюхин, 2025а). Аркто-бореальный вид.
5609. *Ceutorhynchus rapae* Gyllenhal, 1837. Открытые биотопы. На разных крестоцветных. Обычен.
5610. *Ceutorhynchus roberti* Gyllenhal, 1837. Широколиственные леса. На чесночнице (*Alliaria petiolata*). Редко.
5611. *Ceutorhynchus seniculus* C. N. F. Brisout de Barneville, 1883. Петрофитные степи Учалинской лиственничной лесостепи. На бурачках. Локален. Перигляциальный реликт (Дедюхин, Коротяев, 2021). Включен в Красную книгу РБ (2025).
5612. *Ceutorhynchus sisymbrii* (Dieckmann, 1966). Рудеральные места, склоны. На гулявнике Лёзеля. Нередко.
5613. *Ceutorhynchus sophiae* Gyllenhal, 1837. Рудеральные места. На дескурайнии Софии. Обычен.

5614. *Ceutorhynchus subpilosus* C. N. F. Brisout de Barneville, 1869. Шлейфы шиханов Юрактау и Тратау. На бурачке извилистом. Узколокален. Ксеротермический (средиземноморский) реликт. Включен в Красную книгу РБ (2025).
5615. *Ceutorhynchus sulcatus* C. N. F. Brisout de Barneville, 1869. Нарушенные степи, склоны, ксеротермные рудеральные места. На крестоцветных. Очень редок.
5616. *Ceutorhynchus sulcicollis* (Paykull, 1800). Луга, опушки лесов, рудеральные биотопы. На крестоцветных. Нечасто.
5617. *Ceutorhynchus syrites* Germar, 1823 – Рыжиковый скрытнохоботник. Степи, нарушенные биотопы. На рыжиках, гулявниках и др. Обычен.
5618. *Ceutorhynchus typhae* (Herbst, 1795). Луга. На пастушьей сумке и жерушниках. Обычен.
5619. *Ceutorhynchus* sp. aff. *typhae* (Herbst, 1795). Луга, берега рек. На сурепке. Нередко.
5620. *Ceutorhynchus unguicularis* C. G. Thomson, 1871. Осыпи и скалы Стерлитамакских шиханов. На шиверекии. Узколокален, но местами многочислен.
5621. *Ceutorhynchus viator* Faust, 1855. Петрофитные склоны останцов Бугульминской возвышенности. На бурачке извилистом. Локален и редок.
5622. *Ceutorhynchus viridanus* Gyllenhal, 1837. Степи, склоны. На желтушниках. Обычен.
5623. *Ceutorhynchus weisei* Schultze, 1898. Петрофитные степи хребта Ирендык и Учалинской лесостепи (гора Калкантау). На бурачках. Локален и очень редок. Реликтовый вид с широко разорванным ареалом (Дедюхин, Коротяев, 2021). Включен в Красную книгу РБ (2025).
5624. *Coeliastes lamii* (Fabricius, 1792). Широколиственные леса и их опушки. На яснотках. Местами нередок.
5625. *Datonychus arquata* (Herbst, 1795). Берега водоёмов, заболоченные участки. На зюзнике и мяте. Нередко.
5626. *Datonychus paszlavszkyi* (Kuthy, 1890). Степи. На шалфеях. Редок.
5627. *Datonychus urticae* (Boheman, 1845). Широколиственные леса. На чистеце лесном. Редок.
5628. *Glocianus distinctus* (C. N. F. Brisout de Barneville, 1870). Открытые биотопы. На ястребинках, скердах, горчаке. Нередко.
5629. *Glocianus fennicus* (Faust, 1895). Пустыри. На одуванчике. Очень редок.
5630. *Glocianus pilosellus* (Gyllenhal, 1837). Кушн, с. Чирша-Тартыш, степной склон (Дедюхин, 2014).
5631. *Glocianus punctiger* (C. R. Sahlberg, 1835). Пустыри, газоны, придорожная растительность. На одуванчике. Обычен.
5632. *Hadroplontus litura* (Fabricius, 1775). Луга, пустыри. На бодяке. Редко.
5633. *Microplontus edentulus* (Schultze, 1897). Рудеральные биотопы. На трехреберник. Нечасто.

5634. *Microplontus rugulosus* (Herbst, 1795). Рудеральные биотопы. На трехребернике и чернобыльнике. Нередко.
5635. *Microplontus triangulum* (Boheman, 1845). Рудеральные биотопы, нарушенные степи. На тысячелистнике. Обычен.
5636. *Mogulones abbreviatulus* (Fabricius, 1792). В РБ известен по одной находке: Бузд, д. Килимово (Хабибуллин, 2017а).
5637. *Mogulones asperifoliarum* (Gyllenhal, 1813). Леса, опушки, степи, рудеральные места. На незабудках, медуницах, чернокорне, синяке и других бурачниковых. Нередко.
5638. *Mogulones austriacus* (C. N. F. Brisout de Barneville, 1869). Пастбища, склоны. На нонее русской. На кормовом растении – регулярен.
5639. *Mogulones crucifer* (Pallas, 1771). Рудеральные места, склоны, степи. На чернокорне. Обычен.
5640. *Mogulones cynoglossi* (Frauenfeld, 1866). Рудеральные места, склоны. На чернокорне. Реже чем предыдущий вид.
5641. *Mogulones dimidiatus* (J. Frivaldszky, 1865). Пастбища, склоны, степи. На нонее русской. Редок.
5642. *Mogulones geographicus* (Goeze, 1777). Шихан Юрактау, на синяке (Дедюхин, 2025а).
5643. *Mogulones larvatus* (Schultze, 1897). Октябрьский (Д. Володин) (Хабибуллин, 2025б). На медунице мягкой (Дедюхин, 2012).
5644. *Mogulones pallidicornis* (Gougelet & H. Brisout de Barneville, 1860). Леса. На медуницах. Обычен.
5645. *Nedyus quadrimaculatus* (Linnaeus, 1758). Повсеместно на крапиве. Многочислен.
5646. *Oprohinus jakovlevi* (Schultze, 1902) – Луковый скрытнохоботник. Петрофитные степи, осыпи, возможен на приусадебных участках. На луках. Локален, но местами обычен.
5647. *Phrydiuchus topiarius* (Germar, 1824). Ксерофитные останцы Белебеевской возвышенности (Дедюхин, 2015). На шалфеях. Очень редок.
5648. *Prisistus caucasicus bohemani* (Colonnelli, 1986). Петрофитные склоны Стерлитамакских шиханов. Локален и редок.
5649. *Ranunculiphilus faeculentus* (Gyllenhal, 1837). Склоны, осыпи, нарушенные степи. На живокости полевой. Нередко.
5650. *Sirocalodes depressicollis* (Gyllenhal, 1813). Агроценозы, склоны. На дымянке. Редок.
5651. *Sirocalodes quercicola* (Paykull, 1792). Леса, рудеральные места, склоны. На хохлатке и реже на дымянке. Нередко.

? Stenocarus ruficornis (Stephens, 1831) – Корневой маковый скрытнохоботник. Указан для РБ (Животный мир …, 1949). Указание требует подтверждения.

5652. *Thamiocolus imperialis* (Schultze, 1895). Широколственный лес на восточном склоне шихана Тратау. Неморальный реликт (Дедюхин, 2025а, 2025б).

5653. *Thamiocolus nubeculosus* (Gyllenhal, 1837). Степи. На зопнике клубненосном. Местами обычен.
5654. *Thamiocolus sahlbergi* (C. R. Sahlberg, 1845). Высокотравные ложбины и опушки. На зопнике клубненосном. Редок.
5655. *Thamiocolus signatus* (Gyllenhal, 1837). Степи. На чистеце прямом. Редок.
5656. *Thamiocolus virgatus* (Gyllenhal, 1837). Степи, остепнённые луга, опушки дубрав. На зопнике клубненосном. Часто.
5657. *Trichosirocalus barnevillei* (Grenier, 1866). Давл, увал «Гора Уртатау», разнотравно-ковыльная степь (Дедюхин, 2024а).
5658. *Trichosirocalus horridus* (Panzer, 1801). Осыпи, рудеральные биотопы. На чертополохах. Редок.
5659. *Trichosirocalus troglodytes* (Fabricius, 1787). Придорожная растительность. На подорожнике. Редок.
5660. *Zacladus geranii* (Paykull, 1800). Луга, опушки, луговые степи. На геранях. Обычен.

Подсемейство Orobitidinae

5661. *Orobitis cyanea* (Linnaeus, 1758). Леса, опушки, агроценозы. На фиалках. Редок.

Подсемейство Curculioninae

Триба Ellescini

5662. *Ellescus bipunctatus* (Linnaeus, 1758). Леса, берега водоёмов. На ивах. Нечасто

Триба Anthonomini

5663. *Anthonomus* (*Anthomorphus*) *phyllocola* (Herbst, 1795) – Сосновый цветоед. Указан для РБ (Животный мир …, 1949). Развивается на сосне.
5664. *Anthonomus* (*Anthonomidius*) *germanicus* Dieckmann, 1968. Степи в природном парке «Аслы-Куль». На лапчатках. Очень редок (Дедюхин, 2024).
5665. *Anthonomus* (*Anthonomus*) *incurvus* (Panzer, 1795) (= *humeralis* (Panzer, 1794)) – Вишневый цветоед. Сырые леса, заросли кустарников. На черемухе и вишне. Редок.
5666. *Anthonomus* (*Anthonomus*) *pomorum* (Linnaeus, 1758) – Яблонный цветоед. Сады, леса. На яблони и груше. Обычен.
5667. *Anthonomus (Anthonomus*) *rubi* (Herbst, 1795) – Малинный цветоед. Леса, опушки, приусадебные участки. На малине, землянике, ежевике, гравилате. Обычен.
5668. *Anthonomus* (*Anthonomus*) *rufus* Gyllenhal, 1835. Кустарниковые степи. На миндале. Локален и редок.
5669. *Anthonomus* (*Furcipus*) *rectirostris* (Linnaeus, 1758) – Черемуховый цветоед. Леса, поймы, населённые пункты. На черемухе. Обычен.
5670. *Brachonyx pineti* (Paykull, 1792). Сосняки. Редок.
5671. *Bradybatus kellneri* Bach, 1854. Шихан Тратау, кленовник. Неморальный реликт. (Дедюхин, Коротяев, 2021; Дедюхин, 2025а).

5672. *Dorytomus ictor* (Herbst, 1795). Пойменные тополевники. На осокоре. Местами обычен.
5673. *Dorytomus longimanus* (Förster, 1771). Пойменные тополевники. На осокоре. Местами обычен.
5674. *Dorytomus nebulosus* (Gyllenhal, 1835). Поймы. На тополях и ивах.
5675. *Dorytomus suratus* (Gyllenhal, 1835). Поймы. На иве белой. Редок.
5676. *Dorytomus winteri* Korotyaev, 1976. Сибирско-дальневосточный бореомонтанный вид. Указан для горных тундр горы Иремель (Ольшванг, 1986).

Триба Curculionini

5677. *Archarius pyrrhoceras* (Marsham, 1802). Дубравы. На дубе. Обычен.
5678. *Archarius salicivorus* (Paykull, 1792). Берега рек. На ивах.
5679. *Curculio betulae* (Stephens, 1831) – указан для РБ как *Balaninus cerasorum* (Животный мир …, 1949)).
5680. *Curculio glandium* Marsham, 1802 – Дубовый плодожил. Дубравы. На дубе. Обычен.
5681. *Curculio nucum* Linnaeus, 1758 – Ореховый плодожил. Широколиственные леса. На лещине, иногда на дубе. Локален.
5682. *Curculio rubidus* (Gyllenhal, 1835) – Березовый плодожил. Березняки. На березе. Местами обычен.
5683. *Curculio venosus* (Gravenhorst, 1807). Дубравы. На дубе. Редок.
5684. *Curculio villosus* Fabricius, 1781. Октябрьский (Д. Аникина) (Хабибуллин, 2025б). Связан с дубом.

Триба Cionini

5685. *Cionus hortulanus* (Geoffroy, 1785). Луга, степи, опушки. На коровяках. Обычен.
5686. *Cionus leonhardi* Wingelmüller, 1914. Степи. На коровяке метельчатом. Редок.
5687. *Cionus montanus* Wingelmüller, 1914 (ранее указывался как *Cionus longicollis* C.N.F. Brisout de Barneville, 1863). Склоны, луга. На коровяке медвежьем. Спорадичен.
5688. *Cionus olivieri* Rosenschoeld, 1838. Степи. На коровяках, особенно на коровяке метельчатом. Обычный степной вид.
5689. *Cionus scrophulariae* (Linnaeus, 1758). Леса, опушки. На норичнике и реже на коровяках. Нечасто.
5690. *Cionus thapsus* (Fabricius, 1792). Луга, степи, опушки. На коровяках. Обычен.
5691. *Cionus tuberculosus* (Scopoli, 1763). Леса. На норичнике. Довольно редок.

Триба Rhamphini

5692. *Anoplus plantaris* Naezen, 1836. “Шихан Куштау, лес, на березе” (Дедюхин, 2025а).
5693. *Isochnus sequensi* (Stierlin, 1894) – Тополёвый прыгун. Указан для РБ (Животный мир …, 1949 – как *Orchestes populi*).

5694. *Orchestes* (*Alyctus*) *calceatus* (Germar, 1821). Дюртюли, пойма р. Белой, на березе (Дедюхин, 2025в).
5695. *Orchestes* (*Alyctus*) *rusci* (Herbst, 1795). Леса с участием берез. Обычен.
5696. *Orchestes* (*Alyctus*) *testaceus* (O. F. Müller, 1776). Ольшаники по берегам рек и на лесных болотах. На ольхе. Обычен.
5697. *Orchestes* (*Orchestes*) *hortorum* (Fabricius, 1792). Дубравы. На дубе. Обычен.
5698. *Orchestes* (*Orchestes*) *quercus* (Linnaeus, 1758) – Дубовый прыгун. Указан для РБ (Баянов и др., 2015).
? Orchestes (*Orchestes*) *subfasciatus* Gyllenhal, 1835 – Дубовый узкоминирующий долгоносик (Животный мир …, 1949 – как *Rhynchaenus subfasciatus*). Указание, вероятно, ошибочно.
5699. *Orchestes* (*Orchestes*) *sparsus* Fåhraeus, 1843. Дубравы. Локален, но местами бывает обычен.
5700. *Pseudorchestes ermischi* (Dieckmann, 1958). Луга, опушки, разнотравные степи. На васильке шероховатом. Нередок.
5701. *Pseudorchestes pratensis* (Germar, 1821). Луга, опушки. На васильке луговом. Нечасто.
5702. *Pseudorchestes smreczynskii* (Dieckmann, 1958). Обнажения, рудеральные места. На полыни горькой. Нередко.
5703. *Pseudorchestes stobieckyi* Smreczynski, 1957. Указан для РБ (Korotyaev, 1999; Zabaluev, 2025). Минёр на котовнике.
5704. *Rhynchaenus xylostei* Clairville, 1798. Опушки лесов, заросли кустарников. На жимолостях. Нечасто.
5705. *Rhamphus oxyacanthae* (Marsham, 1802). Заросли степных кустарников. На миндале. Редок.
5706. *Tachyerges decoratus* (Germar, 1821). Берега рек. На ивах. Спорадичен.

Триба Mecinini

5707. *Cleopomiarus graminis* (Gyllenhal, 1813). Степи, остепнённые луга. На колокольчиках. Обычен.
5708. *Gymnetron melanarium* (Germar, 1821). Луга, опушки, степи. На вероникax. Обычен.
5709. *Gymnetron veronicae* (Germar, 1821). Ручьи и малые реки. На веронике ключевой и реже на веронике поточной.
5710. *Gymnetron villosulum* Gyllenhal, 1838. Ручьи и малые реки. На веронике поточной. Галлообразователь на завязях. Местами обычен.
5711. *Mecinus collaris* Germar, 1821. Альш, гора-останец Сусактау, на подорожнике степном, 1 экземпляр (Дедюхин, 2024а).
5712. *Mecinus heydenii* Wencker, 1866. Склоны. На *Linaria vulgaris*. Редок.
5713. *Mecinus janthinus* Germar, 1821. Открытые биотопы. На льнянке (*Linaria vulgaris*). Довольно редок.
5714. *Mecinus pascuorum* (Gyllenhal, 1813). Рудеральные места, обнажения. На подорожнике ланцетолистном. Обычен.

5715. *Mecinus plantaginis* (Eppelsheim, 1875). Степи. На подорожнике степном. Местами обычен.
5716. *Miarus* ?*atricolor* Morimoto, 1983. Шихан Тратау. Определение предварительное (Дедюхин, 2012).
5717. *Miarus ajugae* (Herbst, 1795). Луга, опушки. На колокольчиках. Обычен.
5718. *Rhinusa antirrhini* (Paykull, 1800). Открытые биотопы. На льнянках. Обычен.
5719. *Rhinusa collina* (Gyllenhal, 1813). Луга. На льнянке. Редко.
5720. *Rhinusa neta* (Germar, 1821). Открытые биотопы. На льнянках. Обычен.
5721. *Rhinusa pilosa* (Gyllenhal, 1838). Степь у основания шихана Тратау. На льнянке дроколистной (Дедюхин, 2020а; Дедюхин, Мартынеко, 2020).
5722. *Rhinusa tetra* (Fabricius, 1792). Открытые биотопы. На коровяках. Многочислен.

Триба Smicronychini

5723. *Smicronyx coecus* (Reich, 1797). Разные биотопы. На повилике. Обычен.
5724. *Smicronyx jungermanniae* (Reich, 1797). Степи. На степных повиликах. Нередко.
5725. *Smicronyx nebulosus* Tournier, 1874. Степи. На степных повиликах. Локально.

Триба Styphlini

5726. *Pseudostyphlus pillumus* (Gyllenhal, 1835). Рудеральные биотопы, осыпи. На трехреберннике. Нередко.

Триба Tychiini

5727. *Pachytychius sparsutus* (Olivier, 1807). Кустарниковые степи и опушки. На рактинике. Локально.
5728. *Sibinia femoralis* Germar, 1823. Давл (гора Уртатау), петрофитная степь. На смолевках и смолевочках (Дедюхин, 2024а).
5729. *Sibinia hopffgarteni* Tournier, 1874. Степи, осыпи, опушки сосняков. На пустынницах (*Eremogone*). Обычен.
5730. *Sibinia pellucens* (Scopoli, 1772). Открытые биотопы. На гвоздичных. Обычен.
5731. *Sibinia phalerata* Gyllenhal, 1835. Петрофитные степи. На гвоздичных. Локален и редок.
5732. *Sibinia subelliptica* Desbrochers des Loges, 1873. Степи, особенно петрофитные. На гвоздиках. Локален.
5733. *Sibinia tibialis* Gyllenhal, 1835. Степи, осыпи. На смолевках. Локален.
5734. *Sibinia unicolor* Fåhraeus, 1843. Степи, осыпи, опушки сосняков. На качимах. Обычен.
5735. *Sibinia viscariae* (Linnaeus, 1761). Открытые биотопы. На гвоздичных. Обычен.
5736. *Sibinia vittata* Germar, 1823. Степи, особенно петрофитные. На гвоздиках. Редко.
5737. *Tychius albolineatus* Motschulsky, 1860. Луга, опушки, разнотравные степи. На горошках. Нечасто.

5738. *Tychius alexii* (Korotyaev, 1992). Петрофитные степи в природном парке «Аслы-Куль». Олигофаг на степных копеечниках (Дедюхин, 2024а). Реликтовый вид с дизъюнктивным ареалом. Включен в Красную книгу РБ (2025).
5739. *Tychius astragali* Becker, 1862. Разнотравные и ковыльные степи. На астрагалах. Местами обычен.
5740. *Tychius aureolus* Kiesenwetter, 1852 – Рыжий люцерновый семеед. Луга, склоны. На люцерне. Нечасто.
5741. *Tychius breviusculus* Desbrochers des Loges, 1873. Открытые биотопы. На донниках. Обычен.
5742. *Tychius flavus* Becker, 1864. Степи, сухие луга. На люцерне. Местами обычен.
5743. *Tychius lineatulus* Stephens, 1831. Уфа (С.В. Герасимов) (Хабибуллин, 2025б).
5744. *Tychius longulus* Desbrochers des Loges, 1873. Открытые сухие биотопы. На люцерне. Нередко.
5745. *Tychius medicaginis* C. N. F. Brisout de Barneville, 1863. Луга, степи, агроценозы. На люцерне. Обычен.
5746. *Tychius meliloti* Stephens, 1831. Рудеральные биотопы, обнажения, склоны. На донниках. Обычен.
5747. *Tychius molestus* Faust, 1891. Петрофитные степи. На розетковидных астрагалах (*Astragalus testiculatus* и *A. sareptanus*). Локален и редок.
5748. *Tychius picirostris* (Fabricius, 1787). Открытые биотопы. На клеверах. Обычен.
5749. *Tychius polylineatus* (Germar, 1823). Шихан Тратау (Дедюхин, 2025а). Очень редок.
5750. *Tychius quinquepunctatus* (Linnaeus, 1758). Опушки, луга, разреженные леса. На чинах и горошках. Обычен.
5751. *Tychius sharpi* Tournier, 1874. Остепнённые луга, разнотравные степи. На клевере горном. Регулярно.
5752. *Tychius squamulatus* Gyllenhal, 1836. с. Кушнаренково, берег р. Белой. На лядвенце (Дедюхин, 2024а).
5753. *Tychius stephensi* Schoenherr, 1835. Открытые биотопы. На клеверах. Обычен.
5754. *Tychius tectus* LeConte, 1876. Петрофитные и разнотравные степи. На остролодочниках. Локален.
5755. *Tychius tridentinus* Penecke, 1922. Петрофитные степи на глинистых, мергелистых и гипсовых склонах Белебеевской возвышенности. На некоторых видах астрагалов и остролодочников. Локален (Дедюхин, 2024а).
5756. *Tychius trivialis* Boheman, 1843. Мелкотравные луга, опушки. На астрагале датском. На кормовом растении – регулярен.
5757. *Tychius uralensis* Pic, 1902. Петрофитно-кустарниковые степи. На карагане. Часто.

5758. *Tychius junceus* (Reich, 1797). Склоны, пустоши. На люцерне хмелевидной. Локален.

Триба Bagoini

5759. *Bagous nodulosus* Gyllenhal, 1836. Берега и мелководья рек и стариц. На сусаке. Обычен.
5760. *Bagous validus* Rosenhauer, 1847. Берега и мелководья рек и стариц. На сусаке. Редок.
5761. *Hydronomus alismatis* (Marsham, 1802). Берега водоёмов, заболоченные луга. На частухе.

Подсемейство Hyperinae

5762. *Donus* (*Antidonus*) *dauci* (Olivier, 1807). Указан для РБ (Баянов и др., 2015).
5763. *Hypera* (*Kippenbergia*) *arator* (Linnaeus, 1758). Немногочисленный эвритопный вид. На гвоздичных.
5764. *Hypera* (*Boreohypera*) *diversipunctata* (Schrank, 1798). Бореомонтанный вид. Указан для высокогорий Большого и Малого Иремеля (Михайлов, Ермаков, 2016), но может быть и на равнине (особенно в поймах крупных рек).
5765. *Hypera* (*Eririnomorphus*) *conmaculata* (Herbst, 1795). Сырые леса и поймы. Преимущественно на зонтичных. Нередок.
5766. *Hypera* (*Eririnomorphus*) *interruptovittata* (Desbrochers des Loges, 1875). Шихан Юрактау, осыпь, на жабрице порезниковой, 1 экземпляр (Дедюхин, 2025a).
5767. *Hypera* (*Eririnomorphus*) *rogenhoferi* Ferrari, 1866. Стерлитамакские шиханы. Обнажения и осыпи. На купыре (Дедюхин, 2025a).
5768. *Hypera* (*Eririnomorphus*) *rumicis* (Linnaeus, 1758). Пойменные луга. На щавеле конском. Нечасто.
5769. *Hypera* (*Dapalinus*) *fornicata* (Penecke, 1928). Луга, опушки. На клеверах. Нередко.
5770. *Hypera* (*Dapalinus*) *meles* (Fabricius, 1792). Открытые биотопы. На клеверах. Нередко.
5771. *Hypera* (*Hypera*) *denominanda* (Capiomont, 1868). Луга. На горошках. Редок.
5772. *Hypera* (*Hypera*) *miles* (Paykull, 1792). Открытые биотопы. На чинах, горошках, донниках и др. Обычен.
5773. *Hypera* (*Hypera*) *nigrirostris* (Fabricius, 1775). Открытые биотопы. На клеверах. Нередко.
5774. *Hypera* (*Hypera*) *plantaginis* (DeGeer, 1775). Опушки дубрав, разнотравные степи. На вязеле и лядвенце. Нечасто.

– *Hypera* (*Hypera*) *postica* (Gyllenhal, 1813) – Листовой люцерновый слоник. Указание для РБ (Баянов и др., 2015) основано на ошибочном определении *Hypera transsilvanica*.

5775. *Hypera* (*Hypera*) *transsilvanica* (Petri, 1901). Открытые биотопы. На люцернах. Обычен.
5776. *Hypera* (*Hypera*) *viciae* (Gyllenhal, 1813). Склоны, опушки, леса. На горошках. Местами обычен.

5777. *Limobius borealis* (Paykull, 1792). Опушки лесов, луга. На геранях. Редок.
5778. *Metadonus anceps* (Boheman, 1842). Ксеротермные участки склонов и рудеральных биотопов. На маревых. Локален и редок.
5779. *Metadonus distinguendus* (Boheman, 1842). Петрофитные степи, солонцы. Локален и редок.

Подсемейство Entiminae

Триба Otiorhynchini

5780. *Otiorhynchus chrysostictus* Gyllenhal, 1834. Кустарниковые и разнотравные степи. Нередко.

– *Otiorhynchus coecus* Germar, 1824 – Черный скосарь. Был указан для РБ (Животный мир …, 1949 – как *Otiorhynchus niger*). Обитание этого западноевропейского вида на Урале невозможно.

5781. *Otiorhynchus concinnus* Gyllenhal, 1834. Кустарниковые и высокотравные луговые степи, избегает ксеротермных участков склонов. Локален. Перигляциальный реликт.
5782. *Otiorhynchus ligustici* (Linnaeus, 1758) – Большой люцерновый долгоносик. Обычный эвритопный вид (от степей до лесов). Многояден.
5783. *Otiorhynchus nodosus* (O. F. Müller, 1764). Высокогорья гор Большой и Малый Иремель (Михайлов, Ермаков, 2016). Аркто-бореомонтанный вид.
5784. *Otiorhynchus ovatus* (Linnaeus, 1758). Эврибионт. Широкий полифаг. Обычен.
5785. *Otiorhynchus politus* Gyllenhal, 1834. Высокогорья Большого и Малого Иремеля (Михайлов, Ермаков, 2016), а также пойма р. Белой (Дюрт) (Дедюхин, 2025в). Бореомонтанный вид.
5786. *Otiorhynchus raucus* (Fabricius, 1777). Склоны, осыпи, нагорные дубравы. Спорадичен.

– *Otiorhynchus scaber* (Linnaeus, 1758) – Указание для РБ (Баянов, Яковлева, 2001) этого вида ошибочно.

5787. *Otiorhynchus scopularis* Hochhuth, 1847. Крмс, д. Новомусино, опушка склоновой дубравы (Дедюхин, 2016б). Самое восточное из известных местонахождений этого неморального вида.
5788. *Otiorhynchus smreczynskii* Cmoluch, 1968. Населённые пункты. На сирени, ясени и некоторых других деревьях и кустарниках. Адвентивный вид. Обычен.
5789. *Otiorhynchus tristis* (Scopoli, 1763). Луга, опушки, леса. Обычен.
5790. *Otiorhynchus unctuosus* Germar, 1823. Петрофитные и кустарниковые степи. Локален.
5791. *Otiorhynchus* sp. aff. *ursus* Gebler, 1844. Еще не описанный вид. Известен по одному экземпляру, собранному в петрофитной степи шихана Юрактау (Дедюхин, 2025а).
5792. *Otiorhynchus velutinus* Germar, 1823. Разные типы степей. Обычен.

Триба Trachyphloeini

5793. *Romualdius scaber* (Linnaeus, 1758). Шарн, д. Нижнеазитово (С. Галиева) (Хабибуллин, 2025б).
5794. *Trachyphloeus heymesi* Hubenthal, 1934. Известняковые и гипсовые склоны, петрофитные степи. Локален.
5795. *Trachyphloeus spinimanus* Germar, 1823. Степи разных типов. Обычен.

Триба Cyphicerini

5796. *Sphaeroptochus fasciolatus* (Gebler, 1829). Стерлитамакские шиханы. Петрофитно-кустарниковые степи, на спиреях. Локален и редок.

Триба Peritelini

5797. *Centricnemus leucogrammus* (Germar, 1823). Разнотравные и ковыльные степи, склоны. Спорадичен, но местами многочислен.
– *Peritelus sphaeroides* Germar, 1823. Указан для РБ по одному экземпляру из коллекции Зоомузея БашГУ (Хабибуллин, 2017б). Обитание на территории республики этого западнопалеарктического вида маловероятно. Возможно, он был собран в другом регионе или попал сюда в результате непреднамеренного завоза.

Триба Omiini

5798. *Omiamima mollina* (Boheman, 1834). Широколиственные леса и их опушки. Локален и редок.
5799. *Omias puberulus* Boheman, 1834 (= *rotundatus* (Fabricius, 1792)). Открытые биотопы. Обычен.
5800. *Omias verruca* Boheman, 1834. Остепнённые луга, пустоши, нарушенные степи. Местами обычен.
5801. *Urometopus moczarskii* Penecke, 1929. Локален и редок. Обнаружен во влажных широколиственных лесах Стерлитамакских шиханов (Куштау, Тратау) (Дедюхин, 2025а). Указан для Уфы (Ш. Муртазин) (Хабибуллин, 2025б).
5802. *Urometopus nemorum* L. Arnol'di, 1965. Нурм, СОЛ «Авиатор» (Хабибуллин, 2024а).

Триба Phyllobiini

5803. *Phyllobius arborator* (Herbst, 1797). Указан для РБ (Баянов и др., 2015).
5804. *Phyllobius argentatus* (Linnaeus, 1758) – Серебристый долгоносик. Леса. На березе, осине, дубе. Нередко.
5805. *Phyllobius brevis* Gyllenhal, 1834. Открытые биотопы. Очень обычен.
5806. *Phyllobius contemptus* Schoenherr, 1832. Опушки лесов, кустарниковые заросли, рудеральные места. Обычен.
5807. *Phyllobius crassipes* Motschulsky, 1860. Дюрт, пойма р. Белой (Дедюхин, 2025в).
5808. *Phyllobius dahli* Korotyaev, 1984. с. Кушнаренково, берег р. Белой, на полыни высокой, 4 экземпляра (Дедюхин, 2025в).
5809. *Phyllobius glaucus* (Scopoli, 1763). Леса, в основном широколиственные. Нечасто.

5810. *Phyllobius maculicornis* Germar, 1823. Леса, опушки, кустарниковые степи. Обычен.
5811. *Phyllobius pomaceus* Gyllenhal, 1834. Тенистые биотопы, поймы, населённые пункты. Многояден. Особенно част на крапиве.
5812. *Phyllobius pyri* (Linnaeus, 1758). Леса, кустарниковые степи, населённые пункты. Разные деревья и кустарники. Многочислен.
– *Phyllobius roboretanus* Gredler, 1882. Указание для РБ (Баянов и др., 2015) этого западноевропейского вида ошибочно.
5813. *Phyllobius thalassinus* Gyllenhal, 1834. Влажные пойменные луга. Локален.
5814. *Phyllobius virideaeris* (Laicharting, 1781) – Зеленый листовой долгоносик. Указан для РБ (Баянов и др., 2015).
5815. *Phyllobius viridicollis* (Fabricius, 1792). Леса, опушки. В основном на деревьях, но на шихане Тратау жуки изредка встречаются в высокотравных ложбинах на цветущем таране (*Aconogonon alpinum*) (Дедюхин, 2025а). Локален.

Триба Polydrusini

5816. *Liophloeus tessulatus* (O. F. Müller, 1776). Высокотравье в поймах, широколиственные леса и их опушки. На зонтичных. Нечасто.
5817. *Polydrusus amoenus* (Germar, 1824). Указан для РБ (Баянов и др., 2015).
5818. *Polydrusus cervinus* (Linnaeus, 1758). Лиственные леса. На дубе, березе и др. Нечасто.
5819. *Polydrusus confluens* Stephens, 1831. Природный парк «Аслы-Куль», кустарниковая степь, на ректинике (Дедюхин, 2024а).
5820. *Polydrusus corruscus* Germar, 1824. Берега рек. На ивах. Спорадичен.
5821. *Polydrusus flavipes* (DeGeer, 1775). Лиственные леса. На деревьях. Нередко.
5822. *Polydrusus formosus* (Mayer, 1779). Указан для РБ (Баянов и др., 2015). Адвентивный вид.
5823. *Polydrusus fulvicornis* (Fabricius, 1792). Ольшаники, березняки. На ольхе и березе. Редок.
5824. *Polydrusus inustus* Germar, 1823. Кустарниковые степи, населённые пункты. Обычен.
5825. *Polydrusus mollis* (Strøm, 1768). Леса. На дубе, липе, осине и др. Обычен.
5826. *Polydrusus pilosus* Gredler, 1866. Указан для РБ (Баянов и др., 2015).
5827. *Polydrusus pterygomalis* Boheman, 1840. Широколиственные леса. На дубе, осине, ольхе. Местами обычен.
5828. *Polydrusus tereticollis* (DeGeer, 1775). Леса разных типов, населённые пункты. На деревьях. Обычен.

Триба Sciaphilini

5829. *Barypeithes pellucidus* (Boheman, 1834). Уфа (Ш. Муртазин) (Хабибуллин, 2025б). Адвентивный вид.
5830. *Brachysomus echinatus* (Bonsdorff, 1785). Леса. Подстилочный вид. Обычен.

5831. *Brachysomus lituratus* (Stierlin, 1884). Степные останцы на Белебеевской возвышенности (природный парк «Аслы-Куль», гора Уртатау). Ксеротермический (средиземноморский) реликт (Дедюхин, 2024а, 2024б).
5832. *Eusomostrophus acuminatus* (Boheman, 1840). Степи, остепнённые луга. Местами обычен.
5833. *Eusomus ovulum* Germar, 1823. Открытые биотопы. На травах. Обычен.
5834. *Foucartia squamulata* (Herbst, 1795). Открытые биотопы. На травах. Обычен.
5835. *Sciaphilus asperatus* (Bonsdorff, 1785). Леса, парки. В подлеске. Нередок.
5836. *Sciaphobus ningnidus* (Germar, 1823). Дубравы, поймы. Спорадичен.

Триба Brachyderini

5837. *Brachyderes incanus* (Linnaeus, 1758). Указан для РБ (Животный мир …, 1949).

Триба Psallidiini

5838. *Psallidium maxillosum* (Fabricius, 1792) – Черный свекловичный долгоносик. Указан для РБ (Мурзабаева, 2016).

5839. **Триба Tanymecini**

? Chlorophanus flavescens (Fabricius, 1787) (= *graminicola* Schoenherr, 1832). Указан для РБ по коллекции Зоомузея БашГУ (Хабибуллин, 2017б). Обитание в РБ этого вида требует подтверждения.
5840. *Chlorophanus micans* Krynicki, 1832 (= *sellatus* (Fabricius, 1798)). Берега крупных рек. На узколистных ивах. Локально.
5841. *Chlorophanus viridis* (Linnaeus, 1758) – Долгоносик-зеленушка. Поймы рек. На ивах и травах. Локален, но местами обычен.
5842. *Cycloderes pilosulus* (Herbst, 1795). Обнажения, осыпи, степи. Нередко.
5843. *Tanymecus palliatus* (Fabricius, 1787). Открытые биотопы. Очень обычен.

Триба Sitonini

? Charagmus griseus (Fabricius, 1775) **–** Люпиновый долгоносик. Указание для РБ (Баянов и др., 2015) этого вида требует подтверждения. Возможно, оно должно относиться к другому виду этого рода.
5844. *Sitona ambiguus* Gyllenhal, 1834. Луга, разреженные леса. На чинах, реже на горошках. Обычен.
5845. *Sitona callosus* Gyllenhal, 1834. Степи, остепнённые луга. На астрагалах, эспарцете и других бобовых. Нечасто.
5846. *Sitona cylindricollis* Fåhraeus, 1840. Открытые биотопы. На донниках. Обычен. Указан также для высокогорий Большого Иремеля (Михайлов, Ермаков, 2016).
5847. *Sitona hispidulus* (Fabricius, 1777). Обнажения, берега рек, населённые пункты. Местами обычен.
5848. *Sitona humeralis* Stephens, 1831. Указан для РБ (Баянов и др., 2015).
5849. *Sitona inops* Schoenherr, 1832. Открытые биотопы. На люцернах. Обычен.
5850. *Sitona languidus* Gyllenhal, 1834. Луговые степи, опушки дубрав. На вязеле. Локален, но на кормовом растении – регулярен.

5851. *Sitona lateralis* Gyllenhal, 1834. Луга, опушки, разнотравные степи. На чинах и других бобовых. Обычен.
5852. *Sitona lineatus* (Linnaeus, 1758) – Полосатый клубеньковый долгоносик. Открытые биотопы. Обычен.
5853. *Sitona lineellus* (Bonsdorff, 1785). Осыпи, петрофитно-кустарниковые степи, редко – луга. На бобовых, особенно на карагане. Локален.
5854. *Sitona longulus* Gyllenhal, 1834 **–** Люцерновый корневой долгоносик. Сухие открытые биотопы. На люцерне. Нередко.
5855. *Sitona macularius* (Marsham, 1802) – Щетинистый клубеньковый долгоносик. Открытые биотопы. На разных бобовых. Обычен.
5856. *Sitona obsoletus* (Gmelin, 1790) (= *lepidus* Gyllenhal, 1834). Открытые биотопы. На клеверах. Обычен.
5857. *Sitona onerosus* Faust, 1890. Степные останцы на Бугульминской возвышенности. На остролодочниках и копеечниках (Дедюхин, Коротяев, 2024). Локален. Реликтовый степной вид.
5858. *Sitona puncticollis* Stephens, 1831. Луга, населённые пункты. На клеверах. Редок.
5859. *Sitona striatellus* Gyllenhal, 1834. Опушки сосняков, кустарниковые степи. На рактинике. Обычен.
5860. *Sitona sulcifrons* (Thunberg, 1798). Открытые биотопы. На клевере. Многочислен.
5861. *Sitona suturalis* Stephens, 1831. Луга, опушки. На чинах. Обычен.
5862. *Sitona waterhousei* Walton, 1846. с. Кушнаренково, берег р. Белой, на лядвенце (Дедюхин, 2024а)

Триба Byrsopagini

5863. *Trichalophus rudis* Boheman, 1842 (= *biguttatus* (Gebler, 1832); *korotyaevi* Zherikhin & Nazarov, 1990). Высокогорья горы Большой Иремель (Yunakov et al., 2012; Михайлов, Ермаков, 2016). Альпийский сибиро-уральский вид.

Семейство Scolytidae – Короеды

Триба Scolytini

5864. *Scolytus intricatus* (Ratzeburg, 1837) – Дубовый заболонник. Насаждения дуба. Обычен.
5865. *Scolytus koenigi* Schevyrew, 1890 – Кленовый заболонник. Указан для РБ (Животный мир …, 1949). Развивается на кленах.
5866. *Scolytus mali* (Bechstein, 1805) – Плодовый заболонник. Сады. На старых яблонях и сливах.
5867. *Scolytus morawitzi* Semenov, 1902 – Заболонник Моравица. Указан для РБ (Баянов и др., 2015). Вероятно, в горных лесах Урала, так как тесно связан с лиственницей.
5868. *Scolytus multistriatus* (Marsham, 1802) – Струйчатый ильмовый заболонник. Поймы, населённые пункты. На вязах. Обычен.
5869. *Scolytus pygmaeus* (Fabricius, 1787). Уфа (Ш. Муртазин) (Хабибуллин, 2025б). Развивается на вязах.

5870. *Scolytus ratzeburgii* E.W. Janson, 1856 – Березовый заболонник. На старых сухостойных и поваленных березах.
5871. *Scolytus rugulosus* (Müller, 1818) – Морщинистый заболонник. Указан для РБ (Баянов и др., 2015). Связан с плодовыми.
5872. *Scolytus scolytus* (Fabricius, 1775) – Большой ильмовый заболонник. На старых вязах. Обычен.
5873. *Scolytus sulcifrons* Rey, 1892. Уфа (Ш. Муртазин) (Хабибуллин, 2025б). Развивается на вязах.

Триба Cortylini

5874. *Pityophthorus micrographus* (Linnaeus, 1758). Леса с участием хвойных. На веточках ели.

Триба Cryphalini

5875. *Ernoporus tilliae* (Panzer, 1793) – Липовый крифал. В коре сучьев и небольших стволов липы. Местами обычен.
5876. *Trypophloeus alni* (Lindemann, 1875) – Ольховый короед. Указан для РБ (Животный мир …, 1949). На ольхе.
5877. *Trypophloeus asperatus* (Gyllenhal, 1813). Леса. В коре осин. Местами многочислен.
5878. *Trypophloeus granulatus* (Ratzeburg, 1837). Указан для РБ (Животный мир …, 1949).

Триба Crypturgini

5879. *Crypturgus cinereus* (Herbst, 1793) – Сосновый короед крошка. Указан для РБ (Животный мир …, 1949).
5880. *Crypturgus pusillus* (Gyllenhal, 1813) – Еловый короед крошка. Указан для РБ (Животный мир …, 1949).

Триба Dryocoetini

5881. *Dryocoetes autographus* (Ratzeburg, 1837) – Лесовик-автограф. Указан для РБ (Животный мир …, 1949).
5882. *Dryocoetes baicalicus* Reitter, 1899. Указан для РБ (Баянов и др., 2015). Вероятно, в горных лесах Урала. Тесно связан с лиственницей.
5883. *Thamnurgus caucasicus* Reitter, 1887 – Стмк, шихан Юрактау (Дедюхин, 2020в).
5884. *Thamnurgus petzi* Reitter, 1901 – Стмк, шихан Куштау (Дедюхин, 2020в).

Триба Hylastini

5885. *Hylastes ater* (Paykull, 1800) – Черный корнежил. Указан для РБ (Баянов и др., 2015).
5886. *Hylastes cunicularius* Erichson, 1836 – Еловый корнежил. Указан для РБ (Баянов и др., 2015).
5887. *Hylastes opacus* Erichson, 1836 – Малый еловый корнежил. Указан для РБ (Баянов и др., 2015).
5888. *Hylesinus crenatus* (Fabricius, 1787) – Большой ясеневый лубоед. Указан для РБ (Баянов и др., 2015). Адвентивный вид.

5889. *Hylesinus fraxini* (Panzer, 1779) – Ясеневый короед. Уфа (Хабибуллин, 2025б). Адвентивный вид.
5890. *Hylesinus varius* (Fabricius, 1775) – Уфа 1986 и 2006 (Герасимов, 2021б)
5891. *Hylurgops glabratus* (Zetterstedt, 1828) – Черно-бурый лубоед. Связан с хвойными. Редок.
5892. *Hylurgops palliatus* (Gyllenhal, 1813) – Малый еловый лубоед. На ели и сосне. Обычен.

Триба Ipini

5893. *Ips acuminatus* (Gyllenhal, 1827) – Вершинный короед. Указан для РБ (Баянов и др., 2015). Развивается на сосне.
5894. *Ips cembrae* (Heer, 1836) – Большой лиственничный короед. Указан для РБ (Баянов и др., 2015). Только в горных лесах Урала. Тесно связан с лиственницей.
5895. *Ips duplicatus* (Sahlberg, 1836) – Короед-двойник. В лесах с участием ели и сосны. Обычен.
5896. *Ips sexdentatus* (Borner, 1776) – Шестизубый короед, или стенограф. В старых сосновых лесах. Нечасто.
5897. *Ips typographus* (Linnaeus, 1758) – Короед-типограф. В лесах и лесопарках с участием хвойных. Многочислен.
5898. *Orthotomicus laricis* (Fabricius, 1792). Указан для РБ (Баянов и др., 2015). Связан с хвойными.
5899. *Orthotomicus longicollis* (Gyllenhal, 1827) – Длинногрудый короед. Указан для РБ (Баянов и др., 2015). Европейский вид. Указание требует подтверждения.
5900. *Orthotomicus proximus* (Eichhoff, 1867) – Валежный короед. На хвойных. Обычен.
5901. *Orthotomicus sutularis* (Gyllenhal, 1827) – Короед пожарищ. На хвойных. Местами обычен.
5902. *Pityogenes bidentatus* (Herbst, 1783) – Двузубый гравер. Указан для РБ (Баянов и др., 2015).
5903. *Pityogenes chalcographus* (Linnaeus, 1761) – Обыкновенный гравер, или халькограф. На хвойных. Многочислен.
5904. *Pityogenes irkutensis irkutensis* Eggers, 1910 – Сибирский, или иркутский гравер. Указан для РБ (Баянов и др., 2015).
Pityogenes irkutensis monacensis Fuchs, 1911. Указан для РБ (Баянов и др., 2015). Указание требует подтверждения.
5905. *Pityogenes quadridens* (Hartig, 1834) – Четырехзубый гравер. Указан для РБ (Баянов и др., 2015).

Триба Polygraphini

5906. *Carphoborus cholodkovskyi* Spessivtsev, 1916 – Малый лубоед Холодковского. В основном на сосне. Редок.
5907. *Carphoborus minimus* (Fabricius, 1798) – Малый степной лубоед. Указан для РБ (Баянов и др., 2015).

5908. *Polygraphus poligraphus* (Linnaeus, 1758) – Пушистый полиграф. В основном на ели и пихте. Обычен.
5909. *Polygraphus proximus* Blandford, 1894 – Уссурийский полиграф. Инвазионный вид дальневосточного происхождения. Опаснейший вредитель пихты сибирской. Отмечен в Блрц (iNaturalist, М. Барлыбаева, 2024).

Триба Tomicini

5910. *Dendroctonus micans* (Kugelann, 1794) – Большой еловый лубоед. Старые темнохвойные леса. Очень редок.
5911. *Hylurgus ligniperda* (Fabricius, 1787) – Волосатый лубоед. Указан для РБ (Баянов и др., 2015).
5912. *Tomicus minor* (Hartig, 1834) – Малый сосновый лубоед. Сосновые леса. Обычен.
5913. *Tomicus piniperda* (Linnaeus, 1758) – Большой сосновый лубоед (садовник, скрипун). Сосновые леса. На сосне. Многочислен.
5914. *Xylechinus pilosus* (Ratzeburg, 1837) – Пальцеходный лубоед. Горные леса с участием пихты. Обычен, но немногочислен.

Триба Xyloterini

5915. *Trypodendron domesticum* (Linnaeus, 1758). Указан для РБ (Баянов и др., 2015).
5916. *Trypodendron lineatum* (Olivier, 1795) – Хвойный (полосатый) древесинник. На хвойных.
5917. *Trypodendron signatum* (Fabricius, 1792). Леса. На лиственных, особенно на березе и осине. Обычен.

Триба Xyleborini

5918. *Xyleborus dispar* (Fabricius, 1792) – Западный непарный короед. На лиственных, в том числе плодовых. Обычен.

? Xyleborus pfeilii (Ratzeburg, 1837) – Короед Пфейля. Указан для РБ (Животный мир …, 1949). Указание требует подтверждения

Отряд Trichoptera – Ручейники

Подотряд Spicipalpia

Семейство Glossosomatidae

5919. *Agapetus fuscipes* Curtis, 1834

Семейство Hydroptilidae

5920. *Agraylea multipunctata* Curtis, 1834
5921. *Hydroptila pulchricornis* Pictet, 1834
5922. *Hydroptila tineoides* Dalman, 1819
5923. *Hydroptila vectis* Curtis, 1834
5924. *Ithytrichia lamellaris* Eaton, 1873
5925. *Orthotrichia costalis* (Curtis, 1834)
5926. *Oxyethira sp.*

Семейство Rhyacophilidae

5927. *Rhyacophila nubila* Zetterstedt, 1840

5928. *Rhyacophila obliterata* McLachlan, 1863
5929. *Rhyacophila pascoei* McLachlan, 1879

Подотряд Annulipalpia – Кольчатощупиковые

Семейство Ecnomidae

5930. *Ecnomus tenellus* (Rambur, 1842)

Семейство Hydropsychidae

5931. *Arctopsyche ladogensis* (Kolenati, 1859)
5932. *Cheumatopsyche lepida* (Pictet, 1834)
5933. *Hydropsyche angustipennis* (Curtis, 1834)
5934. *Hydropsyche contubernalis* McLachlan, 1865
5935. *Hydropsyche guttata* Pictet, 1834
5936. *Hydropsyche ornatula* McLachlan, 1878
5937. *Hydropsyche pellucidula* (Curtis, 1834)

Семейство Polycentropodidae

5938. *Cyrnus flavidus* McLachlan, 1864
5939. *Holocentropus dubius* (Rambur, 1842)
5940. *Holocentropus picicornis* (Stephens, 1836)
5941. *Neureclepsis bimaculata* (Linnaeus, 1758)
5942. *Plectrocnemia conspersa* (Curtis, 1834)
5943. *Polycentropus flavomaculatus* (Pictet, 1834)

Семейство Psychomyiidae

5944. *Psychomyia pusilla* (Fabricius, 1781)

Подотряд Integripalpia – Цельнощупиковые

Семейство Apataniidae

5945. *Apatania zonella* (Zetterstedt, 1840)

Семейство Brachycentridae

5946. *Brachycentrus subnubilus* Curtis, 1834

Семейство Goeridae

5947. *Goera pilosa* (Fabricius, 1775) – Ишмб 2023, Уфа 2021-2023
5948. *Silo pallipes* (Fabricius, 1781) – Блрц (Чаус, 2022)

Семейство Lepidostomatidae

5949. *Lepidostoma hirtum* (Fabricius, 1775)

Семейство Leptoceridae

5950. *Athripsodes albifrons* (Linnaeus, 1758) – Уфа, Уфмс, Крмс, Иглн
5951. *Athripsodes aterrimus* (Stephens, 1836)
5952. *Athripsodes cinereus* (Curtis, 1834)
5953. *Athripsodes leucophaeus* (Rambur, 1842)
5954. *Ceraclea nigronervosa* (Retzius, 1783)
5955. *Leptocerus tineiformis* Curtis, 1834 – Уфа 2021
5956. *Mystacides azureus* (Linnaeus, 1758)
5957. *Mystacides longicornis* (Linnaeus, 1758)
5958. *Mystacides niger* (Linnaeus, 1758)

5959. *Oecetis furva* (Rambur, 1842)
5960. *Oecetis ochracea* (Curtis, 1825)
5961. *Triaenodes bicolor* (Curtis, 1834)

Семейство Limnephilidae

5962. *Anabolia furcata* Brauer, 1857
5963. *Anabolia laevis* (Zetterstedt, 1840)
5964. *Anabolia soror* McLachlan, 1875 – Блрц (Чаус, 2022)
5965. *Chaetopteryx sahlbergi* McLachlan, 1876
5966. *Chaetopteryx villosa* (Fabricius, 1798)
5967. *Chilostigma sieboldi* McLachlan, 1876 – на снегу
5968. *Dicosmoecus palatus* McLachlan, 1872
5969. *Glyphotaelius pellucidus* (Retzius, 1783)
5970. *Grammotaulius nigropunctatus* (Retzius, 1783) – Блрц (Чаус, 2022)
5971. *Grammotaulius nitidus* (Muller, 1764)
5972. *Halesus interpunctatus* (Zetterstedt, 1840) – Блрц (Чаус, 2022)
5973. *Halesus radiatus* (Curtis, 1834) – реки Ашкадар, Селеук, Инзер, Зилаир, Большой Ик (Чаус, 2018б)
5974. *Limnephilus bipunctatus* Curtis, 1834
5975. *Limnephilus borealis* (Zetterstedt, 1840)
5976. *Limnephilus decipiens* (Kolenati, 1848)
5977. *Limnephilus extricatus* McLachlan, 1865
5978. *Limnephilus flavicornis* (Fabricius, 1787)
5979. *Limnephilus griseus* (Linnaeus, 1758)
5980. *Limnephilus nigriceps* (Zetterstedt, 1840)
5981. *Limnephilus picturatus* McLachlan, 1875
5982. *Limnephilus politus* McLachlan, 1865
5983. *Limnephilus rhombicus* (Linnaeus, 1758)
5984. *Limnephilus sericeus* (Say, 1824)
5985. *Limnephilus stigma* Curtis, 1834
5986. *Limnephilus vittatus* (Fabricius, 1798)
5987. *Nemotaulius punctatolineatus* (Retzius, 1783)
5988. *Potamophylax latipennis* (Curtis, 1834)
5989. *Potamophylax nigricornis* (Pictet, 1834)
5990. *Potamophylax rotundipennis* (Brauer, 1857)

Семейство Molannidae

5991. *Molanna albicans* (Zetterstedt, 1840)
5992. *Molanna angustata* Curtis, 1834
5993. *Molanna submarginalis* McLachlan, 1872
5994. *Molannodes tinctus* (Zetterstedt, 1840)

Семейство Odontoceridae

5995. *Odontocerum albicorne* (Scopoli, 1763)

Семейство Phryganeidae

5996. *Agrypnetes crassicornis* Mclachlan, 1876

5997. *Agripnia pagetana* Curtis, 1835 – Стерлитамак (Чаус, 2015)
5998. *Agripnia varia* (Fabricius, 1793)
5999. *Phryganea bipunctata* Retzius, 1783
6000. *Phryganea grandis* Linnaeus, 1758 – Ручейник большой
6001. *Semblis atrata* (Gmelin, 1789)
6002. *Semblis phalaenoides* (Linnaeus, 1758)

Семейство Sericostomatidae

6003. *Notidobia ciliaris* (Linnaeus, 1761)
6004. *Sericostoma personatum* (Kirby & Spence, 1826)

Отряд Lepidoptera – Чешуекрылые

Подотряд Zeugloptera (Н.Н. Исмагилов)

Надсемейство Micropterigoidea

Семейство Micropterigidae – Зубатые моли (мелкокрылы) (3 вида)

6005. *Micropterix aruncella* (Scopoli, 1763) – без местонахождений [Трофимова, 2006б, 2015; Anikin et al., 2009, 2017]. Преимущественно в старовозрастных лесах по разнотравным опушкам и полянам.
6006. *Micropterix aureatella* (Scopoli, 1763) – Архн, Блрц [Ольшванг, Малоземов, 1987; Трофимова, 2006б]. В бореальных лесах с участием вересковых (*Vaccinium* spp.).
6007. *Micropterix calthella* (Linnaeus, [1760]) – Уфа, Блрц [Круликовский, 1901; Исмагилов, 2025б]. Характерен для широколиственных лесов, по сыроватым опушкам и полянам.

Подотряд Glossata

Инфраотряд Eriocraniomorpha (=Dacnonypha) (Н.Н. Исмагилов)

Надсемейство Eriocranioidea

Семейство Eriocraniidae – Беззубые первичные моли (3 вида)

6008. *Eriocrania cicatricella* (Zetterstedt, 1839) – Уфа [Исмагилов и др., 2022]. По лесам и посадкам с участием берез (*Betula* spp).
6009. *Eriocrania semipurpurella* (Stephens, 1834) – Уфа [Саттаров и др., 2024]. По лесам и посадкам с участием берез (*Betula* spp).
6010. *Eriocrania sparrmannella* (Bosc, 1791) – Бурз, Уфа [Положенцев, 1947; Саттаров и др., 2024]. По лесам и посадкам с участием берез (*Betula* spp.).

Инфраотряд Hepialomorpha (=Exoporia) (Н.Н. Исмагилов)

Надсемейство Hepialoidea

Семейство Hepialidae – Тонкопряды (5 видов)

6011. *Gazoryctra ganna* (Hübner, [1804]) – Блрц [Паженков и др., 2005; Трофимова, 2006б]. В лесах бореального типа с черничниками.
6012. *Hepialus humuli* (Linnaeus, 1758) – на всей территории. Эвритопный лугово-полевой вид.

6013. *Korscheltellus fusconebulosa* (De Geer, 1778) – Блрц, Абзл [Ольшванг, Малоземов, 1987; Исмагилов и др., 2020]. В лесах с участием папоротника-орляка (*Pteridium pinetorum*).
6014. *Phymatopus hecta* (Linnaeus, 1758) – Блрц [Ольшванг, Малоземов, 1987]. В лесах бореального типа.
6015. *Triodia sylvina* (Linnaeus, [1760]) – на всей территории. Эвритопный лесной вид.

Инфраотряд Nepticulomorpha (Н.Н. Исмагилов)

Надсемейство Nepticuloidea

Семейство Nepticulidae – Моли-малютки (15 видов, наличие еще 1 не подтверждено)

Подсемейство Nepticulinae

6016. *Ectoedemia argyropeza* (Zeller, 1839) – без местонахождений [Положенцев, 1949]. Монофаг осины (*Populus tremula*).
6017. *Ectoedemia occultella* (Linnaeus, 1767) (=*argentipedella* Zeller, 1839) – Уфа [Саттаров и др., 2024]. Монофаг берез (*Betula* spp.).
6018. *Ectoedemia turbidella* (Zeller, 1848) – Октябрьский [Черепанова, Саттаров, 2023]. Монофаг осины (*Populus alba* L.) и тополя сереющего (*P. canescens* (Aiton.)).
6019. *Etainia sericopeza* (Zeller, 1839) – Уфа [Исмагилов, 2023]. Монофаг клена платановидного (*Acer platanoides*).
6020. *Stigmella aceris* (Frey, 1857) – Уфа [Исмагилов и др., 2021а]. В широколиственных и смешанных лесах, посадках, паркам с участием кленов (*Acer* spp.).
6021. *Stigmella atricapitella* (Haworth, 1828) – без местонахождений [Положенцев, Кучеров, 1949б]. Монофаг дуба (*Quercus robur*).
6022. *Stigmella basiguttella* (Heinemann, 1862) – без местонахождений [Положенцев, Кучеров, 1949б]. Монофаг дуба (*Quercus robur*).
6023. *Stigmella betulicola* (Stainton, 1856) – Уфа [Саттаров и др., 2024]. По разреженным смешанным и лиственным лесам, посадкам, паркам с участием берез (*Betula* spp.).
6024. *Stigmella lonicerarum* (Frey, 1857) – без местонахождений [Положенцев, 1949]. Монофаг жимолостей (*Lonicera* spp.).
6025. *Stigmella malella* (Stainton, 1854) – Уфа [Исмагилов и др., 2021а]. Монофаг яблонь (*Malus* spp.).
6026. *Stigmella nylandriella* (Tengström, 1848) (=*aucupariae* Frey, 1846) – Аург [Саттаров и др., 2023]. Монофаг рябин (*Sorbus* spp.).
6027. *Stigmella salicis* (Stainton, 1854) – Уфа [Исмагилов и др., 2022]. Монофаг ив (*Salix* spp.).
6028. *Stigmella sorbi* (Stainton, 1861) – Альш [Хабибуллин, 2018а]. Полифаг розоцветных.
6029. *Stigmella tiliae* (Frey, 1856) – без местонахождений [Положенцев, 1949]. Умеренно эвритопный лесной вид трофически связанный с липами (*Tilia* spp.)

? *Stigmella thuringiaca* (Petry, 1904) – Белб [Круликовский, 1910; Anikin et al., 2017] (?). В первой цит. работе приводился без определения вида по минам на листьях кровохлебки лекарственной (*Sanguisorba officinalis*) и земляники лесной (*Fragaria vesca*). Во второй – предыдущее указание было соотнесено с данным видом. Однако мины этой бабочки трудно отличимы и могут относиться к другим представителям рода *Stigmella*.

6030. *Stigmella ulmivora* (Fologne, 1860) (=*ulmifoliae* Hering 1931) – без местонахождений [Положенцев, 1949]. Монофаг вязов (*Ulmus* spp.).

Семейство Opostegidae – Опостегиды (2 вида)

6031. *Opostega salaciella* (Treitschke, 1833) – без местонахождений [Трофимова, 2006б, 2015; Anikin et al., 2009, 2017]. Вероятно, монофаг щавелей (*Rumex* spp.).

6032. *Pseudopostega crepusculella* (Zeller, 1839) – Абзл [Исмагилов и др., 2022]. Монофаг мят (*Mentha* spp.).

Инфраотряд Adelomorpha (Н.Н. Исмагилов)

Надсемейство Adeloidea

Семейство Heliozelidae – Моли-блестянки (1 вид)

6033. *Heliozela hammoniella* Sorhagen, 1885 (=*betulae* (Stainton, 1890)) – Уфа [Саттаров и др., 2024]. Монофаг берез (*Betula* spp.).

Семейство Adelidae – Аделиды (19 видов)

Подсемейство Adelinae

6034. *Adela croesella* (Scopoli, 1763) – Уфа [Исмагилов, 2023]. Гусеницы сапрофаги бирючины обыкновенной (*Ligustrum vulgare*).

6035. *Adela cuprella* ([Denis et Schiffermüller], 1775) – Чишм, Уфа [Круликовский, 1901; Исмагилов, 2025б]. Умеренно эвритопный лесной мезофил. Гусеницы сапрофаги ивы белой (*Salix alba*).

6036. *Cauchas canalella* (Eversmann, 1844) – Нефтекамск [Исмагилов и др., 2021б]. По влажным и пойменным лугам.

6037. *Cauchas fibulella* ([Denis et Schiffermüller], 1775) – Чишм, Уфмс [Круликовский, 1901; Исмагилов и др., 2021б]. Монофаг вероники дубравной (*Veronica chamaedrys*).

6038. *Cauchas leucocerella* (Scopoli, 1763) – Белб, Уфмс, Крмс [Круликовский, 1910; Исмагилов и др., 2020; Исмагилов, 2025б]. Монофаг вероник (*Veronica* spp.).

6039. *Nemophora basella* (Eversmann, 1844) – без местонахождений [Трофимова, 2006б, 2015; Anikin et al., 2009, 2017]. По лесам с участием спиреи средней (*Spiraea media*).

6040. *Nemophora cupriacella* (Hübner, [1819]) – Чишм [Круликовский, 1901]. Хортофаг короставника *полевого (Knautia arvensis*) и сивца лугового (*Succisa pratensis*).

6041. *Nemophora degeerella* (Linnaeus, 1758) – на всей территории. По опушкам лесов неморального и бореального типа.

6042. *Nemophora dumerilella* (Duponchel, [1839]) – без местонахождений [Трофимова, 2006б, 2015; Anikin et al., 2009, 2017]. Монофаг вероник (*Veronica* spp.).
6043. *Nemophora fasciella* (Fabricius, 1775) (=*annae* (Zeller, 1853)) – Крмс [Исмагилов и др., 2020]. По лугам и лесным полянам.
6044. *Nemophora metallica* (Poda, 1761) – по всей территории, по лугам и разреженным лесам. Хортофаг короставника ворсянколистного (*Knautia dipsacifolia*).
6045. *Nemophora mollella* (Hübner, [1816]) – Блрц [Трофимова, 2006б]. По сухим остепнённым лугам и склонам, по опушкам сухих сосновых боров.

Подсемейство Nematopogoninae

6046. *Nematopogon metaxella* (Hübner, [1813]) – без местонахождений [Трофимова, 2006б, 2015; Anikin et al., 2009, 2017]. Гусеницы сапрофаги во влажных бореальных лесах.
6047. *Nematopogon swammerdamella* (Linnaeus, 1758) – Крдл [Валуев, Исмагилов, 2022]. Гусеницы сапрофаги лесного опада.

Подсемейство Prodoxinae

6048. *Lampronia capitella* (Clerck, 1759) – Блрц [Ольшванг, Малоземов, 1987]. Монофаг смородин (*Ribes* spp.).
6049. *Lampronia corticella* (Linnaeus, 1758) (=*rubiella* (Bjerkander, 1781)) – Блрц, Крмс, Уфа [Трофимова, 2006б; Исмагилов и др., 2020; Исмагилов, 2025б]. Монофаг малин (*Rubus* sp.).
6050. *Lampronia flavimitrella* (Hübner, [1817]) – Блрц [Трофимова, 2006б]. Вероятно, монофаг малин (*Rubus* spp.).
6051. *Lampronia rupella* ([Denis et Schiffermüller], 1775) – без местонахождений [Трофимова, 2006б, 2015; Anikin et al., 2009, 2017]. В широколиственных и смешанных лесах.

Подсемейство Incurvariinae

6052. *Incurvaria pectinea* Haworth, 1828 – Блрц, Гафр [Трофимова, 2006б; Исмагилов, 2025б]. В регионе известен как монофаг березы повислой *(Betula pendula)*.

Надсемейство Tischerioidea

Семейство Tischeriidae – Тишериды (1 вид)

6053. *Tischeria ekebladella* (Bjerkander, 1795) (=*complanella* (Hübner, [1817])) – по всей территории, в лесах и посадках с участием дуба (*Querqus robur*).

Инфраотряд Papilionomorpha

Серия Tineiformes (Н.Н. Исмагилов)

Надсемейство Psychoidea

Семейство Psychidae – Мешочницы (13 видов, наличие еще 1 не подтверждено)

Подсемейство Naryciinae

6054. *Dahlica lichenella* (Linnaeus, [1760]) – Белб (?), Уфа [Круликовский, 1910; Кожанчиков, 1956]. Чехлики в разреженных лиственных лесах, реже на скалах, камнях, мертвой древесине.

6055. *Dahlica triquetrella* (Hübner, [1813]) – без местонахождений [Anikin et al., 2000a, 2017]. Чехлики на стволах преимущественно хвойных деревьев.

Подсемейство Taleporiinae

6056. *Taleporia tubulosa* (Retzius, 1783) – Альш, Уфа, Бурз [Круликовский, 1904; Кожанчиков, 1956; Трофимова, 2003]. Чехлики в разных местах, в лесах, болотах, окультуренных ландшафтах.

Подсемейство Psychinae

6057. *Psyche casta* (Pallas, 1767) – Нурм, Давл, Кгрч [Grosser, 1983; Исмагилов и др., 2020; Исмагилов, 2025б]. По травянистым и кустарниковым стациям, по опушкам лесов, долинам рек и оврагов.

Подсемейство Epichnopteriginae

? *Acentra vestalis* (Staudinger, 1871) – Кушн [Исмагилов и др., 2022] (?). Определение по фотографии по внешним паттернам. Для надежного определения требуется исследование генитальных признаков.

6058. *Epichnopterix plumella* ([Denis et Schiffermüller], 1775) (=*pulla* (Esper, 1785)) – Чишм, Уфа [Круликовский, 1897; Кожанчиков, 1956; Исмагилов, 2025б]. По лугам и лесным полянам, гусеницы обычно на злаках.

6059. *Psychocentra millierei* (Heylaerts, 1879) – Ишмб [Исмагилов и др., 2022]. По известняковым склонам степной зоны.

6060. *Rebelia nocturnella* (Alpheraky, 1876) – Кушн, Крмс, Блвр [Исмагилов и др., 2022; Исмагилов, 2025б]. По степям.

Подсемейство Oiketicinae

6061. *Acanthopsyche atra* (Linnaeus, 1767) – Уфмс [Исмагилов и др., 2020]. Преимущественно в хвойных лесах, по замшелым соснякам и ельникам, близ окраин сфагновых болот.

6062. *Canephora hirsuta* (Poda, 1761) (=*unicolor* (Hufnagel, 1766)) – северные, центральные, южные, горно-лесные [Круликовский, 1987; Кожанчиков, 1956; Исмагилов и др., 2020; Исмагилов, 2025б]. По кустарникам в сухих, негустых лесах, по опушкам, по балкам, склонам гор.

6063. *Pachythelia villosella* (Ochsenheimer, 1810) – Бурз [Бакалова, 2016] (?). По сухим местам, особенно на песках, по горным склонам.

6064. *Ptilocephala muscella* ([Denis et Schiffermüller], 1775) – без местонахождений [Anikin et al., 2000a, 2017]. По скалам и осыпям.

6065. *Ptilocephala plumifera* (Ochsenheimer, 1810) – Хайб [Исмагилов и др., 2021б]. По сухим, возвышенным, нередко песчаным местам.

6066. *Sterrhopterix fusca* (Haworth, 1809) – Уфа, Байм [Исмагилов и др., 2021б; Исмагилов, 2025б]. Гусеницы встречаются на кустарниках и деревьях в различных ландшафтах.

Надсемейство Tineoidea

Семейство Tineidae – Настоящие моли (31 вид)

Подсемейство Scardiinae

6067. *Montescardia tessulatellus* (Zeller, 1846) – Белб, Блрц [Круликовский, 1910; Трофимова, 2006б]. Лесной мезофил.

6068. *Morophaga choragella* ([Denis et Schiffermüller], 1775) – Крмс, Нефтекамск [Исмагилов и др., 2020; Исмагилов, 2025б]. Лесной мезофил.

6069. *Scardia boletella* (Fabricius, 1794) (=*polypori* (Esper, 1804)) – Блрц, Нефтекамск, Уфа [Трофимова, 2006б; Исмагилов и др., 2021б]. В старовозрастных смешанных, реже в широколиственных лесах.

Подсемейство Myrmecozelinae

6070. *Ateliotum hungaricellum* Zeller, 1839 – Зиан, Стбш [Исмагилов, 2025б]. По степям.

6071. *Haplotinea insectella* (Fabricius, 1794) (=*misella* (Zeller, 1839)) – Белб, Бурз, Блрц [Круликовский, 1910; Загуляев, 1964; Трофимова, 2006б]. Олигосинантропный вид.

6072. *Myrmecozela lutosella* (Eversmann, 1844) – Бурз, Блвр [Исмагилов, 2023, 2025б]. В остепненных лугах и ксерофитных опушках широколиственных лесов.

Подсемейство Nemapogoninae

6073. *Archinemapogon yildizae* Koçak, 1981 (=*arcuatella* (Stainton, 1854)) – Чишм, Крмс, Стбш [Круликовский, 1901; Исмагилов и др., 2021б; Исмагилов, 2025б]. Умеренно эвритопный лесной мезофил.

6074. *Nemapogon cloacella* (Haworth, 1828) – Белб, Бурз, Крмс, Абзл, Чишм [Круликовский, 1910; Загуляев, 1964; Исмагилов и др., 2020; Исмагилов, 2025б]. Синантропофильный лесной мезофил.

6075. *Nemapogon fungivorella* (Benander, 1939) – Кушн [Исмагилов и др., 2021а]. В старовозрастных лесах с обилием мертвой древесины.

6076. *Nemapogon granella* (Linnaeus, 1758) – без местонахождений [Положенцев, Коровина, 1949; Положенцев, Положенцева, 1977; Мигранов, Саттаров, 2006; Трофимова, 2015; Мигранов, 2016]. Синантропофильный вид.

6077. *Nemapogon picarella* (Clerck, 1759) – Блрц, Крмс, Стмк, Уфа [Трофимова, 2006б; Исмагилов и др., 2021а; Исмагилов, 2025б]. Умеренно эвритопный лесной мезофил.

6078. *Nemapogon variatella* (Clemens, 1860) – Уфа [Исмагилов, 2023]. Синантропофильный лесной мезофил.

6079. *Triaxomera parasitella* (Hübner, 1796) – Уфа [Исмагилов и др., 2022]. Лесной мезофил, трофически связанный с грибами-трутовиками.

Подсемейство Meessiinae

6080. *Infurcitinea ignicomella* (Heydenreich, 1851) – Блрц, Учлн [Трофимова, 2006б]. В гнездах перепончатокрылых.

6081. *Infurcitinea juliae* Satshkov, 1995 – Ишмб [Трофимова, 2006б, 2015]. В смешанных широколиственных лесах.

Подсемейство Tineinae

6082. *Monopis crocicapitella* (Clemens, 1860) – Уфа [Исмагилов, 2025б]. Синантропофильный лесной вид.
6083. *Monopis imella* (Hübner, [1813]) – Белб, Байм, Крмс [Круликовский, 1910; Трофимова, 2006б; Исмагилов, 2023]. Синантропофильный лесной мезофил.
6084. *Monopis laevigella* ([Denis et Schiffermüller], 1775) – Блрц [Трофимова, 2006б]. Лесной мезофил.
6085. *Monopis monachella* (Hübner, 1796) – Уфа, Иглн, Крмс, Кушн, Чишм [Исмагилов и др., 2020; Исмагилов, 2025б]. Синантропофильный лесной мезофил.
6086. *Monopis obviella* ([Denis et Schiffermüller], 1775) – Уфа [Исмагилов и др., 2020]. Синантропофильный лесной мезофил.
6087. *Monopis spilotella* (Tengström, 1848*)* – Бурз, Блрц [Загуляев, 1960; Трофимова, 2006б]. Синантропофильный вид.
6088. *Monopis weaverella* (Scott, 1858) – Уфмс, Блрц [Исмагилов и др., 2021б; Исмагилов, 2025б]. лесной мезофил, трофически связанный с грибами-трутовиками.
6089. *Niditinea fuscella* (Linnaeus, 1758*)* (*=fuscipunctella* (Haworth, 1828)) – Альш, Блрц [Круликовский, 1904; Трофимова, 2006б]. Синантропофильный лесной мезофил.
6090. *Niditinea striolella* (Matsumura, 1931) – Блрц [Трофимова, 2006б]. Олигосинантропный вид.
6091. *Tinea columbariella* Wocke, 1877 – Блрц [Трофимова, 2006б]. Синантропофильный лесной мезофил.
6092. *Tinea hongorella* Zagulajev, 1975 – Учлн [Gaedike, Šumpich, 2017]. Синантропофильный вид.
6093. *Tinea omichlopis* Meyrick, 1928 (*=nonimella* Zagulajev, 1955) – Байм [Трофимова, 2006б]. Облигатный синантроп.
6094. *Tinea pellionella* Linnaeus, 1758 – Белб [Круликовский, 1910]. Облигатный синантроп.
6095. *Tinea semifulvella* Haworth, 1828 – Уфа [Исмагилов и др., 2021б]. В хвойно-широколиственных и широколиственных лесах.
6096. *Tineola bisselliella* (Hummel, 1823*)* (*=furciferella* Zagulajev, 1954) – на всей территории. Эвсинантропный вид, в отапливаемых помещениях.
6097. *Trichophaga tapetzella* (Linnaeus, 1758) – Альш [Круликовский, 1904]. Синантропофильный вид.

Надсемейство Gracillarioidea

Семейство Bucculatricidae – Кривоусые крохотки-моли (3 вида)

6098. *Bucculatrix absinthii* Gartner, 1865 – Уфа [Исмагилов и др., 2022].
6099. *Bucculatrix nigricomella* (Zeller, 1839) – Крмс [Исмагилов, 2023].
6100. *Bucculatrix thoracella* (Thunberg, 1794) – Уфа, Аург [Саттаров и др., 2020, 2023; Исмагилов, 2023].

Семейство Gracillariidae – Моли-пестрянки (29 видов, наличие 5

не подтверждено)

Подсемейство Lithocolletinae

? *Phyllonorycter acerifoliella* (Zeller, 1839) (=*sylvella* (Haworth, 1828)) – без местонахождений [Положенцев, 1949] (?). Приводился без подробностей как трофически связанный с клёнами. В связи с недавним обнаружением в средней полосе вида-двойника *Ph. joannisi* (Le Marchand, 1936) требуется уточнение трофических связей региональных популяций. Монофаг *Acer campestre* L. и *A. tataricum* L.

6101. *Phyllonorycter apparella* (Herrich-Schäffer, [1855]) –Уфа, Октябрьский [Исмагилов и др., 2020; Черепанова, Саттаров, 2023]. Умеренно эвритопный лесной мезофил, олигофаг на ивовых.

? *Phyllonorycter blancardella* (Fabricius, 1781) – Дюрт [Хабибуллин, 2018а] (?). Указывался со ссылкой на студенческую дипломную работу, без указания кормового растения. Вид сложен для определения и требует проверки материала. Олигофаг на розоцветных.

6102. *Phyllonorycter coryli* (Nicelli, 1851) – Уфа [Исмагилов и др., 2021а]. По влажным лесам и паркам, олигофаг на березовых (Betulaceae).

6103. *Phyllonorycter emberizaepenella* (Bouché, 1834) – без местонахождений [Положенцев, 1949]. Лесной вид, олигофаг на жимолостных (Caprifoliaceae).

6104. *Phyllonorycter issikii* (Kumata, 1963) – на всей территории. Эвритопный лесной вид, монофаг *Tilia cordata*.

6105. *Phyllonorycter pastorella* (Zeller, 1846) – Октябрьский [Черепанова, Саттаров, 2023]. В основном по влажным пойменных лесам и лугам, олигофаг на ивовых (Salicaceae).

6106. *Phyllonorycter populifoliella* (Treitschke, 1833) – на всей территории. Эвритопный лесной вид, монофаг тополей *(Populus* spp.).

6107. *Phyllonorycter quercifoliella* (Zeller, 1839) – без местонахождений [Положенцев, 1949, 1977а; Положенцев, Ханисламов, 1962]. Умеренный эвритопный лесной вид, монофаг дуба (*Quercus robur*).

? *Phyllonorycter roboris* (Zeller, 1839) – без местонахождений [Мигранов, 2016] (?). Приводился без каких-либо подробностей. Вид сложен для определения и требует проверки. Монофаг дуба (*Quercus robur*).

6108. *Phyllonorycter sagitella* (Bjerkander, 1790) (=*tremulae* (Zeller, 1846)) – Чишм, Белб, Октябрьский [Круликовский, 1901, 1910; Черепанова, Саттаров, 2023]. Лесной вид, монофаг осины (*Populus tremula*).

6109. *Phyllonorycter ulmifoliella* (Hübner, [1817]) – Уфа, Абзл [Исмагилов и др., 2021б; Исмагилов, 2025б]. Лесной вид, монофаг берез (*Betula* spp.).

Подсемейство Acrocercopinae

6110. *Acrocercops brongniardella* (Fabricius, 1798) – на всей территории. Монофаг дуба черешчатого (*Querqus robur*).

Подсемейство Phyllocnistinae

6111. *Phyllocnistis extrematrix* Martynova, 1955 – Уфа [Мартынова, 1955]. В поймах степных рек. Монофаг тополей (*Populus* sp.).

6112. *Phyllocnistis labyrinthella* (Bjerkander, 1790) – Октябрьский [Черепанова, Саттаров, 2023]. В пойменных лесах и песчаным участкам.

6113. *Phyllocnistis unipunctella* (Stephens, 1834) (=*suffusella* (Zeller, 1847)) – Уфа, Кркм, Октябрьский [Мартынова, 1955; Исмагилов и др., 2021а; Черепанова, Саттаров, 2023]. В пойменных участках, монофаг тополей (*Populus* spp.)

Подсемейство Gracillariinae

6114. *Caloptilia alchimiella* (Scopoli, 1763) – Уфа, Крмс, Стбш [Исмагилов и др., 2021а; Исмагилов, 2025б]. Олигофаг на буковых (Fagaceae).

6115. *Caloptilia betulicola* (M. Hering, 1928) – Бурз [Положенцев, 1947]. Монофаг на березах (*Betula* spp.).

6116. *Caloptilia falconipennella* (Hübner, [1813]) – Уфа [Исмагилов, 2023]. Монофаг на ольхе черной (*Alnus glutinosa*).

6117. *Caloptilia hemidactylella* ([Denis et Schiffermüller], 1775) – Уфа [Исмагилов и др., 2022].

6118. *Caloptilia jurateae* Bengtsson, 2010 – Крмс [Исмагилов, 2023].

6119. *Caloptilia populetorum* (Zeller, 1839) – Уфа, Блрц, Абзл, Уфмс [Трофимова, 2006б; Исмагилов и др., 2021а; Исмагилов, 2025б]. Олигофаг на березовых (Betulaceae).

6120. *Caloptilia rufipennella* (Hübner, 1796) – Крмс, Уфа [Исмагилов и др., 2022]. Монофаг на клене ложноплатановом *Acer pseudoplatanus*.

6121. *Caloptilia stigmatella* (Fabricius, 1781) – Уфа, Октябрьский, Крмс, Слвт, Чишм [Исмагилов и др., 2020; Исмагилов, 2025б]. Олигофаг на ивовых (Salicaceae).

? *Caloptilia suberinella* (Tengström, 1848) – без местонахождений [Трофимова, 2006б] (?). Указывался в среднегорных районах и в последующих работах не упоминался. Требуется подтверждение. Монофаг на березе плосколистной (*Betula platyphylla*).

6122. *Calybites phasianipennella* (Hübner, [1813]) – Уфа, Крмс [Исмагилов и др., 2020; Исмагилов, 2025б]. Полифаг на злаках, бурачниковых, зверобойных и гречишных.

6123. *Euspilapteryx auroguttella* Stephens, 1835 – Чишм, Кмск, Уфа [Круликовский, 1901; Исмагилов и др., 2022; Исмагилов, 2025б]. Монофаг на зверобое продырявленном (*Hypericum perforatum*).

6124. *Gracillaria syringella* (Fabricius, 1794) – без местонахождений [Положенцев, 1949, 1977а; Положенцев, Кучеров, 1949б]. Олигофаг на маслиновых (Oleraceae).

Подсемейство Parornichinae (Orniginae auct.)

6125. *Callisto denticulella* (Thunberg, 1794) (=*guttea* (Haworth, 1828)) – Крмс, Уфа [Исмагилов и др., 2020; Исмагилов, 2025б]. Олигофаг на розоцветных, но в основном на яблонях (*Malus* spp.).

6126. *Parornix anglicella* (Stainton, 1850) – Крмс [Исмагилов и др., 2020]. По разреженным лесам и паркам, олигофаг на розоцветных (Rosaceae).

6127. *Parornix betulae* (Stainton, 1854) – Уфа [Саттаров и др., 2024]. Монофаг берез (*Betula* spp.).

? *Parornix petiolella* (Frey, 1863) – Дюрт [Хабибуллин, 2018а] (?). Указывался со ссылкой на студенческую дипломную работу. Вид сложен для определения и требует проверки. Олигофаг розоцветных (Rosaceae).

Подсемейство Ornixolinae

6128. *Micrurapteryx kollariella* (Zeller, 1839) – Бурз [Положенцев, 1947]. В светлых сухих лесах и пустошах.

Надсемейство Douglasioidea

Семейство Douglasiidae – Дугласииды (1 вид)

6129. *Tinagma ocnerostomella* (Stainton, 1850) – Байм [Трофимова, 2006б]. Характерен для сухих луговых и остепнённых участков.

Серия Yponomeutiformes (Н.Н. Исмагилов)

Надсемейство Yponomeutoidea

Семейство Yponomeutidae – Горностаевые моли (11 видов)

6130. *Cedestis gysseleniella* (Zeller, 1839) – Уфа, Абзл [Исмагилов и др., 2022]. В сосняках.

6131. *Cedestis subfasciella* (Stephens, 1834) – Абзл [Исмагилов, 2023]. В остепнённых сосоняках.

6132. *Euhyponomeutoides ribesiella* (De Joannis, 1900) – Нефтекамск, Уфа [Исмагилов и др., 2022]. В смешанных лесах с участием смородин (*Ribes* spp.)

6133. *Swammerdamia glaucella* Junnilainen, 2001 – Хайб, Зиан, Мелз, Учлн, Ишмб [Junnilainen, 2001; Исмагилов, 2023]. По степям.

6134. *Yponomeuta cagnagella* (Hübner, [1813]) (=*cognatella* (Hübner, [1825])) – Чишм, Белб [Круликовский, 1901, 1910]. В лесах и парках с участием бересклетов (*Euonymus* spp.).

6135. *Yponomeuta evonymella* (Linnaeus, 1758) – на всей территории. Эвритопный лесолуговой вид.

6136. *Yponomeuta malinellus* Zeller, 1838 – на всей территории. По лесам, паркам, агроценозам с участием яблонь (*Malus* spp.).

6137. *Yponomeuta padella* (Linnaeus, 1758) (=*variabilis* (Zeller, 1844)) – без местонахождений [Положенцев, Кучеров, 1949а].

6138. *Yponomeuta plumbella* ([Denis et Schiffermüller], 1775) – на всей территории. Умеренно эвритопный лесной мезофил.

6139. *Yponomeuta rorrella* (Hübner, 1796) – Уфа [Исмагилов, 2025б]. Монофаг на ивах (*Salix* spp.).

6140. *Yponomeuta vigintipunctatus* (Retzius, 1783) (=*sedella* Treitschke, 1833) – Абзл, Кркм, Нефтекамск, Уфа [Трофимова, 2006б; Исмагилов и др., 2021б]. По боровым полянам с очитком большим.

Семейство Argyresthiidae – Аргирестииды (10 видов, наличие еще 1 не подтверждено)

6141. *Argyresthia brockeella* (Hübner, [1813]) – Уфа, Абзл, Белб, Крмс, Кушн, Уфмс [Исмагилов и др., 2020; Исмагилов, 2025б]. В смешанных лесах.
6142. *Argyresthia conjugella* Zeller, 1839 – Крмс, Уфа [Исмагилов и др., 2021а]. Умеренно эвритопный лесной мезофил.
6143. *Argyresthia curvella* (Linnaeus, [1760]) – Бурз [Трофимова, 2003]. В разреженных лесах, монофаг яблонь (*Malus* spp.).
6144. *Argyresthia goedartella* (Linnaeus, 1758) – Чишм, Бурз, Блвщ [Круликовский, 1901; Положенцев, 1947; Исмагилов, 2025б]. Лесной вид.
? *Argyresthia laevigatella* (Heydenreich, 1851) – Бурз [Положенцев, 1947] (?). Указывался по повреждениям хвои лиственницы и в последующем не приводился. Однако, гусеницы этого вида обитают под корой на кончиках ветвей молодых лиственниц, в связи с этим достоверность указания этого вида вызывает сомнения.
6145. *Argyresthia praecocella* Zeller, 1839 – Бурз [Положенцев, 1947]. В лесах с участием можевельников (*Juniperus* spp.).
6146. *Argyresthia pruniella* (Clerck, 1759) – Крмс, Стбш, Чишм [Исмагилов и др., 2020; Исмагилов, 2025б]. Олигофаг розоцветных.
6147. *Argyresthia pulchella* Lienig & Zeller, 1846 – Уфа [Исмагилов, 2025б]. Олигофаг розоцветных (Rosaceae).
6148. *Argyresthia retinella* Zeller, 1839 – Уфа [Исмагилов и др., 2021а]. Лесной вид, в лесах и посадках с участием берез (*Betula* spp.).
6149. *Argyresthia sorbiella* (Treitschke, 1833) – без местонахождений [Anikin et al., 2017]. В смешанных лесах и парках, монофаг рябины (*Sorbus* sp.)
6150. *Argyresthia uralensis* Baraniak et Junnilainen, 2011 – Блрц [Baraniak, Junnilainen, 2011]. Вероятно, по горным таежным лесам.

Семейство Ochsenheimeriidae – Стеблевые моли (3 вида)

6151. *Ochsenheimeria capella* Möschler, 1860 – без местонахождений [Загуляев, 1988; Трофимова, 2006б, 2015; Anikin et al., 2017]. По сухим возвышенным местам, покрытыми различными злаками и присутствием ковыля.
6152. *Ochsenheimeria taurella* ([Denis et Schiffermüller], 1775) – Чишм, Бклн, Ермк, Давл [Коровкина, 1945]. Гусеницы в стеблях озимой ржи.
6153. *Ochsenheimeria vacculella* Fischer v. Röslerstamm, 1842 – без местонахождений [Трофимова, 2006б, 2015; Anikin et al., 2017]. По сухим остепнённым лугам и склонам.

Семейство Ypsolophidae – Ипсолофиды (14 видов)

Подсемейство Ypsolophinae

6154. *Ypsolopha asperella* (Linnaeus, [1760]) – Ишмб, Уфмс, Уфа [Трофимова, 2006б; Исмагилов и др., 2021а; Исмагилов, 2025б]. Синантропофильный лесной вид.
6155. *Ypsolopha dentella* (Fabricius, 1775) – Белб, Крмс, Стбш, Уфа [Хабибуллин, 2017б; Исмагилов и др., 2021б; Исмагилов, 2025б]. В широколиственных и смешанных лесах.

6156. *Ypsolopha falcella* ([Denis et Schiffermüller], 1775) – без местонахождений [Anikin et al., 2017]. В смешанных лесах.
6157. *Ypsolopha horridella* (Treitschke, 1835) – Абзл, Крмс [Трофимова, 2006б; Исмагилов, 2025б]. Лесной мезофил.
6158. *Ypsolopha leuconotella* (Snellen, 1884) – Бурз [Трофимова, 2003]. В широколиственных лесах.
6159. *Ypsolopha lucella* (Fabricius, 1775) – Уфа, Блрц, Бурз, Крмс, Куюр [Трофимова, 2003; Исмагилов и др., 2020; Исмагилов, 2025б]. В лесах и посадках с участием дуба (*Quercus robur*).
6160. *Ypsolopha nemorella* (Linnaeus, 1758) – Бурз [Трофимова, 2003]. Характерен для лесов неморального типа.
6161. *Ypsolopha parenthesella* (Linnaeus, [1760]) – без местонахождений [Трофимова, 2006б, 2015; Anikin et al., 2006c, 2017]. В старовозрастных смешанных и широколиственных лесах.
6162. *Ypsolopha sarmaticella* (Rebel, 1917) – Уфа, Кушн [Исмагилов и др., 2020; Исмагилов, 2025б]. В отсепненных лесах.
6163. *Ypsolopha scabrella* (Linnaeus, [1760]) – Ишмб [Трофимова, 2006б]. Лесной мезофил.
6164. *Ypsolopha sequella* (Clerck, 1759) – Уфа, Крмс [Исмагилов и др., 2022; Исмагилов, 2025б]. Умеренно эвритопный лесной мезофил.
6165. *Ypsolopha sylvella* (Linnaeus, 1767) – Чишм, Уфа [Круликовский, 1901; Исмагилов и др., 2021а]. В лесах и посадках с участием дуба (*Quercus robur*).
6166. *Ypsolopha ustella* (Clerck, 1759) (=*fissella* (Hübner, 1796)) – Уфа, Нурм, Гафр [Исмагилов и др., 2020; Исмагилов, 2025б]. Умеренно эвритопный лесной мезофил.
6167. *Ypsolopha vittella* (Linnaeus, 1758) – Чишм, Бурз, Крмс, Стбш [Круликовский, 1901; Трофимова, 2003; Исмагилов и др., 2021б; Исмагилов, 2025б]. В лесах неморального типа.

Семейство Bedelliidae – Беделлиды (1 вид)

6168. *Bedellia somnulentella* (Zeller, 1847) – Уфа, Иглн, Крмс [Исмагилов и др., 2021б; Исмагилов, 2025б]. Умеренно эвритопный вид, преимущественно в открытых местах и антропогенных ландшафтах.

Семейство Plutellidae – Серпокрылые моли (4 вида)

6169. *Eidophasia hufnagelii* (Zeller, 1839) – Уфа, Абзл [Исмагилов и др., 2021а; Исмагилов, 2025б]. По сухим остепнённым лугам и склонам.
6170. *Plutella xylostella* (Linnaeus, 1758) (=*maculipennis* Curtis, 1832; =*cruciferarum* Zeller, 1843) – на всей территории. Эвритопный лугово-полевой вид.
6171. *Pseudoplutella porrectella* (Linnaeus, 1758) – Крмс [Исмагилов и др., 2020]. По опушкам лесов и лугов с участием крестоцветных (*Brassicaceae*).
6172. *Rhigognostis incarnatella* (Steudel, 1873) (*annulatella* auct.) – Блрц [Трофимова, 2006б]. Во влажных лугах и низинах.

Семейство Glyphipterigidae – Глифиптеригиды (1 вид)

6173. *Glyphipterix thrasonella* (Scopoli, 1763) – Уфа [Исмагилов и др., 2022]. По влажным лугам и полянам с участием полевицы собачьей (*Agrostis canina*).

Семейство Lyonetiidae – Лионетииды (4 вида)

Подсемейство Cemiostominae

6174. *Leucoptera laburnella* (Stainton, 1851) – Уфа [Исмагилов и др., 2022]. В смешанных лесах с участием ракитника (*Chamaecytisus ruthenicus*).

6175. *Leucoptera malifoliella* (O. Costa, [1836]) (=*scitella* (Zeller, 1839)) – без местонахождений [Положенцев, Кучеров, 1949а]. Лесной полифаг.

Подсемейство Lyonetiinae

6176. *Lyonetia clerkella* (Linnaeus, 1758) – Бурз, Уфа [Положенцев, 1947 (?), Трофимова, 2003; Исмагилов и др., 2020]. Лесной мезофил, дендротамнофаг-полифаг, преимущественно розоцветных, отчасти березовых.

6177. *Lyonetia prunifoliella* (Hübner, 1796) – Крмс [Исмагилов и др., 2020]. Лесной мезофил, олигофаг розоцветных (Rosaceae).

Серия Gelechiiformes (Н.Н. Исмагилов)

Надсемейство Oecophoroidea (s. str.)

Семейство Oecophoridae – Ширококрылые моли (9 видов)

Подсемейство Deuterogoniinae

6178. *Deuterogonia pudorina* (Wocke, 1857) – Уфа [Исмагилов и др., 2021б]. В основном в старовозрастных лесах неморального типа.

Подсемейство Oecophorinae

6179. *Bisigna procerella* ([Denis et Schiffermüller], 1775) – Уфа, Абзл, Крмс [Исмагилов и др., 2021а; Исмагилов, 2025б]. В широколиственных и смешанных лесах.

6180. *Buvatina iremella* Junnilainen et K. Nupponen, 1999 – Блрц [Junnilainen, Nupponen, 1999]. В горных таежных лесах.

6181. *Denisia similella* (Hübner, 1796) – Байм, Бурз, Абзл, Крмс, Стмк [Трофимова, 2006б; Исмагилов и др., 2022; Исмагилов, 2025б]. В основном в хвойных и смешанных лесах.

6182. *Denisia stipella* (Linnaeus, 1758) – Чишм, Нефтекамск [Круликовский, 1901; Исмагилов и др., 2022]. В смешанных лесах.

6183. *Denisia stroemella* (Fabricius, 1779) – Бурз [Исмагилов, 2023]. В смешанных лесах.

6184. *Endrosis sarcitrella* (Linnaeus, 1758) (=*lacteella* ([Denis et Schiffermüller], 1775)) – Чишм, Белб, Иглн, Уфа, Сибай [Круликовский, 1901, 1910; Исмагилов и др., 2022; Исмагилов, 2025б]. Олигосинантропный вид (сапрофаг).

6185. *Epicallima formosella* ([Denis et Schiffermüller], 1775) – Уфа [Исмагилов и др., 2021а]. В лесах и старых посадках.

Подсемейство Pleurotinae

6186. *Pleurota aristella* (Linnaeus, 1767) – Альш [Круликовский, 1904]. По степям.

Семейство Depressariidae – Плоские моли (37 видов, наличие еще

3 не подтверждено)

Подсемейство Depressariinae

6187. *Agonopterix alstromeriana* (Clerck, 1759) – на всей территории. Во влажных лугах и поймах рек, в антропогенных и рудеральных участках с участием болиголова пятнистого (*Conium maculatum*).

6188. *Agonopterix angelicella* (Hübner, [1813]) – без местонахождений [Трофимова, 2006б, 2015; Anikin et al., 2017; Львовский, Недошивина, 2023]. Характерен для старовозрастных лесов неморального типа.

6189. *Agonopterix arenella* ([Denis et Schiffermüller], 1775) – на всей территории. Эвритопный лесолуговой вид.

6190. *Agonopterix assimilella* (Treitschke, 1832) – Бурз [Исмагилов, 2025б]. По лугам и степных участкам.

6191. *Agonopterix bipunctosa* (Curtis, 1850) – без местонахождений [Львовский, 2006; Anikin et al., 2017; Львовский, Недошивина, 2023]. Во влажных лесах и опушках.

6192. *Agonopterix ciliella* (Stainton, 1849) – без местонахождений [Трофимова, 2006б, 2015; Anikin et al., 2017; Львовский, Недошивина, 2023]. Лесолуговой мезофил.

6193. *Agonopterix curvipunctosa* (Haworth, [1811]) – без местонахождений [Трофимова, 2006б, 2015; Anikin et al., 2017; Львовский, Недошивина, 2023]. На влажных лугах и низинах, заболоченных участках.

6194. *Agonopterix heracliana* (Linnaeus, 1758) (=*applana* (Fabricius, 1777)) – без местонахождений [Положенцев, 1977б; Трофимова, 2006б, 2015; Anikin et al., 2006b, 2017]. Эвритопный лесолуговой мезофил.

6195. *Agonopterix hypericella* (Hübner, [1817]) – без местонахождений [Трофимова, 2006б, 2015; Anikin et al., 2017; Львовский, Недошивина, 2023]. В старовозрастных лесах.

6196. *Agonopterix kaekeritziana* (Linnaeus, 1767) – Ишмб [Трофимова, 2006б]. Преимущественно в старовозрастных смешанных и широколиственных лесах.

6197. *Agonopterix nervosa* (Haworth, [1811]) – Крмс [Исмагилов, 2025б]. По опушкам песчаных сосняков и остепненным участкам

6198. *Agonopterix ocellana* (Fabricius, 1775) – Чишм, Нефтекамск [Круликовский, 1901; Исмагилов и др., 2022; Львовский, Недошивина, 2023]. Лесной мезофил.

6199. *Agonopterix pallorella* (Zeller, 1839) – Блвщ [Исмагилов, 2023; Львовский, Недошивина, 2023]. По сухим лугам и остепнённым склонам с участием полыней (*Artemisia* spp.)

6200. *Agonopterix propinquella* (Treitschke, 1835) – Уфа, Крмс, Кушн, Уфмс [Исмагилов и др., 2020; Исмагилов, 2025б]. Лесолуговой мезофил.

6201. *Depressaria albipunctella* ([Denis et Schiffermüller], 1775) – Чишм [Круликовский, 1901; Львовский, Недошивина, 2023]. По влажным лугам и низинам с участием зонтичных (Apiaceae).

6202. *Depressaria badiella* (Hübner, 1796) – без местонахождений [Anikin et al., 2006b, 2017; Львовский, Недошивина, 2023]. По сухим лугам и степям, пустыря и залежам.
6203. *Depressaria chaerophylli* Zeller, 1839 – Кгрч [Трофимова, 2006б]. В смешанных и остепненных лиственных лесах.
6204. *Depressaria depressana* (Fabricius, 1775) (=*depressella* Fabricius 1798) – Чишм, Кушн, Уфа [Круликовский, 1901; Исмагилов и др., 2022]. Преимущественно в смешанных лесах.

? *Depressaria douglasella* Stainton, 1849 – без местонахождений [Трофимова, 2006б] (?). Приводился из с отметкой «+» для Зилаирского плато в августе, но в дальнейших работах не упоминался. Вид сложен для определения и требует подтверждения исследованием фактического материала.
6205. *Depressaria hystricella* Möschler, 1860 – Учлн [Исмагилов, 2023]. В лиственных и широколиственных лесах.
6206. *Depressaria libanotidella* Schläger, 1849 – Кгрч [Трофимова, 2006б]. В светлых прогреваемых местах с участием зонтичных (Apiaceae).
6207. *Depressaria olerella* Zeller, 1854 – Блрц [Трофимова, 2006б]. Лесолуговой мезофил.
6208. *Depressaria pimpinellae* Zeller, 1839 – Белб, Кгрч [Круликовский, 1910; Трофимова, 2006б]. Лесолуговой мезофил.
6209. *Depressaria pulcherrimella* Stainton, 1849 – Блрц [Трофимова, 2006б]. В смешанных лесах.

? *Depressaria radiella* (Goeze, 1783) (*heracliana* auct.*)* – Белб [Круликовский, 1910] (?). Требуется фактическое подтверждение современным материалом. Лесолуговой вид.
6210. *Depressaria sordidatella* Tengström, 1848 – без местонахождений [Трофимова, 2015; Anikin et al., 2017; Львовский, Недошивина, 2023]. По сухим остепнённым лугам и склонам.

? *Exaeretia stramentella* (Eversmann, 1844) – без местонахождений [Ménétries, 1849]. Наличие вида в РБ в современный период требует подтверждения. Ксерофитный вид, известный как монофаг пижмы щитковой (*Tanacetum corymbosum* L.).
6211. *Exaeretia allisella* Stainton, 1849 – Белб, Уфа [Круликовский, 1910; Львовский, Недошивина, 2023]. Лугово-полевой мезоксерофил.
6212. *Exaeretia ciniflonella* (Lienig et Zeller, 1846) – Бурз, Нефтекамск [Трофимова, 2003; Исмагилов и др., 2021а]. В смешанных лесах.
6213. *Exaeretia lepidella* (Christoph, 1872) – Блвр, Бурз [Исмагилов, 2023]. По степям.
6214. *Exaeretia niviferella* (Christoph, 1872) – без местонахождений [Anikin et al., 2006b, 2017; Львовский, Недошивина, 2023]. По степям.
6215. *Exaeretia praeustella* (Rebel, 1917) – Блрц [Трофимова, 2006б]. Характерен для сухих опушек сосняков и прилегающих песчаных пустошей с доминированием полыни полевой.

6216. *Exaeteria lvovskyi* Buchner, Junnilainen et Nupponen, 2019 – Хайб [Buchner et al., 2019; Львовский, Недошивина, 2023]. Характерен для горных остепнённых склонов.
6217. *Levipalpus hepatariella* (Lienig et Zeller, 1846) – Кгрч [Трофимова, 2006б]. Лесолуговой вид.
6218. *Luquetia lobella* ([Denis et Schiffermüller], 1775) – Крмс, Блвр [Исмагилов и др., 2021б; Исмагилов, 2025б]. По прогреваемым опушкам смешанных и широколиственных лесов, как правило, с участием терна (*Prunus spinosa*).
6219. *Semioscopis avellanella* (Hübner, 1793) – Абзл, Шарн [Исмагилов и др., 2020; Исмагилов, 2025б]. Лесной мезофил.
6220. *Semioscopis oculella* (Thunberg, 1794) – Абзл, Дувн [Исмагилов и др., 2021б; Исмагилов, 2025б]. Лесной мезофил.
6221. *Semioscopis steinkellneriana* ([Denis et Schiffermüller], 1775) – Уфмс, Кушн [Мигранов и др., 2020б; Исмагилов и др., 2021б]. Лесной мезофил.

Подсемейство Cryptolechiinae

6222. *Anchinia daphnella* ([Denis et Schiffermüller], 1775) – без местонахождений [Трофимова, 2015; Anikin et al., 2017]. Характерен для сухих, хорошо прогреваемых местообитаний с участием волчеягодника борового (*Daphne julia*).
6223. *Hypercallia citrinalis* (Scopoli, 1763) (=*christiernella* (Hübner, [1824])) – Альш [Круликовский, 1904]. По остепненным лугам, опушкам широколиственных лесов.

Семейство Lypusidae – Липузиды (2 вида)

Подсемейство Lypusinae

6224. *Agnoea josephinae* (Toll, 1956) – Блрц [Трофимова, 2006б]. В смешанных лесах неморального типа.
6225. *Lypusa maurella* ([Denis et Schiffermüller], 1775) – без местонахождений [Anikin et al., 2017]. В смешанных лесах неморального типа.

Семейство Chimabachidae – Моли-химбахиды (1 вид)

6226. *Diurnea fagella* ([Denis & Schiffermüller], 1775) – Уфа [Исмагилов, 2025б]. По смешанным, широколиственным лесам и в поймах водоемов

Семейство Ethmiidae – Черноточечные моли (7 видов)

6227. *Ethmia aurifluella* (Hübner, [1810]) – Туйм [Nupponen, 2015; Исмагилов, 2023]. По ксерофитным местам с участием оносмы (*Onosma* sp.).
6228. *Ethmia bipunctella* (Fabricius, 1775*)* – на всей территории. Преимущественно по остепнённым и ксерофитным участкам.
6229. *Ethmia candidella* (Alphéraky, 1908) – Хайб [Исмагилов и др., 2021б]. По степям.
6230. *Ethmia chrysopyga* (Zeller, 1844) – без местонахождений [Трофимова, 2006б, 2015; Anikin et al., 2007, 2017]. По остепнённым склонам и кальцефитным лугам.

6231. *Ethmia pusiella* (Linnaeus, 1758) – Бурз, Ермк, Абзл, Кушн [Трофимова, 2003, 2006б; Исмагилов и др., 2020; Исмагилов, 2025б]. По сухим и остепнённым участкам.
6232. *Ethmia quadrillella* (Goeze, 1783) (=*funerella* (Fabricius, 1787)) – Кушн, Уфа [Исмагилов и др., 2021а]. В смешанных в широколиственных лесах.
6233. *Ethmia vittalbella* (Christoph, 1877) – Уфа [Исмагилов и др., 2020]. По степным участкам.

Надсемейство Elachistoidea (s. str.)

Семейство Elachistidae – Злаковые моли-минеры (25 видов)

Подсемейство Elachistinae

6234. *Cosmiotes freyerella* (Hübner, [1825]) – Байм [Трофимова, 2006б]. По гигрофильным и мезофильным лугам, лесным опушкам и полянам.
6235. *Dibrachia kalki* (Parenti, 1978) – Учлн [Kaila et al., 2003]. По сухим каменистым или песчаным участкам с разреженной ксерофитной растительностью.
6236. *Elachista adscitella* Stainton, 1851 – Учлн, Абзл [Kaila et al., 2003; Исмагилов и др., 2022]. Влажные леса (особенно ольшаники) и сырые луга с доминированием полевицы (*Agrostis*) или вейника (*Calamagrostis*).
6237. *Elachista albifrontella* (Hübner, [1817]) – Зиан [Kaila et al., 2003]. На сухих лугах и каменистых степях.
6238. *Elachista alpinella* Stainton, 1854 – Блрц [Kaila et al., 2003]. Характерен для горных лугов и открытых пространств с доминированием низкорослых злаков.
6239. *Elachista apicipunctella* Stainton, 1849 – Блрц [Kaila et al., 2003]. По влажным и сырым лугам, поймам, лесным полянам.
6240. *Elachista bedellella* (Sircom, 1848) – Зиан [Kaila et al., 2003]. По влажным, сырым и заболоченным местообитаниям.
6241. *Elachista bifasciella* Treitschke, 1833 – без местонахождений [Anikin et al., 2017]. По открытым пространствам с умеренным увлажнением и богатым злаковым разнотравьем.
6242. *Elachista canapennella* (Hübner, [1813]) (=*pulchella* (Haworth, 1828)) – Блрц [Трофимова, 2006б]. По открытым и хорошо освещенным местообитаниям с произрастанием злаков.
6243. *Elachista* cf. *biatomella* (Stainton, 1848) – Учлн, Хайб [Kaila et al., 2003]. Вероятно, по заболоченным лесам, низинным болотом с произрастанием осок.
6244. *Elachista diederichsiella* E. Hering, 1889 – Блрц [Kaila et al., 2003]. По открытым пустошам и лугам.
6245. *Elachista dispilella* Zeller, 1839 (=*manni* Traugott-Olsen, 1990) – Учлн [Kaila et al., 2003]. По влажным и сырым лугам, низинам и опушкам с богатыми осоковыми ассоциациями.

6246. *Elachista fasciola* Parenti, 1983 – Учлн, Блрц [Kaila, Junnilainen, 2002; Kaila et al., 2003]. По сухим, хорошо дренированным и открытым местообитаниям на известковых (щелочных) почвах.
6247. *Elachista gibbera* Kaila, 2003 – Учлн [Kaila et al., 2003]. По влажным и заболоченным местам на известняковых почвах.
6248. *Elachista hedemanni* Rebel, 1899 – Учлн [Kaila et al., 2003]. По сухим, песчаным и супесчаным местообитаниям с доминированием узколистных овсяниц (*Festuca* spp.).
6249. *Elachista heringi* Rebel, 1899 – Мелз, Зиан, Учлн [Kaila et al., 2003].
6250. *Elachista nolckeni* Šulcs, 1992 – Учлн [Kaila et al., 2003]. По сухим песчаным местообитаниям с доминированием узколистных овсяниц (*Festuca* spp.).
6251. *Elachista olschwangi* Kaila, 2003 – Учлн, Хайб [Kaila et al., 2003]. Характерен для сухих каменистых степей на карбонатных породах с доминированием узколистных овсяниц (*Festuca* spp.).
6252. *Elachista pollinariella* Zeller, 1839 – Учлн [Трофимова, 2006б]. По каменистым степям.
6253. *Elachista rudectella* Stainton, 1851 – Учлн, Хайб [Kaila et al., 2003]. По сухим сосновым борам и остепнённым участкам.
6254. *Elachista spumella* Caradja, 1920 – Туйм, Учлн [Kaila et al., 2003]. По степям.
6255. *Elachista squamosella* (Duponchel, [1843]) – Хайб [Kaila et al., 2003]. Влажные леса и луга с доминированием полевицы (*Agrostis*) или вейника (*Calamagrostis*).
6256. *Elachista subalbidella* Schläger, 1847 – Блрц [Kaila et al., 2003]. В тенистых и влажных лугах с произрастанием мятлика (*Poa* spp.)
6257. *Elachista subocellea* (Stephens, 1834) – Абзл [Исмагилов и др., 2022]. Преимущественно во влажных, заболоченных лесах и лугах с богатым травостоем.
6258. *Elachista szocsi* Parenti, 1978 – Байм [Kaila et al., 2003]. По сухим остепнённым лугам и склонам.

Семейство Parametriotidae – Параметриотиды (3 вида)

Подсемейство Parametriotinae

6259. *Blastodacna atra* (Haworth, 1828) – Уфа, Иглн, Крмс, Уфмс [Исмагилов и др., 2021а; Исмагилов, 2025б]. По опушкам лесов, парков и садов с участием яблонь (*Malus* spp.).
6260. *Heinemannia festivella* ([Denis et Schiffermüller], 1775) – Аург [Исмагилов и др., 2022]. По умеренно влажным лесным опушкам, полянам и лугам с богатым разнотравьем.
6261. *Heinemannia laspeyrella* (Hübner, 1796) – Бурз [Синев, 1986]. По сухим луговым и остепнённым участкам.

Надсемейство Coleophoroidea

Семейство Stathmopodidae – Пестроногие моли (1 вид)

6262. *Stathmopoda pedella* (Linnaeus, [1760]) – Туйм, Уфа [Исмагилов, 2023]. По влажным и заболоченным лесам, низинам и поймы с участием ольхи (*Alnus* spp.)

Семейство Coleophoridae – Моли-чехлоноски (61 вид, наличие еще 1 не подтверждено)

6263. *Apista callipelpa* (Falkovitsh, 1979) – Абзл, Байм [Аникин, Трофимова, 2004; Трофимова, 2006б].
6264. *Apista dignella* (Toll, 1961) – Учлн [Будашкин и др., 2015].
6265. *Ardania vulpecula* (Zeller, 1849*)* – Учлн [Будашкин и др., 2015].
6266. *Ascleriducta lithargyrinella* (Zeller, 1849) – Блрц [Аникин, Трофимова, 2004; Трофимова, 2006б]. По опушкам остепнённых широколиственных лесов.
6267. *Bourgogneja pennella* ([Denis et Schiffermüller], 1775) – без местонахождений [Аникин, Трофимова, 2004; Трофимова, 2015; Anikin et al., 2017]. По остепнённым лугам, опушкам широколиственных и смешанных лесов.
6268. *Carpochena squalorella* (Zeller, 1849) – без местонахождений [Anikin et al., 1999, 2017; Трофимова, 2015].
6269. *Casignetella absinthii* (Wocke, 1877) – Блрц [Аникин, Трофимова, 2004; Трофимова, 2006б]. По опушкам остепненных лесов.
6270. *Casignetella albicans* (Zeller, 1849) (=*artemisiella* (Scott, 1861)) – без местонахождений [Anikin et al., 1999, 2017; Трофимова, 2015]. По сухим опушкам сосняков с доминированием полыней.
6271. *Casignetella argentula* (Stephens, 1834) – Блрц [Аникин, Трофимова, 2004; Трофимова, 2006б]. Характерен для прогреваемых луговых участков с участием тысячелистника обыкновенного (*Achillea millefolium*)
6272. *Casignetella clarissa* (Falkovitsh, 1977) – Учлн [Будашкин и др., 2015].
6273. *Casignetella dianthi* (Herrich-Schäffer, [1855]) – Учлн [Будашкин и др., 2015]. Характерен для прогреваемых опушек смешанных лесов.
6274. *Casignetella directella* (Zeller, 1849) – Белб, Учлн [Круликовский, 1910; Будашкин и др., 2015].
6275. *Casignetella gardesanella* (Toll, 1953) – без местонахождений [Anikin et al., 2017].
6276. *Casignetella granulatella* (Zeller, 1849) – без местонахождений [Anikin et al., 1999, 2017]. По остепненным лугам и ксерофитным боровым полянам с участием полыней (*Artemisia* spp.)
6277. *Casignetella linosyridella* (Fuchs, 1880) – Учлн [Будашкин и др., 2015].
6278. *Casignetella loxodon* Falkovitsh, 1993 – без местонахождений [Anikin et al., 2017].
6279. *Casignetella pseudolongicornella* Budashkin et Richter, 2015 – Учлн [Будашкин, Рихтер, 2015].
6280. *Casignetella pseudorepentis* (Toll, 1960) – Учлн [Будашкин и др., 2015].
6281. *Casignetella silenella* (Herrich-Schäffer, [1855]) – без местонахождений [Anikin et al., 2017]. Характерен для прогреваемых опушек смешанных и широколиственных лесов.

6282. *Casignetella spiralis* (Falkovitsh, 1977) – Учлн [Будашкин и др., 2015].
6283. *Coleophora albidella* ([Denis et Schiffermüller], 1775) – Учлн [Будашкин и др., 2015].
6284. *Coleophora anatipennella* (Hübner, 1796) (?*bernoulliella* (Goeze, 1783), nom. dubium) – Чишм [Круликовский, 1901]. По опушкам остепнённых широколиственных лесов.
6285. *Damophila alcyonipennella* (Kollar, 1832) – Блрц, Мелз [Аникин, Трофимова, 2004]. По прогреваемым лугам.
6286. *Damophila* cf. *pustulosa* (Falkovitsh, 1979) – Мелз [Аникин, Трофимова, 2004; Трофимова, 2006б].
6287. *Damophila deauratella* (Lienig et Zeller, 1846) – на всей территории. Умеренно эвритопный луговой мезоксерофил.
6288. *Damophila mayrella* (Hübner, [1813]) – Учлн, Уфа [Будашкин и др., 2015; Исмагилов, 2025б]. По прогреваемым луговым и остепнённым участкам.
6289. *Damophila trifolii* Curtis, 1832 – Уфа [Исмагилов, 2025б]. По прогреваемым луговым и остепненным участкам.
6290. *Ecebalia bagorella* (Falkovitsh, 1977) – Блрц [Аникин, Трофимова, 2004; Трофимова, 2006б].
6291. *Ecebalia gaviaepennella* (Toll, 1952) – без местонахождений [Трофимова, 2015; Anikin et al., 2017].
6292. *Ecebalia obscenella* (Herrich-Schäffer, [1855]) – без местонахождений [Anikin et al., 2017]. Характерен для опушек остепнённых широколиственных лесов.
6293. *Ecebalia parenthella* (Toll, 1952) – Учлн [Будашкин и др., 2015].
6294. *Ecebalia pratella* (Zeller, 1871) – без местонахождений [Anikin et al., 2017].
6295. *Ecebalia sternipennella* (Zetterstedt, 1839) – Белб [Круликовский, 1910]. По рудеральным травяным участкам с марью и лебедой.
6296. *Ecebalia therinella* (Tengström, 1848) – Блрц, Учлн [Аникин, Трофимова, 2004; Будашкин и др., 2015]. По прогреваемым разнотравным лесным опушкам и полянам.
6297. *Ecebalia versurella* (Zeller, 1849) – Блрц [Аникин, Трофимова, 2004; Трофимова, 2006б]. По рудеральным травяным участкам с марью и лебедой.
6298. *Ecebalia vestianella* (Linnaeus, 1758) – Бурз [Аникин, Трофимова, 2004; Трофимова, 2006б]. По рудеральным травяным участкам с марью и лебедой.
6299. *Ecebalia virgaureae* (Stainton, 1857) – без местонахождений [Anikin et al., 2017].
6300. *Eupista lixella* (Zeller, 1849) – без местонахождений [Трофимова, 2015; Anikin et al., 2017].
6301. *Eupista ornatipennella* (Hübner, 1796) – Блрц [Аникин, Трофимова, 2004; Трофимова, 2006б]. По прогреваемым и остепнённым лугам и опушкам.
6302. *Eupista samarensis* Anikin, 2001 – без местонахождений [Anikin et al., 2017]. Характерен для остепненных участков.

6303. *Frederickoenigia flavipennella* (Duponchel, [1843]) – без местонахождений [Anikin et al., 1999, 2017; Трофимова, 2015]. В лесах с участием дуба (*Quercus robur*).
6304. *Haploptilia serratella* (Linnaeus, [1760]) (=*fuscedinella* (Zeller, 1849)) – Октябрьский [Черепанова, Саттаров, 2023]. Лесной вид.
6305. *Helvalbia lineolea* (Haworth, 1828) – без местонахождений [Anikin et al., 2017].
6306. *Ionescumia clypeiferella* (O. Hofmann, 1871) – без местонахождений [Anikin et al., 1999, 2017; Трофимова, 2015].
6307. *Klinzigedia onopordiella* (Zeller, 1849) – Блрц [Аникин, Трофимова, 2004; Трофимова, 2006б].
6308. *Metriotes lutarea* (Haworth, 1828) – Ишмб [Исмагилов, 2025б]. По тенистым лесам и кустарникам с произрастанием звездчатки ланцетолистной (*Stellaria holostea*).
6309. *Multicoloria caelebipennella* (Zeller, 1839) – Байм [Аникин, 2007].
6310. *Multicoloria conspicuella* (Zeller, 1849) – Блрц, Байм, Учлн [Аникин, Трофимова, 2004; Будашкин и др., 2015]. По сухим опушкам сосняков, прилегающим пустошам и остепненным участкам.
6311. *Multicoloria ditella* (Zeller, 1849) – без местонахождений [Anikin et al., 2017].
6312. *Multicoloria vibicigerella* (Zeller, 1839) – Учлн [Будашкин и др., 2015; Anikin et al., 2017]. По сухим боровым полянам и остепненным участкам.
6313. *Orthographis chamaedriella* (Bruand, 1852) – Учлн [Будашкин и др., 2015].
6314. *Orthographis conyzae* (Zeller, 1868) – Учлн [Будашкин и др., 2015].
6315. *Perygra alticolella* (Zeller, 1849) – без местонахождений [Anikin et al., 2017]. В лесах различных типов по сырым и заболоченным участкам с участием ситников (*Juncus* spp.).
6316. *Perygra caespititiella* (Zeller, 1839) – без местонахождений [Anikin et al., 2017].
6317. *Perygra otidipennella* (Hübner, [1817]) (=*murinipennella* (Duponchel, 1844)) – Чишм [Круликовский, 1901]. По сырым и заболоченным лугам с участием ожики волосистой (*Luzula pilosa*).
6318. *Phagolamia auricella* (Fabricius, 1794) – Учлн [Будашкин и др., 2015].
6319. *Postvinculia lutipennella* (Zeller, 1838) – Уфа [Исмагилов, 2025б]. В лесах с участием дуба (*Quercus robur*).
? Protocryptis laricella (Hübner, [1817]) – без местонахождений [Положенцев, 1949, 1977а; Положенцев, Кучеров, 1949б] (?) – этот вид (достоверно не известный в России) определяется по тонким признакам строения гениталий. Он, как и *Protocryptis sibiricella*, монофаги лиственницы (*Larix* spp.).
6320. *Protocryptis sibiricella* (Falkovitsh, 1965) – Сибай [Исмагилов и др., 2021б].
6321. *Razowskia oriolella* (Zeller, 1849) – без местонахождений [Anikin et al., 2017].
6322. *Suireia alnifoliae* (Barasch, 1934) – Зилр [Исмагилов и др., 2021б]. В черноольшаниках.

6323. *Suireia milvipennis* (Zeller, 1839) – без местонахождений [Трофимова, 2015; Anikin et al., 2017].

Семейство Momphidae – Кипрейные моли (5 видов)

6324. *Mompha conturbatella* (Hübner, [1819]) – Абзл [Исмагилов и др., 2022]. По хорошо освещённым местам (вырубкам, гарям, опушкам, пустырям) с произрастанием иван-чая узколистного (*Chamerion angustifolium*).

6325. *Mompha idaei* (Zeller, 1839) – Блрц, Абзл [Трофимова, 2006б; Исмагилов, 2025б]. На влажных лугах и лесных опушках с обильным произрастанием кипреев (*Epilobium* spp.).

6326. *Mompha propinquella* (Stainton, 1851) – Уфа [Исмагилов, 2025б]. По хорошо освещённым местам с произрастанием иван-чая узколистного (*Chamerion angustifolium*).

6327. *Mompha sturnipennella* (Treitschke, 1833) – Блрц, Иглн, Уфа [Трофимова, 2006б; Исмагилов и др., 2020; Исмагилов, 2025б]. По влажным лугам и лесным опушкам с произрастанием кипреев (*Epilobium* spp.).

6328. *Mompha subbistrigella* (Haworth, 1828) – Уфа, Крмс [Исмагилов и др., 2020; Исмагилов, 2025б]. По влажным лугам и лесным опушкам с произрастанием кипреев (*Epilobium* spp.).

Семейство Batrachedridae – Батрахедриды (1 вид)

6329. *Batrachedra praeangusta* (Haworth, 1828) – г.Уфа [Исмагилов и др., 2021а]. Во влажных лесах, поймах рек с произрастанием различных видов ив, тополей, ольхи и берёз, в сережках которых развиваются его гусеницы.

Семейство Blastobasidae – Бластобазиды (1 вид)

6330. *Hypatopa binotella* (Thunberg, 1794) – Абзл [Исмагилов и др., 2022]. В старовозрастных лиственных и смешанных лесов.

Надсемейство Gelechioidea (s. str., sensu Kuznetzov et Stekolnikov, 2001)

Семейство Scythrididae – Мрачные моли (17 видов)

6331. *Parascythris muelleri* (Mann, 1871) – Учлн [Nupponen et al., 2000]. По прогреваемым луговым и остепненным участкам.

6332. *Scythris barguzinensis* Bengtsson et Liška, 1996 (=*karinupponeni* Bengtsson, 2000) – Учлн [Nupponen et al., 2000]. По горным степям.

6333. *Scythris bengtssoni* Patočka et Liška, 1989 – Учлн [Nupponen et al., 2000]. По сухим и открытым местам.

6334. *Scythris bifissella* (O. Hofmann, 1889) – Учлн [Nupponen et al., 2000]. По сухим остепнённым лугам и склонам.

6335. *Scythris braschiella* (O. Hofmann, 1898) – Учлн [Nupponen et al., 2000].

6336. *Scythris clavella* (Zeller, 1855) – Учлн, Хайб [Nupponen et al., 2000]. Сухие, хорошо прогреваемые местообитания.

6337. *Scythris ericetella* (Heinemann, 1872) – Учлн [Nupponen et al., 2000].

6338. *Scythris flavilaterella* (Fuchs, 1886) – Байм [Nupponen et al., 2000]. По сухим известняковым и меловым склонам.

6339. *Scythris flaviventrella* (Herrich-Schäffer, [1855]) – Байм, Учлн, Мелз [Nupponen et al., 2000]. Характерен для сухих лугов и пастбищ.

6340. *Scythris gozmanyi* Passerin d'Entrèves, 1986 – Байм, Учлн [Nupponen et al., 2000]. По сухим степям.
6341. *Scythris kasyi* Hannemann, 1962 – Байм [Nupponen et al., 2000].
6342. *Scythris limbella* (Fabricius, 1775) – Хайб, Крмс, Чишм, Уфа, Сибай [Nupponen et al., 2000; Исмагилов, 2023, 2025б]. По лугам, опушкам и пустырям.
6343. *Scythris mikkolai* Sinev, 1993 – Учлн [Nupponen et al., 2000]. По сухим песчаным местообитаниям.
6344. *Scythris obscurella* (Scopoli, 1763) – Белб (?), Блрц, Учлн, Байм, Хайб [Круликовский, 1910; Nupponen et al., 2000]. В малонарушенных лесах по разнотравным опушкам и лугам.
6345. *Scythris productella* (Zeller, 1839) – без местонахождений [Трофимова, 2006б, 2015; Anikin et al., 2017]. По сухим остепнённым лугам и склонам.
6346. *Scythris sinensis* (Felder & Rogenhofer, 1875) – Иглн, Уфа [Исмагилов, 2025б].
6347. *Scythris subaerariella* (Stainton, 1867) – Учлн [Nupponen et al., 2000]. Сухие, песчаные или известняковые местообитания.

Семейство Autostichidae – Автостихиды (3 вида)

Подсемейство Autostichinae

6348. *Deroxena venosulella* (Möschler, 1862) – Учлн, Абзл [Исмагилов, 2023, 2025б]. По степям.

Подсемейство Oegoconiinae

6349. *Holcopogon adseclella* (Eversmann, 1844) (=*bubulcellus* (Staudinger, 1859)) – Байм [Трофимова, 2006б]. По степям.
6350. *Oegoconia deauratella* (Herrich-Schäffer, [1854]) (=*quadripuncta* (Haworth, 1828); =*bacescui* Popescu-Gorj et Căpuse, 1965) – Байм, Уфмс [Трофимова, 2006б; Исмагилов и др., 2022]. Преимущественно характерен для ксерофитных опушек сосняков.

Семейство Gelechiidae – Выемчатокрылые моли (156 вида, наличие еще 10 не подтверждено)

Подсемейство Anacampsinae

Триба Anacampsini Bruand, 1851

6351. *Anacampsis blattariella* (Hübner, 1796) – Бурз, Учлн, Абзл, Крмс [Трофимова, 2003; Junnilainen et al., 2010; Исмагилов, 2025б]. В лесах и посадках с березой.
6352. *Anacampsis obscurella* ([Denis et Schiffermüller], 1775) – Зиан [Junnilainen et al., 2010].
6353. *Anacampsis populella* (Clerck, 1759) – Белб, Бурз, Учлн [Круликовский, 1910; Трофимова, 2003; Junnilainen et al., 2010]. Лесной мезофил, на стволах ивовых.
6354. *Anacampsis timidella* (Wocke, 1887) – Зиан [Junnilainen et al., 2010]. В разреженных или остепненных дубравах.

6355. *Ananarsia lineatella* (Zeller, 1839) – Зиан, Учлн, Уфа [Junnilainen et al., 2010; Исмагилов и др., 2022]. По опушкам широколиственных лесов.
6356. *Anarsia sibirica* Park et Ponomarenko, 1996 – Учлн, Хайб [Junnilainen et al., 2010].
6357. *Anarsia spartiella* (Schrank, 1802) – Байм, Учлн , Зиан [Junnilainen et al., 2010]. Характерен для остепнённых опушек смешанных и широколиственных лесов.
6358. *Aproaerema anthyllidella* (Hübner, [1813]) – Учлн, Зиан, Иглн, Уфа [Junnilainen et al., 2010; Исмагилов и др., 2022; Исмагилов, 2025б]. По прогреваемым луговым и остепнённым участкам.
6359. *Hypatima rhomboidella* (Linnaeus, 1758) – без местонахождений [Трофимова, 2006б, 2015; Anikin et al., 2017]. Лесной мезофил.
6360. *Nothris gregerseni* Karsholt et Šumpich, 2015 (*lemniscellus* auct.) – Кгрч, Учлн, Давл [Трофимова, 2006б; Junnilainen et al., 2010; Исмагилов и др., 2022].
6361. *Nothris verbascella* ([Denis et Schiffermüller], 1775) – Блрц [Трофимова, 2006б]. Характерен для ксерофитных и остепнённых лугов, особенно на песчаных почвах.
6362. *Stomopteryx remissella* (Zeller, 1847) – Байм, Учлн [Junnilainen et al., 2010].
6363. *Syncopacma albifrontella* (Heinemann, 1870) – Учлн [Junnilainen et al., 2010].
6364. *Syncopacma azosterella* (Herrich-Schäffer, [1854]) – Учлн [Junnilainen et al., 2010].
6365. *Syncopacma cinctella* (Clerck, 1759) (=*vorticella* (Scopoli, 1763)) – Альш, Блрц, Учлн, Хайб [Круликовский, 1904; Трофимова, 2006б; Junnilainen et al., 2010]. По прогреваемым луговым участкам.
6366. *Syncopacma cincticulella* (Bruand, 1850) – Байм [Junnilainen et al., 2010].
6367. *Syncopacma polychromella* (Rebel, 1902) – Уфа [Исмагилов, 2025б].
6368. *Syncopacma vinella* (Bankes, 1898) – Учлн [Junnilainen et al., 2010]. По сухим опушкам и полянам сосняков.

Триба Chelariini Le Marchand, 1947
Подсемейство Dichomeridinae

6369. *Acompsia cinerella* (Clerck, 1759) – на всей территории. Эвритопный луговой мезофил.
6370. *Brachmia blandella* (Fabricius, 1798) – без местонахождений [Трофимова, 2015; Anikin et al., 2017].
6371. *Brachmia dimidiella* ([Denis et Schiffermüller], 1775) – на всей территории. По сухим луговым и остепнённым участкам.
6372. *Dichomeris alacella* (Zeller, 1839) – Учлн, Блвщ, Крмс, Стбш, Уфа [Junnilainen et al., 2010; Исмагилов и др., 2022; Исмагилов, 2025б]. По опушкам широколиственных лесов и посадок.
6373. *Dichomeris derasella* ([Denis et Schiffermüller], 1775) – Учлн, Хайб, Блвр, Крмс, Нефтекамск [Junnilainen et al., 2010; Исмагилов и др., 2021б; Исмагилов, 2025б;]. Преимущественно в старовозрастных лесах.
6374. *Dichomeris latipennella* (Rebel, 1937) – Блрц [Junnilainen et al., 2010].

6375. *Dichomeris limosellus* (Schläger, 1849) – на всей территории. По прогреваемым луговым и остепнённым участкам.
6376. *Helcystogramma albinervis* (Gerasimov, 1929) – Учлн [Junnilainen et al., 2010]. По сухим опушкам сосняков и остепнённых широколиственных перелесков.
6377. *Helcystogramma arulensis* (Rebel, 1929) – Байм, Блвр [Трофимова, 2006б; Исмагилов, 2025б].
6378. *Helcystogramma lutatella* (Herrich-Schäffer, [1854]*)* – Зиан, Иглн, Нурм, Уфа [Junnilainen et al., 2010; Исмагилов и др., 2022; Исмагилов, 2025б]. По сухим луговым и остепнённым участкам.
6379. *Helcystogramma rufescens* (Haworth, 1828) – Уфмс, Абзл, Бурз [Исмагилов и др., 2021б; Исмагилов, 2025б]. По прогреваемым луговым участкам.

Подсемейство Apatetrinae

Триба Apatetrini Le Marchand, 1947

6380. *Chrysoesthia drurella* (Fabricius, 1775) – Блрц [Трофимова, 2006б].
6381. *Chrysoesthia sexguttella* (Thunberg, 1794) – Нефтекамск, Уфа [Исмагилов и др., 2021а; Исмагилов, 2025б].
6382. *Metanarsia modesta* Staudinger, 1871 – Учлн, Хайб, Уфа [Junnilainen et al., 2010; Исмагилов и др., 2021б].

Триба Pexicopiini Hodges, 1986

6383. *Pexicopia malvella* (Hübner, [1805]) – Хайб, Крмс [Junnilainen et al., 2010; Исмагилов и др., 2020]. Преимущественно в агроценозах по травяным пустырям.
6384. *Sitotroga cerealella* (Olivier, 1789) – без местонахождений [Положенцев, Коровина, 1949; Положенцев, Положенцева, 1977].

Подсемейство Anomologinae

6385. *Apodia bifractella* (Duponchel, [1843]) – Чишм, Учлн, Ишмб [Круликовский, 1901; Трофимова, 2006б; Junnilainen at al., 2010; Исмагилов, 2025б].
6386. *Aristotelia subericinella* (Duponchel, [1843]*)* – Байм [Junnilainen et al., 2010]. Характерен для прогреваемых прибрежно-луговых участков с дербенником иволистным.

?. *Bryotropha affinis* (Haworth, 1828) – без местонахождений [Трофимова, 2006б]. Указывался как обычный вид, встречающийся в луговых биотопах в июне-июле, но в дальнейшем не приводился. Вид сложен для определения и требует подсверждения.

6387. *Bryotropha galbanella* (Zeller, 1839) – Блрц [Junnilainen et al., 2010]. По сухим боровым опушкам.
6388. *Bryotropha nupponeni* Karsholt et Rutten, 2005 – Байм [Junnilainen et al., 2010].
6389. *Bryotropha plantariella* (Tengström, 1848) – Учлн [Junnilainen et al., 2010].
6390. *Bryotropha senectella* (Zeller, 1839) – Архн, Крмс, Уфа [Трофимова, 2006б; Исмагилов и др., 2020]. По сухим боровым опушкам, прилегающим пустошам и остепнёнными участкам.
6391. *Bryotropha similis* (Stainton, 1854) – Учлн [Junnilainen et al., 2010]. По опушкам смешанных и лиственных лесов и прилегающим пустошам.

? *Bryotropha terrella* ([Denis et Schiffermüller], 1775) – без местонахождений [Трофимова, 2006б]. Указывался как обычный вид, встречающийся в луговых биотопах, но в дальнейшем это указание не учитывалось. Вид сложен для определения и требует подтверждения. По сухим разнотравным опушкам смешанных лесов.

?. *Bryotropha umbrosella* (Zeller, 1839) – без местонахождений [Трофимова, 2006б]. Указывался как обычный вид, встречающийся в луговых биотопах в июне-июле, но в дальнейшем не приводился. Вид сложен для определения и требует подтверждения.

6392. *Dirhinosia cervinella* (Eversmann, 1844) – Зиан, Хайб [Junnilainen et al., 2010].
6393. *Eulamprotes superbella* (Zeller, 1839) – Учлн [Junnilainen et al., 2010].
6394. *Eulamprotes wilkella* (Linnaeus, 1758) – Учлн [Junnilainen et al., 2010]. Характерен для прогреваемых луговых и остепнённых участков.
6395. *Gladiovalva aizpuruai* Vives, 1990 – Учлн, Кушн [Šumpich, Skyva, 2012; Исмагилов, 2023].
6396. *Isophrictis anthemidella* (Wocke, 1871) – Хайб [Junnilainen at al., 2010; Трофимова, 2006б, 2015; Anikin et al., 2017]. По сухим боровым опушкам и остепнённым участкам.
6397. *Isophrictis striatella* ([Denis et Schiffermüller], 1775) – Блрц [Трофимова, 2006б]. По сухим боровым опушкам и остепнённым участкам.
6398. *Ivanauskiella psamathias* (Meyrick, 1891) – Учлн [Junnilainen et al., 2010].
6399. *Megacraspedus attritellus* Staudinger, 1871 – Блрц [Трофимова, 2006б].
6400. *Megacraspedus balneariellus* (Chrétien, 1907) – Хайб [Junnilainen et al., 2010].
6401. *Megacraspedus fallax* (Mann, 1867) – Байм, Зиан, Учлн [Junnilainen et al., 2010].
6402. *Megacraspedus multispinella* Junnilainen et K. Nupponen, 2010 – Учлн, Хайб [Junnilainen et al., 2010].
6403. *Megacraspedus niphorrhoa* (Meyrick, 1926) – Хайб [Junnilainen et al., 2010].
6404. *Metzneria aprilella* (Herrich-Schäffer, [1854]) – Кушн, Блвр [Исмагилов, 2023, 2025б]. По остепнённым лугам и опушкам широколиственных лесов.
6405. *Metzneria ehikeella* Gozmány, 1954 – Байм, Нефтекамск [Junnilainen at al., 2010; Исмагилов, 2025б]. Характерен для ксерофитных и остепненных луговых участков.
6406. *Metzneria lappella* (Linnaeus, 1758) – Альш, Учлн, Хайб, Нефтекамск [Круликовский, 1904, 1910; Junnilainen at al., 2010; Исмагилов, 2025б]. Эвритопный лугово-полевой мезоксерофил.
6407. *Metzneria metzneriella* (Stainton, 1851) (=*silacella* (Eversmann, 1844)) – Уфа [Исмагилов и др., 2022]. В лесистых ландшафтах по разнотравным лугам и опушкам.
6408. *Metzneria neuropterella* (Zeller, 1839) – на всей территории. По прогреваемым луговым и остепнённым участкам.
6409. *Metzneria santolinella* (Amsel, 1936) – Туйм, Хайб [Junnilainen at al., 2010]. Характерен для ксерофитных и остепнённых луговых участков.

6410. *Monochroa conspersella* (Herrich-Schäffer, [1854]) – Хайб [Junnilainen et al., 2010]. В смешанных лесах.
6411. *Monochroa elongella* (Heinemann, 1870) – Учлн [Трофимова, 2006б, 2015; Junnilainen et al., 2010; Anikin et al., 2017]. Умеренно эвритопный луговой мезофил.
6412. *Monochroa inflexella* Svensson, 1992 – Учлн [Junnilainen et al., 2010].
6413. *Monochroa lucidella* (Stephens, 1834) – Учлн [Junnilainen et al., 2010].
6414. *Monochroa lutulentella* (Zeller, 1839) – Байм, Зиан, Учлн, Блрц [Junnilainen et al., 2010]. Характерен для лесных полян и болот с таволгой вязолистной.
6415. *Monochroa nomadella* (Zeller, 1868) – Байм, Мелз [Junnilainen et al., 2010].
6416. *Monochroa sepicolella* (Herrich-Schäffer, [1854]) – Зиан [Junnilainen et al., 2010]. Характерен для сухих боровых полян и остепненных участков с некоторыми видами щавеля.

? *Monochroa suffusella* (Douglas, 1850) – Блрц [Трофимова, 2006б]. В дальнейшем не приводился. Наличие этого вида в РБ требует подтверждения.
6417. *Monochroa tenebrella* (Hübner, [1817]) – без местонахождений [Anikin et al., 1999, 2017].
6418. *Oxypteryx unicolorella* (Duponchel, [1843]) – Уфа [Исмагилов, 2025б]. По суходольным лугам, сухим борам и пустырям
6419. *Ptocheuusa abnormella* (Herrich-Schäffer, [1854]) [Junnilainen at al., 2010; Anikin et al., 2017].
6420. *Pyncostola bohemiella* (Nickerl, 1864) – Учлн [Junnilainen at al., 2010].

Подсемейство Gelechiinae

Триба Gelechiini Stainton, 1854

6421. *Agnippe echinuloides* Bidzilya et Li, 2010 – Туйм, Хайб, Крмс [Junnilainen et al., 2010; Исмагилов и др., 2022].
6422. *Aroga aristotelis* (Millière, [1876]*)* – Зиан [Junnilainen et al., 2010].
6423. *Aroga flavicomella* (Zeller, 1839) – Байм, Учлн, Хайб [Junnilainen et al., 2010; Исмагилов, 2023].
6424. *Aroga pascuicola* (Staudinger, 1871) – Байм [Исмагилов и др., 2020].
6425. *Aroga velocella* (Zeller, 1839) – Учлн, Бурз, Нефтекамск [Junnilainen et al., 2010; Исмагилов, 2023]. По сухим опушкам сосняков и лиственных перелесков, а также по прилегающим пустошам.
6426. *Athrips aquila* Junnilainen, 2010 – Учлн [Junnilainen et al., 2010].
6427. *Athrips mouffetella* (Linnaeus, 1758) – без местонахождений [Трофимова, 2006б, 2015; Anikin et al., 2017]. По-видимому, умеренно эвритопный лесолуговой вид.
6428. *Athrips pruinosella* (Lienig et Zeller, 1846*)* – Ишмб, Зиан, Учлн, Хайб [Junnilainen et al., 2010].
6429. *Athrips spiraeae* (Staudinger, 1871) – Учлн, Зиан [Junnilainen et al., 2010].
6430. *Chionodes distinctella* (Zeller, 1839) – Чишм, Байм, Зиан, Учлн [Круликовский, 1910; Junnilainen et al., 2010]. По сухим опушкам сосняков и остепненных лиственных перелесков, а также по прилегающим пустошам.

6431. *Chionodes electella* (Zeller, 1839) – Блрц, Учлн, Уфа [Junnilainen et al., 2010; Исмагилов и др., 2022; Исмагилов, 2025б]. В смешанных лесах с участием елей (*Picea* sp.).
6432. *Chionodes fumatella* (Douglas, 1850) – Зиан, Учлн [Junnilainen et al., 2010]. По сухим опушкам сосняков и остепненных лиственных перелесков, прилегающим пустошам, а также в озелененных урбоценозах.
6433. *Chionodes holosericella* (Herrich-Schäffer, [1854]) – Блрц [Junnilainen et al., 2010].
6434. *Chionodes lugubrella* (Fabricius, 1794) – Учлн [Junnilainen et al., 2010]. По боровым опушкам и полянам.
6435. *Chionodes soella* Huemer et Sattler, 1995 – Блрц [Junnilainen et al., 2010].
6436. *Chionodes tragicella* (Heyden, 1865) – Блрц [Junnilainen et al., 2010].
6437. *Chionodes violacea* (Tengström, 1848) – без местонахождений [Anikin et al., 2017].
6438. *Filatima incomptella* (Herrich-Schäffer, [1854]) – Блрц [Junnilainen et al., 2010].
6439. *Filatima pallipalpella* (Snellen, 1884) (=*autocrossa* (Meyrick, 1937)) – Байм, Учлн [Junnilainen et al., 2010].
6440. *Filatima spurcella* (Duponchel, [1843]) – Хайб [Junnilainen et al., 2010].
? *Filatima tephritidella* (Duponchel, [1843]) – Байм [Трофимова, 2006б]. Указывался по 1 самцу, но в дальнейшем не приводился. Требует подтверждения.
6441. *Gelechia jakovlevi* Krulikowsky, 1905 – Крмс [Исмагилов и др., 2020].
6442. *Gelechia muscosella* Zeller, 1839 – Учлн, Уфа [Junnilainen et al., 2010; Исмагилов, 2023]. В старовозрастных лесах.
6443. *Gelechia nigra* (Haworth, 1828) – Чишм, Абзл [Круликовский, 1901; Трофимова, 2006б]. В старовозрастных лесах с участием осины (*Populus tremula*).
6444. *Gelechia rhombella* ([Denis et Schiffermüller], 1775) – Крмс, Уфа [Исмагилов и др., 2020; Исмагилов, 2025б]. Лесной мезофил.
6445. *Gelechia rhombelliformis* Staudinger, 1871 – Альш [Круликовский, 1904].
6446. *Gelechia sestertiella* Herrich-Schäffer, [1854] – Уфа, Иглн [Исмагилов, 2023, 2025б].
6447. *Gelechia sororculella* (Hübner, [1817]*)* – Уфа [Исмагилов и др., 2020]. Характерен для широколиственных лесов лесостепи.
6448. *Gelechia turpella* ([Denis et Schiffermüller], 1775) – Уфа, Иглн [Исмагилов и др., 2022; Исмагилов, 2025б].
6449. *Klimeschiopsis kiningerella* (Duponchel, [1843]) – Уфа [Исмагилов, 2025б]. По сухим и мезофильным лугам с участием тысячелистников (*Achillea* spp.).
6450. *Mirificarma cytisella* (Treitschke, 1833) – Байм, Учлн [Трофимова, 2006б; Junnilainen et al., 2010; Исмагилов, 2025б]. По боровым опушкам и полянам на кустах ракитника.

6451. *Mirificarma lentiginosella* (Zeller, 1839) – Блрц [Трофимова, 2006б]. По боровым опушкам и полянам с участием дрока красильного (*Genista tinctoria*).
6452. *Neofriseria peliella* (Treitschke, 1835) – Байм, Учлн [Junnilainen et al., 2010]. По сухим опушкам сосняков и лиственных перелесков, а также по прилегающим пустошам.
? *Prolita sexpunctella* (Fabricius, 1794) – без местонахождений [Трофимова, 2006б]. Указывался как встречающийся в таежной зоне, на лугах и болотах в июне, но в дальнейшем не приводился. Требуется новое подтверждение материалом.
6453. *Prolita solutella* (Zeller, 1839) – Учлн [Junnilainen et al., 2010]. В сильно остепненных биотопах с доминированием ракитника русского (*Chamaecytisus ruthenicus*).
6454. *Psoricoptera gibbosella* (Zeller, 1839) – Бурз, Зиан [Трофимова, 2003; Junnilainen et al., 2010]. Преимущественно в старовозрастных лесах.
6455. *Psoricoptera speciosella* Teich, 1893 – Учлн [Junnilainen et al., 2010].
6456. *Sophronia chilonella* (Treitschke, 1833) – Учлн [Junnilainen et al., 2010].
6457. *Sophronia consanguinella* Herrich-Schäffer, [1854] – Байм, Учлн, Мелз, Кушн [Junnilainen et al., 2010; Исмагилов, 2023]. По остепнённым лугам и опушкам лесов
6458. *Sophronia semicostella* (Hübner, [1813]) – Чишм, Блрц [Круликовский, 1901; Трофимова, 2006].
6459. *Sophronia sicariellus* (Zeller, 1839) – Байм, Учлн [Трофимова, 2006б; Junnilainen et al., 2010]. Преимущественно по сухим опушкам смешанных лесов, прилегающим пустошам, а также остепненным участкам.

Триба Gnorimoschemini Povolný, 1964

6460. *Agonochaetia intermedia* Sattler, 1968 – Учлн, Хайб [Junnilainen et al., 2010].
6461. *Caryocolum amaurella* (M. Hering, 1924) – Учлн [Junnilainen et al., 2010].
6462. *Caryocolum blandella* (Douglas, 1852) (=*signatella* (Eversmann, 1844)) – Зиан [Junnilainen et al., 2010]. Характерен для смешанных лесов.
6463. *Caryocolum fischerella* (Treitschke, 1833) – Крмс [Исмагилов и др., 2020]. Эвритопный лесолуговой вид.
6464. *Caryocolum kroesmanniella* (Herrich-Schäffer, [1854]) – Блрц, Зиан [Трофимова, 2003, 2006б; Junnilainen et al., 2010]. Преимущественно в смешанных лесах.
6465. *Caryocolum leucomelanella* (Zeller, 1839) – Учлн [Junnilainen et al., 2010].
? *Caryocolum oculatella* (Thomann, 1930) – Блрц [Трофимова, 2006б] (?). Указывался по 1 самцу 26.06.2003 и в дальнейшем не приводился. Наличие вида требует подтверждения.
6466. *Caryocolum petrophila* (Preissecker, 1914) – Зиан, Учлн [Junnilainen et al., 2010].
6467. *Caryocolum schleichi* (Christoph, 1872) (=*arenariella* (Benander, 1937)) – Бурз, Учлн [Трофимова, 2003; Junnilainen et al., 2010].

6468. *Caryocolum tricolorella* (Haworth, 1812) – без местонахождений [Трофимова, 2006б, 2015]. Характерен для смешанных лесов и остепненных широколиственных перелесков
6469. *Ephysteris diminutella* (Zeller, 1847) – Блрц [Трофимова, 2006б].
6470. *Gnorimoschema streliciella* (Herrich-Schäffer, [1854]) – Байм, Учлн [Junnilainen et al., 2010]. Стенотопный лесолуговой ксерофил или ксеромезофил; в лесной зоне должен быть приурочен к песчаным соснякам.
6471. *Lutilabria prolata* Junnilainen et K. Nupponen, 2010 – Туйм [Junnilainen et al., 2010].
6472. *Lutilabria volgensis* Anikin et Piskunov, 1996 – Туйм, Учлн [Junnilainen et al., 2010].
6473. *Scrobipalpa abstrusa* Huemer & Karsholt, 2010 – Учлн [Huemer, Karsholt, 2010].
6474. *Scrobipalpa acuminatella* (Sircom, 1850) – Учлн [Junnilainen et al., 2010]. По прогреваемым луговым участкам.
6475. *Scrobipalpa artemisiella* (Treitschke, 1833) – Бурз, Учлн [Трофимова, 2003; Junnilainen et al., 2010].
6476. *Scrobipalpa atriplicella* (Fischer v. Röslerstamm, 1840) – Блрц [Трофимова, 2006б]. По рудеральным участкам.
6477. *Scrobipalpa dorsoflava* (Povolný, 1996*)* – Учлн [Junnilainen et al., 2010].
6478. *Scrobipalpa grisea* Povolný, 1969 – Байм, Зиан, Учлн [Junnilainen et al., 2010].
6479. *Scrobipalpa heimi* Huemer et Karsholt, 2010 – Учлн [Huemer, Karsholt, 2010].
? *Scrobipalpa lagodes* (Meyrick, 1926) – Байм [Трофимова, 2006б]. Указывался по 1 самцу 12.07.2003, но в дальнейшем не приводился. Требуется подтверждение фактическим материалом.
6480. *Scrobipalpa nitentella* (Fuchs, 1902*)* – Учлн [Junnilainen et al., 2010].
6481. *Scrobipalpa notata* (Povolný, 2001) – Хайб [Junnilainen et al., 2010; Huemer, Karsholt, 2010].
? *Scrobipalpa ocellatella* (Boyd, 1858) – без местонахождений [Мурзабаева, 2016]. Приводился с общеизвестными данными по экологии вида. Наличие вида в РБ требует подтверждения по фактическому материалу. В агроценозах с посевами свеклы.
6482. *Scrobipalpa proclivella* (Fuchs, 1886) – Учлн [Junnilainen et al., 2010]. По ксерофитным луговым и остепненным участкам.
6483. *Scrobipalpa punctata* (Povolný, 1996) – Хайб [Junnilainen et al., 2010].
6484. *Scrobipalpa rebeli* (Preissecker, 1914) – Учлн [Junnilainen et al., 2010].
6485. *Scrobipalpa salinella* (Zeller, 1847) – Байм, Учлн [Junnilainen et al., 2010].
6486. *Scrobipalpa spumata* (Povolný, 2001) – Учлн [Huemer, Karsholt, 2010].
6487. *Scrobipalpula diffluella* (Frey, 1870) – Учлн [Junnilainen et al., 2010].
6488. *Scrobipalpula tussilaginis* (Stainton, 1867) – без местонахождений [Anikin et al., 2017].
6489. *Tuta absoluta* (Meyrick, 1917) – Уфмс [Жимерикин, Миронова, 2012].

Триба Litini Bruand, 1859

6490. *Altenia scriptella* (Hübner, 1796) – Зиан, Уфа [Junnilainen et al., 2010; Исмагилов, 2023]. В лесах с участием кленов (*Acer* spp.).
6491. *Carpatolechia alburnella* (Zeller, 1839) – на всей территории. В относительно малонарушенных лесах с участием берез (*Betula* spp.).
6492. *Carpatolechia decorella* (Haworth, 1812) – Зиан [Junnilainen et al., 2010].
6493. *Carpatolechia filipjevi* (Lvovsky et Piskunov, 1993) – Учлн [Junnilainen et al., 2010].
6494. *Carpatolechia fugitivella* (Zeller, 1839) – Зиан, Блрц, Учлн, Уфа [Junnilainen et al., 2010; Исмагилов и др., 2020; Исмагилов, 2025б].
6495. *Carpatolechia notatella* (Hübner, [1813]) – Чишм [Круликовский, 1901; Anikin et al., 2017].
6496. *Carpatolechia proximella* (Hübner, 1796) – Блрц, Хайб [Junnilainen et al., 2010]. В смешанных и изреженных лиственных лесах.
6497. *Pseudotelphusa aenigma* (Sattler, 1983) – Зиан, Мелз [Junnilainen et al., 2010].
6498. *Pseudotelphusa paripunctella* (Thunberg, 1794) – Блрц, Хайб [Junnilainen et al., 2010]. В смешанных и широколиственных лесах.
6499. *Pseudotelphusa scalella* (Scopoli, 1763) – Чишм, Крмс [Круликовский, 1901; Исмагилов и др., 2022]. В лесах и посадках с дубом.
6500. *Recurvaria leucatella* (Clerck, 1759) – Байм, Абзл, Блвр, Крмс, Уфа [Junnilainen et al., 2010; Исмагилов и др., 2022; Исмагилов, 2025б]. В лесах и старых посадках с участием древесно-кустарниковых розоцветных.
6501. *Recurvaria nanella* ([Denis et Schiffermüller], 1775) – Чишм, Крмс, Уфа [Круликовский, 1901; Исмагилов и др., 2022; Исмагилов, 2025б]. Эвритопный лесной вид.

? *Stenolechia gemmella* (Linnaeus, 1758) – Нефтекамск [Хабибуллин, 2018а]. Указывался со ссылкой на студенческую дипломную работу без указания кормового растения. Вид довольно сложен в определении и требует подтверждения. Характерен для старовозрастных смешанных лесов с участием дуба (*Quercus robur*).
6502. *Teleiodes flavimaculella* (Herrich-Schäffer, [1854]) – Учлн, Уфа [Junnilainen et al., 2010; Исмагилов и др., 2021б].
6503. *Teleiodes kaitilai* Junnilainen, 2010 – Блрц [Junnilainen et Nupponen, 2010; Junnilainen et al., 2010].
6504. *Teleiodes luculella* (Hübner, [1813]) – Уфмс, Уфа [Исмагилов и др., 2021б]. В широколиственных лесах и посадках.
6505. *Teleiodes vulgella* ([Denis et Schiffermüller], 1775) – Байм, Учлн [Junnilainen et al., 2010]. Трофически связан с древесно-кустарниковыми розоцветными.
6506. *Teleiopsis diffinis* (Haworth, 1828) – Учлн, Нефтекамск, Уфа [Junnilainen et al., 2010; Исмагилов, 2023]. Преимущественно по сухим опушкам сосняков, прилегающим пустошам, отчасти по остепненным участкам.

Семейство Cosmopterigidae – Роскошные моли (7 видов)

Подсемейство Antequerinae

6507. *Pancalia leuwenhoekella* (Linnaeus, [1760]) – Бурз [Синев, 1985]. По хорошо прогреваемым луговым и степным участкам.

6508. *Pancalia nodosella* (Bruand, 1850) – Альш, Ишмб [Исмагилов и др., 2020; Исмагилов, 2025б]. В лесостепных ландшафтах.

Подсемейство Cosmopteriginae

6509. *Eteobalea anonymella* (Riedl, 1965) – Бурз, Крмс [Синев, 1986; Исмагилов, 2025б]. По прогреваемым луговым участкам.

6510. *Eteobalea intermediella* (Riedl, 1966) – Крмс [Исмагилов и др., 2021б]. По сухим, прогреваемых луговых или степных участков.

6511. *Eteobalea tririvella* (Staudinger, 1871) – Крмс [Исмагилов и др., 2021б]. По сухим, прогреваемых луговых или степных участков.

6512. *Limnaecia phragmitella* Stainton, 1851 – Байм [Трофимова, 2006б]. Умеренно стенотопный прибрежно-луговой вид.

6513. *Pyroderces argyrogrammos* (Zeller, 1847) – Крмс, Блвр, Уфа [Исмагилов и др., 2020; Исмагилов, 2025б]. По сухим прогреваемым лугам и опушкам лесов.

Надсемейство Alucitoidea

Семейство Alucitidae – Веерокрылки (1 вид, еще 1 не подтвержден)

? *Alucita hexadactyla* (Linnaeus, 1758) – без местонахождений [Мигранов, Саттаров, 2006] (?). Вид сложен для определения и требует подтверждения. Характерен для лесных опушек и перелесков лесостепного типа с участием жимолости (*Lonicera sp.*).

6514. *Pterotopteryx dodecadactyla* Hübner, [1813] – Стмк, Нефтекамск [Исмагилов и др., 2020; Исмагилов, 2025б]. Характерен для лесных опушек и перелесков лесостепного типа с участием жимолости (*Lonicera sp.*).

Надсемейство Pterophoroidea

Семейство Pterophoridae – Пальцекрылки (35 видов, наличие еще 1 не подтверждено)

Подсемейство Agdistinae

6515. *Agdistis adactyla* (Hübner, [1819]) – Байм, Хайб [Трофимова, 2004б, 2006б; Trofimova et al., 2016]. По сухим боровым опушкам, лугам и прилегающим пустошам с обилием полыни полевой.

Подсемейство Platyptiliinae

Триба Platyptiliini Bigot, Gibeaux, Nel et Picard, 1998

6516. *Amblyptilia punctidactyla* (Haworth, [1811]) (=*cosmodactyla* (Hübner, [1819])) – Чишм, Блрц, Бурз, Гафр [Круликовский, 1901; Трофимова, 2003; Trofimova et al., 2016]. В лесных и облесённых ландшафтах по редколесьям, разнотравным опушкам и полянам.

6517. *Cnaemidophorus rhododactyla* ([Denis et Schiffermüller], 1775) – без местонахождений [Anikin et al., 2017]. Характерен для остепненных ландшафтов с участием шиповников (*Rosa* spp.)

6518. *Gillmeria ochrodactyla* ([Denis et Schiffermüller], 1775) (=*tetradactyla* (Linnaeus, 1758)) – Чишм [Круликовский, 1901]. В лесных и облесенных ландшафтах по разнотравным опушкам и полянам.
6519. *Gillmeria pallidactyla* (Haworth, [1811]) – Блрц, Учлн, Кгрч, Зилр, Бурз [Трофимова, 2004б, 2006б; Trofimova et al., 2016]. В лесных и облесенных ландшафтах по редколесьям, разнотравным опушкам и полянам.
6520. *Paraplatyptilia metzneri* (Zeller, 1841) – Блрц, Бурз, Байм [Трофимова, 2004б, 2006б; Trofimova et al., 2016]. По степным склонам.
6521. *Platyptilia calodactyla* ([Denis et Schiffermüller], 1775) – Блрц, Кгрч [Трофимова, 2004б; Trofimova et al., 2016]. Характерен для луговых участков, считается олигофагом некоторых сложноцветных.
6522. *Platyptilia gonodactyla* ([Denis et Schiffermüller], 1775) – на всей территории. Эвритопный лугово-полевой вид, монофаг мать-и-мачехи обыкновенной.
6523. *Platyptilia nemoralis* (Zeller, 1841) – Гафр, Хайб [Трофимова, 2004б, 2006б; Trofimova et al., 2016]. По опушкам широколиственных лесов.
6524. *Platyptilia tesseradactyla* (Linnaeus, [1760]) – Блрц, Гафр [Трофимова, 2004б; Trofimova et al., 2016]. Преимущественно в сосняках, отчасти в лиственных перелесках по сухим опушкам и полянам с участием кошачьей лапки двудомной (*Antennaria dioica*).
6525. *Stenoptilia bipunctidactyla* (Scopoli, 1763) (=*serotinus* (Zeller, 1852)) – по всей территории. По прогреваемым лугам и прилегающим пустырям.
6526. *Stenoptilia coprodactylus* (Stainton, 1851) – Учлн (?), Байм, Блрц [Трофимова, 2004б; Trofimova et al., 2016]. В первой цит. работе указан из Учлн (хр. Узынкыр), однако во второй работе данное указание не подтверждается. По степям и сухим лугам.
6527. *Stenoptilia graphodactyla* (Treitschke, 1833) (?*pneumonanthes* (Büttner, 1880) – Кгрч, Блрц [Трофимова, 2004б, 2006б; Trofimova et al., 2016]. По остепненным участкам с участием горечавок (*Gentiana* spp.).
6528. *Stenoptilia pterodactyla* (Linnaeus, [1760]) – по всей территории. В лесных и облесённых ландшафтах по редколесьям, разнотравным опушкам, прилегающим мезофитным лугам.
6529. *Stenoptilia stigmatodactylus* (Zeller, 1852) – без местонахождений [Anikin et al., 2017]. По остепненным лесам.

Триба Marasmarchini Tutt, 1906 (=Exelastini Gielis, 2000)

6530. *Marasmarcha colossa* Caradja, 1920 – без местонахождений [Anikin et al., 2003, 2017; Трофимова, 2015]. По степям.

Триба Oxyptilini Bigot, Gibeaux, Nel et Picard, 1998 (=Trichoptilini Bigot, Gibeaux, Nel et Picard, 1998)

6531. *Geina didactyla* (Linnaeus, 1758) – на всей территории. В лесах и старых посадках различных типов по тенистым сыроватым редколесьям, опушкам, высокотравным полянам.

6532. *Oxyptilus distans* (Zeller, 1847) – Кгрч, Байм, Крмс [Трофимова, 2004б, 2006б; Trofimova et al., 2016; Исмагилов, 2025б]. По сухим и остепненным лугам, прилегающим пустошам.

6533. *Oxyptilus parvidactylus* (Haworth, [1811]) – Байм, Зилр, Крмс [Trofimova et al., 2016; Исмагилов, 2025б]. По сухим лесным опушкам, прилегающим пустошам и остепненным участкам.

6534. *Oxyptilus tristis* (Zeller, 1841) – на всей территории. По сухим и лугам, отчасти по прилегающим пустошам.

6535. *Procapperia kuldschaensis* (Rebel, 1914) – Учлн (?), Блрц, Кгрч, Бурз, Байм, Зиан [Трофимова, 2004б, 2006б; Trofimova et al., 2016]. В первой цит. работе указан в т.ч. из Учлн (хр. Узынкыр), однако во второй цит. работе данное указание не подтверждено. На степных и сухих склонах.

Подсемейство Pterophorinae

Триба Oidaematophorini Bigot, Gibeaux, Nel et Picard, 1998

6536. *Emmelina monodactyla* (Linnaeus, 1758) – на всей территории. Преимущественно по редколесьям, среди кустарниковой и высокой травянистой растительности.

6537. *Hellinsia carphodactyla* (Hübner, [1813]) – Кгрч (?), Бурз [Трофимова, 2004б, 2006б; Trofimova et al., 2016]. В первых двух цит. работах указан из Кгрч (Мурадымовское ущелье), однако в последней работе данное указание не подтверждено. По сухим боровым опушкам и остепненным участкам.

6538. *Hellinsia didactylites* (Ström, 1783) – Блрц, Кгрч [Трофимова, 2004б, 2006б; Trofimova et al., 2016]. Преимущественно в смешанных лесах по редколесьям, разнотравным опушкам и полянам.

6539. *Hellinsia osteodactylus* (Zeller, 1841) – Зилр, Бурз, Блрц [Trofimova et al., 2016]. Преимущественно в смешанных лесах по редколесьям, разнотравным опушкам и полянам.

6540. *Hellinsia tephradactylus* (Hübner, [1813]) – Учлн, Блрц [Трофимова, 2004б, 2006б; Trofimova et al., 2016]. Преимущественно в смешанных лесах по редколесьям, разнотравным опушкам и полянам.

6541. *Oidaematophorus lithodactyla* (Treitschke, 1833) – Мелз, Байм, Учлн, Кгрч [Трофимова, 2004б, 2006б, 2015; Trofimova et al., 2016]. По сухим боровым опушкам и остепненным участкам.

Триба Pterophorini Bigot, Gibeaux, Nel et Picard, 1998

6542. *Calyciphora albodactylus* (Fabricius, 1794) (=*xerodactyla* (Zeller, 1841)) – Бурз, Блрц, Кгрч [Трофимова, 2003, 2004б; Trofimova et al., 2016]. По остепненным участкам.

6543. *Calyciphora homoiodactyla* (Kasy, 1960) – Блрц, Кгрч, Байм [Трофимова, 2004б; Паженков и др., 2005; Trofimova et al., 2016]. По остепненным участкам.

6544. *Merrifieldia baliodactylus* (Zeller, 1841) – Блрц, Учлн, Бурз, Байм, Зиан, Зилр [Трофимова, 2004б; Trofimova et al., 2016]. По сухим луговым и остепненным участкам с душицей обыкновенной (*Origanum vulgare* L.).

6545. *Merrifieldia leucodactyla* ([Denis et Schiffermüller], 1775) – Блрц, Байм [Трофимова, 2006б; Trofimova et al., 2016]. Преимущественно в лесостепи по сухим луговым и остепненным участкам с душицей обыкновенной (*Origanum vulgare* L.) и (или) тимьяном (*Thymus* spp.).

6546. *Merrifieldia tridactyla* (Linnaeus, 1758) – Блрц, Учлн, Кгрч, Байм [Трофимова, 2004б, 2006б, 2015; Trofimova et al., 2016; Anikin et al., 2017]. По сухим луговым и остепненным участкам с душицей обыкновенной (*Origanum vulgare* L.) и (или) тимьяном (*Thymus* spp.).

6547. *Porrittia galactodactyla* ([Denis et Schiffermüller], 1775) – Кгрч [Трофимова, 2004б, 2006б; Trofimova et al., 2016]. Эвритопный лугово-полевой вид (трофически связан с *Arctium* spp.).

6548. *Pterophorus pentadactyla* (Linnaeus, 1758) – по всей территории. Преимущественно на кустарниковой и высокой травянистой растительности.

6549. *Tabulaephorus marptys* (Christoph, 1872) – без местонахождений [Anikin et al., 2017]. По степям.

? *Wheeleria obsoletus* (Zeller,1841) – без местонахождений («Лесное Оренбуржье») [Eversmann, 1844]. Вид сложен в определении и наличие этого вида требует подтверждения фактическим материалом.

Надсемейство Epermenioidea

Семейство Epermeniidae – Зонтичные моли (7 видов)

Подсемейство Epermeniinae

6550. *Epermenia chaerophyllella* (Goeze, 1783) – без местонахождений [Anikin et al., 2017]. Преимущественно в широколиственных лесах по опушкам и полянам.

6551. *Epermenia farreni* (Walsingham, 1894) – без местонахождений [Трофимова, 2015; Anikin et al., 2017]. В пойменных лугах.

6552. *Epermenia illigerella* (Hübner, [1813]) – без местонахождений [Трофимова, 2006б, 2015; Anikin et al., 2006с, 2017]. Преимущественно в широколиственных лесах по опушкам и полянам.

6553. *Epermenia insecurella* (Stainton, 1849) – Блвр [Исмагилов, 2025б]. По сухим лугам и степям.

6554. *Epermenia pontificella* (Hübner, 1796) – Уфа [Исмагилов и др., 2022]. По степям.

6555. *Phaulernis dentella* (Zeller, 1839) – без местонахождений [Трофимова, 2006б, 2015; Anikin et al., 2017]. Преимущественно в старовозрастных широколиственных лесах по разрежениям и опушкам.

Подсемейство Ochromolopinae

6556. *Ochromolopis zagulajevi* Budashkin et Satchkov, 1991 – Зиан [Трофимова, 2006б]. По степям и опушкам широколиственных лесов.

Надсемейство Choreutoidea

Семейство Choreutidae – Моле-листовертки (5 вида)

6557. *Anthophila fabriciana* (Linnaeus, 1767) – Чишм [Хабибуллин, 2025б]. В лесах и посадках по сыроватым разрежениям и опушкам.

6558. *Choreutis diana* (Hübner, [1822]) – Бурз, Блрц [Данилевский, Кузнецов, 1973; Трофимова, 2003; Исмагилов и др., 2020; Исмагилов, 2025б]. В смешанных лесах.

6559. *Choreutis pariana* (Clerck, 1759) – Крмс, Чишм [Исмагилов и др., 2020; Исмагилов, 2025б]. В озелененных населенных пунктах и изреженных перелесках лесостепного типа.

6560. *Prochoreutis myllerana* (Fabricius, 1794) – Зилр [Трофимова, 2006б]. В смешанных и широколиственных лесах по сыроватым полянам.

6561. *Tebenna bjerkandrella* (Thunberg, 1784) – без местонахождений [Anikin et al., 2017]. По лугам и лесным опушкам.

Надсемейство Tortricoidea

Семейство Tortricidae – Листовертки (285 видов, наличие еще 4 не подтверждено)

Подсемейство Tortricinae

Триба Sparganothini Druce, 1912

6562. *Sparganothis pilleriana* ([Denis et Schiffermüller], 1775) – на всей территории. По сухим боровым опушкам, остепненным участкам и прилегающим пустошам.

6563. *Sparganothis praecana* (Kennel, 1900) – Блрц [Ольшванг, Малоземов, 1987]. По горным таежным лесам.

6564. *Sparganothis rubicundana* (Herrich-Schäffer, [1856]) – Блрц [Трофимова, 2006б, 2015]. По горным таежным лесам с участием черник (*Vaccinum* spp.).

Триба Archipini Pierce et Metcalfe, 1922 (=Ramapesiini Razowski, 1993)

6565. *Adoxophyes orana* (Fischer v. Röslerstamm, 1834) – Нефтекамск, Уфа, Иглн [Исмагилов и др., 2022; Исмагилов, 2025б]. В лесах неморального типа.

6566. *Aphelia paleana* (Hübner, 1793) – Уфа, Крмс, Гафр, Блвц, Куюр [Исмагилов и др., 2020; Исмагилов, Валуев, 2023б; Исмагилов, 2025б]. По лесным опушкам, высокотравным лугам, травянистым пустырям.

6567. *Aphelia viburnana* ([Denis et Schiffermüller], 1775) – на всей территории. В смешанных и лиственных лесах.

6568. *Archips betulana* (Hübner, 1787) – без местонахождений [Anikin et al., 2017]. В хвойно широколиственных и широколиственных лесах.

6569. *Archips crataegana* (Hübner, [1799]) – на всей территории. Эвритопный лесной вид.

6570. *Archips oporana* (Linnaeus, 1758) (=*piceana* (Linnaeus, 1758)) – Уфа, Уфмс [Исмагилов и др., 2021а; центральные, южные, горно-лесные р-ны]. В хвойных и смешанных лесах.

6571. *Archips podana* (Scopoli, 1763) – на всей территории. Умеренно эвритопный лесной вид.

6572. *Archips rosana* (Linnaeus, 1758) (=*testaceana* (Eversmann, 1844)) – на всей территории. Эвритопный лесолуговой вид.

6573. *Archips xylosteana* (Linnaeus, 1758) – на всей территории. В лесах неморального типа.
6574. *Argyrotaenia ljungiana* (Thunberg, 1797) – Нефтекамск, Уфа, Иглн, Кушн, Стбш [Исмагилов и др., 2021а; Исмагилов, 2025б]. Преимущественно в смешанных и изреженных лиственных лесах по опушкам и полянам.
6575. *Capua vulgana* (Frölich, 1828) – Крмс, Стмк [Исмагилов и др., 2020; Исмагилов, 2025б]. В лесах различных типов преимущественно по редколесьям и опушкам.
6576. *Choristoneura diversana* (Hübner, [1817]) – на всей территории. Эвритопный лесной вид.
6577. *Choristoneura hebenstreitella* (Müller, 1764) (=*sorbiana* (Hübner, 1799)) – центральные, южные, горно-лесные р-ны [Круликовский, 1904; Гирфанова, 1970; Исмагилов, 2025б]. В старовозрастных смешанных и широколиственных лесах.
6578. *Choristoneura murinana* (Hübner, [1799]) – без местонахождений [Anikin et al., 2006a, 2017]. В смешанных лесах с елью.
6579. *Clepsis neglectana* (Herrich-Schäffer, [1851]) – Илиш, Бурз, Кушн [Исмагилов и др., 2020; Исмагилов, 2025б]. Характерен для остепненных широколиственных и, отчасти, смешанных лесов.
6580. *Clepsis nybomi* Hackman, 1950 – Блрц [Nupponen, 2012]. В таежных лесах с густым подлеском.
6581. *Clepsis pallidana* (Fabricius, [1777]) (=*strigana* (Hübner, 1799)) – Бурз, Ермк, Абзл, Кушн, Уфа [Трофимова, 2003; Исмагилов и др., 2021а; Исмагилов, 2025б]. По остепненным участкам, сухим боровым полянам и опушкам.
6582. *Clepsis praeclarana* (Kennel, 1899) – без местонахождений [Костюк, 1980; Трофимова, 2006б, 2015; Anikin et al., 2006a, 2017]. В степях с участием караганы кустарниковой (*Caragana frutex*).
6583. *Clepsis rogana* (Guenée, 1845) – Блрц [Трофимова, 2006б; Ольшванг, Малоземов, 1987]. В хвойно-широколиственных лесах по разнотравным полянам.
6584. *Clepsis rurinana* (Linnaeus, 1758) – Уфа, Абзл, Бурз [Исмагилов, 2023, 2025б]. В лесах неморального типа по разрежениям и опушкам.
6585. *Clepsis senecionana* (Hübner, [1819]) (=*rusticana* (Hübner, 1799)) – Чишм, Учлн, Давл, Крмс, Уфа [Круликовский, 1901; Мигранов и др., 2020а; Исмагилов, Валуев, 2023б; Исмагилов, 2025б]. Преимущественно по сухим травянистым опушкам сосняков и прилегающим пустошам, реже по остепненным участкам.
6586. *Epagoge grotiana* (Fabricius, 1781) – северные, центральные, горно-лесные р-ны [Исмагилов и др., 2020; Исмагилов, 2025б]. В старовозрастных смешанных лесах.
6587. *Lozotaenia forsterana* (Fabricius, 1781) – Блрц [Трофимова, 2015]. В травянисто-кустарниковом ярусе старовозрастных смешанных лесов.

6588. *Pandemis cerasana* (Hübner, 1786) (=*ribeana* (Hübner, [1796])) – на всей территории. Эвритопный лесной вид.
6589. *Pandemis chondrillana* (Herrich-Schäffer, 1860) – Байм [Исмагилов и др., 2022]. Характерен для лесных участков лесостепной и степной зон.
6590. *Pandemis cinnamomeana* (Treitschke, 1830) – Иглн [Исмагилов, 2025б]. В смешанных и широколиственных лесах
6591. *Pandemis corylana* (Fabricius, 1794) – на всей территории. Эвритопный лесной вид.
6592. *Pandemis dumetana* (Treitschke, 1835) – Уфа [Исмагилов и др., 2022]. В старовозрастных смешанных лесах.
6593. *Pandemis heparana* ([Denis et Schiffermüller], 1775) – на всей территории. Эвритопный лесной вид.
6594. *Paramesia gnomana* (Clerck, 1759) – Ермк, Стмк, Абзл, Кушн, Октябрьский [Исмагилов и др., 2020; Исмагилов, 2025б]. В сосняках и разреженных лиственных лесах преимущественно по остепненным редколесьям и опушкам.
6595. *Periclepsis cinctana* ([Denis et Schiffermüller], 1775) – без местонахождений [Костюк, 1980 (?); Трофимова, 2006б, 2015; Anikin et al., 2006a, 2017]. По-видимому, характерен для прогреваемых опушек смешанных лесов и лесостепных перелесков.
6596. *Philedone gerningana* ([Denis et Schiffermüller], 1775) – на всей территории. По прогреваемым луговым и остепненным участкам.
6597. *Ptycholoma lecheana* (Linnaeus, 1758) – Уфа, Крмс [Исмагилов и др., 2020]. В лесах неморального типа.
6598. *Ptycholomoides aeriferana* (Herrich-Schäffer, [1851]) – Учлн, Абзл, Туйм, Уфа [Исмагилов и др., 2021б; Исмагилов, 2025б]. В лесах и посадках с лиственницей.
6599. *Syndemis musculana* (Hübner, [1799]) – Чишм, Абзл, Иглн, Крмс, Уфа [Круликовский, 1901; Исмагилов, 2025б]. В лесах и старых посадках различных типов.

Триба Cnephasiini Stainton, [1858]

6600. *Cnephasia alticolana* (Herrich-Schäffer, [1851]) – Байм [Трофимова, 2006б]. Преимущественно в сосняках по разрежениям, сухим разнотравным опушкам и полянам.
6601. *Cnephasia asseclana* ([Denis et Schiffermüller], 1775) – без местонахождений [Трофимова, 2006б, 2015; Anikin et al., 2006a, 2017]. Эвритопный лесолуговой мезофил.

? *Cnephasia sedana* (Constant, 1884) – Байм [Трофимова, 2006б] (?). В России известен из Восточного Кавказа и Алтая. Наличие в горах Южного Урала требует подтверждения.

6602. *Cnephasia stephensiana* (Doubleday, [1849]) – Байм [Трофимова, 2006б, 2015]. Эвритопный лесолуговой мезофил.

6603. *Eana argentana* (Clerck, 1759) – на всей территории. По разнотравным лесным полянам, опушкам и прилегающим лугам.
6604. *Eana incanana* (Stephens, 1852) – Уфа [Исмагилов, 2025б]. По опушкам светлых лесов, остепненных лугов и склонов.
6605. *Eana osseana* (Scopoli, 1763) – Блрц [Трофимова, 2015]. Характерен для смешанных лесов бореального типа, лесолуговой вид.
6606. *Eana penziana* (Thunberg, 1791) – Абзл [Исмагилов и др., 2022]. Характерен для старовозрастных смешанных лесов.
6607. *Exapate congelatella* (Clerck, 1759) – без местонахождений [Мигранов, Саттаров, 2006]. В широколиственных и хвойно-широколиственных лесах.
6608. *Tortricodes alternella* ([Denis et Schiffermüller], 1775) – Уфа, Стмк [Исмагилов и др., 2020; Исмагилов, 2025б]. В широколиственных лесах.
6609. *Xerocnephasia rigana* (Sodoffsky, 1829) – Байм, Учлн [Исмагилов, 2023]. По сухим боровым опушкам и остепненным участкам.

Триба Tortricini Latreille, 1803

6610. *Acleris aspersana* (Hübner, [1817]) – северные, южные, центральные, горно-лесные р-ны [Трофимова, 2006б; Исмагилов и др., 2021а; Исмагилов, 2025б]. Преимущественно по остепненным, реже по мезофитным лугам, лесным полянам и опушкам.
6611. *Acleris bergmanniana* (Linnaeus, 1758) – Чишм, Абзл [Круликовский, 1901; Исмагилов, 2025б]. По прогреваемым лесным опушкам и луговым участкам с зарослями шиповников.
6612. *Acleris comariana* (Lienig et Zeller, 1846) – без местонахождений [Трофимова, 2006б, 2015; Anikin et al., 2006a, 2017]. По лесным сфагновым болотам с участием сабельника болотного (*Comarum palustre*).
6613. *Acleris forsskaleana* (Linnaeus, 1758) – на всей территории. В лесных биотопах с участием кленов (*Acer* spp.).
6614. *Acleris hastiana* (Linnaeus, 1758) – Уфа, Иглн [Исмагилов, 2023 Исмагилов, 2025б]. Умеренно эвритопный лесной мезофил.
6615. *Acleris lacordairana* (Duponchel, [1836]) – Кгрч, Уфа [Трофимова, 2006ба; Исмагилов, 2025б]. Характерен для хвойно-широколиственных лесов.
6616. *Acleris laterana* (Fabricius, 1794) (=*latifasciana* (Haworth, 1811)) – Блрц, Крмсы [Трофимова, 2003; Исмагилов и др., 2020]. Преимущественно в малонарушенных лесах по редколесьям, опушкам и полянам.
6617. *Acleris lipsiana* ([Denis et Schiffermüller], 1775) – Блрц [Трофимова, 2006б]. В смешанных лесах.
6618. *Acleris logiana* (Clerck, 1759) (=*niveana* (Fabricius, 1787)) – Чишм, Бурз, Блрц, Слвт, Стмк, Уфа [Круликовский, 1901; Трофимова, 2003; Исмагилов, 2025б]. В лесах и посадках с участием берез (*Betula* spp.).
6619. *Acleris notana* (Donovan, 1806) – Блрц [Исмагилов и др., 2022].
6620. *Acleris roscidana* (Hübner, [1799]) – Байм [Трофимова, 2006б]. Преимущественно в старовозрастных лесах неморального типа.

6621. *Acleris rufana* ([Denis et Schiffermüller], 1775) – Блрц [Трофимова, 2006б]. По опушкам смешанных и разреженных (с элементами остепнения) широколиственных лесов.
6622. *Acleris shepherdana* (Stephens, 1852) – Ишмб [Трофимова, 2006б]. Преимущественно по остепненным, реже по мезофитным лугам, лесным полянам и опушкам.
6623. *Acleris umbrana* (Hübner, [1799]) – Крмс, Блрц [Исмагилов и др., 2020; Исмагилов, 2025б]. Преимущественно в старовозрастных широколиственных и смешанных лесах.
6624. *Aleimma loeflingiana* (Linnaeus, 1758) – Уфа, Крмс [Исмагилов и др., 2020]. В лесах и посадках с участием дуба (*Quercus robur*).
6625. *Tortrix viridana* Linnaeus, 1758 – по всей территории. В лесах и посадках с участием дуба (*Quercus robur*).

Триба Euliini Kuznetzov et Stekolnikov, 1977

6626. *Eulia ministrana* (Linnaeus, 1758) – Крмс, Кушн [Исмагилов и др., 2020; Исмагилов, 2025б]. В широколиственных и сложных смешанных лесах.
6627. *Pseudargyrotoza conwagana* (Fabricius, 1775) -. Уфа [Исмагилов и др., 2021а]. Преимущественно в широколиственных лесах и садово-парковых насаждениях.

Триба Cochylini Guenée, 1845

6628. *Aethes bilbaensis* (Rössler, 1877) – Байм [Трофимова, 2006б]. По степным склонам.
6629. *Aethes dilucidana* (Stephens, 1852) – Байм [Nupponen et al., 2001a]. По степям.
6630. *Aethes fennicana* (M. Hering, 1924) – Кгрч, Мелз [Трофимова, 2006б, 2015]. По прогреваемым разнотравным опушкам смешанных и широколиственных лесов.
6631. *Aethes flagellana* (Duponchel, [1836]) – Зиан, Учлн, Кушн [Nupponen et al., 2001a; Исмагилов, 2025б]. По опушкам смешанных и остепненных широколиственных лесов.
6632. *Aethes francillana* (Fabricius, 1794) – Учлн, Хайб [Nupponen et al., 2001a]. По остепненным участкам.
6633. *Aethes hartmanniana* (Clerck, 1759) – Кушн [Исмагилов и др., 2022]. По прогреваемым лугам.
6634. *Aethes kindermanniana* (Treitschke, 1830) – Зиан [Nupponen et al., 2001a]. По сухим опушкам песчаных сосняков, отчасти, по остепненным участкам с доминированием полыни полевой.
6635. *Aethes margaritana* (Haworth, [1811]) – Учлн, Хайб, Крмс, Кушн [Nupponen et al., 2001a; Исмагилов, 2025б]. По сухим луговым и остепненным участкам.
6636. *Aethes moribundana* (Staudinger, 1859) – Учлн [Nupponen et al., 2001a]. Преимущественно по остепненным участкам, отчасти (в лесной зоне), по сухим боровым опушкам и пустошам.

6637. *Aethes rubigana* (Treitschke, 1830) (*cnicana* auct.) – Хайб, Уфмс, Блвр [Nupponen et al., 2001a; Исмагилов и др., 2022; Исмагилов, 2025б]. По прогреваемым луговым и рудеральным участкам.
6638. *Aethes smeathmanniana* (Fabricius, 1781) – Нефтекамск, Крмс, Кушн, Стбш [Исмагилов и др., 2022; Исмагилов, 2025б]. По остепненным лугам, сухим боровым опушкам и полянам.
6639. *Aethes tesserana* ([Denis et Schiffermüller], 1775) (=*aleella* (Schulze, 1776)) – Чишм. Кушн, Уфмс, Крмс, Уфа [Круликовский, 1901; Исмагилов и др., 2022; Исмагилов, 2025б]. По лугам, разнотравным лесным опушкам и полянам.
6640. *Aethes triangulana* (Treitschke, 1835) – Байм, Учлн [Трофимова, 2006б; Nupponen et al., 2001a]. В старовозрастных смешанных и широколиственных лесах по заболоченным высокотравным полянам.
6641. *Aethes williana* (Brahm, 1791) – Уфа [Исмагилов, 2023]. По сухим луговым и остепненным участкам.
6642. *Agapeta hamana* (Linnaeus, 1758) – на всей территории. Эвритопный луговой мезоксерофил.
6643. *Agapeta zoegana* (Linnaeus, 1767) – северные, центральные, южные, юго-восточные р-ны [Круликовский, 1901; Исмагилов, 2025б]. По прогреваемым лугам.
6644. *Ceratoxanthis externana* (Eversmann, 1844) – Байм, Учлн, Мелз [Nupponen et al., 2001a]. По степям.
6645. *Cochylidia heydeniana* (Herrich-Schäffer, [1851]) – Байм [Исмагилов и др., 2022]. По сухим лесным опушкам и прилегающим пустошам преимущественно на песчаных почвах.
6646. *Cochylidia implicitana* (Wocke, 1856) – на всей территории. По прогреваемым луговым участкам.
6647. *Cochylidia moguntiana* (Rössler, 1864) – Учлн [Nupponen et al., 2001a]. По ксерофитным лугам и опушкам сосняков с обилием полыни полевой.
6648. *Cochylidia richteriana* (Fischer v. Röslerstamm, 1837) – Байм [Трофимова, 2015]. Характерен для опушек песчаных сосняков, прилегающих лугов и пустошей с доминированием полыни полевой.
6649. *Cochylimorpha alternana* (Stephens, 1834) – Кушн [Исмагилов и др., 2022]. По прогреваемым луговым участкам.
6650. *Cochylimorpha clathratana* (Staudinger, 1879) – Учлн, Ишмб [Nupponen et al., 2001a; Исмагилов, 2023]. По ксерофитным участкам.
6651. *Cochylimorpha discopunctana* (Eversmann, 1844) – Байм [Исмагилов и др., 2022]. По-видимому, степной ксерофильный вид.
6652. *Cochylimorpha hedemanniana* (Snellen, 1883) – Хайб [Nupponen et al., 2001a]. По степным склонам.
6653. *Cochylimorpha ignicolorana* Junnilainen et K. Nupponen, 2001 – Учлн [Nupponen et al., 2001a]. По степным склонам.
6654. *Cochylimorpha meridiana* (Staudinger, 1859) – Зиан, Учлн [Nupponen et al., 2001a]. По степям.

6655. *Cochylimorpha nodulana* (Möschler, 1862) – Блрц [Трофимова, 2006б]. По степным склонам.
6656. *Cochylimorpha straminea* (Haworth, [1811]) – Бурз [Трофимова, 2006б]. По остепненным участкам.
6657. *Cochylimorpha woliniana* (Schleich, 1868) – Хайб, Блвр, Крмс, Кушн, Уфа [Nupponen et al., 2001a; Исмагилов и др., 2021б; Исмагилов, 2025б]. По прогреваемым луговым и остепненным участкам.
6658. *Cochylis atricapitana* (Stephens, 1852) – Иглн [Исмагилов, 2025б]. По рудеральным участкам, сухим лугам и пустырям с участием пижмы обыкновенной (*Tanacetum vulgare*).
6659. *Cochylis dubitana* (Hübner, [1799]) – Учлн, Иглн [Nupponen et al., 2001a; Исмагилов, 2025б]. По разнотравным опушкам сосняков и прилегающим пустошам, в основном на песчаных почвах.
6660. *Cochylis epilinana* Duponchel, [1843] – Чишм, Дувн, Шарн, Татш, Туйм [Коровкина, 1946]. Характерен для сухих боровых опушек и остепненных участков с участием льна (*Linum* spp.).
6661. *Cochylis flaviciliana* (Westwood, 1854) – Блвщ [Исмагилов и др., 2021б]. По сухим боровым опушкам, прилегающим пустошам и остепненным участкам.
6662. *Cochylis hybridella* (Hübner, [1813]) – Учлн, Ишмб, Иглн, Нурм, Уфмс [Nupponen et al., 2001a; Исмагилов и др., 2021а; Исмагилов, 2025б]. По сухим боровым опушкам, прилегающим пустошам и остепненным участкам.
6663. *Cochylis nana* (Haworth, [1811]) – Блрц, Уфа [Nupponen et al., 2001a; Исмагилов, 2023]. В лесах и посадках различных типов по опушкам и полянам.
6664. *Cochylis pallidana* Zeller, 1847 – северные, центральные, южные р-ны [Исмагилов, 2025б]. По опушкам смешанных и остепненных широколиственных лесов.
6665. *Cochylis posterana* Zeller, 1847 – центральные, южные, юго-восточные р-ны [Nupponen et al., 2001a; Исмагилов, 2025б]. По прогреваемым луговым участкам.
6666. *Eugnosta hydrargyrana* (Eversmann, 1842) – без местонахождений [Трофимова, 2015; Anikin et al., 2017]. По степным участкам.
6667. *Eugnosta lathoniana* (Hübner, [1800]) – центральные, южные, юго-восточные р-ны [Nupponen et al., 2001a; Исмагилов, 2025б]. По степным участкам.
6668. *Eugnosta magnificana* (Rebel, 1914) (=*margaritana* (Hübner, [1813])) – Альш, Байм, Учлн [Круликовский, 1904; Nupponen et al., 2001a]. По сухим остепненным участкам.
6669. *Eupoecilia ambiguella* (Hübner, 1796) – без местонахождений [Положенцев, 1949, 1977а; Мигранов, Саттаров, 2006]. Характерен для прогреваемых лесных опушек.
6670. *Eupoecilia angustana* (Hübner, [1799]*)* – Учлн, Иглн, Кушн, Уфмс, Уфа [Nupponen et al., 2001a; Исмагилов, 2025б]. По остепненным лугам, сухим боровым опушкам и прилегающим пустошам.

6671. *Eupoecilia citrinana* Razowski, 1960 – Байм [Паженков и др., 2005]. По степям.
6672. *Eupoecilia sanguisorbana* (Herrich-Schäffer, [1856]) – Учлн, Абзл, Блвщ, Ишмб, Уфмс [Nupponen et al., 2001a; Исмагилов, 2025б]. По лугам с участием кровохлебки лекарственной (*Sanguisorba officinalis*).
6673. *Falseuncaria degreyana* (McLachlan, 1869) – Байм, Зиан, Учлн [Nupponen et al., 2001a]. По остепненным участкам и прилегающим пустошам.
6674. *Falseuncaria ruficiliana* (Haworth, [1811]) – без местонахождений [Трофимова, 2006б, 2015; Anikin et al., 2006a, 2017]. По прогреваемым луговым участкам.
6675. *Fulvoclysia nerminae* Koçak, 1982 – Крмс, Абзл [Исмагилов и др., 2021б; Исмагилов, 2025б]. По опушкам старовозрастных лесов неморального типа.
6676. *Gynnidomorpha alismana* (Ragonot, 1883) – Байм [Трофимова, 2006б, 2015]. По берегам водоемов и болотам с участием частухи подорожниковой (*Alisma plantago-aquatica*).
6677. *Gynnidomorpha permixtana* ([Denis et Schiffermüller], 1775) – Блрц [Трофимова, 2006б, 2015]. По прогреваемым лугам.
6678. *Phalonidia contractana* (Zeller, 1847) – на всей территории. По прогреваемым лугам и прилегающим сегетальным пустырям.
6679. *Phalonidia latifasciana* (Razowski, 1970) – Учлн [Nupponen et al., 2001a]. По степным склонам.
6680. *Phalonidia manniana* (Fischer v. Röslerstamm, 1839) – Уфа [Исмагилов, 2023]. В смешанных и широколиственных лесах по сыроватым и заболоченным опушкам и полянам.
6681. *Phtheochroa inopiana* (Haworth, [1811]) – Белб, Блвр, Уфмс, Шарн, Уфа [Круликовский, 1910 Исмагилов, 2025б]. По прогреваемым лугам и прилегающим пустырям.
6682. *Phtheochroa pulvillana* Herrich-Schäffer, [1851] – Уфа, Аург, Крмс, Кушн [Исмагилов и др., 2021б; Исмагилов, 2025б]. Характерен для остепненных участков.
6683. *Phtheochroa sodaliana* (Haworth, [1811]) – Стмк [Исмагилов и др., 2021а]. По остепненным местам с участием жостеров (*Rhamnus* spp.).
6684. *Phtheochroa vulneratana* (Zetterstedt, 1839) – Блрц [Nupponen et al., 2001a]. В горных лесах выше 1300 м.

Подсемейство Olethreutinae

Триба Endotheniini Diakonoff, 1973

6685. *Endothenia ericetana* (Humphreys et Westwood, 1845) (=*trifoliana* Herrich-Schäffer, 1851) – Кушн [Исмагилов и др., 2021а]. По сухим лесным опушкам, остепненным участкам и прилегающим пустошам.

? *Endothenia gentianaeana* (Hübner, [1799]) – Байм [Трофимова, 2006б], но в дальнейшем для РБ не упоминался. Наличие в РБ требует подтверждения. Долгое время он смешивался или путался с видом-двойником *E. oblongana*.

6686. *Endothenia marginana* (Haworth, [1811]) – без местонахождений [Трофимова, 2006б, 2015; Anikin et al., 2006a, 2017]. Умеренно эвритопный луговой мезоксерофил.
6687. *Endothenia nigricostana* (Haworth, [1811]) – Кушн, Уфа [Исмагилов и др., 2021а; Исмагилов, 2025б]. В старовозрастных лесах неморального типа по сырым разнотравным опушкам и полянам.
6688. *Endothenia quadrimaculana* (Haworth, [1811]) (=*antiquana* (Hübner, 1822)) – на всей территории. Эвритопный лугово-полевой вид.

Триба Bactrini Falkovitsh, 1962

6689. *Bactra furfurana* (Haworth, [1811]) – Учлн, Бурз, Уфа [Трофимова, 2006б; Исмагилов и др., 2022; Исмагилов, 2025б]. По травяным болотам и берегам слабопроточных водоемов.

Триба Olethreutini Walshingham, 1895

6690. *Apotomis betuletana* (Haworth, [1811]) – Туйм [Исмагилов и др., 2020]. В смешанных, мелколиственных лесах и посадках с берёзой.
6691. *Apotomis capreana* (Hübner, [1817]) – Крмс [Исмагилов и др., 2020]. Преимущественно в старовозрастных лесах.
6692. *Apotomis inundana* ([Denis et Schiffermüller], 1775) – Белб [Круликовский, 1910]. Характерен для смешанных лесов.
6693. *Apotomis lineana* ([Denis & Schiffermüller], 1775) – Уфа [Исмагилов, 2025б]. По влажным и заболоченным лесам, берегам водоемов с участием ив (*Salix* spp.).
6694. *Apotomis semifasciana* (Haworth, [1811]) – Кушн [Исмагилов и др., 2022]. Характерен для смешанных лесов.
6695. *Apotomis sororculana* (Zetterstedt, 1839) – Бурз, Крмс, Уфа [Трофимова, 2003; Исмагилов, 2023; Саттаров и др., 2024]. Преимущественно в смешанных лесах.
6696. *Apotomis turbidana* Hübner, [1825] – Давл, Учлн, Уфа [Исмагилов и др., 2020; Саттаров и др., 2024; Исмагилов, 2025б]. Эвритопный лесной вид.
6697. *Capricornia boisduvaliana* (Duponchel, [1836]) – Блрц [Трофимова, 2006б, 2015]. Характерен для прогреваемых опушек и полян смешанных лесов.
6698. *Celypha capreolana* (Herrich-Schäffer, [1851]) – без местонахождений [Трофимова, 2006б, 2015; Anikin et al., 2006a, 2017]. По сухим лугам.
6699. *Celypha cespitana* (Hübner, [1817]) – Крмс, Кгрч, Стбш, Уфа [Исмагилов и др., 2022; Исмагилов, 2025б]. Преимущественно по сухим боровым полянам и опушкам, отчасти, по остепненным участкам.
6700. *Celypha flavipalpana* (Herrich-Schäffer, [1851]) – Уфа, Абзл, Гафр, Иглн [Исмагилов и др., 2021а; Исмагилов, 2025б]. По сухим боровым полянам, прилегающим пустошам и остепненным участкам.
6701. *Celypha rosaceana* (Schläger, 1847) – Байм, Крмс, Кушн, Уфа [Исмагилов и др., 2020; Исмагилов, 2025б]. По прогреваемым травянистым (преимущественно рудеральным) участкам.

6702. *Celypha rufana* (Scopoli, 1763) – на всей территории. Преимущественно по сухим опушкам сосняков и прилегающим пустошам на песчаных почвах, отчасти, по остепненным участкам.
6703. *Celypha striana* ([Denis et Schiffermüller], 1775) – на всей территории. Эвритопный лугово-полевой мезоксерофил.
6704. *Cymolomia hartigiana* (Saxesen, 1840) – Уфа [Исмагилов и др., 2021а]. В смешанных лесах с участием елей (*Picea* spp.).
6705. *Eudemis porphyrana* (Hübner, [1799]) – Уфа, Ишмб [Исмагилов и др., 2021а; Исмагилов, 2025б]. Умеренно эвритопный лесной мезофил.
6706. *Eudemis profundana* ([Denis et Schiffermüller], 1775) – Крмс, Уфа [Исмагилов и др., 2020; Исмагилов, 2025б]. В лесах неморального типа.
6707. *Hedya dimidioalba* (Retzius, 1783) (*variegana* (Hübner, 1799), nom. praeoc.; =*nubiferana* (Haworth, 1811)) – Уфа, Кушн [Зей-Нечаева, 1984; Исмагилов, 2023, 2025б]. Эвритопный лесной вид.
6708. *Hedya ochroleucana* (Frölich, 1828) – Уфа, Крмс, Блвр [Исмагилов и др., 2020; Исмагилов, 2025б]. Эвритопный лесной вид.
6709. *Hedya salicella* (Linnaeus, 1758) – Уфа [Исмагилов и др., 2020]. В лесах и старых посадках различных типов.
6710. *Lobesia abscisana* (Doubleday, [1849]) – Уфа [Исмагилов, 2025б]. Характерен для сухих опушек сосняков, остепненных участков и прилегающих пустошей
6711. *Lobesia bicinctana* (Duponchel, [1844]) – Байм [Трофимова, 2006б]. По степям с участием диких луковых (Allioideae).
6712. *Metendothenia atropunctana* (Zetterstedt, 1839) – Блвщ, Кушн, Бурз, Стбш, Уфа [Исмагилов, 2023, 2025б]. В смешанных и широколиственных лесах по разнотравным опушкам и полянам.
6713. *Olethreutes arcuella* (Clerck, 1759) – на всей территории. В лесах неморального типа по редколесьям и опушкам; скопления бабочек отмечались вокруг клена остролистного.
6714. *Olethreutes spiraeana* (Kuznetsov, 1962) – Уфа [Исмагилов и др., 2022]. По остепненным участкам со спиреями.
6715. *Olethreutes subtilana* (Falkovitsh, 1959) – Нефтекамск [Исмагилов и др., 2022]. Характерен для смешанных лесов подтаежной полосы.
6716. *Orthotaenia undulana* ([Denis et Schiffermüller], 1775) (=*urticana* (Hübner, 1796)) – на всей территории. В основном в старовозрастных лесах по редколесьям, разнотравным опушкам, полянам и по прилегающим мезофитным лугам.
6717. *Phiaris metallicana* (Hübner, [1799])– Блрц [Трофимова, 2006б, 2015; Исмагилов, 2023]. В борах зеленомошниках.
6718. *Phiaris micana* ([Denis et Schiffermüller], 1775) – Блрц [Трофимова, 2006б, 2015]. В борах-зеленомошниках и по сфагновым болотам.
6719. *Phiaris obsoletana* (Zetterstedt, 1839) – Блрц [Ольшванг, Малоземов, 1987; Туркменова, 2016]. В борах зеленомошниках.

6720. *Phiaris palustrana* (Lienig et Zeller, 1846) – Блрц, Кушн, Уфа [Ольшванг, Малоземов, 1987; Туркменова, 2016; Исмагилов и др., 2022]. В борах-зеленомошниках.
6721. *Phiaris turfosana* (Herrich-Schäffer, [1851]) – без местонахождений [Трофимова, 2006б), 2015; Anikin et al., 2006a, 2017]. В лесах бореального типа по сфагновым болотам.
6722. *Piniphila bifasciana* (Haworth, [1811]) – Блрц, Уфа [Трофимова, 2006б, 2015; Исмагилов и др., 2021а]. В сосняках.
6723. *Pristerognatha fuligana* ([Denis et Schiffermüller], 1775) – Блрц [Трофимова, 2006б, 2015]. По смешанным лесам.
6724. *Rudisociaria expeditana* (Snellen, 1883) – Байм [Паженков и др., 2005]. Характерен для луговых участков.
6725. *Syricoris doubledayana* Barrett, 1872 – без местонахождений [Трофимова, 2006б (*Loxotherna*), 2015; Anikin et al., 2017]. Характерен для смешанных лесов, лесолуговой вид.
6726. *Syricoris lacunana* ([Denis et Schiffermüller], 1775) – на всей территории. Эвритопный лесолуговой мезофил.
6727. *Syricoris rivulana* (Scopoli, 1763) – на всей территории. По луговым участкам и прилегающим пустошам.

Триба Enarmoniini Diakonoff, 1953

6728. *Ancylis achatana* ([Denis et Schiffermüller], 1775) – Уфа [Зей-Нечаева, 1984; Хабибуллин, 2018а; Исмагилов и др., 2021а]. В лесах неморального типа, садах, парках.
6729. *Ancylis badiana* ([Denis et Schiffermüller], 1775) – на всей территории. Умеренно эвритопный луговой мезофил.
6730. *Ancylis comptana* (Frölich, 1828) – северные, центральные, южные, юго-восточные р-ны [Трофимова, 2006б; Исмагилов и др., 2021а; Исмагилов, 2025б]. По сухим боровым опушкам и остепненным участкам.
6731. *Ancylis geminana* (Donovan, 1806) – Уфа [Исмагилов и др., 2021б]. Умеренно эвритопный лесолуговой мезофил.
6732. *Ancylis laetana* (Fabricius, 1775) – без местонахождений [Трофимова, 2006б, 2015; Anikin et al., 2006a, 2017]. Преимущественно в старовозрастных смешанных и широколиственных лесах.
6733. *Ancylis mitterbacheriana* ([Denis et Schiffermüller], 1775) – Уфа, Крмс, Кушн [Исмагилов и др., 2020; Исмагилов, 2025б]. В лесах и посадках с участием дуба (*Quercus robur*).
6734. *Ancylis uncella* ([Denis et Schiffermüller], 1775) – Учлн [Исмагилов, 2023]. Преимущественно в смешанных лесах по сухим разнотравным опушкам.
6735. *Ancylis unguicella* (Linnaeus, 1758) – без местонахождений [Трофимова, 2006б; Anikin et al., 2006a, 2017]. Характерен для смешанных лесов с участием вересковых (Ericaceae).
6736. *Eucosmomorpha albersana* (Hübner, [1813]) – Уфа [Исмагилов и др., 2022]. В лесах и посадках различных типов. Трансевразиатский температный вид.

Триба Eucosmini Meyrick, 1909

6737. *Epiblema foenella* (Linnaeus, 1758) – на всей территории. По прогреваемым лугам и пустырям с участием полыней (*Artemisia* spp.).
6738. *Epiblema grandaevana* (Lienig et Zeller, 1846) – Зилр, Уфа [Трофимова, 2006б, 2015; Исмагилов, 2023]. Умеренно эвритопный лесолуговой мезофил.
6739. *Epiblema graphana* (Treitschke, 1835) – Уфа, Абзл [Исмагилов и др., 2022]. По сухим луговым и остепненным участкам.
6740. *Epiblema junctana* (Herrich-Schäffer, [1856]) – Бурз [Трофимова, 2003]. По сухим остепненным участкам.
6741. *Epiblema scutulana* ([Denis et Schiffermüller], 1775) – без местонахождений [Трофимова, 2006б, 2015; Anikin et al., 2006a, 2017]. Эвритопный луговой вид.
6742. *Epiblema similana* ([Denis & Schiffermüller], 1775) – Блвр [Исмагилов, 2025б]. По рудеральным участкам, опушкам лесов и кустарниковым зарослям с участием полыней (*Artemisia* spp.).
6743. *Epiblema sticticana* (Fabricius, 1794) – Уфа [Исмагилов и др., 2021а]. Эвритопный лесолуговой вид.
6744. *Epinotia abbreviana* (Fabricius, 1794) – Уфа, Абзл [Исмагилов и др., 2021а]. Преимущественно в широколиственных лесах.
6745. *Epinotia bilunana* (Haworth, [1811]) – Уфа, Бурз [Исмагилов и др., 2021а; Исмагилов, 2025б]. В лесах и посадках с участием березы (*Betula* spp.).
6746. *Epinotia brunnichana* (Linnaeus, 1767) (=*sinuana* ([Denis et Schiffermüller], 1775)) – Белб, Уфа [Круликовский, 1910; Исмагилов и др., 2021а]. Преимущественно в старовозрастных лесах.
6747. *Epinotia cinereana* (Haworth, [1811]) – Байм, Давл, Уфа [Исмагилов и др., 2022; Исмагилов, 2025б]. В лесах с участием осины (*Populus tremula*).
6748. *Epinotia cruciana* (Linnaeus, [1760]) – без местонахождений [Трофимова, 2006б, 2015; Anikin et al., 2006a, 2017]. В смешанных лесах.
6749. *Epinotia demarniana* (Fischer v. Röslerstamm, 1839) – Уфа [Исмагилов и др., 2021б]. Характерен для смешанных лесов.
6750. *Epinotia immundana* (Fischer v. Röslerstamm, 1839) – Уфа [Исмагилов и др., 2022]. В черноольшаниках подтаежной полосы.
6751. *Epinotia maculana* (Fabricius, 1775) – Уфа [Исмагилов и др., 2022]. В лесах и старых посадках с участием осины (*Populus tremula*).
6752. *Epinotia nanana* (Treitschke, 1835) – без местонахождений [Трофимова, 2006б, 2015; Anikin et al., 2006a, 2017]. В лесах и посадках с участием ели (*Picea* spp.).
6753. *Epinotia nisella* (Clerck, 1759) – Чишм, Ишмб, Иглн [Круликовский, 1901; Исмагилов, 2025б]. Эвритопный лесной мезофил.
6754. *Epinotia pygmaeana* (Hübner, [1799]) – без местонахождений [Положенцев, 1949]. В лесах с участием ели (*Picea* spp.).
6755. *Epinotia ramella* (Linnaeus, 1758) – Ермк, Стбш, Уфа [Исмагилов и др., 2020; Исмагилов, 2025б]. Преимущественно в малонарушенных лесах с березой (*Betula* spp.).

6756. *Epinotia solandriana* (Linnaeus, 1758) – Бурз, Мелз [Положенцев, 1947; Трофимова, 2003]. Преимущественно в старовозрастных лесах.
6757. *Epinotia tedella* (Clerck, 1759) – без местонахождений [Положенцев, 1949, 1977а]. В лесах с участием ели (*Picea* spp.).
6758. *Epinotia tenerana* ([Denis et Schiffermüller], 1775) – без местонахождений [Трофимова, 2006б, 2015; Anikin et al., 2006а, 2017]. Преимущественно в старовозрастных смешанных, широколиственных лесах и черноольшаниках по разрежениям, опушкам, полянам.
6759. *Epinotia tetraquetrana* (Haworth, [1811]) – Бурз, Блрц, Уфа [Положенцев, 1947; Трофимова, 2003; Исмагилов и др., 2021б]. Преимущественно в малонарушенных лесах.
6760. *Epinotia thapsiana* (Zeller, 1847) – Уфа [Исмагилов, 2025б]. Преимущественно по сухим остепненным участкам.
6761. *Epinotia trigonella* (Linnaeus, 1758) – Мелз, Нефтекамск [Трофимова, 2006б; Исмагилов, 2023]. В смешанных лесах с обилием берез (*Betula* spp.).
6762. *Eriopsela quadrana* (Hübner, [1813]) – Уфа [Исмагилов, 2023]. В смешанных и широколиственных лесах по разрежениям и опушкам.
6763. *Eucosma abacana* (Erschoff, 1877) – Учлн [Трофимова, 2006б]. По ксерофитным степям.
6764. *Eucosma aspidiscana* (Hübner, [1817]) – Давл [Исмагилов, Валуев, 2023б]. По сухим разнотравным опушкам смешанных лесов и прилегающим пустошам.
6765. *Eucosma balatonana* (Osthelder, 1937) – без местонахождений [Трофимова, 2006б, 2015; Anikin et al., 2017]. По опушкам смешанных и широколиственных лесов.
6766. *Eucosma campoliliana* ([Denis et Schiffermüller], 1775) – Блрц [Исмагилов, 2023]. По ксерофитным сильно остепненным и степным участкам.
6767. *Eucosma cana* (Haworth, [1811]) – Уфа, Блрц, Абзл, Кушн [Исмагилов и др., 2022; Исмагилов, 2025б]. По прогреваемым лугам и пустырям.
6768. *Eucosma conterminana* (Guenée, 1845) – на всей территории. По прогреваемым луговым и остепненным участкам, отчасти по прилегающим пустырям.
6769. *Eucosma flavispecula* Kuznetsov, 1964 – Блрц [Трофимова, 2006б, 2015]. По прогреваемым лугам и сегетальным пустырям.
6770. *Eucosma hohenwartiana* ([Denis et Schiffermüller], 1775) – Блвщ, Блвр, Туйм [Исмагилов, 2025б]. По прогреваемым лугам.
6771. *Eucosma metzneriana* (Treitschke, 1830) – Байм, Блвр, Кушн, Уфмс, Уфа [Трофимова, 2015; Исмагилов и др., 2020; Исмагилов, 2025б]. По прогреваемым луговым участкам и прилегающим пустошам с участием полыней (*Artemisia* spp.).

? *Eucosma obumbratana* (Lienig et Zeller, 1846) – без местонахождений [Трофимова, 2006б]. В дальнейшем для РБ не приводился. Наличие вида требует подтверждения. По прогреваемым луговым и остепненным участкам.

6772. *Eucosma paetulana* (Kennel, 1900) – без местонахождений [Трофимова, 2006б; Anikin et al., 2006a, 2017]. По открытым ксерофитным участкам.
6773. *Eucosma pupillana* (Clerck, 1759) – на всей территории. По сухим луговым и остепненным участкам.
6774. *Eucosma rubescana* (Constant, 1895) (=*catoptrana* (Rebel, 1903)) – Байм [Трофимова, 2006б]. По каменистым степям.
6775. *Eucosma scorzonerana* (Benander, 1942) – без местонахождений [Трофимова, 2006б, 2015; Anikin et al., 2017]. По лугам различных типов.
6776. *Eucosma tundrana* (Kennel, 1900) – Кгрч, Кушн, Шарн [Исмагилов и др., 2021a; Исмагилов, 2025б]. По сухим луговым и остепненным участкам.
6777. *Gravitarmata margarotana* (Heinemann, 1863) – без местонахождений [Положенцев, 1949, 1977a; Положенцев, Кучеров, 1949б]. Характерен для старовозрастных неморальных сосняков.
6778. *Gypsonoma dealbana* (Frölich, 1828) – Уфа [Исмагилов и др., 2021a]. Умеренно эвритопный лесной мезофил.
6779. *Gypsonoma minutana* (Hübner, [1799]) – Уфа [Исмагилов, 2023]. Характерен для лесов и посадок с участием тополей (*Populus* spp.).
6780. *Gypsonoma sociana* (Haworth, [1811]) – Крмс, Уфа [Исмагилов и др., 2021a]. Умеренно эвритопный лесной мезофил.
6781. *Lepteucosma huebneriana* (Koçak, 1980) – Кгрч, Кушн, Стбш, Уфмс [Трофимова, 2006б; Исмагилов и др., 2022; Исмагилов, 2025б]. Характерен для смешанных лесов.
6782. *Notocelia cynosbatella* (Linnaeus, 1758) – центральные, горно-лесные, юго-восточные р-ны [Исмагилов и др., 2020; Исмагилов, 2025б]. Преимущественно в лесах неморального типа.
6783. *Notocelia incarnatana* (Hübner, [1800]) – без местонахождений [Трофимова, 2006б, 2015; Anikin et al., 2006a, 2017]. В смешанных и широколиственных лесах с элементами остепнения.
6784. *Notocelia roborana* ([Denis et Schiffermüller], 1775) (=*aquana* (Hübner, [1799])) – Уфа, Нефтекамск, Блрц, Крмс [Круликовский, 1910; Трофимова, 2006б; Исмагилов и др., 2022; Исмагилов, 2025б]. В старовозрастных лесах неморального типа.
6785. *Notocelia uddmanniana* (Linnaeus, 1758) – центральные, южные, юго-восточные р-ны [Круликовский, 1901, 1910; Исмагилов, 2025б]. В смешанных и широколиственных лесах с элементами остепнения.
6786. *Pelochrista arabescana* (Eversmann, 1844) – Байм, Бурз, Мелз [Исмагилов и др., 2020; Исмагилов, 2025б]. По сухим остепненным участкам.
6787. *Pelochrista decolorana* (Freyer, [1840]) – Байм [Трофимова, 2006б, 2015]. По каменистым степям.
6788. *Pelochrista huebneriana* (Lienig et Zeller, 1846) – Кгрч [Трофимова, 2006б]. Характерен для смешанных лесов.
6789. *Pelochrista infidana* (Hübner, [1824]) – Байм [Исмагилов и др., 2022]. Преимущественно по сухим опушкам сосняков и прилегающим пустошам,

отчасти, по остепненным участкам на песчаных почвах с доминированием полыни полевой.

6790. *Pelochrista mollitana* (Zeller, 1847) – Уфа [Исмагилов и др., 2022]. По-видимому, по сухим опушкам сосняков и остепненным участкам.

6791. *Pseudococcyx posticana* (Zetterstedt, 1839) – Уфа, Нефтекамск, Кушн [Исмагилов и др., 2021б; Исмагилов, 2025б]. В сосняках.

6792. *Pseudococcyx turionella* (Linnaeus, 1758) (=*turionana* (Hübner, [1813])) – Клтс, Бурз [Положенцев, 1946, 1947]. В сосняках.

6793. *Retinia perangustana* (Snellen, 1883) – Зиан [Трофимова, 2006б]. В посадках и лесах с участием лиственницы (*Larix sibirica*).

6794. *Retinia resinella* (Linnaeus, 1758) – Клтс, Бурз [Положенцев, 1946, 1947; Латышев, 1963]. В сосновых лесах.

6795. *Rhopobota myrtillana* (Humphreys et Westwood, 1845) – Блрц [Трофимова, 2006б]. В смешанных лесах с вересковыми ягодными.

6796. *Rhopobota naevana* (Hübner, [1817]) – Уфа [Исмагилов и др., 2021а]. Преимущественно по сфагновым болотам с участием вересковых ягодных.

6797. *Rhopobota stagnana* ([Denis et Schiffermüller], 1775) – Кушн, Уфа [Исмагилов и др., 2022; Исмагилов, 2025б]. По сухим луговым и остепненным участкам.

6798. *Rhyacionia buoliana* ([Denis et Schiffermüller], 1775) – Стмк [Исмагилов и др., 2020]. В сосняках.

6799. *Rhyacionia duplana* (Hübner, [1813]) – Клтс [Положенцев, 1946]. В старовозрастных сосняках.

6800. *Rhyacionia pinivorana* (Lienig et Zeller, 1846) – без местонахождений [Положенцев, 1949]. В сосняках.

6801. *Spilonota laricana* (Heinemann, 1863) – Кгрч, Абзл, Уфа [Трофимова, 2006б; Исмагилов, 2023, 2025б]. В посадках лиственницы (*Larix sibirica*).

6802. *Spilonota ocellana* ([Denis et Schiffermüller], 1775) – Уфа, Чекм, Крмс [Исмагилов и др., 2020; Исмагилов, 2025б]. Эвритопный лесной мезофил.

6803. *Thiodia citrana* (Hübner, [1799]) – Абзл, Бурз, Кушн, Уфа [Исмагилов, 2025б]. По прогреваемым луговым и остепненным участкам.

6804. *Thiodia torridana* (Lederer, 1859) – Уфа [Исмагилов, 2025б]. По остепнённым участкам с участием астры ромашковой (*Aster amellus* L.).

6805. *Zeiraphera griseana* (Hübner, [1799]) (=*diniana* (Guenée, 1845)) – Уфа [Исмагилов и др., 2022]. В хвойных и смешанных лесах.

6806. *Zeiraphera isertana* (Fabricius, 1794) (=*corticana* (Hübner, 1813)) – Чишм, Крмс, Куюр [Круликовский, 1901; Исмагилов и др., 2022; Исмагилов, 2025б]. В лесах и посадках с участием дуба (*Quercus robur*).

6807. *Zeiraphera rufimitrana* (Herrich-Schäffer, [1851]) – Уфа [Исмагилов и др., 2022]. В хвойных и смешанных лесах.

Триба Grapholitini Guenée, 1845

6808. *Cydia amplana* (Hübner, [1800]) – Стбш [Исмагилов, 2025б]. В остепненных широколиственных лесах с участием дуба (*Quercus robur*).

6809. *Cydia coniferana* (Saxesen, 1840) – без местонахождений [Положенцев, 1949]. В сосняках.
6810. *Cydia duplicana* (Zetterstedt, 1839) – без местонахождений [Положенцев, 1949]. В старовозрастных хвойных и смешанных лесах.
6811. *Cydia inquinatana* (Hübner, [1799]) – Уфа [Исмагилов и др., 2021б]. В смешанных, широколиственных лесах и старых посадках с участием клёнов (*Acer* spp.).
6812. *Cydia medicaginis* (Kuznetsov, 1962) – Байм [Трофимова, 2015]. По прогреваемым луговым и остепненным участкам.
6813. *Cydia nigricana* (Fabricius, 1794*)* – на всей территории. Умеренно эвритопный луговой мезоксерофил.
6814. *Cydia oxytropidis* (Martini, 1912) – Стмк [Исмагилов и др., 2021а]. Характерен для остепненных участков с зарослями астрагала нутового.
6815. *Cydia pactolana* (Zeller, 1840) – Клтс [Положенцев, 1946]. В хвойных и смешанных лесах с участием елей (*Picea* sp.).
6816. *Cydia pomonella* (Linnaeus, 1758) – на всей территории. Преимущественно в агроценозах с участием яблонь (*Malus* spp.).
6817. *Cydia servillana* (Duponchel, [1836]) – Бурз [Положенцев, 1947]. Лесной вид.
6818. *Cydia splendana* (Hübner, [1799]) – Уфа, Стмк, Крмс [Исмагилов и др., 2020; Исмагилов, 2025б]. Преимущественно в широколиственных лесах и посадках с участием дуба (*Quercus robur*).
6819. *Cydia strobilella* (Linnaeus, 1758) – Уфа [Исмагилов, 2025б]. В старовозрастных хвойных и смешанных лесах.
6820. *Cydia succedana* ([Denis et Schiffermüller], 1775) – без местонахождений [Трофимова, 2006б, 2015; Anikin et al., 2006a, 2017]. По лесным опушкам и лугам с участием ракитника (*Chamaecytisus ruthenicus*).
6821. *Cydia zebeana* (Ratzeburg, 1840) – Бурз [Положенцев, 1947]. В лесах с участием лиственницы (*Larix sibirica*).
6822. *Dichrorampha acuminatana* (Lienig et Zeller, 1846) – Бурз, Блвщ, Крмс, Уфа [Трофимова, 2006б, 2015; Исмагилов, 2023]. По прогреваемым луговым участкам.
6823. *Dichrorampha aeratana* (Pierce et Metcalfe, 1915) – Слвт [Трофимова, 2006б, 2015; Anikin et al., 2006a, 2017]. По прогреваемым лугам.
6824. *Dichrorampha alaicana* Rebel, 1910 – Учлн [Nupponen, 2012]. По каменистым степным склонам.
6825. *Dichrorampha alpestrana* ([Zeller], 1843) (=*montanana* (Duponchel, [1843])) – Блрц [Трофимова, 2006б, 2015]. В тундрово-луговом поясе гор.
6826. *Dichrorampha cacaleana* (Herrich-Schäffer, [1851]) – Блрц [Трофимова, 2015]. По горным лугам.
6827. *Dichrorampha consortana* Stephens, 1852 – Блрц [Трофимова, 2006б]. По прогреваемым луговым участкам.
6828. *Dichrorampha eximia* (Danilevsky, 1948) – Байм [Трофимова, 2006б, 2015]. По ксерофитным степям с выходом известняков.

6829. *Dichrorampha incursana* (Herrich-Schäffer, [1851]) – Мелз [Трофимова, 2003, 2006б].
6830. *Dichrorampha insperata* (Danilevsky, 1960) – без местонахождений [Трофимова, 2006б, 2015; Anikin et al., 2006a, 2017]. Характерен для прогреваемых опушек смешанных лесов.
6831. *Dichrorampha klimeschiana* Toll, 1955 – Бурз [Данилевский, Кузнецов, 1968]. Характерен для сухих луговых и остепненных участков.
6832. *Dichrorampha petiverella* (Linnaeus, 1758) – Альш, Белб, Бурз, Крмс, Уфа [Круликовский, 1904, 1910; Данилевский, Кузнецов, 1968; Исмагилов, 2025б]. Умеренно эвритопный луговой мезоксерофил.
6833. *Dichrorampha plumbagana* (Treitschke, 1830) – Белб [Круликовский, 1910]. По прогреваемым луговым участкам.
6834. *Dichrorampha plumbana* (Scopoli, 1763) – Белб, Бурз [Круликовский, 1910; Данилевский, Кузнецов, 1968]. Преимущественно по сухим опушкам сосняков, отчасти, по остепненным участкам.
6835. *Dichrorampha sequana* (Hübner, [1799]) – Бурз, Мелз, Крмс, Уфа [Данилевский, Кузнецов, 1968; Трофимова, 2006б; Исмагилов и др., 2022; Исмагилов, 2025б]. По прогреваемым луговым участкам.
6836. *Dichrorampha simpliciana* (Haworth, [1811]) – Блвщ [Исмагилов и др., 2021б]. Эвритопный лугово-полевой ксеромезофил.
6837. *Dichrorampha vancouverana* McDunnough, 1935 (=*gueneeana* Obraztsov, 1953) – Бурз [Данилевский, Кузнецов, 1968]. По прогреваемым луговым и остепненным участкам.
6838. *Grapholita caecana* (Schläger, 1847) – Крмс, Ишмб, Кушн [Исмагилов, 2023, 2025б]. Преимущественно по остепненным участкам.
6839. *Grapholita compositella* (Fabricius, 1775) – северные, центральные, южные, горно-лесные, юго-восточные р-ны [Данилевский, Кузнецов, 1968; Исмагилов и др., 2021а; Исмагилов, 2025б]. Умеренно эвритопный луговой мезофил.
6840. *Grapholita fissana* (Frölich, 1828) – Уфмс [Исмагилов и др., 2021б]. Характерен для малонарушенных лесов неморального типа.
6841. *Grapholita funebrana* (Treitschke, 1835) – Крмс, Чишм, Уфа [Исмагилов, 2023, 2025б]. Характерен для садово-парковых ценозов.
6842. *Grapholita gemmiferana* (Treitschke, 1835) – без местонахождений [Трофимова, 2006б, 2015; Anikin et al., 2006a, 2017]. По опушкам смешанных лесов.
6843. *Grapholita jungiella* (Clerck, 1759) – без местонахождений [Трофимова, 2006б, 2015; Anikin et al., 2006a, 2017]. По разнотравным лесным полянам, опушкам, прилегающим лугам.

? *Grapholita lunulana* ([Denis et Schiffermüller], 1775) (=*dorsana* (Fabricius 1775)) – Белб, Уфмс [Рушковский, 1914] (?). Указывался как вредитель гороха. Но указания «*Grapholita dorsana*» как вредителя гороха в средней полосе Европейской России чаще считаются относящимися к *Cydia nigricana*.

Нахождение в РБ не должно вызывать сомнений, но требуется фактическое подтверждение.

6844. *Grapholita orobana* (Treitschke, 1830) – Бурз [Данилевский, Кузнецов, 1968]. По прогреваемым луговым и остепненным участкам.

6845. *Lathronympha strigana* (Fabricius, 1775) (=*hypericana* (Hübner, [1799])) – Белб, Уфа [Круликовский, 1910; Исмагилов, 2025б]. Умеренно эвритопный луговой мезофил.

6846. *Pammene aurana* (Fabricius, 1775) – Блрц [Трофимова, 2006б]. В лесах неморального типа по высокотравным опушкам и полянам.

6847. *Pammene insulana* (Guenée, 1845) – Белб [Данилевский, Кузнецов, 1968]. В старовозрастных мелколиственных и широколиственных лесах.

6848. *Pammene obscurana* (Stephens, 1834) – Уфа [Исмагилов и др., 2021б]. В смешанных и широколиственных лесах.

Серия Cossiformes (Н.Н. Исмагилов)

Надсемейство Cossoidea

Семейство Brachodidae – Дерновинные моли (2 вида, наличие еще 1 не подтверждено)

6849. *Brachodes appendiculata* (Esper, [1783]) – без местонахождений [Трофимова, 2015; Anikin et al., 2017]. По ковыльным степям.

? *Brachodes fulgurita* (Fischer von Waldheim, 1832) (=*pusilla* (Eversmann, 1844)) [Eversmann, 1844] – приводился из «Ik Baschkiriae». Наличие современных популяций в РБ требует подтверждения фактическим материалом. По сухим степям.

6850. *Brachodes pumila* (Ochsenheimer, 1808) – южные, горно-лесные, юго-восточные р-ны [Шовкун, Трофимова, 2020; Исмагилов, 2025б]. По лугам, поймам степных рек, остепненным склонам хребтов.

Семейство Cossidae – Древоточцы (8 видов)

Подсемейство Cossinae

6851. *Acossus terebra* ([Denis et Schiffermüller], 1775) – Хайб, Ермк, Шарн, Абзл, Кушн, Уфа [Ахола и др., 1997; Исмагилов и др., 2020; Исмагилов, 2025б]. В старых осинниках.

6852. *Cossus cossus* (Linnaeus, 1758) – на всей территории. Эвритопный лесной вид.

6853. *Dyspessa salicicola* (Eversmann, 1848) – Хайб [Yakovlev et al., 2022]. По степям.

6854. *Dyspessa ululа* (Borkhausen, 1790) – Стмк [Исмагилов и др., 2021б]. По сухим степям.

6855. *Paracossulus thrips* (Hübner, [1813]) – Чишм, Хайб, Мелз, Чекм, Блвр [Круликовский, 1897; Исмагилов и др., 2021б; Мигранов, 2023в; Исмагилов, 2025б]. По степям.

6856. *Parahypopta caestrum* (Hübner, [1808]) – без местонахождений [Трофимова, 2015; Anikin et al., 2017]. По сухим и песчаным местам с участием спаржи (*Asparagus* spp).

Подсемейство Zeuzerinae

6857. *Phragmataecia castaneae* (Hübner, 1790) (=*arundinis* (Hübner, [1808])) – Кушн [Исмагилов и др., 2021а]. По берегам чистых водоемов с участием тростника (*Phragmites australis*).

6858. *Zeuzera pyrina* (Linnaeus, [1760]) – Уфа [Исмагилов и др., 2022]. По остепненным лесам и агроценозам с участием плодовых деревьев.

Семейство Sesiidae – Стеклянницы (19 видов, наличие еще 3 не подтверждено)

Подсемейство Tinthiinae

6859. *Microsphecia brosiformis* (Hübner, [1813]) – Зиан [Князев, Горбунов, 2023]. По ксерофитным участкам с участием вьюнков (*Convolvulus* sp.).

6860. *Pennisetia hylaeiformis* (Laspeyres, 1801) – Бурз, Зиан [Бакалова, 2016; Исмагилов и др., 2022]. По редколесьям, лесным опушкам, а также в агроценозах с участием малин (*Rubu*s spp.)

Подсемейство Sesiinae

6861. *Chamaesphecia astatiformis* (Herrich-Schäffer, [1846]) – без местонахождений [Anikin et al., 2000a, 2017; Мигранов, 2016]. Характерен для степи и лесостепи.

? *Chamaesphecia bibioniformis* (Esper, 1800) – Крмс [Исмагилов и др., 2020] (?). Определялся по фотографии наблюдения исходя из внешних паттернов. Однако для более надежного определения требуется исследование генитальных признаков. По степям.

6862. *Chamaesphecia chalciformis* (Esper, [1804]) (=*prosopiformis* Ochsenheimer, 1808) – Зилр [Трофимова, 2006б]. По каменистым степям.

6863. *Chamaesphecia empiformis* (Esper, [1783]) – Зиан [Grosser, 1983]. По остепненным участкам с участием молочая прутьевидного (*Euphorbia virgata*).

6864. *Chamaesphecia leucopsiformis* (Esper, 1800) – без местонахождений [Anikin et al., 2000a, 2017]. Характерен для степи и лесостепи.

6865. *Eusphecia melanocephala* (Dalman, 1816) – без местонахождений [Положенцев, 1977а]. В старых осинниках.

6866. *Paranthrene tabaniformis* (Rottemburg, 1775) (*asiliformis* auct.) – Уфа, Хайб, Блрц [Мигунова, 1942; Ахола и др., 1997]. В осинниках.

6867. *Pyropteron cirgisa* (Bartel, 1912) – без местонахождений [Anikin et al., 2000a, 2017]. По степям.

? *Pyropteron muscaeformis* (Esper, [1783]) (=*philanthiformis* (Laspeyres, 1801)) – без местонахождений [Eversmann, 1841, 1844]. В связи со сложностью определения и давностью указания требуется подтверждение. По песчаным местам.

6868. *Sesia apiformis* (Clerck, 1759) – на всей территории. Эвритопный лесной вид; бабочки обычно держатся на стволах тополей (*Populus* spp.).
6869. *Synanthedon culiciformis* (Linnaeus, 1758) – без местонахождений [Положенцев, 1977а; Anikin et al., 2000a, 2017; Мигранов, Саттаров, 2006]. В лесах с участием берёз и ольх (*Betula* spp., *Alnus* spp.).
6870. *Synanthedon formicaeformis* (Esper, [1783]) – без местонахождений [Eversmann, 1841, 1844; Положенцев, 1977а; Anikin et al., 2000a, 2017]. В различных биотопах с ивами (*Salix* spp.).
6871. *Synanthedon martjanovi* Sheljuzhko, 1918 – Нефтекамск (?), Уфа [Хабибуллин, 2018а; Исмагилов, 2025б] Указание в первой работе, в связи со сложностью определения, сомнительно и требует проверки. Кормовым растением, вероятно, является осина (*Populus tremula*).
6872. *Synanthedon mesiaeformis* (Herrich-Schäffer, [1846]) – без местонахождений [Anikin et al., 2017]. В лесах и прибрежных перелесках с участием ольхи черной (*Alnus glutinosa*).
6873. *Synanthedon myopaeformis* (Borkhausen, 1789) – Уфа [Исмагилов и др., 2022]. В лесах и агроценозах с участием яблонь (*Malus* spp.).
6874. *Synanthedon scoliaeformis* (Borkhausen, 1789) – Альш, Блрц, Ермк, Учлн [Круликовский, 1904; Ахола и др., 1997; Исмагилов и др., 2021б]. В лесах с участием старых берёз (*Betula* spp.).
6875. *Synanthedon soffneri* Špatenka, 1983 – Блрц [Ахола и др., 1997].
6876. *Synanthedon spheciformis* ([Denis et Schiffermüller], 1775) – без местонахождений [Eversmann, 1841, 1844; Хабибуллин, 2016]. По лесам различных типов, где присутствует молодая поросль ольхи (*Alnus* spp.).
6877. *Synanthedon tipuliformis* (Clerck, 1759) – Крмс, Уфмс [Исмагилов и др., 2021а; Исмагилов, 2025б]. По смешанным лесам, посадкам и садовым участкам, с участием смородины чёрной (*Ribes nigrum*)
? *Synanthedon vespiformis* (Linnaeus, [1760]) (=*cynipiformis* (Esper, 1783)) – без местонахождений [Eversmann, 1841, 1844]. В связи со сложностью определения и давностью указания требуется подтверждение. В старых дубравах.

Надсемейство Zygaenoidea

Семейство Limacodidae – Слизневидки (1 вид)

6878. *Apoda limacodes* (Hufnagel, 1766) – на всей территории. В лесах и посадках с участием дуба (*Quercus robur*).

Семейство Zygaenidae – Пестрянки (20 видов)

Подсемейство Procridinae

6879. *Adscita albanica* (Naufock, 1926) – без местонахождений [Anikin et al., 2017]. По остепненным склонам и опушкам сосновых и смешанных лесов.
6880. *Adscita statices* (Linnaeus, 1758) – Чишм, Бурз, Хайб [Круликовский, 1897; Соколов, 1897; Бурзянцев и др., 1994]. По разнотравным лесным опушкам, полянам и мезофитным лугам.

6881. *Jordanita chloros* (Hübner, [1813]) (=*sepium* (Boisduval, 1834)) – Зиан, Стмк, Крмс, Слвт [Трофимова, 2006б; Исмагилов и др., 2021а; Исмагилов, 2025б]. По остепненным склонам и прогреваемым опушкам смешанных лесов.
6882. *Jordanita globulariae* (Hübner, 1793) – Давл [Исмагилов и др., 2020]. По прогреваемым разнотравным опушкам смешанных лесов.
6883. *Jordanita subsolana* (Staudinger, 1862) – Давл, Блрц [Исмагилов и др., 2020]. По степям.
6884. *Jordanita volgensis* (Möschler, 1862) – Зиан, Байм (?) [Grosser, 1983; Трофимова, 2006б (?)]. По степным склонам. Указание для Байм во второй цит. работе не подтверждено в [Трофимова, 2015].
6885. *Rhagades pruni* ([Denis et Schiffermüller], 1775) – Нурм [Grosser, 1983]. В основном в старовозрастных борах зеленомошниках, изредка в прилегающих лесах неморального типа по разрежениям, опушкам и полянам.

Подсемейство Zygaeninae

6886. *Zygaena angelicae* Ochsenheimer, 1808 – Стмк, Зиан, Шарн [Grosser, 1983; Мигранов, 2022а]. Характерен для остепненных лугов с выходами известняков и доминированием вязеля разноцветного (*Coronilla varia*).
6887. *Zygaena carniolica* (Scopoli, 1763) (=*onobrychis* ([Denis et Schiffermüller], 1775)) – на всей центральной и южной территории республики. По сильно остепненным участкам с обилием эспарцета песчаного (*Onobrichis arenaria).*
6888. *Zygaena centaureae* Fischer von Waldheim, 1832 – северные, центральные, южные р-ны [Исмагилов и др., 2020; Мигранов и др., 2020в; Мигранов, 2022а; Исмагилов, 2025б]. Преимущественно по остепненным участкам, отчасти по прилегающим пустошам и прогреваемым лесным опушкам.
6889. *Zygaena cynarae* (Esper, 1789) – без местонахождений [Ménétries, 1855; Anikin et al., 2000a, 2017; Трофимова, 2006б; Хабибуллин, 2017б]. Указание в работе [Grosser, 1983] из южных районов следует относить к следующему виду. По опушкам сосновых лесов и остепненным песчаным балкам.
6890. *Zygaena ephialtes* (Linnaeus, 1767*)* – на всей центральной и южной территории республики. Встречается по остепненным лугам и лесным опушкам с обилием вязеля разноцветного (*Coronilla varia* L.).
6891. *Zygaena filipendulae* (Linnaeus, 1758) – на всей территории. Умеренно эвритопный луговой мезоксерофил.
6892. *Zygaena lonicerae* (Scheven, 1777) – на всей территории. Умеренно эвритопный лесолуговой мезофил.
6893. *Zygaena loti* ([Denis et Schiffermüller], 1775) (=*achilleae* Esper, 1780) – Зиан, Крмс [Grosser, 1983; Исмагилов и др., 2021а; Исмагилов, 2025б]. Лугово-степной ксеромезофильный вид.
6894. *Zygaena minos* ([Denis et Schiffermüller], 1775) – на всей территории. По прогреваемым луговым участкам.
6895. *Zygaena osterodensis* Reiss, 1921 (*scabiosae* auct., nec (Scheven, 1777)) – на всей территории. В старовозрастных смешанных и широколиственных лесах по разнотравным полянам и опушкам.

6896. *Zygaena purpuralis* (Brünnich, 1763) (=*pilosellae* Esper, 1780) – Чишм, Зиан, Хайб, Бурз, Учлн [Круликовский, 1897; Grosser, 1983; Бурзянцев и др., 1994; Бакалова, 2016; Исмагилов, 2025б] По остепненным местам с участием тимьянов (*Thymus* spp.).
6897. *Zygaena sedi* Fabricius, 1787 – Зиан [Grosser, 1983]. По сухим остепненным лугам и склонам.
6898. *Zygaena viciae* ([Denis et Schiffermüller], 1775) (=*meliloti* Esper, 1789) – на всей территории. По прогреваемым лугам, лесным полянам и опушкам.

Серия Pyraliformes (Н.Н. Исмагилов)

Семейство Pyralidae – Настоящие огневки (15 видов, наличие еще 1 требует подтверждения)

Подсемейство Galleriinae

6899. *Achroia grisella* (Fabricius, 1794) – Уфмс, Бурз [Исмагилов и др., 2021б; Бакалова, Бакалов, 2023]. Эвритопный и синантропофильный лесолуговой вид.
6900. *Aphomia anella* ([Denis et Schiffermüller], 1775) – Чишм, Уфа [Круликовский, 1901; Исмагилов, 2025б]. Эвритопный и синантропофильный лесолуговой вид.
6901. *Aphomia sociella* (Linnaeus, 1758) – на всей территории. Эвритопный и синантропофильный лесолуговой вид.
6902. *Galleria mellonella* (Linnaeus, 1758) – Уфа, Бурз, Блвщ, Иглн, Кушн [Исмагилов и др., 2020; Бакалова, Бакалов, 2023; Исмагилов, 2025б]. Эвритопный и синантропофильный лесолуговой вид.
6903. *Lamoria zelleri* De Joannis, 1932 – на всей территории. По сухим лугам и лесным опушкам, преимущественно на песчаных почвах.

Подсемейство Pyralinae

6904. *Aglossa pinguinalis* (Linnaeus, 1758) – на всей территории. Олигосинантропный вид.
6905. *Endotricha flammealis* ([Denis et Schiffermüller], 1775) – на всей территории. В лесах и посадках под их пологом и по опушкам.
6906. *Hypotia massilialis* (Duponchel, [1833]) – Байм [Трофимова, 2004а, 2006б]. По степям.
6907. *Hypsopygia costalis* (Fabricius, 1775) (=*fimbrialis* ([Denis et Schiffermüller], 1775)) – на всей территории. Эвритопный и синантропофильный лугово-полевой вид.
6908. *Hypsopygia glaucinalis* (Linnaeus, 1758) – Стмк, Абзл, Кушн, Уфа [Исмагилов и др., 2020; Исмагилов, 2025б]. Эвритопный и синантропофильный лугово-полевой вид.
6909. *Pyralis cardinalis* Kaila, Huemer, Mutanen, Tyllinen et Wikström, 2020 – северные, центральные, южные р-ны [Исмагилов и др., 2021а; Исмагилов, 2025б]. В смешанных и широколиственных лесах.

6910. *Pyralis farinalis* (Linnaeus, 1758) – на всей территории. Олигосинантропный вид.
6911. *Pyralis perversalis* (Herrich-Schäffer, [1849]) – Байм [Исмагилов и др., 2022].
6912. *Pyralis regalis* ([Denis et Schiffermüller], 1775) – Блрц, Бурз [Трофимова, 2003, 2004а] (?). Наличие вида не может вызывать сомнения, но указания все же требуют проверки в связи с неописанным тогда следующего вида-двойника.
6913. *Synaphe antennalis* (Fabricius, 1794) – Уфа, Абзл, Байм, Куюр, Учлн [Исмагилов и др., 2020; Исмагилов, 2025б]. По ксерофитным остепненным участкам и песчаным опушкам смешанных и лиственных лесов.

? *Synaphe moldavica* (Esper, 1794) – без местонахождений [Мигранов, Саттаров, 2006]. Вид сложен для определения и требует подтверждения фактическим материалом.

Семейство Phycitidae – Узкокрылые огневки (84 вида, наличие еще 2 не подтверждено)

Подсемейство Anerastiinae

6914. *Anerastia lotella* (Hübner, [1813]) – Белб, Блрц, Нефтекамск [Круликовский, 1910; Трофимова, 2004а, 2006б; Исмагилов, 2025б]**.** По ксерофитным боровым опушкам и полянам, а также по луговым участкам.

Подсемейство Phycitinae

6915. *Acrobasis advenella* (Zincken, 1818) – Уфа, Крмс [Исмагилов и др., 2020; Исмагилов, 2025б]. В лесах и посадках различных типов.
6916. *Acrobasis consociella* (Hübner, [1813]) – Кушн [Исмагилов, 2023]. Характерен для лесов юга лесной зоны и лесостепи с участием дуба (*Quercus robur*).
6917. *Acrobasis legatea* (Haworth, [1811]) – Кушн, Крмс [Исмагилов и др., 2021а; Исмагилов, 2025б]. Характерен для широколиственных лесов лесостепи.
6918. *Acrobasis repandana* (Fabricius, 1798) – Уфа, Уфмс [Исмагилов и др., 2021б]. В широколиственных лесах.
6919. *Acrobasis suavella* (Zincken, 1818) – без местонахождений [Трофимова, 2015; Anikin et al., 2017]. По остепненным участкам с терновниками.
6920. *Acrobasis tumidana* ([Denis et Schiffermüller], 1775) – Уфа [Исмагилов и др., 2021а]. В хвойно-широколиственных и широколиственных лесах (монофаг на дубе).
6921. *Ancylosis cinnamomella* (Duponchel, 1836) – Байм [Исмагилов и др., 2022]. Характерен для песчаных ксерофитных участков.
6922. *Ancylosis maculifera* Staudinger, 1870 – без местонахождений [Трофимова, 2015; Anikin et al., 2017]. По сухим степям.
6923. *Ancylosis oblitella* (Zeller, 1848) – Сибай, Уфа [Исмагилов и др., 2021б; Исмагилов, 2025б]. В посадках караганы древовидной.
6924. *Ancylosis sareptalla* (Herrich-Schäffer, [1861]) – без местонахождений [Трофимова, 2015; Anikin et al., 2017]. По сухим степям.

6925. *Apomyelois bistriatella* (Hulst, 1887) – Уфмс, Байм, Бурз, Уфа [Исмагилов и др., 2021б; Трофимова, Шовкун, 2022; Исмагилов, 2025б]. В смешанных лесах.
6926. *Asalebria ferruginella* (Zerny, 1914) – Блвр [Исмагилов, 2025б]. Характерен для степных ландшафтов
6927. *Asalebria geminella* (Eversmann, 1844) – Байм [Трофимова, 2004а]. По ксерофитным участкам.
6928. *Asalebria venustella* (Ragonot, 1887) – Блрц [Трофимова, 2004а]. По степям.
6929. *Assara terebrella* (Zincken, 1818) – без местонахождений [Положенцев, 1949; Положенцев, Кучеров, 1949б]. В хвойных и смешанных лесах.
6930. *Bazaria gilvella* Ragonot, 1887 – Уфа [Исмагилов, 2023]. В средней полосе приурочен к ксерофитным луговым участкам или пустошам.
6931. *Bradyrrhoa gilveolella* (Treitschke, 1832) – без местонахождений [Трофимова, 2015; Anikin et al., 2017]. По ксерофитным пустошам и известнякам.
6932. *Catastia marginea* ([Denis et Schiffermüller], 1775) – Байм [Трофимова, 2004а, 2006б]. В хвойных и смешанных лесах.
6933. *Cymbalorissa fuliginosella* (Heinemann, 1865) – Блрц, Блвщ, Иглн, Уфмс, Уфа [Исмагилов и др., 2021а; Исмагилов, 2025б]. Преимущественно в смешанных лесах.
6934. *Delplanqueia dilutella* ([Denis et Schiffermüller], 1775) – Абзл [Исмагилов и др., 2020]. По ксерофитным луговым и степным участкам на песчаных почвах или с обнажениями известняков.
6935. *Dioryctria abietella* ([Denis et Schiffermüller], 1775) – Бурз, Блрц, Уфмс [Положенцев, 1947; Трофимова, 2006а; Путенихина, 2016]. В хвойных и смешанных лесах.
6936. *Dioryctria schuetzeella* Fuchs, 1899 – Уфа [Исмагилов и др., 2022]. В хвойных и смешанных лесах.
6937. *Dioryctria simplicella* Heinemann, 1865 – Уфа, Абзл [Исмагилов и др., 2022]. В хвойных и смешанных лесах, монофаг на сосне.
6938. *Dioryctria sylvestrella* (Ratzeburg, 1840) (=*splendidella* (Herrich-Schäffer, 1847)) – без местонахождений [Положенцев, 1949, 1977а; Трофимова, 2015; Anikin et al., 2017]. В хвойных и смешанных лесах.
6939. *Eccopisa effractella* Zeller, 1848 – Уфа [Исмагилов, 2023]. Лесной вид.
6940. *Elegia similella* (Zincken, 1818) – Уфа [Исмагилов и др., 2020]. В смешанных и широколиственных лесах с участием дуба (*Quercus robur*).
6941. *Ephestia animella* K. Nupponen et Junnilainen, 1998 – Блрц [Nupponen, Junnilainen, 1998]. В таежных лесах.
6942. *Ephestia elutella* (Hübner, 1796) – Нефтекамск, Уфа, Кушн [Исмагилов и др., 2021а; Исмагилов, 2025б]. Эвсинантропный вид, вредитель продовольственных запасов.
6943. *Ephestia kuehniella* Zeller, 1879 – Блрц [Мигранов, Саттаров, 2008]. Олигосинантропный вид, развивающийся в гнездах птиц и грызунов.

6944. *Epischnia prodromella* (Hübner, [1799]) – Байм [Исмагилов и др., 2022]. Степной ксерофил.
6945. *Episcythrastis tabidella* (Mann, 1864) – Байм [Исмагилов, 2023]. Характерен для степных ландшафтов. В лесной зоне приурочен к ксерофитным опушкам сосняков.
6946. *Episcythrastis tetricella* ([Denis et Schiffermüller], 1775) – Абзл, Учлн, Уфа [Трофимова, 2006а, 2006б; Исмагилов, 2023]. В смешанных и мелколиственных лесах, особенно в прибрежных ивняках.
6947. *Etiella zinckenella* (Treitschke, 1832) – Байм [Исмагилов и др., 2022]. Луговой ксеромезофил.
6948. *Eucarphia vinetella* (Fabricius, 1787) – Байм, Учлн [Трофимова, 2004а, 2006б; Исмагилов, 2025б]. По степям.
6949. *Eurhodope cirrigerella* (Zincken, 1818) – без местонахождений [Трофимова, 2015; Anikin et al., 2017]. По ксерофитным песчаным опушкам сосняков, прилегающим пустошам, а также по остепненным участкам.
6950. *Eurhodope rosella* (Scopoli, 1763) – Чишм, Байм [Круликовский, 1901; Трофимова, 2004а, 2006б]. По ксерофитным песчаным опушкам сосняков, прилегающим пустошам, а также по остепненным участкам.
6951. *Euzophera bigella* (Zeller, 1848) – Уфа, Крмс [Исмагилов и др., 2022]. Характерен для перелесков лесостепного типа и садово-парковых ландшафтов.
6952. *Euzophera cinerosella* (Zeller, 1839) – Уфа, Нефтекамск, Кушн [Исмагилов, 2023, 2025б]. По прогреваемым лесным опушкам, остепненным участкам и прилегающим пустырям.
6953. *Glyptoteles leucacrinella* Zeller, 1848 – Уфа, Кушн, Уфмс [Исмагилов и др., 2022; Исмагилов, 2025б]. По-видимому, умеренно эвритопный лесолуговой термофильный вид.
6954. *Homoeosoma inustella* Ragonot, 1884 (?*calcella* Ragonot, 1887) – Байм [Трофимова, 2006б]. По степным склонам.
6955. *Homoeosoma nebulella* ([Denis et Schiffermüller], 1775) – на всей территории. По прогреваемым лугам и пустырям.
? *Homoeosoma nimbella* (Duponchel, 1836) – Учлн [Трофимова, 2006а] (?). В дальнейшем для РБ не приводился. Требуется подтверждение фактическим материалом. По ксерофитным песчаным лесным опушкам, прилегающим пустырям и остепненным участкам.
6956. *Homoeosoma sinuella* (Fabricius, 1794) – Уфа [Исмагилов и др., 2021б]. По ксерофитным песчаным лесным опушкам, прилегающим пустырям и остепненным участкам.
6957. *Hypochalcia ahenella* ([Denis et Schiffermüller], 1775) – Чишм, Блрц [Круликовский, 1901; Трофимова, 2004а]. Луговой мезоксерофил.
6958. *Hypochalcia decorella* (Hübner, [1810]) – без местонахождений [Трофимова, 2015; Anikin et al., 2017]. по степным участкам.

6959. *Hypochalcia dignella* (Hübner, 1796) – без местонахождений [Трофимова, 2015; Anikin et al., 2017]. Степной вид.
? *Hypochalcia lignella* (Hübner, 1796) – Байм [Трофимова, 2004а, 2006б] (?). Указания в свете современных данных выглядят очень сомнительно, т.к. до недавнего времени он определялся по неполному отечественному определителю.
6960. *Hypochalcia propinquella* (Eversmann, 1842) – Уфа, Крмс, Блвр, Ермк [Исмагилов и др., 2020; Исмагилов, 2025б]. По прогреваемым лугам.
6961. *Insalebria serraticornella* (Zeller, 1839) (=*gregella* (Eversmann, 1844)) – Чишм [Круликовский, 1901]. По степным участкам и прилегающим ксерофитным пустошам.
6962. *Isauria dilucidella* (Duponchel, 1836*)* (=*ilignella* (Zeller, 1839)) – центральные, южные, горно-лесные р-ны [Круликовский, 1910; Трофимова, 2006а, 2006б; Исмагилов, 2025б]. По ксерофитным опушкам сосняков, прилегающим пустошам, а также по остепненным участкам.
6963. *Laodamia faecella* (Zeller, 1839) – на всей территории. Преимущественно по ксерофитным опушкам смешанных лесов и прилегающим пустошам на песчаных почвах, реже по степным участкам.
6964. *Moitrelia obductella* (Zeller, 1839) – Кгрч, Уфа [Трофимова, 2006б; Исмагилов и др., 2021б]. По-видимому, лугово-степной вид.
6965. *Myelois circumvoluta* (Fourcroy, 1785) (*cribrum* ([Denis et Schiffermüller], 1775), nom. praeoc.) – северные, центральные, южные р-ны [Круликовский, 1901, 1910; Трофимова, 2004а, 2006б; Исмагилов, 2025б]. Луговой мезоксерофил.
6966. *Nephopterix angustella* (Hübner, 1796) – Уфмс, Туйм [Исмагилов и др., 2021б; Исмагилов, 2025б]. В смешанных лесах с участием бересклетов (*Euonymus* spp.).
6967. *Nyctegretis lineana* (Scopoli, 1786) (=*achatinella* (Hübner, [1824])) – на всей территории. Лугово-полевой ксеромезофил.
6968. *Nyctegretis triangulella* Ragonot, 1901 – Уфа, Кушн, Блвр [Исмагилов и др., 2021а; Исмагилов, 2025б]. По-видимому, лугово-полевой ксеромезофил.
6969. *Oncocera semirubella* (Scopoli, 1763) – на всей территории. Луговой мезоксерофил.
6970. *Ortholepis betulae* (Goeze, 1778) – Блрц [Трофимова, 2004а]. В смешанных и мелколиственных лесах и посадках с участием берез (*Betula* spp.).
6971. *Ortholepis vacciniella* (Lienig et Zeller, 1846) – без местонахождений [Трофимова, 2015; Anikin et al., 2017]. В смешанных лесах с черничниками.
6972. *Pempelia alpigenella* (Duponchel, 1836) – без местонахождений [Трофимова, 2015; Anikin et al., 2017]. Характерен для степных участков.
6973. *Pempeliella bulgarica* Slamka et Plant, 2016 (*ardosiella* auct.) – Байм [Трофимова, 2019]. По-видимому, ксерофильный и петрофильный степной вид.

6974. *Pempeliella ornatella* ([Denis et Schiffermüller], 1775) – центральные, южные, горно-лесные, юго-восточные р-ны [Трофимова, 2004а; Исмагилов, 2025б]. По ксерофитным степным участкам на песчаных почвах или с обнажениями известняков.
6975. *Phycitodes albatella* (Ragonot, 1887*)* – Байм [Трофимова, 2004а, 2006б]. Лугово-степной мезоксерофил.
6976. *Phycitodes binaevella* (Hübner, [1813]) – на всей территории. Преимущественно по сухим разнотравным и остепненным участкам.
6977. *Phycitodes lacteella* (Rothschild, 1915) – Блрц, Крмс, Туйм, Уфа [Трофимова, 2004а, 2006б; Исмагилов, 2025б]. Луговой ксерофил.
6978. *Phycitodes maritima* (Tengström, 1848) – Абзл [Исмагилов и др., 2022]. Преимущественно по ксерофитным песчаным лесным опушкам и прилегающим пустырям, реже по остепненным участкам.
6979. *Phycitodes saxicola* (Vaughan, 1870) – без местонахождений [Трофимова, 2015; Anikin et al., 2017]. Преимущественно по ксерофитным песчаным лесным опушкам и прилегающим пустырям, реже по остепненным участкам.
6980. *Pima boisduvaliella* (Guenée, 1845) – Байм [Трофимова, 2006а, 2006б]. Лугово-степной вид.
6981. *Plodia interpunctella* (Hübner, [1813]) – на всей территории. Эвсинантропный вид, вредитель продовольственных запасов.
6982. *Psorosa dahliella* (Treitschke, 1832) – Бурз [Трофимова, 2003, 2004а, 2006б]. По степным участкам.
6983. *Psorosa nucleolella* (Möschler, 1866) – Байм, Стбш [Трофимова, 2004а; Исмагилов, 2025б]. По литературным данным, трофически связан с желтой акацией; в данном районе, очевидно, адвентивный вид.
6984. *Pterothrixidia rufella* (Duponchel, 1836) (*ssp. squalidella* (Eversmann, 1842)) – без местонахождений [Трофимова, 2015; Anikin et al., 2017]. По-видимому, степной вид.
6985. *Pyla fusca* (Haworth, [1811]) – северные, центральные, горно-лесные р-ны [Трофимова, 2006а, 2006б; Исмагилов, 2025б]. Характерный для смешанных и мелколиственных лесов.
6986. *Ratasa alienalis* (Eversmann, 1844) (=*noctualis* (Eversmann, 1842)) – Чишм [Круликовский, 1901]. По степям.
6987. *Rhodophaea formosa* (Haworth, [1811]) – Ишмб [Исмагилов и др., 2021б]. Характерен для хвойно-широколиственных и широколиственных лесов.
6988. *Salebriopsis albicilla* (Herrich-Schäffer, [1849]) – Уфа [Исмагилов и др., 2021а]. Лесной мезофил.
6989. *Sciota adelphella* (Fischer v. Röslerstamm, 1836) – Уфа, Кушн, Стмк [Исмагилов и др., 2020; Исмагилов, 2025б]. Преимущественно в смешанных лесах и прибрежных ивняках.
6990. *Sciota fumella* (Eversmann, 1844) – Кушн, Блвр, Крмс [Исмагилов и др., 2021а; Исмагилов, 2025б]. По ксерофитным опушкам смешанных лесов, прилегающим пустошам, а также по остепненным участкам.

6991. *Sciota hostilis* (Stephens, 1834) – Блрц, Уфа [Трофимова, 2006а; Исмагилов, 2025б]. В лесах и посадках, особенно с участием тополей (*Populus* spp.).
6992. *Sciota marmorata* (Alphéraky, 1876) – Блрц, Крмс, Кушн, Стмк, Уфа [Трофимова, 2004а; Исмагилов и др., 2020; Исмагилов, 2025б]. В разреженных лиственных лесах, сосняках и посадках с участием акаций (*Robinia* sp.).
6993. *Sciota rhenella* (Zincken, 1818) – Чишм, Уфа [Круликовский, 1901; Исмагилов и др., 2022]. По литературным данным, лесной и синантропофильный вид, монофаг на тополях (включая интродуценты).
6994. *Selagia argyrella* ([Denis et Schiffermüller], 1775) – Чишм, Белб, Абзл, Ишмб, Кушн [Круликовский, 1901, 1910; Исмагилов, 2025б]. По ксерофитным опушкам сосняков и прилегающим лугам.
6995. *Selagia spadicella* (Hübner, 1796) – на всей территории. По прогреваемым луговым участкам, прилегающим пустырям и полям.
6996. *Vitula biviella* (Zeller, 1848) – Сибай [Исмагилов и др., 2021а]. Характерен для старовозрастных сосняков южного типа.
6997. *Zophodia grossulariella* (Hübner, [1809]) (=*convolutella* ([Denis et Schiffermüller], 1775)) – Крмс, Бузд, Уфа [Исмагилов и др., 2020; Исмагилов, Валуев, 2023б]. В лесах и населенных пунктах с участием крыжовниковых.

Семейство Crambidae – Огневки-травянки (56 видов, наличие еще 1 требует подтверждения)

Подсемейство Nymphulinae

6998. *Cataclysta lemnata* (Linnaeus, 1758) – северные, центральные, южные р-ны [Круликовский, 1901, 1910; Исмагилов, 2025б]. Амфибионтный и прибрежно-луговой вид.
6999. *Elophila nymphaeata* (Linnaeus, 1758) – северные, центральные, южные, горно-лесные р-ны [Круликовский, 1904; Трофимова, 2004а, 2006б; Исмагилов, Валуев, 2023б; Исмагилов, 2025б]. Амфибионтный и прибрежно-луговой гигромезофил.
7000. *Kasania arundinalis* (Eversmann, 1842) – Альш, Уфмс [Круликовский, 1904; Хабибуллин, 2017б]. Амфибионтный и прибрежно-луговой вид.
7001. *Nymphula nitidulata* (Hufnagel, 1767) (=*stagnata* (Donovan, 1806)) – северные, центральные, южные, юго-восточные р-ны [Круликовский, 1901, 1910; Трофимова, 2006б; Исмагилов, 2025б]. Амфибионтный и прибрежно-лесолуговой вид.
7002. *Parapoynx stratiotata* (Linnaeus, 1758) – на всей территории. Амфибионтный и прибрежно-лесолуговой вид.

Подсемейство Acentropinae

7003. *Acentria ephemerella* ([Denis et Schiffermüller], 1775) – Кушн, Блвщ, Иглн, Уфа [Исмагилов и др., 2021а; Исмагилов, 2025б]. Амфибионт чистых стоячих водоемов.

Подсемейство Schoenobiinae

7004. *Donacaula forficella* (Thunberg, 1794) – Нефтекамск [Исмагилов и др., 2021б; Исмагилов, 2025б]. Прибрежно-луговой гигромезофил.

7005. *Donacaula mucronella* ([Denis et Schiffermüller], 1775) – Байм [Трофимова, 2006а, 2006б]. Прибрежно-луговой гигромезофил.

Подсемейство Crambinae

Триба Chilonini Heinemann, 1865

7006. *Chilo phragmitella* (Hübner, [1810]) – Кушн, Нефтекамск [Исмагилов и др., 2021а; Исмагилов, 2025б]. Прибрежно-луговой гигрофил.

Триба Haimbachini Landry, 1995

7007. *Friedlanderia cicatricella* (Hübner, [1824]) – Чишм, Бирс, Кркм [Круликовский, 1901, 1910]. Прибрежно-луговой гигрофил.

Триба Calamotrophini Gaskin, 1988

7008. *Calamotropha paludella* (Hübner, [1824]) – Кушн, Блвр, Стмк [Исмагилов и др., 2021а; Исмагилов, 2025б]. Прибрежно-луговой гигрофил.

Триба Crambini Latreille, 1810

7009. *Agriphila aeneociliella* (Eversmann, 1844) – Альш, Кгрч, Кушн [Круликовский, 1904; Трофимова, 2004а; Исмагилов, 2025б]. Лугово-степной мезоксерофил.

7010. *Agriphila inquinatella* ([Denis et Schiffermüller], 1775) – Уфа, Нефтекамск, Кушн [Исмагилов и др., 2021а; Исмагилов, 2025б]. По прогреваемым лугам и прилегающим пустырям.

7011. *Agriphila poliellus* (Treitschke, 1832) – Иглн [Исмагилов, 2025б]. Преимущественно по ксерофитным опушкам сосняков и прилегающим лугам на песчаных почвах, реже по остепненным участкам.

7012. *Agriphila selasella* (Hübner, [1813]) – на всей территории. Лесолуговой мезофил.

7013. *Agriphila straminella* ([Denis et Schiffermüller], 1775) – на всей территории. Лугово-полевой мезофил.

7014. *Agriphila tristella* ([Denis et Schiffermüller], 1775) – на всей территории. Лугово-полевой мезоксерофил.

7015. *Catoptria falsella* ([Denis et Schiffermüller], 1775) – без местонахождений [Трофимова, 2015; Anikin et al., 2017]. В различных лесных и облесенных биотопах.

7016. *Catoptria lythargyrella* (Hübner, 1796) – Зилр, Кгрч, Ишмб, Бурз [Трофимова, 2004а, Исмагилов, 2023, 2025б]. Степной ксерофил; в лесной зоне может обитать по опушкам сосняков и прилегающим пустошам на песчаных почвах.

7017. *Catoptria maculalis* (Zetterstedt, 1839) – Блрц [Трофимова, 2015]. По горным таежным лесам.

7018. *Catoptria margaritella* ([Denis et Schiffermüller], 1775) – Блрц [Трофимова, 2006а]. Немногие известные первому автору находки – в смешанных лесах по сфагновым болотам с обилием багульника.

? *Catoptria myella* (Hübner, 1796) – Чишм [Круликовский, 1901] (?). Вид

сложен для определения и без проверки гениталий не отличим от предыдущего. Характерен для смешанных лесов бореального типа.

7019. *Catoptria permiacus* (W. Petersen, 1924) – Блрц, Байм, Бурз [Трофимова, 2006а; Хабибуллин, 2017б]. В смешанных лесах по сфагновым болотам.

7020. *Catoptria permutatellus* (Herrich-Schäffer, [1848]) – Блрц, Абзл [Трофимова, 2004а; Исмагилов, 2025б]. Характерен для смешанных лесов.

7021. *Catoptria pinella* (Linnaeus, 1758) – на всей территории. Преимущественно в экосистемах смешанных лесов по прогреваемым разнотравным опушкам, прилегающим лугам, а также по сфагновым болотам.

7022. *Catoptria verellus* (Zincken, 1817) – Ермк, Блрц, Блвщ, Уфа [Исмагилов и др., 2020; Исмагилов, 2025б]. В различных лесных и облесенных биотопах.

7023. *Chrysoteuchia culmella* (Linnaeus, 1758) (=*hortuellus* (Hübner, 1796)) – на всей территории. Лугово-полевой мезоксерофил.

7024. *Crambus hamella* (Thunberg, 1794) – без местонахождений [Anikin et al., 2003, 2017; Трофимова, 2015]. В экосистемах смешанных лесов по ксерофитным песчаным опушкам и полянам.

7025. *Crambus lathoniellus* (Zincken, 1817) (*pratellus* auct.) – на всей территории. Лугово-полевой мезоксерофил.

7026. *Crambus pascuellus* (Linnaeus, 1758) – на всей территории. Лугово-полевой мезоксерофил.

7027. *Crambus perlella* (Scopoli, 1763) (=*monochremellus* Herrich-Schäffer, [1855]) – на всей территории. Лугово-полевой мезоксерофил.

7028. *Crambus pratella* (Linnaeus, 1758) – Блрц [Трофимова, 2004а]. Преимущественно в экосистемах смешанных лесов по ксерофитным песчаным опушкам и прилегающим лугам, значительно реже по остепненным участкам на известняках.

7029. *Crambus uliginosellus* Zeller, 1850 – Уфа [Исмагилов и др., 2022]. По сфагновым болотам.

7030. *Euchromius gratiosella* (Caradja, 1910) – Уфа [Исмагилов, 2023]. Характерен для сухих остепненных лугов, песчаных и щебнистых степей, сухих склонов с разреженной растительностью.

7031. *Euchromius ocellea* (Haworth, [1811]) – Иглн, Салават [Хабибуллин, 2025б]. Луговой ксеромезофил.

7032. *Flavocrambus picassensis* Błeszyński, 1965 – Бурз [Błeszyński, 1965]. Характерен для хвойно-широколиственных лесов.

7033. *Mesocrambus candiellus* (Herrich-Schäffer, [1848]) – без местонахождений [Anikin et al., 2017]. По сухим степям.

7034. *Metacrambus carectellus* (Zeller, 1847) – без местонахождений [Трофимова, 2015; Anikin et al., 2017]. По сухим лугам и степным участкам.

7035. *Pediasia aridella* (Thunberg, 1794) – Абзл, Бурз [Исмагилов и др., 2022; Исмагилов, 2025б]. Преимущественно по ксерофитным остепненным участкам, реже – по опушкам сосняков и прилегающим пустошам на песчаных почвах.

7036. *Pediasia contaminella* (Hübner, 1796) – северные, центральные, южные, горно-лесные р-ны [Трофимова, 2003, 2004а; Исмагилов и др., 2021а; Исмагилов, 2025б]. Преимущественно по ксерофитным остепненным участкам, реже – по опушкам сосняков и прилегающим пустошам на песчаных почвах.
7037. *Pediasia luteella* ([Denis et Schiffermüller], 1775) – на всей территории. Луговой ксеромезофил.
7038. *Pediasia pudibundellus* (Herrich-Schäffer, [1855]) – без местонахождений [Трофимова, 2015; Anikin et al., 2017]. По сухим степям.
7039. *Platytes alpinella* (Hübner, [1813]) – Байм, Уфа [Трофимова, 2006а; Исмагилов, 2025б]. Преимущественно по ксерофитным опушкам сосняков и прилегающим лугам на песчаных почвах, реже по остепненным участкам.
7040. *Platytes cerussella* ([Denis et Schiffermüller], 1775) – на всей территории. По сухим лугам и лесным опушкам.
7041. *Thisanotia chrysonuchella* (Scopoli, 1763) – Альш, Зилр, Бузд, Уфа [Круликовский, 1904; Трофимова, 2004а; Исмагилов, Валуев, 2023б; Исмагилов, 2025б]. Лугово-степной мезоксерофил.

Триба Ancylolomiini Ragonot, 1889

7042. *Talis quercella* ([Denis et Schiffermüller], 1775) – Чишм, Байм, Абзл, Бурз, Уфа [Круликовский, 1901; Исмагилов и др., 2022; Исмагилов, 2025б]. По ксерофитным опушкам сосняков и остепненным участкам.
7043. *Talis mongolica* Błeszyński, 1965 – Байм [Anikin et al., 2017]. По сухим каменистым (горным) лугам.

Подсемейство Scopariinae

7044. *Eudonia lacustrata* (Panzer, 1804) – на всей территории. Эвритопный лесной вид.
7045. *Eudonia mercurella* (Linnaeus, 1758) – без местонахождений [Трофимова, 2015; Anikin et al., 2017]. Характерен для лесных участков.
7046. *Eudonia murana* (Curtis, 1827) – Блрц [Трофимова, 2004а]. В смешанных лесах.
7047. *Eudonia truncicolella* (Stainton, 1849) – Уфа, Нефтекамск, Блвщ, Иглн [Исмагилов и др., 2020; Исмагилов, 2025б]. Эвритопный лесной вид.
7048. *Gesneria centuriella* ([Denis et Schiffermüller], 1775) – Ишмб [Исмагилов и др., 2020]. Характерен для смешанных лесов бореального типа.
7049. *Scoparia ancipitella* (de La Harpe, 1855) (=*ulmella* (Knaggs, 1867)) – Блрц [Трофимова, 2006а]. В смешанных лесах.
7050. *Scoparia basistrigalis* Knaggs, 1866 – Кушн, Блрц [Трофимова, 2006а; Исмагилов и др., 2021а]. Эвритопный лесной вид.
7051. *Scoparia ingratella* (Zeller, 1846) – северные, центральные, южные, юго-восточные р-ны [Трофимова, 2006а; Большаков, Исмагилов, 2019; Исмагилов, 2025б]. Преимущественно в изреженных перелесках лесостепи, отчасти по прилегающим остепненным участкам.

7052. *Scoparia pyralella* ([Denis et Schiffermüller], 1775) – северные, центральные, южные, юго-восточные р-ны [Трофимова, 2006а, 2006б; Исмагилов, 2025б]. В лесах различных типов по редколесьям, опушкам, отчасти по прилегающим лугам.

7053. *Scoparia subfusca* Haworth, [1811] – на всей территории. В разреженных лесах и посадках неморального типа.

Семейство Pyraustidae – Ширококрылые огневки (70 видов, наличие еще 2 видов требует подтверждения)

Подсемейство Odontiinae

Триба Odontiini Guinée, 1854

7054. *Aporodes floralis* (Hübner, [1809]) – Крмс, Ишмб, Кушн [Исмагилов и др., 2020; Исмагилов, 2025б]. Степной ксерофил.

7055. *Cynaeda dentalis* ([Denis et Schiffermüller], 1775) – Чишм [Круликовский, 1901]. В лесной зоне обитает по опушкам сосняков и прилегающим пустошам на песчаных почвах, в лесостепи – и по остепненным лугам.

7056. *Cynaeda forsteri* De Lattin, 1951 – Байм, Абзл, Учлн [Трофимова, 2006а, 2006б; Исмагилов, 2025б]. По степям.

Триба Eurrhypini Leraut et Luquet, 1983

7057. *Eurrhypis pollinalis* ([Denis et Schiffermüller], 1775*)* – Крмс [Исмагилов и др., 2022]. По опушкам смешанных и остепненных лиственных лесов с участием ракитника (*Chamaecytisus ruthenicus*).

Подсемейство Evergestinae

7058. *Evergestis aenealis* ([Denis et Schiffermüller], 1775) – центральные, южные, горно-лесные р-ны [Круликовский, 1901; Трофимова, 2004а; Исмагилов, Валуев, 2023б; Исмагилов, 2025б]. По ксерофитным луговым участкам.

7059. *Evergestis desertalis* (Hübner, [1813]) – без местонахождений [Трофимова, 2015; Мигранов, 2016; Anikin et al., 2017]. По степным участкам с выходом известняков.

7060. *Evergestis extimalis* (Scopoli, 1763) – на всей территории. По лесным опушкам, полянам, закустаренным участкам.

7061. *Evergestis forficalis* (Linnaeus, 1758) – Ишмб, Крмс, Уфа [Исмагилов и др., 2020; Исмагилов, 2025б]. Лугово-полевой синантропофильный вид.

7062. *Evergestis frumentalis* (Linnaeus, [1760]) – центральные, южные р-ны [Круликовский, 1901; Исмагилов, Валуев, 2023б; Исмагилов, 2025б]. По открытым луговым участкам.

7063. *Evergestis pallidata* (Hufnagel, 1767) – Учлн, Блрц, Крмс, Уфмс, Уфа [Трофимова, 2006а; Исмагилов, 2025б]. Наиболее характерен для сырых и заболоченных лесных полян.

7064. *Evergestis politalis* ([Denis et Schiffermüller], 1775) – Стмк [Исмагилов и др., 2022]. По остепненным участкам.

7065. *Evergestis sophialis* (Fabricius, 1787) – Зилр, Байм, Блрц, Абзл, Бурз [Трофимова, 2004а; Исмагилов, 2025б]. Приурочен к подтаежным ландшафтам.

Подсемейство Glaphyriinae

7066. *Hyperlais dulcinalis* (Treitschke, 1835) – Байм [Трофимова, 2006а, 2006б]. По степям.

Подсемейство Pyraustinae

7067. *Achyra nudalis* (Hübner, 1796*)* – без местонахождений [Anikin et al., 2017]. По сухим открытым пространствам.

7068. *Anania coronata* (Hufnagel, 1767) (=*sambucalis* ([Denis et Schiffermüller], 1775)) – Чишм, Кушн [Круликовский, 1901; Исмагилов, 2025б]. В травянисто-кустарниковом ярусе лесов и посадок различных типов.

7069. *Anania crocealis* (Hübner, 1796) – Байм [Трофимова, 2006а, 2006б, 2015; Anikin et al., 2017]. В смешанных и широколиственных лесах по прогреваемым разнотравным опушкам и полянам.

7070. *Anania funebris* (Ström, 1768) (=*octomaculata* (Linnaeus, 1771)) – Чишм, Блрц [Круликовский, 1901; Трофимова, 2004а]. В старовозрастных лесах по разнотравным опушкам и полянам, реже по прилегающим высокотравным лугам.

7071. *Anania fuscalis* ([Denis et Schiffermüller], 1775) – Блрц, Крмс [Трофимова, 2004а; Исмагилов, 2025б]. В лесах различных типов по редколесьям, опушкам, полянам.

7072. *Anania hortulata* (Linnaeus, 1758) (=*urticata* (Linnaeus, [1760])) – на всей территории. В лесах и посадках различных типов с участием крапив (*Urtica* spp.).

7073. *Anania lancealis* ([Denis et Schiffermüller], 1775) – Нефтекамск, Уфа, Блрц [Исмагилов и др., 2021а; Исмагилов, 2025б]. В травянисто-кустарниковом ярусе старовозрастных влажноватых лесов.

7074. *Anania luctualis* (Hübner, 1793) – Чишм, Блрц [Круликовский, 1901; Трофимова, 2004а, 2006б; Исмагилов, 2023]. В старовозрастных лесах по разнотравным опушкам и полянам.

7075. *Anania perlucidalis* (Hübner, [1809]) – Кгрч, Абзл, Бурз, Уфмс, Уфа [Трофимова, 2006а, 2006б; Исмагилов, 2025б]. В лесах неморального облика по разнотравным опушкам и полянам.

7076. *Anania stachydalis* (Germar, 1821) – Блрц, Бурз, Уфмс, Шарн, Уфа [Исмагилов, 2025б]. В травянисто-кустарниковом ярусе старовозрастных лесов.

7077. *Anania verbascalis* ([Denis et Schiffermüller], 1775) – Ишмб, Уфа [Исмагилов и др., 2020; Исмагилов, 2025б]. Преимущественно в старовозрастных смешанных и широколиственных лесах по тенистым редколесьям и опушкам, отчасти, по прилегающим закустаренным лугам.

7078. *Ecpyrrhorrhoe rubiginalis* (Hübner, 1796) – на всей территории. Лугово-степной мезоксерофил.

7079. *Loxostege aeruginalis* (Hübner, 1796) – без местонахождений [Anikin et al., 2017]. По степям.
7080. *Loxostege clathralis* (Hübner, [1813]) – без местонахождений [Трофимова, 2015; Anikin et al., 2017]. По степям.
7081. *Loxostege deliblatica* Szent-Iványet Uhrik-Mészáros, 1942 (=*sulphuralis* (Hübner, [1811])) – Чишм [Круликовский, 1901]. По степям.
7082. *Loxostege sticticalis* (Linnaeus, [1760]) – на всей территории. Луговополевой мезоксерофил.
7083. *Loxostege turbidalis* (Treitschke, 1829) – Кушн, Блвр, Крмс [Исмагилов и др., 2022; Исмагилов, 2025б]. Преимущественно по ксерофитным песчаным опушкам сосняков, прилегающим лугам, реже по остепненным участкам.
7084. *Loxostege virescalis* (Guenée, 1854) – Байм [Трофимова, 2006а, 2006б]. Степной вид, в лесной зоне встречается по ксерофитным опушкам сосняков.
7085. *Nascia cilialis* (Hübner, 1796) – Блрц, Зилр, Ишмб [Трофимова, 2004а; Исмагилов, 2025б]. Прибрежно-болотный гигрофил.
7086. *Ostrinia kasmirica* (Moore, 1888) – без местонахождений [Трофимова, 2015; Anikin et al., 2017]. На открытых, хорошо прогреваемых склонах с богатым разнотравьем.
7087. *Ostrinia nubilalis* (Hübner, 1796) – на всей территории. Широчайший полифаг, предпочитающий хлебные злаки.
7088. *Ostrinia palustralis* (Hübner, 1796) – Учлн, Блрц [Трофимова, 2006а, 2006б; Исмагилов, 2023]. Преимущественно в старовозрастных смешанных лесах по сырым заболоченным полянам.
7089. *Ostrinia peregrinalis* (Eversmann, 1852) – Блрц, Бурз [Трофимова, 2006а, 2006б; Полтавский и др., 2013]. В поймах рек, влажных лугах и опушках лесов.
7090. *Ostrinia scapulalis* (Walker, 1859) – без местонахождений [Трофимова, 2015; Anikin et al., 2017]. Луговой мезоксерофил.
7091. *Paratalanta hyalinalis* (Hübner, 1796) – на всей территории. Преимущественно в старовозрастных смешанных, отчасти в широколиственных лесах по редколесьям и опушкам.
7092. *Paratalanta pandalis* (Hübner, [1825]) – Блрц, Блвщ, Давл, Уфа [Трофимова, 2006а, 2006б; Исмагилов, 2025б]. В лесах различных типов по редколесьям, опушкам, полянам.
7093. *Psammotis pulveralis* (Hübner, 1796) – Белб, Учлн, Зилр [Круликовский, 1910; Трофимова, 2006а]. Преимущественно по лесным травяным болотам и берегам водоемов, отчасти, по прилегающим луговым участкам.
7094. *Pyrausta aerealis* (Hübner, 1793) – Уфа [Трофимова, 2015; Anikin et al., 2017; Исмагилов и др., 2021а]. По ксерофитным песчаным опушкам сосняков и прилегающим пустошам.
7095. *Pyrausta aurata* (Scopoli, 1763) (=*punicealis* ([Denis et Schiffermüller], 1775)) – на всей территории. По остепненным участкам и разнотравным опушкам смешанных лесах.

7096. *Pyrausta castalis* Treitschke, 1829 – Блрц, Байм, Абзл, Бурз [Трофимова, 2006а; Исмагилов, 2025б]. По степям.
7097. *Pyrausta despicata* (Scopoli, 1763) (=*cespitalis* ([Denis et Schiffermüller], 1775)) – на всей территории. По прогреваемым разнотравным участкам.
7098. *Pyrausta obfuscata* (Scopoli, 1763) – Кушн [Исмагилов и др., 2022]. По остепненным участкам.
7099. *Pyrausta ostrinalis* (Hübner, 1796) – Учлн, Абзл, Байм, Кушн [Исмагилов и др., 2021б; Исмагилов, 2025б]. Лугово-степной ксерофил.

? *Pyrausta porphyralis* ([Denis et Schiffermüller], 1775) – без местонахождений [Трофимова, 2006б]. В последующем для РБ не приводился, требуется подтверждение. По опушкам сосняков и прилегающим ксерофитным лугам на песчаных почвах.

7100. *Pyrausta purpuralis* (Linnaeus, 1758) – на всей территории. По луговым участкам, прилегающим полям и пустырям.
7101. *Pyrausta rectefascialis* Toll, 1936 – Октябрьский [Исмагилов, 2025б]. Характерен для остепненных участков с участием шалфеев (*Salvia* spp.)
7102. *Pyrausta sanguinalis* (Linnaeus, 1767) – Зилр, Альш, Ермк, Крмс, Стмк [Трофимова, 2004а; Исмагилов, 2025б]. По остепненным участкам.
7103. *Pyrausta tithonialis* (Zeller, 1872) – Учлн, Уфа [Šumpich, Skyva, 2012; Исмагилов и др., 2021а]. Вероятно, приурочен к ксерофитным стациям и постепенно расширяет свой ареал в западном направлении.
7104. *Sclerocona acutellus* (Eversmann, 1842) – Кушн, Блвр, Туйм [Исмагилов и др., 2022; Исмагилов, 2025б]. В старовозрастных смешанных и широколиственных лесах по болотам и прибрежным участкам с тростником.
7105. *Sitochroa palealis* ([Denis et Schiffermüller], 1775) – Шарн, Уфмс, Иглн, Кушн, Нефтекамск [Исмагилов и др., 2020; Исмагилов, Валуев, 2021а; Исмагилов, Валуев, 2023б; Исмагилов, 2025б]. По прогреваемым лугам.
7106. *Sitochroa verticalis* (Linnaeus, 1758) – на всей территории. По луговым участкам, прилегающим полям и пустырям.
7107. *Uresiphita gilvata* (Fabricius, 1794) – без местонахождений [Трофимова, 2015; Anikin et al., 2017]. По ксерофитным участкам.

Подсемейство Spilomelinae

7108. *Agrotera nemoralis* (Scopoli, 1763) – Нефтекамск, Слвт [Исмагилов и др., 2021б; Исмагилов, 2025б]. В старых лесах с участием дуба (*Quercus robur*).
7109. *Diasemia reticularis* (Linnaeus, [1760]) – Блрц [Трофимова, 2004а]. Луговой мезофил.
7110. *Mecyna flavalis* ([Denis et Schiffermüller], 1775) – на всей территории. По прогреваемых лугам и разнотравным опушкам.
7111. *Nomophila noctuella* ([Denis et Schiffermüller], 1775) – на всей территории. Лугово-полевой мезоксерофил.
7112. *Patania ruralis* (Scopoli, 1763) (*verticalis* auct.) – на всей территории. В лесах и посадках различных типов, по прилегающим высокотравным лугам, а также по пустырям с участием крапив (*Urtica* spp.).

7113. *Udea accolalis* (Zeller, 1867) – Блрц [Трофимова, 2004а, 2006б]. По остепненным перелескам.
7114. *Udea austriacalis* (Herrich-Schäffer, [1851]) – без местонахождений [Трофимова, 2015; Anikin et al., 2017]. По горным лугам и долинам горных ручьев.
7115. *Udea decrepitalis* (Herrich-Schäffer, [1848]) – Блрц [Трофимова, 2004а; Исмагилов, Валуев, 2023б]. В смешанных и широколиственных лесах.
7116. *Udea elutalis* ([Denis et Schiffermüller], 1775) – без местонахождений [Трофимова, 2015; Anikin et al., 2017]. Лугово-лесной мезоксерофил.
7117. *Udea exalbalis* (Caradja, 1916) – Кушн, Уфа [Исмагилов и др., 2021а; Исмагилов, 2025б]. В лесных и облесенных биотопах по опушкам и прилегающим открытым местам.
7118. *Udea fulvalis* (Hübner, [1809]) – на всей территории. Лугово-полевой мезоксерофил.
7119. *Udea hamalis* (Thunberg, 1792) – Блрц [Трофимова, 2004, 2006б]. В смешанных лесах с черничниками.
7120. *Udea languidalis* (Eversmann, 1842) – Байм [Исмагилов, 2023]. Лесолугово-степной мезоксерофил.
7121. *Udea lutealis* (Hübner, [1809]) – Бурз, Блрц, Абзл, Нефтекамск [Трофимова, 2003; Исмагилов, 2023]. В лесах и посадках различных типов по опушкам и полянам.

? *Udea olivalis* ([Denis et Schiffermüller], 1775) – Блрц [Трофимова, 2004а]. В дальнейших работах не приводился, требуется подтверждение. В лесах различных типов по редколесьям и опушкам.

7122. *Udea prunalis* ([Denis et Schiffermüller], 1775) – северные, центральные, южные, горно-лесные р-ны [Круликовский, 1904; Трофимова, 2003, 2004; Исмагилов, 2025б]. В лесах различных типов в травянисто-кустарниковом ярусе.

Надсемейство Thyridoidea

Семейство Thyrididae – Окончатые мотыльки (1 вид)

7123. *Thyris fenestrella* (Scopoli, 1763) – Чишм [Круликовский, 1897]. В смешанных и редких сосновых лесах, на опушках и пустошах.

Серия Geometriformes (Н.Н. Исмагилов)

Надсемейство Drepanoidea

Семейство Thyatiridae – Совковидки (8 видов)

Подсемейство Thyatirinae

7124. *Habrosyne pyritoides* (Hufnagel, 1766) (=*derasa* (Linnaeus, 1767)) – центральные, южные, юго-восточные р-ны [Grosser, 1983; Исмагилов и др., 2020; Горбунов, 2023; Исмагилов, 2025б]. Характерен для смешанных и лиственных лесов.
7125. *Thyatira batis* (Linnaeus, 1758) – на всей территории. Преимущественно в смешанных и светлых лиственных лесах.

Подсемейство Palimpsestinae

7126. *Ochropacha duplaris* (Linnaeus, [1760]) – северные, центральные, южные, горно-лесные, юго-восточные р-ны [Grosser, 1983; Ахола и др., 1997; Горбунов, 2023; Исмагилов, 2025б]**.** В старых смешанных и лиственных лесах и посадках.

7127. *Tetheella fluctuosa* (Hübner, [1803]) – Блрц, Учлн [Ахола и др., 1997; Горбунов, 2023; Исмагилов, 2023]. Преимущественно в смешанных лесах.

7128. *Tethea ocularis* (Linnaeus, 1767) – по всей территории. В редколесьях и посадках различных типов.

7129. *Tethea or* ([Denis et Schiffermüller], 1775) – Блрц, Учлн [Ахола и др., 1997; Горбунов, 2023]. Преимущественно в старовозрастных лесах и посадках различных типов.

Подсемейство Polyplocinae

7130. *Achlya flavicornis* (Linnaeus, 1758) – на всей территории. Преимущественно в старовозрастных лесах различных типов с участием берез (*Betula* spp.)

7131. *Polyploca ridens* (Fabricius, 1787) – Гафр [Исмагилов, 2025б]. По остепненным дубравам.

Семейство Drepanidae – Серпокрылки (5 видов)

7132. *Drepana curvatula* (Borkhausen, 1790) – Блрц, Учлн [Ахола и др., 1997; Горбунов, 2023]. В старовозрастных лесах с черноольшанниками.

7133. *Drepana falcataria* (Linnaeus, 1758) – на всей территории. В лесах и посадках различных типов, особенно в мелколиственных.

7134. *Falcaria lacertinaria* (Linnaeus, 1758) – центральные, южные, горно-лесные, юго-восточные р-ны [Круликовский, 1897; Ахола и др., 1997; Горбунов, 2023; Исмагилов, 2025б]. В смешанных и тенистых лиственных лесах и посадках.

7135. *Sabra harpagula* (Esper, [1786]) – центральные, южные, горно-лесные р-ны [Ахола и др., 1997; Исмагилов и др., 2020; Исмагилов, 2025б]. По старовозрастным мешанным и широколиственным лесам.

7136. *Watsonalla binaria* (Hufnagel, 1767) – Уфмс, Кушн, Крмс, Стбш Уфа [Исмагилов и др., 2021б; Исмагилов, 2025б]. По смешанным лесам с наличием дуба.

Надсемейство Geometrioidea

Семейство Geometridae – Пяденицы (314 видов, наличие еще 8 видов требует подтверждения)

Подсемейство Sterrhinae

Триба Cosymbiini Prout, 1910

7137. *Cyclophora albiocellaria* (Hübner, 1789) – Давл, Куюр, Стбш, Уфа [Антонова, 1985; Исмагилов, 2025б]. В смешанных, мелколиственных лесах и старых посадках.

7138. *Cyclophora albipunctata* (Hufnagel, 1767) – на всей территории. В смешанных, мелколиственных лесах и старых посадках.

7139. *Cyclophora annularia* (Fabricius, 1775) – на всей территории. В лесах и посадках с обилием клёна.
7140. *Cyclophora pendularia* (Clerck, 1759) – Альш, Бурз, Крмс, Кушн, Нефтекамск [Круликовский, 1904; Антонова, 1985; Исмагилов, 2025б]. Характерен для тенистых лесов и старых посадок различных типов.
7141. *Cyclophora porata* (Linnaeus, 1767) – Кушн, Стбш [Исмагилов, 2023, 2025б]. По широколиственным лесам.
7142. *Cyclophora punctaria* (Linnaeus, 1758) – на всей территории. В лесах и посадках с обилием дуба.
7143. *Cyclophora quercimontaria* (Bastelberger, 1897) – Учлн [Ахола и др., 1997]. В лесах и посадках с обилием дуба.

Триба Timandrini Stephens, 1850

7144. *Timandra comae* A. Schmidt, 1931 (*amata* Linnaeus, 1758), nom. praeoc.; *griseata* auct.) – на всей территории. Эврибионтный вид.

Триба Rhodostrophiini Agenjo, 1952 (=Lythriini Herbulot, 1962)

7145. *Lythria cruentaria* (Hufnagel, 1767) (=*rotaria* (Fabricius, 1798)*; purpurata* (Linnaeus, 1761), nom. praeoc.) – Чишм, Зиан, Крмс, Мелз, Уфа [Круликовский, 1897; Антонова, 1985; Исмагилов, 2025б]. Преимущественно по разнотравным лесным опушкам и прилегающим лугам.
7146. *Lythria purpuraria* (Linnaeus, 1758) – на всей территории. По остепненным участкам и прилегающим сухим пустырям, агроценозам.
7147. *Rhodostrophia vibicaria* (Clerck, 1759) – на всей территории. По прогреваемым сухим опушкам сосняков и остепненным участкам.

Триба Rhodometrini Agenjo, 1952

7148. *Casilda antophilaria* (Hübner, [1813]) – Хайб [Исмагилов и др., 2021б]. По сухим местам и солончакам.

Триба Sterrhini Meyrick, 1892

7149. *Cleta filacearia* (Herrich-Schäffer, [1847]) – Бурз [Исмагилов, 2025б]. По степным участкам.
7150. *Idaea aureolaria* ([Denis et Schiffermüller], 1775) (=*trilineata* (Scopoli, 1772)) – на всей территории. Преимущественно по сухим разнотравным боровым полянам и сильно остепненным склонам.
7151. *Idaea aversata* (Linnaeus, 1758) – на всей территории. В лесах и посадках различных типов.
7152. *Idaea biselata* (Hufnagel, 1767) – на всей территории. В лесах и старых посадках различных типов по разрежениям, опушкам, полянам и прилегающим мезофитным лугам.
7153. *Idaea descitaria* (Christoph, 1893) (*elongaria* auct.) – на всей территории. Характерен для открытых прогреваемых биотопов.
7154. *Idaea deversaria* (Herrich-Schäffer, [1847]) – Уфа, Бурз [Исмагилов и др., 2021а; Исмагилов, 2025б]. Характерен для смешанных и широколиственных лесов лесостепи.

7155. *Idaea dilutaria* (Hübner, [1799]) – Стмк, Куюр, Уфмс [Исмагилов и др., 2021а; Исмагилов, 2025б]. Характерен для облесенных остепненных биотопов.
7156. *Idaea dimidiata* (Hufnagel, 1767) – Нурм, Стмк, Блвр, Кушн, Уфа [Grosser, 1983; Anikin et al., 2000b, 2017; Исмагилов и др., 2020; Исмагилов, 2025б]. В лесах и посадках различных типов.
7157. *Idaea emarginata* (Linnaeus, 1758) – Нурм, Блвщ, Белб, Октябрьский [Grosser, 1983; Антонова, 1985; Исмагилов, 2023, 2025б]. В смешанных и лиственных лесах с подлеском.
7158. *Idaea fuscovenosa* (Goeze, 1781) – Абзл [Исмагилов и др., 2020]. По остепненным лесам.
7159. *Idaea humiliata* (Hufnagel, 1767) (=*osseata* ([Denis et Schiffermüller], 1775)) – на всей территории. По прогреваемым разнотравным и остепненным лесным опушкам и склонам.
7160. *Idaea moniliata* ([Denis et Schiffermüller], 1775) – Ишмб, Кушн, Блвр [Grosser, 1983; Исмагилов и др., 2022; Исмагилов, 2025б]. Характерен для облесенных остепненных биотопов.
7161. *Idaea muricata* (Hufnagel, 1767) – Уфа, Кушн, Учлн [Исмагилов и др., 2021а; Горбунов, 2023]. Преимущественно в старых смешанных и широколиственных лесах по опушкам, сыроватым или заболоченным полянам.
7162. *Idaea ochrata* (Scopoli, 1763) – центральные, южные, юго-восточные р-ны [Grosser, 1983; Исмагилов и др., 2021а; Исмагилов, 2025б]. Характерен для сухих степей и открытых разнотравных участках на песках вблизи сосняков.
7163. *Idaea pallidata* ([Denis et Schiffermüller], 1775) – на всей территории. Преимущественно по прогреваемым лугам и лесным полянам.
? *Idaea rubraria* (Staudinger, 1901) – Мелз [Трофимова, 2006б] (?). Указывался по одному экземпляру 2.08.2000. Вид сложен для определения, внешне схожен с пока не известным в РБ, но более широко распространенным *I. degeneraria* (Hbn.).
7164. *Idaea rufaria* (Hübner, [1799]) – на всей территории. По остепненным участкам, прилегающим сухим лугам и пустырям.
7165. *Idaea rusticata* ([Denis et Schiffermüller], 1775) – центральные, южные, юго-восточные р-ны [Исмагилов и др., 2020; Исмагилов, 2025б]. Характерен для облесенных остепненных биотопов.
7166. *Idaea sericeata* (Hübner, [1813]) – Абзл [Исмагилов, 2023]. По степям.
7167. *Idaea serpentata* (Hufnagel, 1767) (=*similata* (Thunberg, 1784); =*perochraria* (Fischer von Röslerstamm, 1836)) – на всей территории. По прогреваемым разнотравным лугам.
7168. *Idaea straminata* (Borkhausen, 1794) (=*suffusata* (Treitschke, 1828); =*inornata* (Haworth, 1809)) – Клтс, Бурз, Учлн, Кушн, Уфа [Антонова, 1985; Горбунов, 2023; Исмагилов, 2025б]. В смешанных и разреженных широколиственных лесах.

Триба Scopulini Duponchel, 1845

7169. *Scopula beckeraria* (Lederer, 1853) – Куюр, Байм [Антонова, 1985; Исмагилов и др., 2020]. Характерен для ксерофитных остепненных биотопов.
7170. *Scopula corrivalaria* (Kretschmar, 1862) – Крмс [Исмагилов и др., 2020]. По лесным болотам и прибрежным травянистым участкам.
7171. *Scopula decorata* ([Denis et Schiffermüller], 1775) – южные, юго-восточные р-ны [Антонова, 1985; Горбунов, 2023; Исмагилов, 2025б]. По остепненным участкам.
7172. *Scopula floslactata* (Haworth, [1809]) – на всей территории. В лесах и старых посадках различных типов, держится в кронах нижнего яруса.
7173. *Scopula immorata* (Linnaeus, 1758) – на всей территории. По лугам различных типов и прилегающим пустырям.
7174. *Scopula immutata* (Linnaeus, 1758) (*sylvestraria* auct.) – на всей территории. По сыроватым разнотравным лугам, лесным полянам, травяным болотам.
7175. *Scopula incanata* (Linnaeus, 1758) – на всей территории. По разнотравным и остепненным лесным опушкам, полянам, прилегающим лугам.
7176. *Scopula marginepunctata* (Goeze, 1781) – центральные, юго-восточные р-ны [Grosser, 1983; Ахола и др., 1997; Исмагилов и др., 2020; Горбунов, 2023; Исмагилов, 2025б]. Характерен для старых хвойно-широколиственных и широколиственных лесов.
7177. *Scopula nemoraria* (Hübner, [1799]) – Белб, Бурз, Учлн, Нефтекамск [Антонова, 1985; Горбунов, 2023; Исмагилов, 2025б]. По хвойно-широколиственным лесам.
7178. *Scopula nigropunctata* (Hufnagel, 1767) (=*strigilaria* (Hübner, 1799)) – на всей территории. В лесах и старых посадках различных типов, держится в травянисто-кустарниковом ярусе.

    ? *Scopula ochraceata* (Staudinger, 1901) – Белб [Круликовский, 1910]. Указывался как аберрация *S. rubiginata* (Hufnagel, 1767). Требуется подтверждение фактическим материалом.
7179. *Scopula ornata* (Scopoli, 1763) – на всей территории. По остепненным лугам.
7180. *Scopula rubiginata* (Hufnagel, 1767) (=*rubricaria* ([Denis et Schiffermüller], 1775)) – на всей территории. По прогреваемым суховатым лугам и, отчасти, прилегающим сегетальным пустырям.
7181. *Scopula subpunctaria* (Herrich-Schäffer, [1847]) – Уфа, Ишмб, Байм, Блрц, Учлн [Grosser, 1983; Антонова, 1985; Горбунов, 2023; Исмагилов, 2023]. Характерен для остепненных склонов с обнажениями известняков.
7182. *Scopula ternata* (Schrank, 1802) – Бурз [Антонова, 1985]. Характерен для смешанных лесов с обилием вересковых ягодных.
7183. *Scopula tessellaria* (Boisduval, 1840) – Зиан [Исмагилов, 2025б]. По степям
7184. *Scopula umbelaria* (Hübner, [1813]) – Бурз [Антонова, 1985]. По остепненным лесам.
7185. *Scopula virgulata* ([Denis et Schiffermüller], 1775) (=*strigaria* Hübner, [1799]) – центральные, южные, горно-лесные, юго-восточные р-ны [Grosser, 1983; Антонова, 1985; Ахола и др., 1997; Горбунов, 2023; Исмагилов, 2025б].

Характерен для ксерофитных разнотравных и остепненных лесных опушек, полян, прилегающих лугов.

Подсемейство Larentiinae

Триба Trichopterygini Warren, 1894

7186. *Acasis appensata* (Eversmann, 1842) – Бурз, Блрц, Учлн [Антонова, 1985; Ахола и др., 1997; Горбунов, 2023]. Характерен для старых лесов таежного типа.

7187. *Lobophora halterata* (Hufnagel, 1767) – на всей территории. В лесах и посадках различных типов.

7188. *Pterapherapteryx sexalata* (Retzius, 1783) – Клтс, Бурз, Кушн, Уфа [Антонова, 1985; Исмагилов, 2023]. По старым лесам неморального облика, держится по разрежениям и опушкам.

7189. *Trichopteryx carpinata* (Borkhausen, 1794) – на всей территории. Во влажноватых смешанных и мелколиственных лесах и старых посадках.

7190. *Trichopteryx polycommata* ([Denis et Schiffermüller], 1775) – Нефтекамск, Учлн [Исмагилов и др., 2021б; Горбунов, 2023]. Характерен для широколиственных лесов и старых посадок.

Триба Chesiadini Stephens, 1850

7191. *Aplocera plagiata* (Linnaeus, 1758) – на всей территории. По прогреваемым суховатым и остепненным лугам.

7192. *Aplocera praeformata* (Hübner, [1826]) – на всей территории. В старых лесах различных типов по опушкам и полянам.

7193. *Lithostege farinata* (Hufnagel, 1767) – на всей территории. По прогреваемым лугам и сегетальным пустырям.

7194. *Lithostege griseata* ([Denis et Schiffermüller], 1775) – Альш, Чекм, Туйм, Блвр [Круликовский, 1904; Антонова, 1985; Anikin et al., 2000b, 2017; Исмагилов, 2025б]. Наиболее характерен для остепненных участков.

7195. *Odezia atrata* (Linnaeus, 1758) – на всей территории. По сыроватым лесным опушкам, полянам и прилегающим лугам.

7196. *Schistostege nubilaria* (Hübner, [1799]) – Чишм, Зилр, Байм [Круликовский, 1897; Антонова, 1985; Исмагилов, 2023]. Характерен для сухих степей.

Триба Asthenini Warren, 1894

7197. *Asthena albulata* (Hufnagel, 1767) – Абзл [Исмагилов и др., 2020]. Преимущественно в старых широколиственных лесах с обилием лещины.

7198. *Euchoeca nebulata* (Scopoli, 1763) – Иглн [Исмагилов, 2025б]. Характерен для старых лесов с ольшанниками.

7199. *Hydrelia flammeolaria* (Hufnagel, 1767) – северные, центральные, южные, горно-лесные, юго-восточные р-ны [Grosser, 1983; Антонова, 1985; Ахола и др., 1997; Горбунов, 2023; Исмагилов, 2025б]. Преимущественно в тенистых влажноватых лесах и посадках.

7200. *Hydrelia sylvata* ([Denis et Schiffermüller], 1775) (=*testaceata* (Donovan, 1810)) – Альш, Клтс, Нефтекамск [Круликовский, 1904; Антонова, 1985; Anikin et

al., 2000b, 2017; Исмагилов, 2025б]. Характерен для старых смешанных и мелколиственных лесов.

7201. *Minoa murinata* (Scopoli, 1763) – на всей территории. По прогреваемым полянам и опушкам.

7202. *Venusia blomeri* (Curtis, 1832) – на всей территории. В старых лесах с участием вязов (*Ulmus* spp.).

7203. *Venusia cambrica* Curtis, 1839 – Блрц, Чекм [Ахола и др., 1997; Исмагилов и др., 2021а]. По лесам таежного типа.

Триба Perizomini Herbulot, 1962

7204. *Gagitodes sagittata* (Fabricius, 1787) – Блрц [Исмагилов и др., 2021а; Исмагилов, 2025б]. На полянах и опушках старых сырых и тенистых широколиственных, еловых и елово-широколиственных лесов.

7205. *Martania taeniata* (Stephens, 1831) – Нурм, Блрц [Grosser, 1983; Исмагилов и др., 2021а]. По смешанным лесам.

7206. *Mesotype didymata* (Linnaeus, 1758) – Белб, Нурм, Блрц [Круликовский, 1910; Grosser, 1983; Исмагилов, 2025б]. Характерен для старых смешанных лесов.

? *Mesotype parallelolineata* (Retzius, 1783) (=*vespertaria* (Retzius, 1783)) – без местонахождений (“Лесное Оренбуржье”) [Eversmann, 1844]. Наличие вида в РБ вполне вероятно, но требует подтверждения фактическим материалом. В старых смешанных и широколиственных лесах.

7207. *Perizoma albulata* ([Denis et Schiffermüller], 1775) – на всей территории. По мезофитным и сырым лугам, лесным полянам и опушкам.

7208. *Perizoma alchemillata* (Linnaeus, 1758) – на всей территории. В лесах и посадках различных типов.

7209. *Perizoma bifaciata* (Haworth, [1809]*)* – Кушн, Учлн [Исмагилов и др., 2022; Горбунов, 2023]. Характерен для сухих разнотравных боровых опушек (на песках) и остепненных участков.

7210. *Perizoma blandiata* ([Denis et Schiffermüller], 1775) – Бурз [Антонова, 1985]. Характерен для старых смешанных лесов таежного типа.

7211. *Perizoma flavofasciata* (Thunberg, 1792) – центральные, южные, горно-лесные р-ны [Антонова, 1985; Ахола и др., 1997; Мигранов и др., 2020а; Исмагилов, Валуев, 2023б; Исмагилов, 2025б]. Характерен для разреженных сосново-лиственных и остепненных широколиственных лесов.

7212. *Perizoma hydrata* (Treitschke, 1829) – Нурм, Бурз, Хайб. Учлн [Grosser, 1983; Антонова, 1985; Ахола и др., 1997; Горбунов, 2023]. Характерен для прогреваемых полян и опушек смешанных лесов на песчаных почвах.

Триба Melanthiini Duponchel, 1845

7213. *Anticollix sparsata* (Treitschke, 1828) – Нурм, Учлн [Grosser, 1983; Горбунов, 2023]. В старых лесах различных типов и по прилегающим сырым лугам.

7214. *Coenocalpe lapidata* (Hübner, [1809]*)* – Учлн, Бурв [Горбунов, 2023); Исмагилов, Валуев, 2023а; Исмагилов, Валуев, 2023б]. Характерен для

смешанных лесов таежного типа, но известны локалитеты и в остепненных сосново-широколиственных перелесках лесостепи.

7215. *Horisme aemulata* (Hübner, [1813]) – Учлн, Блрц [Горбунов, 2023; Исмагилов, 2023]. По смешанным лесам.

7216. *Horisme aquata* (Hübner, [1813]) – Абзл, Учлн, Байм [Антонова, 1985; Ахола и др., 1997; Исмагилов, 2025б]. Характерен для ксерофитных остепненных участков.

7217. *Horisme calligraphata* (Herrich-Schäffer, 1838) – центральные, южные, горно-лесные, юго-восточные р-ны [Круликовский, 1904; Антонова, 1985; Исмагилов и др., 2020; Горбунов, 2023; Исмагилов, 2025б]. По остепненным широколиственным лесам.

7218. *Horisme tersata* ([Denis et Schiffermüller], 1775) – Абзл [Исмагилов и др., 2022]. Характерен для остепненных лесов и перелесков, держится среди кустарников подлеска.

7219. *Horisme vitalbata* ([Denis et Schiffermüller], 1775) – Учлн [Ахола и др., 1997; Горбунов, 2023]. Характерен для остепненных лесов.

7220. *Melanthia mandshuricata* (Bremer, 1864) – Блрц [Ахола и др., 1997]. По лиственным и смешанным лесам.

7221. *Melanthia procellata* ([Denis et Schiffermüller], 1775) – Блрц, Учлн [Ахола и др., 1997; Исмагилов и др., 2021а; Горбунов, 2023]. По остепненным лесам и перелескам.

Триба Eupitheciini Tutt, 1896

7222. *Chloroclystis v-ata* (Haworth, [1809]) – Блрц, Учлн, Крмс, Уфа [Ахола и др., 1997; Горбунов, 2023; Исмагилов, 2025б]. Характерен для старых широколиственных лесов.

7223. *Eupithecia abietaria* (Goeze, 1781) – Клтс, Блрц [Положенцев, 1946; Ахола и др., 1997]. В хвойных и смешанных лесах и старых посадках, держится обычно в кронах старых деревьев.

7224. *Eupithecia absinthiata* (Clerck, 1759) – на всей территории. По прогреваемым лугам, полям, травянистым пустырям.

7225. *Eupithecia actaeata* Walderdorff, 1869 – Блрц [Ахола и др., 1997]. В смешанных лесах с участием воронца колосистого (*Actaea spicata*).

7226. *Eupithecia analoga* Djakonov, 1926 (=*strobilata* (Hübner, 1813)) – Блрц [Ахола и др., 1997]. В хвойных и смешанных лесах.

7227. *Eupithecia assimilata* Doubleday, 1856 – Нурм, Учлн, Уфа [Grosser, 1983; Антонова, 1985; Горбунов, 2023]. Характерен для разреженных лесов и посадок.

7228. *Eupithecia breviculata* (Donzel, 1837) – Хайб, Блвр [Ахола и др., 1997; Исмагилов, 2023]. По степям.

7229. *Eupithecia carpophilata* Staudinger, 1897 – Блрц [Миронов, Трофимова, 2007]. В смешанных лесах среднего пояса гор.

7230. *Eupithecia centaureata* ([Denis et Schiffermüller], 1775) – центральные, южные р-ны [Круликовский, 1897; Исмагилов и др., 2022; Исмагилов, 2025б].

Преимущественно по прогреваемым редколесьям, лугам, сегетальным пустырям.

7231. *Eupithecia conterminata* (Lienig et Zeller, 1846) – Блрц, Учлн [Ахола и др., 1997; Горбунов, 2023]. В хвойных и смешанных лесах.

7232. *Eupithecia denotata* (Hübner, [1813]) – Бурз, Учлн [Антонова, 1985; Горбунов, 2023]. Характерен для старых лесов неморального типа.

7233. *Eupithecia egenaria* Herrich-Schäffer, [1848] – Уфа, Нефтекамск [Антонова, 1985; Исмагилов, 2025б]. В лесах с доминированием липы.

7234. *Eupithecia exiguata* (Hübner, [1813]) – Блрц, Уфа [Ахола и др., 1997; Исмагилов, 2025б]. Характерен для широколиственных лесов и посадок.

7235. *Eupithecia extensaria* (Freyer, 1844) – без местонахождений [Anikin et al., 2000b, 2017]. По степным участкам.

7236. *Eupithecia extraversaria* Herrich-Schäffer, [1852] – Бурз [Антонова, 1985]. Луговой термофильный вид.

? *Eupithecia goossensiata* Mabille, 1869 – Байм [Антонова, 1985] (?) – таксон *goossensiata* на рубеже веков был синонимизирован к *absinthiata*, но недавно сделана попытка восстановления его видового статуса. Материал требует проверки. В смешанных лесах и является монофагом вереска.

7237. *Eupithecia graphata* (Treitschke, 1828) – Байм, Учлн [Миронов, Трофимова, 2007; Горбунов, 2023; Исмагилов, 2023]. Характерен для петрофитных сообществ скальных обнажений.

7238. *Eupithecia gueneata* Millière, 1862 – Куюр, Кушн, Учлн, Уфмс [Антонова, 1985; Миронов, 1989; Исмагилов и др., 2021б; Горбунов, 2023; Исмагилов, 2025б]. Характерен для широколиственных лесов с элементами остепнения.

7239. *Eupithecia icterata* (De Villers, 1789) – на всей территории. Преимущественно в разреженных лесах и посадках.

7240. *Eupithecia indigata* (Hübner, [1813]) – Бурз, Учлн, Крмс [Антонова, 1985; Горбунов, 2023; Исмагилов, 2025б]. Характерен для смешанных лесов и старых посадок сосны.

7241. *Eupithecia innotata* (Hufnagel, 1767) – Альш [Круликовский, 1904]. Характерен для прогреваемых разнотравных и остепненных лесных опушек и лугов.

7242. *Eupithecia intricata* (Zetterstedt, 1839) – Блрц [Ахола и др., 1997]. По смешанным лесам с обилием можжевельника.

7243. *Eupithecia lanceata* (Hübner, [1825]) – Учлн, Нефтекамск [Горбунов, 2023; Исмагилов, 2023]. В ельниках.

7244. *Eupithecia lariciata* (Freyer, [1841]) – Учлн, Бурз, Блрц [Антонова, 1985; Ахола и др., 1997; Исмагилов и др., 2021б; Горбунов, 2023]. В лесах и посадках лиственницы.

7245. *Eupithecia linariata* ([Denis et Schiffermüller], 1775) – на всей территории. По лугам.

7246. *Eupithecia millefoliata* Rössler, 1866 – Кушн, Учлн [Антонова, 1985; Горбунов, 2023]. По прогреваемым лугам с тысячелистником обыкновенным.

7247. *Eupithecia nanata* (Hübner, [1813]) – Учлн [Горбунов, 2023]. В смешанных лесах с участием вереска (*Calluna vulgaris*).
7248. *Eupithecia ochridata* Schütze et Pinker, 1968 – Учлн [Горбунов, 2023]. Характерен для прогреваемых лугов и, вероятно, других открытых биотопов.
7249. *Eupithecia orphnata* W. Petersen, 1910 – без местонахождений [Трофимова, 2015; Anikin et al., 2017]. По остепненным биотопам.
7250. *Eupithecia pernotata* Guenée, [1858] – Учлн [Горбунов, 2023]. Характерен для петрофитных сообществ скальных обнажений.
7251. *Eupithecia pimpinellata* (Hübner, [1813]) – Байм, Бурз, Учлн [Антонова, 1985; Горбунов, 2023]. По-видимому, характерен для старых смешанных и лиственных лесов.
7252. *Eupithecia plumbeolata* (Haworth, [1809]) – Блрц [Ахола и др., 1997]. В старых смешанных и широколиственных лесах, держится в травянисто-кустарниковом ярусе.
7253. *Eupithecia pusillata* ([Denis et Schiffermüller], 1775) (=*sobrinata* (Hübner, 1817)) – Чекм, Бурз, Иглн, Уфа [Антонова, 1985; Исмагилов, 2025б]. В смешанных лесах с обилием можжевельника.
7254. *Eupithecia pygmaeata* (Hübner, [1799]) – Блрц [Ахола и др., 1997]. В старовозрастных лесах.
7255. *Eupithecia pyreneata* Mabille, 1871 – без местонахождений [Трофимова, 2015; Anikin et al., 2017]. По каменистым склонам.
7256. *Eupithecia satyrata* (Hübner, [1813]) – Зилр, Блрц, Учлн [Антонова, 1985; Ахола и др., 1997; Горбунов, 2023]. В лесах и старых посадках различных типов по разрежениям, опушкам, полянам.
7257. *Eupithecia selinata* Herrich-Schäffer, [1861] – Учлн [Исмагилов, 2023]. Характерен для старых смешанных лесов неморального облика.
7258. *Eupithecia silenicolata* Mabille, 1866 – без местонахождений [Anikin et al., 2017]. По сухим и остепненным лугам.
7259. *Eupithecia simpliciata* (Haworth, [1809]) (=*subnotata* (Hübner, 1813)) – Хайб, Куюр, Нефтекамск [Антонова, 1985; Исмагилов, 2025б]. Наиболее характерен для прогреваемых антропогенных травянистых пустырей.
7260. *Eupithecia sinuosaria* (Eversmann, 1848) – на всей территории. Характерен для прогреваемых антропогенных травянистых пустырей.
7261. *Eupithecia subfuscata* (Haworth, [1809]) (=*castigata* (Hübner, [1813])) – Давл, Бурз, Учлн [Антонова, 1985; Горбунов, 2023]. В лесах и старых посадках различных типов по разрежениям, опушкам, полянам, прилегающим лугам.
7262. *Eupithecia subumbrata* ([Denis et Schiffermüller], 1775) – Хайб, Благовещенский [Ахола и др., 1997; Исмагилов, 2023]. Характерен для прогреваемых разнотравных лесных полян и опушек, преимущественно на песчаных почвах.
7263. *Eupithecia succenturiata* (Linnaeus, 1758) – на всей территории. В лесах и посадках различных типов.

7264. *Eupithecia tantillaria* Boisduval, 1840 – Блрц, Учлн, Крмс, Кушн, Уфа [Ахола и др., 1997; Горбунов, 2023; Исмагилов, 2025б]. В ельниках.
7265. *Eupithecia thalictrata* (Püngeler, 1902) – без местонахождений [Трофимова, 2015]. Монофаг на *Thalictrum* spp.
7266. *Eupithecia tripunctaria* Herrich-Schäffer, [1852] – Учлн [Горбунов, 2023]. По опушкам лиственных и широколиственных лесов.
7267. *Eupithecia trisignaria* Herrich-Schäffer, [1848] – Бурз [Антонова, 1985]. Характерен для разнотравных опушек и полян в смешанных лесах.
7268. *Eupithecia vacuata* Dietze, 1903 – Учлн [Горбунов, 2023]. Характерен для заболоченных лесов (ольшаников), влажных пойменных лесов, сырых лугов и низинных болот.
7269. *Eupithecia veratraria* Herrich-Schäffer, [1848] – Блрц, Учлн [Ахола и др., 1997; Исмагилов и др., 2021б; Горбунов, 2023]. По прогреваемым луговым и остепненным участкам.
7270. *Eupithecia virgaureata* Doubleday, 1861 – без местонахождений [Anikin et al., 2000b, 2017]. В лесах и посадках различных типов.
7271. *Eupithecia vulgata* (Haworth, [1809]) – Уфа, Учлн [Антонова, 1985; Горбунов, 2023]. Эврибионтный вид.
7272. *Gymnoscelis rufifasciata* (Haworth, [1809]) – Уфа [Исмагилов и др., 2021а]. В травянисто-кустарниковом ярусе широколиственных лесов.
7273. *Pasiphila chloerata* (Mabille, 1870) – Нурм [Grosser, 1983; Исмагилов, 2025б]. Характерен для разреженных лесов.
7274. *Pasiphila debiliata* (Hübner, [1817]) – Нефтекамск [Исмагилов и др., 2021б]. В основном в смешанных лесах с черничниками.
7275. *Pasiphila rectangulata* (Linnaeus, 1758) – на всей территории. В лесах и посадках различных типов.

Триба Operophterini Packard, 1876

7276. *Epirrita autumnata* (Borkhausen, 1794) – северные, центральные, юго-восточные р-ны [Горбунов, 2023; Исмагилов, Валуев, 2023б; Исмагилов, 2025б]. В лесах и посадках различных типов.
7277. *Malacodea regelaria* Tengström, 1869 – Блрц [Ахола и др., 1997]. В ельниках.
7278. *Operophtera brumata* (Linnaeus, 1758) – на всей территории. В лесах и посадках различных типов.

Триба Solitaneini Leraut, 1980

7279. *Baptria tibiale* (Esper, 1791) (=*tibialata* (Hübner, [1799])) – Бурз [Соколов, 1897; Бакалова, 2016]. В старых смешанных лесах таежного типа с участием воронца колосистого (*Actaea spicata*).

Триба Rheumapterini Herbulot, 1961

7280. *Rheumaptera hastata* (Linnaeus, 1758) – Альш, Бурз, Блрц, Учлн [Круликовский, 1904; Антонова, 1985; Мигранов, Саттаров, 2008; Мигранов и др., 2020а; Исмагилов, Валуев, 2023б]. Преимущественно в тенистых смешанных лесах с берёзой.

7281. *Rheumaptera subhastata* (Nolcken, 1870) – без местонахождений [Трофимова, 2006б, 2015]. В лесах таежного типа.
7282. *Rheumaptera undulata* (Linnaeus, 1758) – северные, южные, центральные, горно-лесные, юго-восточные р-ны [Grosser, 1983; Исмагилов и др., 2020; Горбунов, 2023; Исмагилов, 2025б]. Преимущественно в смешанных лесах, держится в травянисто-кустарниковом ярусе.

Триба Phileremini Pierce, 1914

7283. *Philereme transversata* (Hufnagel, 1767) – Блвщ [Grosser, 1983]. По остепненным лесам.
7284. *Philereme vetulata* ([Denis et Schiffermüller], 1775) – северные, центральные, южные р-ны [Grosser, 1983; Антонова, 1985; Исмагилов, 2025б]. Характерен для сосново-широколиственных и остепненных лиственных лесов.

Триба Cidariini Duponchel, 1845

7285. *Chloroclysta siterata* (Hufnagel, 1767) – Учлн, Слвт [Исмагилов и др., 2021б; Горбунов, 2023; Исмагилов, 2025б]. Характерен для старых широколиственных лесов.
7286. *Cidaria fulvata* (Forster, 1771) – Ишмб, Ермк, Уфа [Исмагилов и др., 2020]. По сухим, прогреваемых биотопам с кустарниковыми зарослями.
7287. *Colostygia aptata* (Hübner, [1813]) – Кркм, Бурз, Ермк, Абзл, Учлн, Уфа [Grosser, 1983; Антонова, 1985; Исмагилов и др., 2020; Горбунов, 2023]. По опушкам смешанных лесов на песчаных почвах.
7288. *Colostygia pectinataria* (Knoch, 1781) – Чишм, Кушн, Учлн, Блрц, Нефтекамск [Круликовский, 1897; Антонова, 1985; Горбунов, 2023; Исмагилов, 2025б]. Характерен преимущественно для старых лесов неморального облика.
7289. *Cosmorhoe ocellata* (Linnaeus, 1758) – на всей территории. Преимущественно в старых лесах и посадках различных типов.
7290. *Dysstroma citrata* (Linnaeus, [1760]) – северные, центральные, горно-лесные, юго-восточные р-ны [Grosser, 1983; Ольшванг, Малоземов, 1987; Хабибуллин, 2018а (?); Исмагилов и др., 2022; Горбунов, 2023; Исмагилов, 2025б]. В лесах и посадках различных типов.
7291. *Dysstroma infuscata* (Tengström, 1869) – Учлн [Горбунов, 2023]. В лесах с участием хвойных пород.
7292. *Dysstroma latefasciata* (Blöcker, 1908) – Учлн [Горбунов, 2023]. В таежных лесах.
7293. *Dysstroma truncata* (Hufnagel, 1767) – северные, центральные, южные, горно-лесные, юго-восточные р-ны [Круликовский, 1904, 1910 (?); Антонова, 1985; Ахола и др., 1997; Горбунов, 2023; Исмагилов, 2025б]. В старых лесах и посадках различных типов.
7294. *Ecliptopera capitata* (Herrich-Schäffer, 1839) – Стмк, Нефтекамск [Антонова, 1985; Исмагилов, 2025б]. В старых, преимущественно смешанных лесах неморального облика.

7295. *Ecliptopera silaceata* ([Denis et Schiffermüller], 1775) – Блрц [Ахола и др., 1997]. Характерен для старых, преимущественно смешанных лесов неморального облика.
7296. *Electrophaes corylata* (Thunberg, 1792) – Уфа, Ишмб, Альш, Блрц, Блвщ [Антонова, 1985; Хабибуллин, 2018а; Исмагилов, 2025б]. В лесах и посадках различных типов.
7297. *Eulithis mellinata* (Fabricius, 1787) (=*associata* (Borkhausen, 1794)) – на всей территории. В смешанных лесах и садово-парковых ценозах, где развиваются на крыжовниковых.
7298. *Eulithis populata* (Linnaeus, 1758) – без местонахождений [Мигранов, Саттаров, 2006; Трофимова, 2015]. В смешанных лесах с обилием вересковых ягодных кустарничков.
7299. *Eulithis prunata* (Linnaeus, 1758) – Учлн [Горбунов, 2023]. Характерен для смешанных лесов и садово-парковых ценозов, где развивается на крыжовниковых.
7300. *Eulithis pyropata* (Hübner, [1809]) – Уфмс [Исмагилов, 2023]. В смешанных лесах и садово-парковых ценозах, где развиваются на крыжовниковых.
7301. *Eulithis testata* (Linnaeus, [1760]) – Нефтекамск, Кушн [Исмагилов, 2023]. В старых тенистых лесах.
7302. *Eustroma reticulata* ([Denis et Schiffermüller], 1775) – Нурм, Клтс, Блрц [Grosser, 1983; Антонова, 1985; Исмагилов, 2025б]. Преимущественно в старых смешанных лесах.
7303. *Gandaritis pyraliata* ([Denis et Schiffermüller], 1775) – на всей территории. В старых лесах по разрежениям, опушкам, полянам.
7304. *Heterothera serraria* (Lienig et Zeller, 1846) – Блрц [Ольшванг, Малоземов, 1987; Ахола и др., 1997]. По хвойным лесам с елью.
7305. *Lampropteryx otregiata* (Metcalfe, 1917) – Иглн [Исмагилов, 2025б]. По смешанным лесам.
7306. *Lampropteryx suffumata* ([Denis et Schiffermüller], 1775) – северные, центральные, южные, горно-лесные, юго-восточные р-ны [Антонова, 1985; Ахола и др., 1997; Горбунов, 2023; Исмагилов, Валуев, 2023б; Исмагилов, 2025б]. Преимущественно в смешанных лесах.
7307. *Plemyria rubiginata* ([Denis et Schiffermüller], 1775) – северные, центральные, южные, горно-лесные, юго-восточные р-ны [Grosser, 1983; Исмагилов, 2025б]. Характерен для опушек тенистых смешанных и лиственных лесов и старых посадок.
7308. *Scotopteryx bipunctaria* ([Denis et Schiffermüller], 1775) – на всей территории. По остепненным участкам.
7309. *Scotopteryx chenopodiata* (Linnaeus, 1758) (=*limitata* (Scopoli, 1763)) – на всей территории. По лугам всех типов, травянистым пустырям.
7310. *Scotopteryx coarctaria* ([Denis et Schiffermüller], 1775) – центральные, южные, горно-лесные, юго-восточные р-ны [Круликовский, 1904; Антонова, 1985; Ахола и др., 1997; Горбунов, 2023; Исмагилов, Валуев, 2023б;

Исмагилов, 2025б]. В лесной зоне характерен для опушек песчаных сосняков с дюнами, южнее – по сухим степным участкам.

7311. *Scotopteryx luridata* (Hufnagel, 1767) (=*palumbaria* ([Denis et Schiffermüller], 1775)) – Бурз, Учлн [Хабибуллин, 2018а (?); Горбунов, 2023]. В старовозрастных смешанных лесах.

7312. *Scotopteryx moeniata* (Scopoli, 1763) (*peribolata* auct.) – Бурз, Учлн, Абзл, Байм [Антонова, 1985; Горбунов, 2023; Исмагилов, 2025б]. По прогреваемым лесным полянам и остепненным участкам с обилием ракитника русского.

7313. *Scotopteryx mucronata* (Scopoli, 1763) – на всей территории. По лесным опушкам и закустаренным остепненным участкам с обилием ракитника русского.

7314. *Thera obeliscata* (Hübner, 1787) – Нефтекамск, Учлн [Исмагилов и др., 2021б; Горбунов, 2023]. Характерен в основном для лесов с обилием сосны.

7315. *Thera variata* ([Denis et Schiffermüller], 1775) – Блрц, Крмс, Уфа [Ахола и др., 1997; Исмагилов и др., 2022]. В ельниках.

Триба Scotopterygini Warren, 1895 (s. str.)

Триба Euphyiini Herbulot, 1962

7316. *Euphyia biangulata* (Haworth, [1809]) (=*picata* (Hübner, 1813)) – на всей территории. Характерен для хвойно-широколиственных и прогреваемых широколиственных лесов.

7317. *Euphyia unangulata* (Haworth, [1809]) – Бурз, Блрц, Учлн, Блрц [Антонова, 1985; Ахола и др., 1997; Горбунов, 2023; Исмагилов, 2025б]. В старых смешанных лесах.

7318. *Spargania luctuata* ([Denis et Schiffermüller], 1775) – Бурз, Блрц, Учлн, Уфа [Антонова, 1985; Ахола и др., 1997; Горбунов, 2023; Исмагилов, 2025б]. Характерен для старых смешанных лесов, бабочки бывают активны днём по опушкам и разрежениям.

Триба Cataclysmini Herbulot, 1962

7319. *Cataclysme riguata* (Hübner, [1813]) – Учлн, Стмк [Ахола и др., 1997; Исмагилов и др., 2020; Горбунов, 2023]. По степным участкам.

7320. *Orthonama obstipata* (Fabricius, 1794) – Уфа [Исмагилов, 2025б]. По открытым, низкотравным участкам. Активный мигрант

7321. *Phibalapteryx virgata* (Hufnagel, 1767) – южные, горно-лесные, юго-восточные, центральные р-ны [Круликовский, 1897; Антонова, 1985; Исмагилов, Валуев, 2021а; Исмагилов, Валуев, 2023б; Исмагилов, 2025б]. Характерен для сухих остепненных склонов.

Триба Xanthorhoini Pierce, 1914

7322. *Camptogramma bilineata* (Linnaeus, 1758) – на всей территории. Во всех лесных и луговых биотопах.

7323. *Costaconvexa polygrammata* (Borkhausen, 1794) – центральные, южные, юго-восточные р-ны [Антонова, 1985; Исмагилов и др., 2020; Горбунов, 2023; Исмагилов, 2025б]. По остепненным участкам.

7324. *Xanthorhoe biriviata* (Borkhausen, 1794) (=*pomoeriaria* (Eversmann, 1844)) – на всей территории. Преимущественно в старых смешанных и широколиственных лесах.
7325. *Xanthorhoe decoloraria* (Esper, [1806]) – Блрц [Ахола и др., 1997]. По таежным лесам.
7326. *Xanthorhoe designata* (Hufnagel, 1767) – на всей территории. Преимущественно в хвойно-широколиственных и широколиственных лесах.
7327. *Xanthorhoe ferrugata* (Clerck, 1759) – на всей территории. В лесах и, отчасти, посадках различных типов и по прилегающим лугам.
7328. *Xanthorhoe fluctuata* (Linnaeus, 1758) – на всей территории. В лесах и посадках различных типов.
7329. *Xanthorhoe montanata* ([Denis et Schiffermüller], 1775) – на всей территории. В старых лесах неморального облика с развитым подлеском.
7330. *Xanthorhoe pseudoannotinata* Vasilenko, 2007 – Блрц [Василенко, 2007]. В таежных лесах с вересковыми ягодными.
7331. *Xanthorhoe quadrifasiata* (Clerck, 1759) – на всей территории. В лесах и посадках различных типов.
7332. *Xanthorhoe spadicearia* ([Denis et Schiffermüller], 1775) – Бурз, Абзл, Блрц, Учлн, Уфа [Антонова, 1985; Ахола и др., 1997; Ишбирдина и др., 2020; Мигранов и др., 2020а; Горбунов, 2023; Исмагилов, Валуев, 2023б]. Характерен для лесных разрежений и мезофитных лугов.

Триба Epirrhoini Pierce, 1914

7333. *Anticlea derivata* ([Denis et Schiffermüller], 1775) – Давл, Учлн, Абзл, Бурз, Нефтекамск [Антонова, 1985; Исмагилов, 2023, 2025б]. Характерен для разреженных лесов и посадок различных типов, включая садово-парковые ценозы.
7334. *Catarhoe cuculata* (Hufnagel, 1767) – Бурз, Зилр, Учлн [Антонова, 1985; Горбунов, 2023]. По прогреваемым разнотравным лугам и редколесьям, лиственным лесам.
7335. *Catarhoe rubidata* ([Denis et Schiffermüller], 1775) – центральные, южные, горно-лесные, юго-восточные р-ны [Антонова, 1985; Трофимова, 2006б; Исмагилов, 2025б]. Характерен для прогреваемых редколесий и прилегающих сегетальных пустырей.
7336. *Earophila badiata* ([Denis et Schiffermüller], 1775) – Бурз, Учлн, Крмс [Антонова, 1985; Горбунов, 2023; Исмагилов, 2025б]. Характерен для смешанных и широколиственных лесов.
7337. *Epirrhoe alternata* (Müller, 1764) (=*sociata* (Borkhausen, 1794)) – на всей территории. Эврибионтный вид.
7338. *Epirrhoe galiata* ([Denis et Schiffermüller], 1775) – центральные, южные, горно-лесные, юго-восточные р-ны [Круликовский, 1897; Антонова, 1985; Горбунов, 2023; Исмагилов, 2025б]. В прогреваемых лесах и посадках неморального и, особенно, лесостепного облика.

7339. *Epirrhoe hastulata* (Hübner, 1790) – Бурз, Блрц, Учлн [Антонова, 1985; Ахола и др., 1997; Горбунов, 2023; Исмагилов, 2025б]. Характерен для старых лесов неморального облика, держится преимущественно в кронах по разрежениям и опушкам.
7340. *Epirrhoe pupillata* (Thunberg, 1792) – центральные, южные, горно-лесные, юго-восточные р-ны [Антонова, 1985; Ахола и др., 1997; Горбунов, 2023; Исмагилов, Валуев, 2023б; Исмагилов, 2025б]. Характерен для остепненных лугов.
7341. *Epirrhoe rivata* (Hübner, [1813]) – Ишмб, Ермк [Исмагилов, 2023, 2025б]. По смешанным и широколиственным лесам.
7342. *Epirrhoe tartuensis* Möls, 1965 – Нефтекамск, Учлн, Чекм [Исмагилов и др., 2021б; Горбунов, 2023; Исмагилов, 2025б]. Характерен для пойменных участков с ивняками.
7343. *Epirrhoe tristata* (Linnaeus, 1758) – на всей территории. Характерен для лесных разрежений и лугов различных типов.

Триба Larentiini Duponchel, 1845

7344. *Entephria caesiata* ([Denis et Schiffermüller], 1775) – без местонахождений [Трофимова, 2015]. Горно- тундровый вид.
7345. *Larentia clavaria* (Haworth, [1809]) (=*cervinata* ([Denis et Schiffermüller], 1775])) – Бурз, Клтс, Блвр [Соколов, 1897; Grosser, 1983; Исмагилов, 2025б]. Характерен для открытых прогреваемых, особенно антропогенных биотопов.
7346. *Mesoleuca albicillata* (Linnaeus, 1758) – на всей территории. В лесах и посадках различных типов с малиной.
7347. *Pelurga comitata* (Linnaeus, 1758) (*chenopodiata* auct.) – на всей территории. В лесах и посадках различных типов с малиной.

Триба Hydriomenini Meyrick, 1892

7348. *Hydriomena furcata* (Thunberg, 1784) – Нурм, Кушн [Grosser, 1983; Антонова, 1985]. В старых смешанных и широколиственных лесах с развитым подлеском.
7349. *Hydriomena impluviata* ([Denis et Schiffermüller], 1775) – без местонахождений [Трофимова, 2006б, 2015; Anikin et al., 2017]. Характерен для старых смешанных лесов.
7350. *Hydriomena ruberata* (Freyer, [1831]) – Блрц [Ахола и др., 1997]. В смешанных лесах таежного типа.

Подсемейство Geometrinae

Триба Geometrini Stephens, 1829

7351. *Geometra papilionaria* Linnaeus, 1758 – на всей территории. В старых лесах и посадках различных типов.

Триба Comibaenini Inoue, 1961

7352. *Comibaena bajularia* ([Denis et Schiffermüller], 1775) – центральные, южные, северные р-ны [Исмагилов и др., 2020; Исмагилов, 2025б]. В старовозрастных дубравах.

7353. *Hemistola chrysoprasaria* (Esper, [1795]) (*vernaria* auct.) – Бурз, Учлн [Антонова, 1985; Бакалова, 2016; Горбунов, 2023]. По остепненным лесным опушкам и склонам с участием прострелов (*Pulsatilla* spp.).

7354. *Thetidia smaragdaria* (Fabricius, 1787) – на всей территории. По прогреваемым и остепненным лугам, отчасти по прилегающим сегетальным пустырям.

Триба Pseudoterpnini Warren, 1893

7355. *Pseudoterpna pruinata* (Hufnagel, 1767) – на всей территории. По сухим боровым опушкам и остепненным участкам с обилием ракитника русского.

Триба Hemitheini Bruand, 1846 (=Jodini Inoue, 1961; =Thalerini Herbulot, 1963)

7356. *Chlorissa cloraria* (Hübner, [1813]) – Хайб, Учлн, Белб, Давл, Шарн [Ахола и др., 1997; Исмагилов, 2025б]. По лесным опушкам и прилегающим лугам.

7357. *Chlorissa viridata* (Linnaeus, 1758) – на всей территории. По разнотравным лугам.

7358. *Dyschloropsis impararia* (Guenée, [1858]) – Куюр, Хайб, Учлн [Антонова, 1985; Ахола и др., 1997]. По степям.

7359. *Hemithea aestivaria* (Hübner, 1789) – на всей территории. Преимущественно в старых смешанных и лиственных лесах и посадках.

7360. *Jodis lactearia* (Linnaeus, 1758) – Альш, Белб, Бурз, Учлн, Уфа, Нефтекамск [Круликовский, 1904; Антонова, 1985; Горбунов, 2023; Исмагилов, 2025б]. В старых смешанных и лиственных лесах.

7361. *Jodis putata* (Linnaeus, 1758) – Кушн, Блрц, Нефтекамск [Антонова, 1985; Исмагилов, Валуев, 2023б; Исмагилов, 2025б]. В смешанных лесах с обилием вересковых ягодных.

7362. *Phaiogramma etruscaria* (Zeller, 1849) – Стбш, Шарн [Исмагилов, 2025б]. По степям

7363. *Thalera fimbrialis* (Scopoli, 1763) (=*bupleuraria* ([Denis et Schiffermüller], 1775)) – на всей территории. По прогреваемым и остепненным лугам, отчасти по прилегающим сегетальным пустырям.

Подсемейство Desmobathrinae

7364. *Gypsochroa renitidata* (Hübner, [1817]) – центральные, южные, горно-лесные, юго-восточные р-ны [Соколов, 1897; Антонова, 1985; Исмагилов и др., 2021б; Горбунов, 2023; Исмагилов, Валуев, 2023б; Исмагилов, 2025б]. В степях и сухих склонах.

Подсемейство Archiearinae

? *Archiearis notha* (Hübner, [1803]) – Бурз [Соколов, 1897] (?). Этот вид встречается гораздо локальнее, чем *Archiearis parthenias* и требует подтверждения фактическим материалом. По прогреваемым лесным просекам с участием осины (*Populus tremula*).

7365. *Archiearis parthenias* (Linnaeus, [1760]) – на всей территории. Встречается в березняках всех типов, преимущественно по опушкам и полянам.

Подсемейство Ennominae

Триба Gnophini Duponchel, 1845

7366. *Angerona prunaria* (Linnaeus, 1758) – на всей территории. В лесах и посадках различных типов.

7367. *Aspitates gilvaria* ([Denis et Schiffermüller], 1775) – Учлн, Куюр, Мелз [Исмагилов и др., 2021б; Горбунов, 2023; Исмагилов, 2025б]. По ксерофитным степным участкам.

7368. *Aspitates mundataria* (Stoll, 1782) – Хайб [Исмагилов и др., 2021б]. По степям.

7369. *Charissa olschwangi* P. Gorbunov, 2023 – Учлн [Горбунов, 2023]. В горной петрофитной степи.

? *Charissa ochrofasciata* (Staudinger, 1896) (*creperaria* auct.) – Абзл (?), Учлн (?) [Исмагилов и др., 2022; Горбунов, 2023] – в цит. работах приводился только по фотографиям наблюдений. Для более достоверного определения требуется исследование генитальных структур.

7370. *Dyscia conspersaria* ([Denis et Schiffermüller], 1775) – Ишмб, Белб, Бурз, Учлн [Grosser, 1983; Антонова, 1985; Ахола и др., 1997; Хабибуллин, 2017б; Горбунов, 2023; Исмагилов, 2025б]. По степным склонам.

7371. *Hypoxystis pluviaria* (Fabricius, 1787) (=*adspersaria* (Hübner, 1790)) – на всей территории. По прогреваемым лугам и лесным полянам.

7372. *Kemtrognophos ambiguata* (Duponchel, 1830) (=*sheljuzhkoi* (Schawerda, 1924)) – северные, центральные, южные, горно-лесные, юго-восточные р-ны [Schawerda, 1924; Антонова, 1985; Горбунов, 2023; Исмагилов, 2025б]. По сухим полянам и опушкам старых сосняков на песчаных почвах.

7373. *Megalycinia strictaria* Lederer, 1853 – Хайб [Ахола и др., 1997]. По открытым биотопам.

7374. *Perconia strigillaria* (Hübner, 1787) – Альш, Учлн [Круликовский, 1904; Горбунов, 2023]. Характерен для опушек песчаных сосняков с верещатниками.

7375. *Siona lineata* (Scopoli, 1763) (=*dealbata* (Linnaeus, 1767)) – на всей территории. По лугам всех типов.

7376. *Synopsia sociaria* (Hübner, [1799]) – центральные, южные, юго-восточные р-ны [Ахола и др., 1997; Горбунов, 2023; Исмагилов, 2025б]. По ксерофитным участкам.

Триба Odontoperini Tutt, 1896

7377. *Crocallis elinguaria* (Linnaeus, 1758) – Уфа, Учлн, Байм, Блвщ [Хабибуллин, 2017б; Горбунов, 2023; Исмагилов, 2025б]. Характерен для старых лесов неморального типа.

7378. *Odontopera bidentata* (Clerck, 1759) – Уфа, Бурз, Блрц, Учлн [Антонова, 1985; Ахола и др., 1997; Горбунов, 2023]. В старых смешанных и широколиственных лесах.

Триба Ennomini Duponchel, 1845 (s. str., sensu Beljaev, 2008)

7379. *Ennomos autumnaria* (Werneburg, 1859) – на всей территории. Преимущественно в лесах и посадках неморального типа.
7380. *Ennomos erosaria* ([Denis et Schiffermüller], 1775) – северные, центральные, южные, горно-лесные р-ны [Антонова, 1985; Трофимова, 2003; Паженков и др., 2005; Исмагилов, 2025б]. В лесах и старых посадках различных типов.
7381. *Ennomos quercinaria* (Hufnagel, 1767) – северные, центральные, южные, горно-лесные р-ны [Антонова, 1985; Трофимова, 2003; Паженков и др., 2005; Исмагилов, 2025б]. В широколиственных лесах и садово-парковых насаждениях.
7382. *Ourapteryx sambucaria* (Linnaeus, 1758) – Бурз, Ермк, Кушн, Учлн [Хабибуллин, 2017б; Исмагилов и др., 2022]. Преимущественно в широколиственных лесах и посадках.

Триба Rumiini Tutt, 1896

7383. *Opisthograptis luteolata* (Linnaeus, 1758) (=*crataegata* (Linnaeus, [1760])) – на всей территории. Характерен для лесов и старых посадок неморального облика.

Триба Campaeini Forbes, 1948

7384. *Hylaea fasciaria* (Linnaeus, 1758) – Бурз, Учлн, Уфмс, Кушн, Нефтекамск [Антонова, 1985; Горбунов, 2023; Исмагилов, 2023]. В хвойных и смешанных лесах.

Триба Alsophilini Herbulot, 1962

7385. *Alsophila aescularia* ([Denis et Schiffermüller], 1775) – Уфа, Уфмс, Абзл, Дувн, Иглн [Антонова, 1985; Исмагилов, 2025б]. Характерен преимущественно для лиственных лесов и старых посадок.

Триба Prosopolophini Warren, 1894 (=Colotoini Wehrli, 1940)

7386. *Colotois pennaria* (Linnaeus, [1760]) – Крмс [Исмагилов, 2023]. По лиственным и смешанным лесам.

Триба Diptychini Janse, 1933 (=Lithinini Forbes, 1948)

7387. *Petrophora chlorosata* (Scopoli, 1763) (=*petraria* (Hübner, 1799)) – на всей территории. В смешанных лесах по опушкам и полянам с обилием папоротника орляка.

Триба Epirranthini Forbes, 1948

7388. *Epirranthis diversata* ([Denis et Schiffermüller], 1775) – Нефтекамск [Исмагилов, 2023]**.** В старых смешанных лесах, преимущественно по полянам и сфагновым болотам.

Триба Baptini Forbes, 1948 (=Theriini Herbulot, 1963)

7389. *Lomographa bimaculata* (Fabricius, 1775) – северные, центральные, южные, юго-восточные р-ны [Антонова, 1985; Горбунов, 2023; Исмагилов, 2025б]. В лесах и посадках различных типов.
7390. *Lomographa temerata* ([Denis et Schiffermüller], 1775) – северные, центральные, южные, юго-восточные р-ны [Круликовский, 1897; Антонова,

1985; Горбунов, 2023; Исмагилов, 2025б]. Преимущественно в хвойно-широколиственных и широколиственных лесах.

Триба Epionini Bruand, 1846

7391. *Epione repandaria* (Hufnagel, 1767) (=*apicaria* ([Denis et Schiffermüller], 1775)) – Блвщ, Иглн [Grosser, 1983; Исмагилов, 2025б]. Преимущественно в старых лесах различных типов.

7392. *Epione vespertaria* (Linnaeus, 1767) (=*paralellaria* ([Denis et Schiffermüller], 1775)) – центральные, южные, горно-лесные, юго-восточные р-ны [Антонова, 1985; Трофимова, 2003; Паженков и др., 2005; Горбунов, 2023; Исмагилов, 2025б]. Преимущественно в старых лесах различных типов.

Триба Hypochrosini Guinée, 1858

7393. *Cepphis advenaria* (Hübner, [1790]) – северные, центральные, горно-лесные, юго-восточные р-ны [Антонова, 1985; Чаус, Биктимерова, 2019; Горбунов, 2023; Исмагилов, 2025б]. Преимущественно в старых влажноватых смешанных и лиственных лесах под их пологом.

7394. *Plagodis dolabraria* (Linnaeus, 1767) – на всей территории. В лесах и посадках различных типов.

7395. *Plagodis pulveraria* (Linnaeus, 1758) – Альш, Учлн, Блрц, Дувн, Нефтекамск [Круликовский, 1904; Мигранов и др., 2020а; Горбунов, 2023; Исмагилов, Валуев, 2023б; Исмагилов, 2025б]. В старых смешанных и широколиственных лесах; держится в травянисто-кустарниковом ярусе.

7396. *Pseudopanthera macularia* (Linnaeus, 1758) – на всей территории. В старых смешанных лесах по разрежениям, опушкам, полянам.

7397. *Selenia dentaria* (Fabricius, 1775) (=*bilunaria* (Esper, 1801)) – северные, центральные, горно-лесные, юго-восточные р-ны [Антонова, 1985; Ахола и др., 1997; Горбунов, 2023; Исмагилов, 2025б]. Преимущественно в хвойно-широколиственных и широколиственных лесах.

7398. *Selenia lunularia* (Hübner, 1788) – центральные, южные, горно-лесные, юго-восточные р-ны [Исмагилов и др., 2020; Горбунов, 2023; Исмагилов, 2025б]. Преимущественно в хвойно-широколиственных и широколиственных лесах.

7399. *Selenia tetralunaria* (Hufnagel, 1767) (=*illustraria* (Hübner, 1799)) – на всей территории. Преимущественно в хвойно-широколиственных и широколиственных лесах.

Триба Apeirini Kuznetzov et Stekolnikov, 1982

7400. *Apeira syringaria* (Linnaeus, 1758) – северные, центральные, южные, горно-лесные р-ны [Grosser, 1983; Бакалова, 2016; Хабибуллин, 2017б; Исмагилов, 2025б]. Преимущественно в широколиственных лесах и посадках.

Триба Caberini Duponchel, 1845

7401. *Cabera exanthemata* (Scopoli, 1763) – на всей территории. В лесах и посадках различных типов, особенно в мелколиственных.

7402. *Cabera pusaria* (Linnaeus, 1758) – на всей территории. В лесах и посадках различных типов.

Триба Macariini Guinée, 1858 (s.l., sensu Beljaev, 2006) (=Abraxini Warren, 1893; =Cassymini Holloway, 1994)

7403. *Abraxas grossulariata* (Linnaeus, 1758) – на всей территории. В остепненных широколиственных лесах.

7404. *Abraxas sylvata* (Scopoli, 1763) – на всей территории. В хвойно-широколиственных и разреженных широколиственных лесах.

7405. *Chiasmia aestimaria* (Hübner, [1809]) – без местонахождений [Anikin et al., 2017]. Характерен для солончаковых степей и лугов.

7406. *Chiasmia clathrata* (Linnaeus, 1758) – на всей территории. По лугам.

7407. *Chiasmia saburraria* (Eversmann, 1851) – без местонахождений [Anikin et al., 2017]. Характерен для солончаковых степей и лугов.

7408. *Heliomata glarearia* ([Denis et Schiffermüller], 1775) – на всей территории. По остепненным участкам и прилегающим прогреваемым лугам.

7409. *Isturgia arenacearia* ([Denis et Schiffermüller], 1775) – центральные, южные, горно-лесные, юго-восточные р-ны [Антонова, 1985; Исмагилов, Валуев, 2023б; Исмагилов, 2025б]. По лугам и остепненным участкам.

7410. *Isturgia murinaria* ([Denis et Schiffermüller], 1775) – на всей территории. Ксеромезофильный луговой вид, по сухим разнотравным и остепненным участкам.

? *Isturgia roraria* (Fabricius, [1777]) (=*spartiaria* (Treitschke, 1827)) – Учлн [Ахола и др., 1997] (?). Указание является чуть ли не единственной современной находкой для России этого сложно определяемого вида, в связи с чем требует подтверждения.

7411. *Lomaspilis cararia* (Hübner, [1790]) – Уфа [Антонова, 1985]. Характерен для старых лесов неморального облика.

7412. *Lomaspilis marginata* (Linnaeus, 1758) – на всей территории. В лесах и посадках различных типов.

7413. *Lomaspilis nigrita* Heydemann, 1936 (*opis* auct.) – Блрц, Давл, Учлн [Ахола и др., 1997; Исмагилов и др., 2021а; Горбунов, 2023]. В старых смешанных и, отчасти, в широколиственных лесах.

7414. *Macaria alternata* ([Denis et Schiffermüller], 1775) – на всей территории. В лесах и, отчасти, посадках различных типов.

7415. *Macaria artesiaria* ([Denis et Schiffermüller], 1775) – Клтс, Куюр, Учлн, Кушн [Антонова, 1985; Горбунов, 2023; Исмагилов, 2023]. Характерен для старых смешанных лесов.

7416. *Macaria brunneata* (Thunberg, 1784) – без местонахождений [Anikin et al., 2017]. В смешанных лесах с черничниками.

? *Macaria carbonaria* (Clerck, 1759) – приводился в т.ч. из лесного Оренбуржья [Eversmann, 1844]. Наличие вида по крупным верховым болотам РБ не должно вызывать сомнения, но требует подтверждения современным материалом.

7417. *Macaria continuaria* (Eversmann, 1852) – Уфа [Исмагилов, 2025б]. По лесам и посадкам с участием лиственницы сибирской (*Larix sibirica*).

7418. *Macaria liturata* (Clerck, 1759) – на всей территории. В хвойных и смешанных лесах и посадках.
7419. *Macaria loricaria* (Eversmann, 1837) – Стмк [Антонова, 1985]. Характерен для старых смешанных лесов.
7420. *Macaria notata* (Linnaeus, 1758) – на всей территории. В лесах и, отчасти, посадках различных типов.
7421. *Macaria signaria* (Hübner, [1809]) – северные, центральные, горно-лесные, юго-восточные р-ны [Grosser, 1983; Антонова, 1985; Ахола и др., 1997; Горбунов, 2023; Исмагилов, 2025б]. В ельниках.
7422. *Macaria wauaria* (Linnaeus, 1758) (*wavaria* auct., error) – Клтс, Учлн [Антонова, 1985; Горбунов, 2023]. В смешанных лесах и садово-парковых ценозах.
7423. *Narraga fasciolaria* (Hufnagel, 1767) – Чишм, Куюр, Бурз [Круликовский, 1897; Антонова, 1985]. По сухим разнотравным боровым полянам и лугам на песчаных почвах.

Триба Boarmiini Duponchel, 1845

(=Hiberniini Duponchel, 1845; =Bistonini Stephens, 1850; =Bupalini Patočka, 1978)

7424. *Aethalura punctulata* ([Denis et Schiffermüller], 1775) – на всей территории. В лесах и посадках всех типов с участием берёз (*Betula* spp.).
7425. *Agriopis leucophaearia* ([Denis & Schiffermüller], 1775) – Уфа [Исмагилов, 2025б]. В лесостепных дубравах.
7426. *Agriopis marginaria* (Fabricius, [1777]) – Уфа, Чишм, Учлн [Антонова, 1985; Горбунов, 2023; Исмагилов, 2025б]. Преимущественно в лиственных лесах и старых посадках.
7427. *Alcis deversata* (Staudinger, 1892) – Абзл, Уфмс, Учлн [Исмагилов и др., 2020; Горбунов, 2023]. Характерен для старых сосново-смешанных лесов на песчаных почвах.
7428. *Alcis jubata* (Thunberg, 1788) – Блрц [Исмагилов и др., 2021а]. Характерен для старых хвойных и смешанных лесов.
7429. *Alcis repandata* (Linnaeus, 1758) – на всей территории. В лесах и посадках различных типов.
7430. *Apocheima hispidaria* ([Denis et Schiffermüller], 1775) – Блвщ, Иглн, Крмс, Гафр, Уфа [Антонова, 1985; Исмагилов, 2023, 2025б]. Характерен преимущественно для широколиственных лесов.
7431. *Ascotis selenaria* ([Denis et Schiffermüller], 1775) – северные, центральные, южные, юго-восточные р-ны [Ахола и др., 1997; Горбунов, 2023; Исмагилов, Валуев, 2023б; Исмагилов, 2025б]. Характерен для остепненных широколиственных лесов и посадок.
7432. *Biston betularia* (Linnaeus, 1758) – на всей территории. В лесах и посадках различных типов.
7433. *Biston strataria* (Hufnagel, 1767) – северные, центральные, горно-лесные, юго-восточные р-ны [Антонова, 1985; Горбунов, 2023; Исмагилов, 2025б].

Характерен преимущественно для широколиственных лесов и старых посадок.

7434. *Boarmia roboraria* ([Denis et Schiffermüller], 1775) – на всей территории. В лесах и посадках различных типов.

7435. *Bupalus piniaria* (Linnaeus, 1758) – на всей территории. В сосновых лесах.

7436. *Cleora cinctaria* ([Denis et Schiffermüller], 1775) – на всей территории. В лесах и посадках различных типов.

7437. *Deileptenia ribeata* (Clerck, 1759) – Нурм, Блрц, Нефтекамск [Grosser, 1983; Исмагилов и др., 2021б; Исмагилов, 2025б]. В старых смешанных и хвойных лесах.

7438. *Ectropis crepuscularia* ([Denis et Schiffermüller], 1775) (=*bistortata* (Goeze, 1781)) – на всей территории. В лесах и посадках различных типов, особенно в березовых.

7439. *Ematurga atomaria* (Linnaeus, 1758) – на всей территории. По лугам всех типов, полям, травянистым пустырям, а также лесным опушкам.

7440. *Erannis defoliaria* (Clerck, 1759) – без местонахождений [Положенцев, Ханисламов, 1962; Мигранов, Саттаров, 2006]. Преимущественно в лесах и посадках неморального облика.

7441. *Hypomecis punctinalis* (Scopoli, 1763) – на всей территории. В лесах и посадках различных типов.

7442. *Lycia hirtaria* (Clerck, 1759) – на всей территории. В лесах и посадках различных типов.

7443. *Lycia pomonaria* (Hübner, 1790) – северные, северо-восточные, центральные, горно-лесные р-ны [Антонова, 1985; Исмагилов, 2025б]. Характерен преимущественно для широколиственных лесов и старых посадок.

7444. *Paradarisa consonaria* (Hübner, [1799]) – северные, центральные, горно-лесные р-ны [Антонова, 1985; Мигранов и др., 2020а; Исмагилов, Валуев, 2023б; Исмагилов, 2025б]. Преимущественно в смешанных лесах.

7445. *Parectropis similaria* (Hufnagel, 1767) (=*luridata* (Borkhausen, 1894)) – северные, центральные, южные, юго-восточные р-ны [Круликовский, 1904; Исмагилов и др., 2020; Горбунов, 2023; Исмагилов, 2025б]. В лесах и старых посадках неморального типа.

7446. *Peribatodes rhomboidaria* ([Denis et Schiffermüller], 1775) – Илиш, Учлн, Куюр [Исмагилов и др., 2022; Горбунов, 2023; Исмагилов, 2025б]. Характерен для остепненных широколиственных лесов.

7447. *Phigalia pilosaria* ([Denis et Schiffermüller], 1775) (=*pedaria* (Fabricius, 1787)) – северные, центральные, южные, северо-восточные р-ны [Антонова, 1985; Хабибуллин, 2018а; Исмагилов, 2025б]. Характерен преимущественно для лиственных лесов и старых посадок.

7448. *Phyllometra culminaria* (Eversmann, 1843) – без местонахождений [Anikin et al., 2000b (?), 2017; Трофимова, 2006б, 2015]. По сухим степям.

7449. *Selidosema plumaria* ([Denis et Schiffermüller], 1775) – Бурз, Крмс, Мелз [Антонова, 1985; Исмагилов, 2025б]. По сухим степным участкам.

7450. *Spartopteryx kindermannaria* (Staudinger, 1871) – Хайб [Ахола и др., 1997]. По степям.

Серия Bombyciformes (Н.Н. Исмагилов)

Надсемейство Lasiocampoidea

Семейство Lasiocampidae – Коконопряды (19 видов)

Подсемейство Poecilocampinae

7451. *Poecilocampa populi* (Linnaeus, 1758) – Учлн [Горбунов, 2023; Исмагилов, 2025б]. В широколиственных и смешанных лесах и посадках.

7452. *Trichiura crataegi* (Linnaeus, 1758) – Учлн, Зиан, Кушн, Крмс, Мелз [Горбунов, 2023; Исмагилов, 2023, 2025б]. Характерен для старовозрастных лесов.

Подсемейство Malacosominae

7453. *Malacosoma castrensis* (Linnaeus, 1758) – южные, горно-лесные, юго-восточные р-ны [Исмагилов и др., 2020; Горбунов, 2023; Исмагилов, 2025б]. Характерен для ксерофитных (особенно боровых) и хорошо прогреваемых мезофитных лесных полян и опушек.

7454. *Malacosoma neustria* (Linnaeus, 1758) – на всей территории. В лесах и посадках различных типов.

Подсемейство Lasiocampinae

7455. *Cosmotriche lobulina* ([Denis et Schiffermüller], 1775) – Блрц, Учлн, Абзл [Ахола и др., 1997; Nupponen, Fibiger, 2002; Горбунов, 2023; Исмагилов, 2025б]. В хвойных и смешанных лесах.

7456. *Dendrolimus pini* (Linnaeus, 1758) – на всей территории. В основном в старовозрастных сосняках.

7457. *Dendrolimus superans* (Butler, 1881) (=*sibiricus* Tshetvericov, 1908) – на всей территории Зауралья. В лесах и посадках лиственницы (*Larix sibirica*).

7458. *Eriogaster lanestris* (Linnaeus, 1758) – Кркм, Байм, Слвт, Стмк [Исмагилов и др., 2021а; Исмагилов, 2025б]. Характерен для смешанно-мелколиственных лесов.

7459. *Eriogaster neogena* (Fischer von Waldheim, 1824) – Учлн, Кушн, Блвр [Nupponen, Fibiger, 2002; Исмагилов и др., 2021б; Исмагилов, 2023]. По ксерофитным участкам и пустшам.

7460. *Euthrix potatoria* (Linnaeus, 1758) – на всей территории. В лесных ландшафтах и около посадок по редколесьям, опушкам, полянам и прилегающим открытым местам

7461. *Gastropacha populifolia* ([Denis et Schiffermüller], 1775) – Учлн, Абзл, Кушн [Nupponen, Fibiger, 2002; Исмагилов, 2025б]. Преимущественно в широколиственных лесах.

7462. *Gastropacha quercifolia* (Linnaeus, 1758) – на всей территории. Преимущественно в старовозрастных хвойно–широколиственных и широколиственных лесах.

7463. *Lasiocampa quercus* (Linnaeus, 1758) – на всей территории. Преимущественно в борах-зеленомошниках, реже (в южных районах) в широколиственных лесах.
7464. *Macrothylacia rubi* (Linnaeus, 1758) – на всей территории. Преимущественно по лесным опушкам, полянам, посадкам, по прилегающим открытым местам.
7465. *Odonestis pruni* (Linnaeus, 1758) – на всей территории. Преимущественно в изреженных широколиственных лесах
7466. *Pachygastria trifolii* ([Denis et Schiffermüller], 1775) (=*medicaginis* (Borkhausen, 1793)) – центральные, южные, юго-восточные р-ны [Nupponen, Fibiger, 2002; Исмагилов и др., 2020; Горбунов, 2023; Исмагилов, 2025б]. Характерен для ксерофитных боровых полян на песчаных почвах и остепненных участков.
7467. *Phyllodesma ilicifolia* (Linnaeus, 1758) – Учлн, Уфа [Nupponen, Fibiger, 2002; Горбунов, 2023; Исмагилов, 2025б]. Характерен для смешанных лесов.
7468. *Phyllodesma japonica* (Leech, 1888) – Учлн [Горбунов, 2023]
7469. *Phyllodesma tremulifolia* (Hübner, [1810]) (=*betulifolia* (Ochsenheimer, 1810)) – Учлн, Кушн, Стмк, Туйм [Nupponen, Fibiger, 2002; Исмагилов, 2025б]. В лесах различных типов.

Семейство Lemoniidae – Осенние шелкопряды (2 вида)

7470. *Lemonia dumi* (Linnaeus, [1760]) – Крмс, Туйм [Исмагилов и др., 2021б; Мигранов, 2023а]. Преимущественно по прогреваемым открытым местам с травянистой растительностью.
7471. *Lemonia taraxaci* ([Denis et Schiffermüller], 1775) – Мелз (?), Кгрч, Альш, Чекм [Паженков и др., 2005; Трофимова, 2006б, 2015; Мигранов, 2023б]. Указание о находке вида в долине реки Нугуш (Мелз) [Паженков и др., 2005] не подтверждается в последующих работах. Характерен для сухих боровых полян и остепненных участков.

Семейство Endromidae – Березовые шелкопряды (1 вид)

7472. *Endromis versicolora* (Linnaeus, 1758) – на всей территории. Преимущественно в старовозрастных лесах и лесопарках с участием берез (*Betula* spp.).

Надсемейство Bombycoidea

Семейство Saturniidae – Павлиноглазки (2 вида, наличие еще 1 не подтверждено)

Подсемейство Agliinae

7473. *Aglia tau* (Linnaeus, 1758) – на всей территории. Преимущественно в старых смешанных и лиственных лесах с густым подлеском.

Подсемейство Saturniinae

? *Eudia spini* ([Denis et Schiffermüller], 1775) – Абзл [Туркменова, 2016] (?). Указывался по данным онлайн базы Уральского института экологии растений и животных. В данном случае невозможно подтвердить достоверность материала, он мог ошибочно идентифицирован вместо самки *E. pavonia.*

Характерен для степных меловых склонов.

7474. *Eudia pavonia* (Linnaeus, 1758) (=*carpini* ([Denis et Schiffermüller], 1775)) – на всей территории. В лесах и, отчасти, посадках различных типов.

Надсемейство Sphingoidea

Семейство Sphingidae – Бражники (21 вид)

Подсемейство Smerinthinae

Триба Mimatini Tutt, 1902

7475. *Mimas tiliae* (Linnaeus, 1758) – на всей территории. В лесах и посадках различных типов.

Триба Smerinthini Grote & Robinson, 1865

7476. *Laothoe amurensis* (Staudinger, 1892) – на всей территории. В старовозрастных смешанных и лиственных лесах.

7477. *Laothoe populi* (Linnaeus, 1758) – на всей территории. В лесах и посадках различных типов, отчасти по прилегающим открытым местам.

7478. *Smerinthus caecus* Ménétries, 1857 – на всей территории. В старовозрастных смешанных и лиственных лесах.

7479. *Smerinthus ocellata* (Linnaeus, 1758) – на всей территории. В лесах и посадках различных типов, отчасти по прилегающим открытым местам.

Подсемейство Sphinginae

Триба Sphingini Latreille, [1802]

7480. *Acherontia atropos* (Linnaeus, 1758) – Кгрч, Шарн [Мигранов, 2021а; Исмагилов и др., 2020]. Южный мигрант.

7481. *Agrius convolvuli* (Linnaeus, 1758) – Бурз, Альш [Бакалова, 2016; Мигранов, 2021а]. Южный мигрант.

7482. *Hyloicus pinastri* (Linnaeus, 1758) – на всей территории. В основном в старых сосняках.

7483. *Sphinx ligustri* Linnaeus, 1758 – на всей территории. Встречается в хвойно-широколиственных и широколиственных лесах, лесопарках.

7484. *Sphinx morio* (Rothschild & Jordan, 1903) – Абзл [Исмагилов, 2025б]. В хвойных и смешанных лесах с участием лиственницы (*Larix sibirica*).

Подсемейство Macroglossinae

Триба Hemarini Tutt, 1902

7485. *Hemaris fuciformis* (Linnaeus, 1758) – на всей территории. В различных ландшафтах по лесным опушкам, полянам, лугам.

7486. *Hemaris tityus* (Linnaeus, 1758) (=*bombyliformis* (Linnaeus, 1758)) – на всей территории. В основном по остепненным и прогреваемым разнотравным участкам.

Триба Dilophonotini Burmeister, 1878

7487. *Proserpinus proserpina* (Pallas, 1772) – Кгрч, Кушн, Байм, Учлн, Октябрьский [Мигранов, 2021а, 2022в; Исмагилов и др., 2021б; Горбунов, 2023; Исмагилов, 2025б]**.** Характерен для остепненных участков и прилегающих прогреваемых лугов.

Триба Macroglossini Harris, 1839

7488. *Deilephila elpenor* (Linnaeus, 1758) – на всей территории. Развивается в основном в мезофитных биотопах, но бабочки широко разлетаются по открытым местам.
7489. *Deilephila porcellus* (Linnaeus, 1758) – на всей территории. В основном по разнотравным опушкам, полянам и лугам.
7490. *Hyles euphorbiae* (Linnaeus, 1758) – на всей территории. По остепненным участкам с участием молочаев (*Euphorbia* spp.).
7491. *Hyles gallii* (Rottemburg, 1775) (*galii* auct., error) – на всей территории. По разнотравным лугам, лесным опушкам и полянам.
7492. *Hyles hippophaes* (Esper, [1789]) – Куюр, Хайб, Кумертау [Исмагилов и др., 2020; Исмагилов, 2025б].
7493. *Hyles livornica* (Esper, [1780]) (*lineata* auct.*)* – Бурз [Бакалова, 2016]. Южный мигрант.
7494. *Macroglossum stellatarum* (Linnaeus, 1758) – на всей территории. Встречается в основном по открытым прогреваемым местам. Первая генерация представлена в основном южными мигрантами.
7495. *Neopterodonta gorgoniades* (Hübner, [1819]) – Учлн [Горбунов, 2023]. По степям.

Серия Noctuiformes (Н.Н. Исмагилов)

Надсемейство Notodontoidea

Семейство Notodontidae – Хохлатки (31 вид, наличие еще 2 не подтверждено)

Подсемейство Pygaerinae

7496. *Clostera albosigma* Fitch, 1856 – Учлн [Горбунов, 2023]. Преимущественно по смешанным лесам таежного типа.
7497. *Clostera anachoreta* ([Denis et Schiffermüller], 1775) – Блрц, Бурз, Уфа, Нефтекамск [Nupponen, Fibiger, 2002; Хабибуллин, 2017б; Исмагилов, 2025б]. В лесах и посадках различных типов.
7498. *Clostera anastomosis* (Linnaeus, 1758) – северные, центральные, южные, юго-восточные р-ны [Исмагилов и др., 2020; Исмагилов, 2025б]. Характерен для старовозрастных лесов различных типов.
7499. *Clostera curtula* (Linnaeus, 1758) – северные, центральные, горно-лесные, юго-восточные р-ны [Nupponen, Fibiger, 2002; Горбунов, 2023; Исмагилов, 2025б]. В лесах и посадках различных типов.
7500. *Clostera pigra* (Hufnagel, 1766) (=*reclusa* ([Denis et Schiffermüller], 1775)) – Чишм, Бурз, Учлн, Кушн, Стбш [Круликовский, 1897; Хабибуллин, 2017б; Горбунов, 2023; Исмагилов, 2025б]. В старовозрастных лесах и посадках различных типов.
7501. *Gluphisia crenata* (Esper, [1785]) – на всей территории. В основном в старовозрастных смешанных и лиственных лесах.

7502. *Pygaera timon* (Hübner, [1803]) – Блрц, Бурз [Nupponen, Fibiger, 2002; Исмагилов, 2023]. В старовозрастных смешанных лесах.

Подсемейство Spataliinae

7503. *Pterostoma palpina* (Clerck, 1759) – центральные, южные, горно-лесные, юго-восточные р-ны [Grosser, 1983; Исмагилов и др., 2020; Горбунов, 2023; Исмагилов, 2025б]. В лесах и посадках различных типов.

? *Spatalia argentina* ([Denis et Schiffermüller], 1775) – без местонахождений [Мигранов, Саттаров, 2006] (?). Требуется подтверждение фактическим материалом. Характерен для перелесков лесостепи.

Подсемейство Phalerinae

7504. *Phalera bucephala* (Linnaeus, 1758) – на всей территории. В лесах и посадках различных типов.

Подсемейство Notodontinae

7505. *Cerura erminea* (Esper, [1783]) – северные, центральные, южные, юго-восточные р-ны [Ахола и др., 1997; Загорская, 2019; Горбунов, 2023; Исмагилов, 2025б]. Гусеницы развиваются на ивовых.

7506. *Cerura vinula* (Linnaeus, 1758) – на всей территории. В старых лесах и посадках с участием ивовых (Salicaceae).

? *Dicranura ulmi* ([Denis et Schiffermüller], 1775) – Альш [Круликовский, 1904] (?). приводился лишь по гусеницам в июле. Современное нахождение вида в РБ возможно, но требует подтверждения. В остепненных лесах.

7507. *Drymonia dodonaea* ([Denis et Schiffermüller], 1775) – Зиан, Крмс, Кушн [Nupponen, Fibiger, 2002; Исмагилов, 2025б]. В старовозрастных широколиственных лесах и посадках с участием дуба (*Quercus robur*).

7508. *Drymonia ruficornis* (Hufnagel, 1766) – Крмс, Кушн, Уфмс [Трофимова, 2006б; Исмагилов и др., 2020; Исмагилов, 2025б]. Преимущественно в широколиственных лесах с участием дуба (*Quercus robur*).

7509. *Furcula aeruginosa* (Christoph, 1872) – Кушн, Чекм [Исмагилов и др., 2021а; Исмагилов, 2025б]. Характерен для долин степных рек с древесно-кустарниковой растительностью.

7510. *Furcula bicuspis* (Borkhausen, 1790) – центральные, южные, горно-лесные, юго-восточные р-ны [Ахола и др., 1997; Nupponen, Fibiger, 2002; Горбунов, 2023; Исмагилов, 2025б]. Характерен для старовозрастных лесов.

7511. *Furcula bifida* (Brahm, 1787) – центральные, южные, горно-лесные, юго-восточные р-ны [Ахола и др., 1997; Nupponen, Fibiger, 2002; Горбунов, 2023; Исмагилов, 2025б]. Характерен для старовозрастных лесов.

7512. *Furcula furcula* (Clerck, 1759) – Блрц, Байм, Кушн [Ахола и др., 1997; Nupponen, Fibiger, 2002; Исмагилов, 2025б]. В старых лесах и посадках различных типов.

7513. *Leucodonta bicoloria* ([Denis et Schiffermüller], 1775) – Блрц, Байм, Учлн [Ахола и др., 1997; Nupponen, Fibiger, 2002; Горбунов, 2023]. В старовозрастных смешанных и лиственных лесах.

7514. *Notodonta dromedarius* (Linnaeus, 1767) – на всей территории. В лесах и посадках различных типов.
7515. *Notodonta torva* (Hübner, [1809]) – Блрц, Стбш [Ахола и др., 1997; Nupponen, Fibiger, 2002; Исмагилов, 2023, 2025б]. Характерен для старовозрастных смешанных и лиственных лесов.
7516. *Notodonta tritophus* ([Denis et Schiffermüller], 1775) (=*phoebe* (Siebert, 1790)) – центральные, горно-лесные, юго-восточные р-ны [Ахола и др., 1997; Nupponen, Fibiger, 2002; Горбунов, 2023; Исмагилов, 2025б]. В лесах и посадках различных типов.
7517. *Notodonta ziczac* (Linnaeus, 1758) – на всей территории. В лесах и посадках различных типов.
7518. *Odontosia carmelita* (Esper, [1798]) – Блрц, Учлн [Ахола и др., 1997; Nupponen, Fibiger, 2002; Горбунов, 2023]. В смешанных и широколиственных лесах с участием березы (*Betula* spp.).
7519. *Odontosia sieversii* (Ménétries, 1856) – Нефтекамск [Исмагилов и др., 2021б]. В смешанных лесах с участием берез (*Betula* spp.).
7520. *Peridea anceps* (Goeze, 1781) – Уфа, Стбш [Положенцев, Ханисламов, 1962; Anikin et al., 2000a, 2017; Мигранов, Саттаров, 2006; Трофимова, 2006б, 2015; Хабибуллин, 2017б; Исмагилов, 2025б]. В смешанных и широколиственных лесах с участием дуба (*Quercus robur*).
7521. *Pheosia gnoma* (Fabricius, [1777]) (=*dictaeoides* Esper, 1789) – на всей территории. В лесах и посадках различных типов.
7522. *Pheosia tremula* (Clerck, 1759) (=*dictaea* (Linnaeus, 1767)) – на всей территории. В лесах и посадках различных типов, особенно в мелколиственных.
7523. *Ptilodon capucina* (Linnaeus, 1758) (=*camelina* (Linnaeus, 1758)) – центральные, горно-лесные, юго-восточные р-ны [Соколов, 1897; Ахола и др., 1997; Nupponen, Fibiger, 2002; Горбунов, 2023; Исмагилов, 2025б]. Преимущественно в старовозрастных лесах и посадках различных типов.
7524. *Ptilodon cucullina* ([Denis et Schiffermüller], 1775) – Блвщ [Исмагилов, 2023]. В остепненных широколиственных перелесках и лесопосадках с участием кленов (*Acer* spp.).
7525. *Ptilophora plumigera* ([Denis et Schiffermüller], 1775) – Нефтекамск, Уфа, Уфмс, Иглн, Мелз [Ризаева, Книсс, 2012; Хабибуллин, 2018а; Исмагилов, 2023; Исмагилов, 2025б]. В лесах и старых посадках с участием клена платановидного (*Acer platanoides*).
7526. *Stauropus fagi* (Linnaeus, 1758) – на всей территории. В старовозрастных лесах различных типов.

Надсемейство Noctuoidea

Семейство Nolidae – Нолиды (11 видов)

Подсемейство Nolinae

7527. *Meganola albula* ([Denis et Schiffermüller], 1775) – Чишм, Абзл [Круликовский, 1897; Исмагилов и др., 2022]. В широколиственных и смешанных лесах.
7528. *Meganola strigula* ([Denis et Schiffermüller], 1775) – Альш, Крмс [Круликовский, 1904; Исмагилов и др., 2022]. Преимущественно в хвойно-широколиственных лесах с участием дуб (*Quercus robur*).
7529. *Nola aerugula* (Hübner, 1793) (=*centonalis* (Hübner, 1796)) – на всей территории. В хвойно-широколиственных лесах и остепненных лиственных перелесках по разрежениям, опушкам и полянам.
7530. *Nola confusalis* (Herrich-Schäffer, [1847]) – Уфа, Учлн, Кушн [Исмагилов и др., 2020; Горбунов, 2023; Исмагилов, 2025б]. В старовозрастных смешанных и широколиственных лесах.

Подсемейство Chloephorinae

7531. *Bena bicolorana* (Fuesslin, 1775) – без местонахождений [Anikin et al., 2017]. Характерен для лесов неморального типа с участием дуба (*Quercus robur*).
7532. *Earias clorana* (Linnaeus, [1760]) – Уфа, Нурм, Блрц, Учлн, Уфмс [Grosser, 1983; Ахола и др., 1997; Nupponen, Fibiger, 2002; Горбунов, 2023; Исмагилов, 2025б]. Преимущественно по заболоченным и прибрежным лесным участкам с ивняками.
7533. *Earias vernana* (Fabricius, 1787) – Зиан [Nupponen, Fibiger, 2002]. По кустарникам и уремам долин степных рек.
7534. *Nycteola degenerana* (Hübner, [1799]) – Блрц, Учлн, Абзл, Крмс [Nupponen, Fibiger, 2002; Горбунов, 2023; Исмагилов, 2025б]. Преимущественно в старовозрастных лесах различных типов.
7535. *Nycteola eremostola* Dufay, 1961 – Кушн, Иглн [Исмагилов, 2023, 2025б]. Преимущественно по смешанным лесам на песчаных почвах.
7536. *Nycteola revayana* (Scopoli, 1772) – без местонахождений [Трофимова, 2015; Anikin et al., 2017]. Характерен для лесов и перелесков неморального типа.
7537. *Pseudoips prasinana* (Linnaeus, 1758) – центральные, южные, горно-лесные, юго-восточные р-ны [Круликовский, 1897; Положенцев, 1947; Nupponen, Fibiger, 2002; Горбунов, 2023; Исмагилов, 2025б]. В старых смешанных и широколиственных лесах и посадках.

Семейство Lymantriidae – Волнянки (15 видов, наличие еще 1 не подтверждено)

7538. *Arctornis l-nigrum* (Müller, 1764) – на всей территории [Исмагилов и др., 2020]. Преимущественно в широколиственных лесах.
7539. *Calliteara abietis* ([Denis et Schiffermüller], 1775) – без местонахождений [Трофимова, 2015; Anikin et al., 2017]. В старых лесах с участием елей (*Picea* spp.).
7540. *Calliteara pudibunda* (Linnaeus, 1758) – на всей территории. Преимущественно в старовозрастных смешанных, отчасти в широколиственных лесах.

7541. *Dicallomera fascelina* (Linnaeus, 1758) – центральные, южные, юго-восточные р-ны [Nupponen, Fibiger, 2002; Горбунов, 2023; Исмагилов, 2025б]. По разнотравным лугам и опушкам сосняков на песчаных почвах.
7542. *Euproctis chrysorrhoea* (Linnaeus, 1758) (=*phaeorrhoea* (Haworth, 1803)) – на всей территории. В остепненных широколиственных лесах. Преимущественно в смешанных лесах, реже – в лесах и посадках других типов.
7543. *Euproctis similis* (Fuesslin, 1775) – на всей территории. Преимущественно в смешанных лесах, реже – в лесах и посадках других типов.
7544. *Gynaephora pumila* (Staudinger, 1881) – Байм [Trofimova, 2008; «Красная ...», 2014; Трофимова, 2015]. Сухие горные степи с разреженной растительностью.
7545. *Gynaephora selenitica* (Esper, 1789) – Байм, Бурз, Кркм [Исмагилов и др., 2021б; Яныбаева, 2024; Исмагилов, 2025б]. По остепненным лесным опушкам и полянам.
7546. *Leucoma salicis* (Linnaeus, 1758) – на всей территории. В лесах и посадках различных типов с участием осины (*Populus tremula*).
7547. *Lymantria dispar* (Linnaeus, 1758) – на всей территории. В лесах и посадках различных типов, преимущественно по разрежениям, опушкам, полянам.
7548. *Lymantria monacha* (Linnaeus, 1758) – на всей территории. Преимущественно в смешанных лесах, реже в лесах и посадках других типов.
7549. *Orgyia antiqua* (Linnaeus, 1758) – на всей территории. Преимущественно в смешанных, отчасти в лиственных лесах по опушкам и полянам.
7550. *Orgyia antiquoides* (Hübner, [1822]) – Учлн, Бижб, Кушн, Байм [Nupponen, Fibiger, 2002; Мигранов и др., 2021б; Исмагилов и др., 2021б]. По степям, отчасти в смешанных лесах по опушкам и полянам.
7551. *Orgyia recens* (Hübner, [1819]) (=*gonostygma* (Linnaeus, 1767)) – Блрц, Дюрт, Кушн, Чишм, Уфа [Исмагилов и др., 2020; Исмагилов, 2025б]. В смешанных и широколиственных лесах по опушкам и полянам.
? Parocneria detrita (Esper, [1785]) – Альш [Круликовский, 1904] (?). Современное обитание вида в РБ требует подтверждения. Характерен для лесостепных дубрав.
7552. *Teia dubia* (Tauscher, 1806) – Ишмб, Хайб [Grosser, 1983; Исмагилов и др., 2021б]. Отмечается по солончакам.

Семейство Arctiidae – Медведицы (48 видов, наличие еще 1 не подтверждено)

Подсемейство Arctiinae

7553. *Arctia caja* (Linnaeus, 1758) – на всей территории. В различных лесных и облесенных ландшафтах по редколесьям, опушкам, полянам и прилегающим открытым местам.
7554. *Arctia flavia* (Fuesslin, 1779) – на всей территории. Преимущественно в старовозрастных смешанных лесах по опушкам и полянам.

7555. *Callimorpha dominula* (Linnaeus, 1758) – на всей территории. В старовозрастных хвойно-широколиственных лесах по опушкам и полянам.
7556. *Chelis caecilia* (Kindermann, 1853) – Учлн [Nupponen, Fibiger, 2006; Мигранов, 2021б; Горбунов, 2023]. По горным участкам.
7557. *Chelis dahurica* (Boisduval, 1832) – Бурз, Блрц, Учлн, Зиан, Абзл, Зилр [Дубатолов, 1988; Паженков и др., 2005; Nupponen, Fibiger, 2006; «Красная ...», 2014; Исмагилов и др., 2020; Мигранов, 2021б; Горбунов, 2023; Исмагилов, 2023; Рыбалкин, 2024]. По участкам горной разнотравно-злаковой степи.
7558. *Chelis maculosa* (Gerning, 1780) – повсеместно в лесостепной зоне. По остепненным участкам.
7559. *Coscinia cribraria* (Linnaeus, 1758) – северные, южные, горно-лесные, юго-восточные р-ны [Nupponen, Fibiger, 2002; Мигранов, 2021б; Горбунов, 2023; Исмагилов, 2025б]. Приурочен к соснякам, держится по прогреваемым разнотравным опушкам и полянам на песчаных почвах.
7560. *Diacrisia sannio* (Linnaeus, 1758) (=*russula* (Linnaeus 1758)) – на всей территории. По разнотравным лугам, лесным полянам и опушкам.
7561. *Diaphora mendica* (Clerck, 1759) – центральные, южные, горно-лесные, юго-восточные р-ны [Nupponen, Fibiger, 2002; Бакалова, 2016; Мигранов, 2021б; Валуев, Исмагилов, 2023б; Исмагилов, Валуев, 2023б; Исмагилов, 2025б]. В старовозрастных лесах по разнотравным опушкам, полянам, отчасти по прилегающим лугам и пустырям.
7562. *Epatolmis luctifera* ([Denis et Schiffermüller], 1775) (=*caesarea* (Goeze, 1781) – Нефтекамск [Мигранов, 2021б]. Преимущественно по остепненным участкам.
7563. *Epicallia villica* (Linnaeus, 1758) – на всей территории. Преимущественно в экосистемах смешанных и светлых лиственных лесов по прогреваемым опушкам и прилегающим открытым местам.
7564. *Eucharia festiva* (Hufnagel, 1766) (=*hebe* (Linnaeus, 1758)) – Альш, Абзл, Блрц, Байм, Уфа [Круликовский, 1904; Валуев, 2016б; Мигранов, Валуев, 2017б; Мигранов, 2021б; Исмагилов, 2025б]. В лесной зоне приурочен к сухим соснякам, держится по наиболее прогреваемым разнотравным опушкам и полянам на песчаных почвах или дюнах, в лесостепи – к степным участкам.
7565. *Euplagia quadripunctaria* (Poda, 1761) (=*hera* (Linnaeus, 1767)) – на всей территории. Приурочен к сухим соснякам и лесостепным перелескам на песчаных и известковых почвах, держится по наиболее прогреваемым разнотравным опушкам и полянам.
7566. *Holoarctia puengeleri* (O. Bang-Haas, 1927) (*cervini* auct.) – Блрц [Габидуллин, 1987; Ольшванг, Малоземов, 1987; Ахола и др., 1997; Nupponen, Fibiger, 2002; Паженков и др., 2005; «Красная ...», 2014; Мигранов, 2021б]. По каменистым тундрам верхнего пояса гор.

7567. *Hyphoraia aulica* (Linnaeus, 1758) – центральные, южные, горно-лесные, юго-восточные р-ны [Трофимова, 2006б; Хабибуллин, 2017б; Исмагилов и др., 2020; Мигранов и др., 2020б; Мигранов, 2021б; Исмагилов, Валуев, 2023б; Исмагилов, 2025б]. Преимущественно по остепненным участкам, в лесной зоне приурочен к соснякам на песчаных почвах.

? *Hyphantria cunea* (Drury, [1773]) – без местонахождений [Мигранов, Саттаров, 2006; Мигранов, 2021б] (?). Во второй цит. работе отмечено, что вид приведен на основе отчета лаборатории экологии лесных насекомых ИБ БФАН СССР. Однако, данный инвазивный вид распространен гораздо в более западных регионах и требует квалифицированного определения. Мог быть спутан с представителями аборигенной фауны рода *Spilosoma*.

7568. *Lacydes spectabilis* (Tauscher, 1806) – Хайб, Бурз [Мигранов, 2021б; Исмагилов, 2025б]. Южный мигрант.

7569. *Parasemia plantaginis* (Linnaeus, 1758) – на всей территории. В старовозрастных смешанных лесах, особенно в сосняках, по суховатым редколесьям, разнотравным опушкам и полянам.

7570. *Pericallia matronula* (Linnaeus, 1758) – на всей территории. Преимущественно в экосистемах старовозрастных смешанных лесов.

7571. *Phragmatobia fuliginosa* (Linnaeus, 1758) – на всей территории. Преимущественно по разнотравным опушкам и полянам, отчасти по прилегающим полям, пустырям.

7572. *Rhyparia purpurata* (Linnaeus, 1758) (=*purpurea* (Linnaeus, 1767)) – на всей территории. Приурочен к старовозрастным смешанным лесах, держится по прогреваемым разнотравным опушкам, полянам и торфяникам.

7573. *Rhyparioides metelkana* (Lederer, 1861) – Нефтекамск [Исмагилов и др., 2021б]. По опушкам смешанных лесов.

7574. *Spilarctia lutea* (Hufnagel, 1766) (*lubricipeda* auct.) – на всей территории. По прогреваемым лугам, лесным разрежениям, опушкам, полянам.

7575. *Spilosoma lubricipeda* (Linnaeus, 1758) (=*menthastri* ([Denis et Schiffermüller], 1775)) – на всей территории. В лесах и посадках всех типов и по прилегающим к ним открытым местам.

7576. *Spilosoma urticae* (Esper, 1789) – на всей территории. По прогреваемым лугам, лесных разрежениям, опушкам, полянам

7577. *Spiris striata* (Linnaeus, 1758) – на всей территории. По сухим соснякам, а также степным участкам и пустырям.

7578. *Tyria jacobaeae* (Linnaeus, 1758) – Чишм, Бурз, Кркм [Круликовский, 1897; Мигранов, 2021б; Валуев, Исмагилов, 2023а; Исмагилов, Валуев, 2023б]. Приурочен к лугам и полянам в лесу с участием якобеи обыкновенной (*Senecio jacobaea*).

7579. *Utetheisa pulchella* (Linnaeus, 1758) (=*pulchra* ([Denis et Schiffermüller], 1775)) – Блрц, Уфа [Мигранов, 2021б; Исмагилов и др., 2022]. По ксерофитным участкам, мигрант.

7580. *Watsonarctia deserta* (Bartel, 1903) (*casta* (Esper, 1785), nom. praeoc.) – центральные, южные, горно-лесные, юго-восточные р-ны [Ахола и др., 1997; Nupponen, Fibiger, 2002; Мигранов, 2021б; Горбунов, 2023; Исмагилов, 2025б]. По степным участкам.

Подсемейство Lithosiinae

7581. *Atolmis rubricollis* (Linnaeus, 1758) – на всей территории. Преимущественно в лиственных лесах и посадках.
7582. *Collita griseola* (Hübner, [1803]) – на всей территории. Преимущественно в старовозрастных лесах различных типов, отчасти в сыроватых посадках и лесопарках под их пологом и по опушкам.
7583. *Cybosia mesomella* (Linnaeus, 1758) – на всей территории. Преимущественно в старых смешанных, отчасти в лиственных лесах по разрежениям, опушкам и полянам.
7584. *Eilema complana* (Linnaeus, 1758) – на всей территории. В смешанных и разреженных широколиственных лесах преимущественно по опушкам и полянам.
7585. *Eilema lurideola* ([Zincken], 1817) – на всей территории. В старых смешанных лесах и в остепненных широколиственных перелесках.
7586. *Eilema lutarella* (Linnaeus, 1758) – на всей территории. В лесной зоне приурочен к сухим соснякам, держится по прогреваемым разнотравным опушкам, полянам и сфагновым болотам, в лесостепи – преимущественно к остепненным ландшафтам.
7587. *Eilema palliatella* (Scopoli, 1763) (=*unita* ([Denis et Schiffermüller], 1775)) – Стмк, Учлн [Исмагилов и др., 2021а; Мигранов, 2021б; Горбунов, 2023]. По степным участкам.
7588. *Eilema pygmaeola* (Doubleday, 1847) – Учлн, Блвщ [Nupponen, Fibiger, 2002; Исмагилов и др., 2022; Горбунов, 2023]. В лесной зоне приурочен к соснякам на песчаных почвах, в лесостепи – и к степным участкам.
7589. *Eilema sororcula* (Hufnagel, 1766) – на всей территории. В лесах и посадках различных типов.
7590. *Katha depressa* (Esper, 1787) – Нефтекамск, Уфа, Стбш [Мигранов, 2021б; Исмагилов, 2025б]. Преимущественно в сухих сосняках, реже в смешанных лесах других типов.
7591. *Lithosia quadra* (Linnaeus, 1758) – на всей территории.
7592. *Miltochrista miniata* (Forster, 1771) (=*rosea* (Fabricius, 1775)) – на всей территории. Преимущественно в смешанных лесах, реже в изреженных лиственных лесах под их пологом и по опушкам.
7593. *Pelosia muscerda* (Hufnagel, 1766) – Уфа, Блвщ, Кушн, Учлн, Блвр [Grosser, 1983; Исмагилов и др., 2022; Горбунов, 2023; Исмагилов, 2025б]. Характерен для старовозрастных смешанных лесов (особенно зеленомошников) и сфагновых болот.
7594. *Pelosia obtusa* (Herrich-Schäffer, [1852]) – Кушн [Исмагилов и др., 2022]. По облесенным берегам водоемов с тростником.

7595. *Setina irrorella* (Linnaeus, 1758) (=*irrorea* (Esper, 1787)) – на всей территории. Характерен для старовозрастных смешанных и широколиственных лесов.
7596. *Setina roscida* ([Denis et Schiffermüller], 1775) (*ssp. kuhlweini* (Hübner, [1824])) – Мелз, Стмк, Бурз [Трофимова, 2003; Исмагилов и др., 2020; Мигранов, 2021б; Исмагилов, 2025б]. По степным участкам.
7597. *Thumatha senex* (Hübner, [1808]) – Кушн, Крдл, Учлн [Исмагилов и др., 2021а; Мигранов, 2021б; Горбунов, 2023]. Приурочен к старовозрастным смешанным и широколиственным лесам, держится по редколесьям, опушкам и прилегающим сыроватым лугам.

Подсемейство Synthominae

7598. *Dysauxes ancilla* (Linnaeus, 1767) – центральные, южные р-ны [Круликовский, 1904; Исмагилов, 2025б]. В остепненных широколиственных и сосново-широколиственных лесах по опушкам и разрежениям.
7599. *Dysauxes punctata* (Fabricius, 1781) – центральные, южные, юго-восточные р-ны [Grosser, 1983; Исмагилов и др., 2020; Горбунов, 2023; Исмагилов, 2025б]. По степным участкам с обнажениями известняков.
7600. *Syntomis nigricornis* Alphéraky, 1883 (*phegea* auct.) – на всей территории. По остепненным склонам, лесным опушкам и просекам.

Семейство Erebidae – Эребиды (56 видов, наличие еще 2 не подтверждено)

Подсемейство Scoliopteryginae

7601. *Scoliopteryx libatrix* (Linnaeus, 1758) – на всей территории. В лесах и посадках различных типов, а также в населенных пунктах.

Подсемейство Rivulinae

7602. *Rivula sericealis* (Scopoli, 1763) – на всей территории. В лесах и посадках различных типов, а также по прилегающим сыроватым полянам и лугам.

Подсемейство Hypeninae

7603. *Hypena crassalis* (Fabricius, 1787) – Учлн [Горбунов, 2023]. В смешанных лесах с обилием черники.
7604. *Hypena obesalis* Treitschke, 1828 – северо-восточные, центральные, южные, юго-восточные р-ны [Круликовский, 1904, 1910; Nupponen, Fibiger, 2002; Хабибуллин, 2017б; Исмагилов, 2025б]. Характерен для старовозрастных смешанных лесов.
7605. *Hypena proboscidalis* (Linnaeus, 1758) – на всей территории. В лесах и посадках различных типов, а также по прилегающим сыроватым полянам и лугам.
7606. *Hypena rostralis* (Linnaeus, 1758) – на всей территории. В лесах и посадках различных типов, а также в населенных пунктах.

Подсемейство Calpinae

7607. *Calyptra thalictri* (Borkhausen, 1790) – центральные, южные, горно-лесные, юго-восточные р-ны [Nupponen, Fibiger, 2002; Ишбирдина и др., 2020;

Горбунов, 2023; Исмагилов, 2025б]. В лесных и облесенных ландшафтах по прогреваемым лугам и опушкам с участием василистников (*Thalictrum* spp.).

Подсемейство Herminiinae

7608. *Herminia grisealis* ([Denis et Schiffermüller], 1775) – на всей территории. Характерен преимущественно для старовозрастных лесов.

7609. *Herminia tarsicrinalis* (Knoch, 1782) – Мелз, Бурз, Уфа [Трофимова, 2003; Исмагилов и др., 2021б]. По сырым редколесьям, лесным опушкам, полянам, прилегающим заболоченным лугам.

7610. *Idia calvaria* ([Denis et Schiffermüller], 1775) – Стмк, Блрц [Исмагилов и др., 2021б; Исмагилов, 2025б]. В лесах с участием дуба (*Quercus robur*).

7611. *Macrochilo cribrumalis* (Hübner, 1793) – Крмс [Исмагилов и др., 2021а]. По сфагновым и травяным болотам.

7612. *Paracolax tristalis* (Fabricius, 1794) (*glaucinalis* auct.) – на всей территории. В смешанных и широколиственных лесах по прогреваемым разнотравным опушкам.

7613. *Pechipogo strigilata* (Linnaeus, 1758) (=*barbalis* (Clerck, 1759)) – на всей территории. В лесах и посадках различных типов.

7614. *Polypogon tentacularia* (Linnaeus, 1758) – на всей территории. По прогреваемым разнотравным лесным опушкам и полянам.

7615. *Simplicia rectalis* (Eversmann, 1842) – Уфа, Иглн, Кушн [Исмагилов и др., 2021а; Исмагилов, 2025б]. Характерен для старовозрастных широколиственных и хвойно-широколиственных лесов.

7616. *Zanclognatha lunalis* (Scopoli, 1763) (=*tarsiplumalis* (Hübner, 1796)) – на всей территории. В широколиственных и хвойно-широколиственных лесах по прогреваемым опушкам и полянам.

7617. *Zanclognatha tarsipennalis* (Treitschke, 1835) – Уфа, Кркм, Ишмб, Нурм, Крмс, Учлн [Grosser, 1983; Исмагилов и др., 2020; Горбунов, 2023]. В лесах и посадках различных типов.

Подсемейство Toxocampinae

? *Anumeta cestis* (Ménétries, 1849) – без местонахождений [Ménétries, 1849] (?). Наличие вида в РБ в современный период требует подтверждения. Характерен для полупустынных аридных ландшафтов, солончаков.

7618. *Lygephila craccae* ([Denis et Schiffermüller], 1775) – на всей территории. По прогреваемым разнотравным и остепненным опушкам сосновых и широколиственных лесов.

7619. *Lygephila lubrica* (Freyer, 1846) – центральные, южные, юго-восточные р-ны [Grosser, 1983; Исмагилов и др., 2020; Горбунов, 2023; Исмагилов, 2025б]. По остепненным участкам и, отчасти, по прилегающим пустырям.

7620. *Lygephila ludicra* (Hübner, 1790) – северо-восточные, центральные, южные, горно-лесные, юго-восточные р-ны [Nupponen, Fibiger, 2002; Горбунов, 2023; Исмагилов, 2025б]. По остепненным участкам и, отчасти, по прилегающим пустырям.

7621. *Lygephila lusoria (*Linnaeus, 1758) – Кушн [Исмагилов, 2025б]. Характерен для степных участков
7622. *Lygephila pastinum* (Treitschke, 1826) – центральные, южные, юго-восточные р-ны [Nupponen, Fibiger, 2002; Исмагилов, Валуев, 2021б; Горбунов, 2023; Исмагилов, Валуев, 2023б; Исмагилов, 2025б]. По лугам и разнотравным лесным опушкам.
7623. *Lygephila viciae* (Hübner, [1822]) – Кушн, Бирский, Учлн [Исмагилов и др., 2022; Горбунов, 2023]. По прогреваемым разнотравным и остепненным опушкам сосновых и широколиственных лесов.

Подсемейство Boletobiinae

7624. *Colobochyla salicalis* ([Denis et Schiffermüller], 1775) – Кушн, Уфа [Исмагилов и др., 2021а; Исмагилов, 2025б]. По сырым лесным полянам и заболоченным лугам.
7625. *Eublemma amasina* (Eversmann, 1842) – Учлн [Nupponen, Fibiger, 2006]. По лугам и степям.
7626. *Eublemma amoena* (Hübner, [1803]) – Абзл [Исмагилов и др., 2020]. Характерен для степных участков.
7627. *Eublemma minutata* (Fabricius, 1794) – Учлн [Горбунов, 2023]. На песчаных пустошах с участием цмина песчаного (*Helichrysum arenarium*).
7628. *Eublemma pallidula* (Herrich-Schäffer, [1856]) – Зиан, Кушн [Nupponen, Fibiger, 2002; Исмагилов и др., 2021б]. В степях.
7629. *Eublemma polygramma* (Duponchel, [1842]) – Хайб, Стмк [Ахола и др., 1997; Nupponen, Fibiger, 2002; Исмагилов и др., 2021б]. По степным участкам.
7630. *Eublemma porphyrina* (Freyer, 1844) (*ostrina* auct.) – Хайб, Учлн, Байм, Ишмб [Ахола и др., 1997; Nupponen, Fibiger, 2002; Мигранов, Валуев, 2020; Горбунов, 2023; Исмагилов, Валуев, 2023б; Рыбалкин, 2024]. По степным участкам с выходами известняков.
7631. *Eublemma purpurina* ([Denis et Schiffermüller], 1775) – центральные, южные, юго-восточные р-ны [Nupponen, Fibiger, 2002; Исмагилов, 2025б]. По остепненным участкам и, отчасти, по прилегающим пустырям.
7632. *Eublemma pusilla* (Eversmann, 1837) – Зиан, Байм [Grosser, 1983; Nupponen, Fibiger, 2002]. По степным участкам.
7633. *Eublemma rosea* (Hübner, 1790) (=*rosina* (Hübner, [1803])) – Учлн [Nupponen, Fibiger, 2002]. Характерен для степных участков.
7634. *Laspeyria flexula* ([Denis et Schiffermüller], 1775) – центральные, южные, горно-лесные, юго-восточные р-ны [Исмагилов и др., 2020; Горбунов, 2023; Исмагилов, 2025б]. Преимущественно в смешанных и широколиственных лесах и посадках.
7635. *Odice arcuinna* (Hübner, 1790) (=*inamoena* (Hübner, [1803])) – Зиан [Grosser, 1983; Nupponen, Fibiger, 2002]. Характерен для степных участков.
7636. *Parascotia fuliginaria* (Linnaeus, [1760]) – северные, центральные, южные, горно-лесные, юго-восточные р-ны [Свиридов и др., 2006; Трофимова, 2006б;

Исмагилов, 2025б]. В лесах и посадках различных типов, а также в населенных пунктах.

7637. *Phytometra viridaria* (Clerck, 1759) – центральные, южные, горно-лесные, юго-восточные р-ны [Nupponen, Fibiger, 2002; Горбунов, 2023; Исмагилов, 2025б]. Преимущественно по остепненным участкам.

7638. *Trisateles emortualis* ([Denis et Schiffermüller], 1775) – Чишм, Учлн, Уфа, Нефтекамск [Круликовский, 1897; Исмагилов и др., 2021б; Горбунов, 2023]. Характерен для сосново-широколиственных и широколиственных лесов.

Подсемейство Erebinae

7639. *Callistege fortalitium* (Tauscher, 1809) – Кгрч, Ишмб, Зиан, Учлн [Grosser, 1983; Рыбалкин, 2024]. По степям.

7640. *Callistege mi* (Clerck, 1759) – на всей территории. По разнотравным лугам и лесным опушкам.

7641. *Catephia alchymista* ([Denis et Schiffermüller], 1775) – Чишм, Ишмб, Крмс, Уфа [Круликовский, 1897; Grosser, 1983; Исмагилов и др., 2021а; Исмагилов, 2025б]. Характерен для сосново-широколиственных и остепненных широколиственных лесов с дубом.

7642. *Catocala adultera* Ménétries, 1856 – Кушн, Учлн, Нефтекамск [Исмагилов и др., 2020; Мигранов, 2022б; Горбунов, 2023]. Характерен для лесов таежного типа.

7643. *Catocala electa* (Vieweg, 1790) – Крмс, Блвщ, Хайб, Зиан, Уфмс [Чаус, Биктимерова, 2019 (?); Исмагилов и др., 2020; Мигранов, 2022б; Исмагилов, 2025б]. В лесах и старых лесопарках с участием ивовых (Salicaceae).

? *Catocala elocata* (Esper, 1787) – Туйм [Хабибуллин, 2018а] (?). Вид довольно сложен для определения и требуется подтверждение. Характерен для берегов рек и прудов с ивняками-ракитниками.

7644. *Catocala fraxini* (Linnaeus, 1758) – на всей территории. Преимущественно в старовозрастных лесах и посадках различных типов.

7645. *Catocala fulminea* (Scopoli, 1763) – на всей территории. Преимущественно в широколиственных и смешанных лесах и посадках.

7646. *Catocala helena* Eversmann, 1856 – Сибай, Уфмс, Хайб [Исмагилов, Кривошеев, 2020; Исмагилов, 2025б]. Пойменные долины рек с редколесьями и уремами.

7647. *Catocala neonympha* (Esper, 1805) – Бурз, Байм [Соколов, 1897; Исмагилов и др., 2022]. По степным оврагам и балкам с участием солодки (*Glycyrrhiza* sp.).

7648. *Catocala nupta* (Linnaeus, 1767) – на всей территории. В лесах и посадках различных типов.

7649. *Catocala pacta* (Linnaeus, 1758) – Кушн, Чекм, Уфмс [Мигранов, 2022б, 2023г; Исмагилов, 2025б]. Наиболее характерен для старовозрастных прибрежных ивняков, в меньшей степени для заболоченных участков смешанных лесов.

7650. *Catocala promissa* ([Denis et Schiffermüller], 1775) – Альш, Бурз, Уфмс, Крмс, Уфа [Круликовский, 1904; Трофимова, 2015; Мигранов, 2022б; Исмагилов, 2025б]. В широколиственных и смешанных лесах и посадках с дубом.
7651. *Catocala puerpera* (Giorna, 1791) – Уфмс, Кгрч, Уфа [Исмагилов и др., 2020; Мигранов, 2022б]. Характерен для старовозрастных прибрежных ивняков лесостепи.
7652. *Catocala sponsa* (Linnaeus, 1767) – на всей территории. В широколиственных и смешанных лесах и посадках с дубом.
7653. *Chrysorithrum flavomaculata* (Bremer, 1861) – Бурз [Свиридов и др., 2006; Трофимова, 2006б]. По разреженным лесам, полянам и лугам.
7654. *Drasteria cailino* (Lefèbvre, 1827) – Хайб, Учлн, Байм, Абзл [Ахола и др., 1997; Nupponen, Fibiger, 2002; Рыбалкин, 2024; Исмагилов, 2025б]. По долинам степных рек.
7655. *Euclidia glyphica* (Linnaeus, 1758) – на всей территории. По разнотравным лугам.
7656. *Gonospileia triquetra* ([Denis et Schiffermüller], 1775) – Туйм, Давл, Альш [Nupponen, Fibiger, 2002; Исмагилов и др., 2020]. По степям.
7657. *Minucia lunaris* ([Denis et Schiffermüller], 1775) – Чишм, Хайб, Мелз [Круликовский, 1897; Бурзянцев и др., 1994; Nupponen, Fibiger, 2002]. В сосново-широколиственных и остепненных широколиственных лесах с дубом.

Семейство Noctuidae – Совки (408 видов, наличие еще 10 не подтверждено)

Подсемейство Plusiinae

Триба Abrostolini Eichlin et Cunningham, 1978

7658. *Abrostola asclepiadis* ([Denis et Schiffermüller], 1775) – центральные, южные, горно-лесные, юго-восточные р-ны [Nupponen, Fibiger, 2002; Ahola et al., 2012; Исмагилов, 2025б] – по сухим опушкам смешанных лесов и остепненным местам с участием ластовня ласточкина (*Vincetoxicum hirundinaria*).
7659. *Abrostola tripartita* (Hufnagel, 1766) (=*urticae (*Hübner, [1817])) – на всей территории. Эвритопный луговой вид.
7660. *Abrostola triplasia* (Linnaeus, 1758) – на всей территории. Эвритопный луговой вид.

Триба Plusiini Boisduval, 1828

7661. *Autographa bractea* ([Denis et Schiffermüller], 1775) – Учлн, Бурз, Абзл [Ahola et al., 2012; Бакалова, 2016; Горбунов, 2023; Исмагилов, 2025б]. В старовозрастных лесах по тенистым разнотравным опушкам и полянам.
7662. *Autographa buraetica* (Staudinger, 1892) – Блрц, Бурз, Учлн [Ахола и др., 1997; Nupponen, Fibiger, 2002, 2006; Ahola et al., 2012]. По лесам таежного типа.

7663. *Autographa excelsa* (Kretschmar, 1862) – северные, центральные, горно-лесные, юго-восточные р-ны [Ahola et al., 2012; Исмагилов и др., 2022; Горбунов, 2023; Исмагилов, 2025б]. По разнотравным опушкам старовозрастных смешанных лесов.
7664. *Autographa gamma* (Linnaeus, 1758) – на всей территории. Эвритопный лугово-полевой вид.
7665. *Autographa jota* (Linnaeus, 1758) – центральные, южные, горно-лесные, юго-восточные р-ны [Nupponen, Fibiger, 2002; Ahola et al., 2012; Хабибуллин, 2018а; Горбунов, 2023; Исмагилов, 2025б]. В старовозрастных лесах по разрежениям, опушкам, полянам.
7666. *Autographa macrogamma* (Eversmann, 1842) – Чишм, Блрц, Учлн [Круликовский, 1897; Nupponen, Fibiger, 2002; Ahola et al., 2012]. Арктобореомонтанный вид.
7667. *Autographa mandarina* (Freyer, 1845) – центральные, горно-лесные, юго-восточные р-ны [Nupponen, Fibiger, 2002; Ahola et al., 2012; Горбунов, 2023; Исмагилов, 2025б]. Преимущественно по прогреваемым лугам и пустырям.
7668. *Autographa pulchrina* (Haworth, [1809]) – центральные, южные, горно-лесные, юго-восточные р-ны [Ахола и др., 1997; Nupponen, Fibiger, 2002; Трофимова, 2003; Горбунов, 2023; Исмагилов, 2025б]. Преимущественно в старовозрастных лесах по разрежениям, опушкам, полянам.
7669. *Diachrysia chrysitis* (Linnaeus, 1758) – на всей территории. Эвритопный луговой вид.
7670. *Diachrysia chryson* (Esper, 1789) (*orichalcea* auct.) – Учлн, Блрц, Ермк [Nupponen, Fibiger, 2002; Ahola et al., 2012; Горбунов, 2023; Исмагилов, 2025б]. Характерен для сырых и заболоченных луговых участков.
7671. *Diachrysia stenochrysis* (Warren, 1913) (=*tutti* (Kostrowicki, 1961)) – на всей территории. Эвритопный луговой вид.
7672. *Diachrysia zosimi* (Hübner, [1822]) – Чишм, Бурз, Учлн, Блрц [Круликовский, 1897; Соколов, 1897; Nupponen, Fibiger, 2002; Свиридов и др., 2006]. По прогреваемым лугам и остепненным участкам.
7673. *Euchalcia consona* (Fabricius, 1787) – северные, центральные, южные, горно-лесные, юго-восточные р-ны [Grosser, 1983; Ахола и др., 1997; Nupponen, Fibiger, 2002; Исмагилов, 2025б]. По остепненным участкам.
7674. *Euchalcia modestoides* Poole, 1989 – Учлн, Блрц [Nupponen, Fibiger, 2002; Горбунов, 2023; Исмагилов, 2025б]. По разнотравным опушкам и полянам смешанных и широколиственных лесов.
7675. *Euchalcia variabilis* (Piller et Mitterpacher, 1783) (=*uralensis* (Eversmann, 1842)) – Блрц, Зиан, Бурз, Учлн [Ахола и др., 1997; Nupponen, Fibiger, 2002; Свиридов и др., 2006; Ahola et al., 2012; Горбунов, 2023]. По опушкам смешанных и широколиственных лесов.
7676. *Lamprotes c-aureum* (Knoch, 1781) – Блвщ, Учлн, Блрц, Кушн [Grosser, 1983; Nupponen, Fibiger, 2002; Горбунов, 2023; Исмагилов, 2025б]. В

старовозрастных хвойно-широколиственных и широколиственных лесах по разрежениям, тенистым разнотравным опушкам и полянам.

7677. *Macdunnoughia confusa* (Stephens, 1850) (=*gutta* (Guenée, 1852)*; circumflexa* auct.) – на всей территории. Эвритопный луговой вид.

7678. *Panchrysia deaurata* (Esper, 1787) – Ишмб [Nupponen, Fibiger, 2002; Исмагилов и др., 2022]. По степям.

7679. *Panchrysia ornata* (Bremer, 1864) (*v-argenteum* auct.) – Учлн [Nupponen, Fibiger, 2002; Свиридов и др., 2006; Ahola et al., 2012; Горбунов, 2023]. Характерен для степей.

7680. *Plusia festucae* (Linnaeus, 1758) – Учлн, Байм, Уфа [Nupponen, Fibiger, 2002; Горбунов, 2023; Исмагилов, 2025б]. Преимущественно по сырым лесным полянам, низинным лугам и берегам водоемов.

7681. *Plusia putnami* Grote, 1873 – Чекм, Учлн, Кушн, Уфмс, Уфа [Исмагилов и др., 2020; Горбунов, 2023; Исмагилов, 2025б]. Преимущественно по сырым лесным полянам, травяным болотам и берегам водоемов.

7682. *Plusidia cheiranthi* (Tauscher, 1809) (=*eugenia* (Eversmann, 1841)) – центральные, южные, горно-лесные, юго-восточные р-ны [Ахола и др., 1997; Nupponen, Fibiger, 2002; Ahola et al., 2012; Горбунов, 2023; Исмагилов, 2025б]. По разнотравным опушкам старовозрастных смешанных лесов.

7683. *Polychrysia moneta* (Fabricius, 1787) – северные, центральные, горно-лесные, юго-восточные р-ны [Nupponen, Fibiger, 2002; Ahola et al., 2012; Горбунов, 2023; Исмагилов, 2025б]. По разнотравным опушкам старовозрастных смешанных лесов.

7684. *Syngrapha ain* (Hochenwarth, 1785) – Блрц, Байм, Учлн, Бурз, Абзл [Ахола и др., 1997; Nupponen, Fibiger, 2002; Ahola et al., 2012; Горбунов, 2023; Исмагилов, 2025б]. Приурочен к посадкам и лесам с участием лиственницы (*Larix sibirica*).

7685. *Syngrapha interrogationis* (Linnaeus, 1758) – Уфа [Исмагилов, 2025б]. В смешанных лесах с обилием вересковых.

Подсемейство Eustrotiinae

7686. *Deltote bankiana* (Fabricius, 1775) (=*argentula* (Hübner, 1787)) – на всей территории. По лесным опушкам и лугам всех типов.

7687. *Deltote deceptoria* (Scopoli, 1763) (=*atratula* ([Denis et Schiffermüller], 1775)) – на всей территории. Характерен для прогреваемых лесных опушек и полян.

7688. *Deltote uncula* (Clerck, 1759) – Кушн [Исмагилов и др., 2021а]. По сфагновым и травяным болотам.

7689. *Phyllophila obliterata* (Rambur, 1833) – Альш, Кушн [Круликовский, 1904; Исмагилов и др., 2021а]. По сухим лугам и остепненным участкам с участием полыни полевой (*Artemisia campestris*).

7690. *Protodeltote pygarga* (Hufnagel, 1766) (=*fasciana* (Linnaeus, 1762)) – – на всей территории. Эвритопный лесной вид.

Подсемейство Acontiinae

Триба Acontiini Guenée, 1841

7691. *Acontia lucida* (Hufnagel, 1766) – центральные, южные, горно-лесные р-ны [Grosser, 1983; Хабибуллин, 2017б; Исмагилов и др., 2020; Исмагилов, 2025б]. По прогреваемым лугам и пустырям.
7692. *Acontia melanura* (Tauscher, 1809) (*titania* auct.) – центральные, южные, горно-лесные, юго-восточные р-ны [Круликовский, 1897; Ахола и др., 1997; Nupponen, Fibiger, 2002; Ahola et al., 2012; Исмагилов, 2025б]. По остепненным участкам.
7693. *Emmelia trabealis* (Scopoli, 1763) (=*sulphurea* ([Denis et Schiffermüller], 1775)) – на всей территории. По прогреваемым разнотравным лугам и прилегающим пустырям.

Триба Aediini Beck, 1960

7694. *Aedia funesta* (Esper, 1786) – на всей территории. В изреженных лесах и посадках.

Подсемейство Pantheinae

7695. *Colocasia coryli* (Linnaeus, 1758) – Блрц, Туйм, Бурз, Учлн, Крмс [Nupponen, Fibiger, 2002; Ahola et al., 2012; Горбунов, 2023; Исмагилов, 2025б]. Преимущественно в широколиственных лесах.
7696. *Panthea coenobita* (Esper, [1785]) – Блрц, Байм, Бурз, Абзл [Nupponen, Fibiger, 2002; Паженков и др., 2005; Ahola et al., 2012; Исмагилов, 2025б]. В старовозрастных смешанных лесах с участием елей (*Picea* spp.).
7697. *Trichosea ludifica* (Linnaeus, 1758) – Блрц [Ахола и др., 1997; Nupponen, Fibiger, 2002]. Характерен для горных таежных лесов.

Подсемейство Dilobinae

7698. *Diloba caeruleocephala* (Linnaeus, 1758) – без местонахождений [Мигранов, Саттаров, 2006]. Известен как эвритопный и синантропофильный лесной вид, но в республике на крайней восточной границе ареала.

Подсемейство Acronictinae

7699. *Acronicta aceris* (Linnaeus, 1758) – на всей территории. В смешанных и широколиственных лесах с участием клёнов (*Acer* spp.).
7700. *Acronicta alni* (Linnaeus, 1767) – центральные, южные, юго-восточные р-ны [Ахола и др., 1997; Nupponen, Fibiger, 2002; Ahola et al., 2012; Горбунов, 2023; Исмагилов, 2025б]. По мелколиственным и широколиственным лесам.
7701. *Acronicta auricoma* ([Denis et Schiffermüller], 1775) – на всей территории. По прогреваемым лугам и опушкам.
7702. *Acronicta cinerea* (Hufnagel, 1766) – центральные, южные, горно-лесные, юго-восточные р-ны [Nupponen, Fibiger, 2002; Ahola et al., 2012; Горбунов, 2023; Исмагилов, 2025б]. По остепненным участкам.
7703. *Acronicta cuspis* (Hübner, [1813]) – Учлн [Nupponen, Fibiger, 2002; Горбунов, 2023]. Преимущественно в старовозрастных смешанных и лиственных лесах.
7704. *Acronicta leporina* (Linnaeus, 1758) – на всей территории. Умеренно эвритопный лесной вид.
7705. *Acronicta megacephala* ([Denis et Schiffermüller], 1775) – на всей территории. Эвритопный лесной вид.

7706. *Acronicta psi* (Linnaeus, 1758) – на всей территории. Эвритопный лесной мезофил.
7707. *Acronicta rumicis* (Linnaeus, 1758) – на всей территории. Эвритопный луговой вид.
7708. *Acronicta strigosa* ([Denis et Schiffermüller], 1775) – центральные, южные, горно-лесные, юго-восточные р-ны [Ахола и др., 1997; Nupponen, Fibiger, 2002; Ahola et al., 2012; Горбунов, 2023; Исмагилов, 2025б]. В старовозрастных смешанных и широколиственных лесах.
7709. *Acronicta tridens* ([Denis et Schiffermüller], 1775) – Блрц, Бурз, Хайб [Ахола и др., 1997; Ahola et al., 2012; Исмагилов, 2025б]. Лесной вид.
7710. *Eogena contaminei* (Eversmann, 1847) (=*bombycina* (Ménétries, 1849)) – без местонахождений [Ménétries, 1849; Anikin et al., 2000c, 2017]. Характерен для глинисто-солонцеватых степей.
7711. *Moma alpium* (Osbeck, 1778) (=*orion* (Esper, 1791)) – центральные, южные, юго-восточные р-ны [Круликовский, 1897; Grosser, 1983; Nupponen, Fibiger, 2002; Горбунов, 2023; Исмагилов, 2025б]. В смешанных и широколиственных лесах и посадках.
7712. *Oxicesta geographica* (Fabricius, 1787) – центральные, южные р-ны [Исмагилов и др., 2020; Исмагилов, 2025б]. По остепненным участкам.
7713. *Simyra albovenosa* (Goeze, 1781) – Хайб [Ахола и др., 1997; Nupponen, Fibiger, 2002]. Прибрежно-луговой вид.
7714. *Simyra dentinosa* Freyer, [1838] – Хайб [Исмагилов, 2025б]. По степным участкам на молочаях.
7715. *Simyra nervosa* ([Denis et Schiffermüller], 1775) – Кгрч, Зиан, Учлн, Кушн, Стбш [Grosser, 1983; Nupponen, Fibiger, 2002; Горбунов, 2023; Исмагилов, 2025б]. По прогреваемым лугам, степям и пустырям.

Подсемейство Metoponiinae

7716. *Aegle kaekeritziana* (Hübner, [1799]) – Ермк, Иглн [Исмагилов и др., 2020; Исмагилов, 2025б]. Характерен для степных участков.
7717. *Apaustis rupicola* ([Denis et Schiffermüller], 1775) – Хайб, Зиан [Ахола и др., 1997; Nupponen, Fibiger, 2002]. Характерен для глинисто-солонцеватых степей.
7718. *Mycteroplus puniceago* (Boisduval, 1840) – Учлн [Ahola et al., 2012]. По степям.
7719. *Panemeria tenebrata* (Scopoli, 1763) – Блрц [Nupponen, Fibiger, 2002]. В старовозрастных лесах по опушкам и полянам.
7720. *Tyta luctuosa* ([Denis et Schiffermüller], 1775) – на всей территории. По прогреваемым разнотравным лугам и опушкам.

Подсемейство Cuculliinae

7721. *Cucullia absinthii* (Linnaeus, [1760]) – северные, центральные, южные, юго-восточные р-ны [Nupponen, Fibiger, 2002; Свиридов и др., 2006; Исмагилов, 2025б]. Преимущественно по прогреваемым лугам.

7722. *Cucullia argentea* (Hufnagel, 1766) – Учлн, Стбш [Nupponen, Fibiger, 2002; Исмагилов, 2025б]. По прогреваемым лугам и пустырям с обилием полыни полевой.
7723. *Cucullia argentina* (Fabricius, 1787) – Учлн [Nupponen, Fibiger, 2002]. По степям.
7724. *Cucullia artemisiae* (Hufnagel, 1766) – центральные, горно-лесные, юго-восточные р-ны [Nupponen, Fibiger, 2002; Ahola et al., 2012; Исмагилов и др., 2022; Исмагилов, 2025б]. По прогреваемым лугам и пустырям с обилием полыни полевой.
7725. *Cucullia asteris* ([Denis et Schiffermüller], 1775) – Байм, Учлн, Бурз [Nupponen, Fibiger, 2002; Исмагилов, 2025б]. По сухим боровым полянам, прилегающим лугам и пустошам на песчаных почвах.
7726. *Cucullia balsamitae* Boisduval, 1840 – Учлн [Исмагилов и др., 2021б; Горбунов, 2023]. Преимущественно по степным участкам.
7727. *Cucullia biornata* Fischer von Waldheim, 1840 – Учлн, Сибай [Nupponen, Fibiger, 2002; Ahola et al., 2012; Исмагилов, 2025б]. Преимущественно по степным участкам.
7728. *Cucullia cineracea* Freyer, [1841] – Байм, Учлн [Nupponen, Fibiger, 2002]. По степям.
7729. *Cucullia dracunculi* (Hübner, [1813]) – Учлн [Ahola et al., 2012]. Степной вид.
7730. *Cucullia fraudatrix* Eversmann, 1837 – Чишм, Уфмс, Крмс, Уфа, Нефтекамск [Круликовский, 1897; Исмагилов, 2025б]. Преимущественно по прогреваемым лугам.
7731. *Cucullia gnaphalii* (Hübner, [1813]) – Чишм, Учлн [Круликовский, 1897; Ахола и др., 1997; Nupponen, Fibiger, 2002; Горбунов, 2023]. Ксерофильный лугово-степной вид; в лесной зоне характерен для опушек сосняков на песках и прилегающих пустошей.

? *Cucullia gozmanyi* G. Ronkay et L. Ronkay, 1994 – Хайб [Nupponen, Fibiger, 2002]. В работе [Anikin et al., 2017] вид фактически исключен из фаун как неверно определенный и встречающийся не ближе Балкан. Неясно, просматривали ли авторы материал, но в каталоге чешуекрылых России (2019) указывался для региона № 17 (Южный Урал) как вполне достоверный. Ситуация требует прояснения.

7732. *Cucullia inderiensis* Herrich-Schäffer, [1855] – Хайб [Исмагилов и др., 2022]. Характерен для глинисто-солонцеватых степей.
7733. *Cucullia lactea* (Fabricius, 1787) – без местонахождений [Anikin et al., 2017]. Степной вид.
7734. *Cucullia lucifuga* ([Denis et Schiffermüller], 1775) – Белб, Учлн, Илиш, Уфа [Круликовский, 1910; Nupponen, Fibiger, 2002; Горбунов, 2023; Исмагилов, Валуев, 2023б; Исмагилов, 2025б]. По прогреваемым лугам.
7735. *Cucullia lychnitis* (Rambur, 1833) – Хайб, Учлн, Бурз, Гафр [Nupponen, Fibiger, 2002; Горбунов, 2023; Исмагилов, 2023]. По прогреваемым полянам в сосняках и остепненным участкам.

7736. *Cucullia praecana* Eversmann, 1843 – Учлн [Nupponen, Fibiger, 2002; Ahola et al., 2012; Горбунов, 2023]. По степям.
7737. *Cucullia propinqua* Eversmann, 1842 – Учлн [Nupponen, Fibiger, 2002; Ahola et al., 2012; Горбунов, 2023]. Степной вид.
7738. *Cucullia pustulata* Eversmann, 1842 (*ssp. fraterna* Butler, 1878) – на всей территории. По прогреваемым лугам.
7739. *Cucullia santonici* (Hübner, [1813]) – Бурз, Учлн [Ahola et al., 2012; Горбунов, 2023]. Степной вид.
7740. *Cucullia scrophulariae* ([Denis et Schiffermüller], 1775) (=*scrophulahvora* (Guenée, 1852)) – Хайб, Учлн [Ахола и др., 1997; Ahola et al., 2012]. По прогреваемым полянам в сосняках и остепненным участкам.
7741. *Cucullia splendida* (Stoll, [1782]) – Учлн, Байм, Хайб [Nupponen, Fibiger, 2002; Ahola et al., 2012; Исмагилов, 2023]. По остепненным участкам.
7742. *Cucullia tanaceti* ([Denis et Schiffermüller], 1775) – Учлн, Уфмс, Байм [Nupponen, Fibiger, 2002; Исмагилов и др., 2021а; Исмагилов, 2025б]. По прогреваемым лугам и лесным опушкам, отчасти по прилегающим пустырям.
7743. *Cucullia umbratica* (Linnaeus, 1758) – на всей территории. Эвритопный луговой вид.
7744. *Cucullia verbasci* (Linnaeus, 1758) – Ишмб, Нурм, Уфа [Grosser, 1983; Исмагилов и др., 2022; Исмагилов, 2025б]. По прогреваемым полянам в сосняках и остепненным участкам.
7745. *Cucullia virgaureae* Boisduval, 1840 – Учлн [Ahola et al., 2012]. Степной вид.
7746. *Cucullia xeranthemi* Boisduval, 1840 – Байм, Учлн [Nupponen, Fibiger, 2002; Ahola et al., 2012]. Преимущественно по степным участкам.

Подсемейство Oncocnemidinae

7747. *Calophasia lunula* (Hufnagel, 1766) (=*linariae* ([Denis et Schiffermüller], 1775)) – на всей территории. Преимущественно по остепненным участкам, отчасти по прилегающим сухим лугам и пустырям.
7748. *Epimecia ustula* (Freyer, [1835]) (=*lurida* (Treitschke, 1835)) – Байм [Свиридов и др., 2006; Трофимова, 2006б]. По степям.
7749. *Sympistis campicola* Lederer, 1853 – Зиан, Учлн [Nupponen, Fibiger, 2002; Ahola et al., 2012; Горбунов, 2023]. Степной вид.
7750. *Sympistis heliophila* (Paykull, 1793) – Блрц [Nupponen, Fibiger, 2002]. Горный вид, характерный для вересковых пустошей.
7751. *Sympistis nigricula* (Eversmann, 1847) – Учлн, Кгрч [Nupponen, Fibiger, 2002; Свиридов и др., 2006; Ahola et al., 2012]. Характерен для горных участков.
7752. *Sympistis senica* (Eversmann, 1856) – Учлн [Nupponen, Fibiger, 2011]. Характерен для каменистых степей.

Подсемейство Amphipyrinae

7753. *Amphipyra livida* ([Denis et Schiffermüller], 1775) – Уфа, Учлн, Кушн, Уфмс [Исмагилов и др., 2020; Горбунов, 2023; Исмагилов, 2025б]. Лесолуговой термофильный вид.

7754. *Amphipyra perflua* (Fabricius, 1787) – Блвщ, Мелз, Бурз, Крмс, Уфа [Grosser, 1983; Трофимова, 2003; Паженков и др., 2005; Исмагилов и др., 2021а; Исмагилов, 2025б]. В основном в старовозрастных лесах.
7755. *Amphipyra pyramidea* (Linnaeus, 1758) – Учлн, Блрц, Бурз [Nupponen, Fibiger, 2002; Мигранов, Саттаров, 2008; Бакалова, 2016]. Преимущественно в хвойно-широколиственных и широколиственных лесах и посадках.
7756. *Amphipyra tetra* (Fabricius, 1787) – Кушн [Исмагилов, 2023]. Лесолуговой термофильный вид.
7757. *Amphipyra tragopoginis* (Clerck, 1759) – на всей территории. Эвритопный лесолуговой вид.
7758. *Phidrimana amurensis* (Staudinger, 1892) – Учлн, Сибай [Nupponen, Fibiger, 2006; Ahola et al., 2012; Исмагилов и др., 2020]. Преимущественно в антропогенных ландшафтах.

Подсемейство Psaphidinae

7759. *Allophyes oxyacanthae* (Linnaeus, 1758) – Нефтекамск, Крмс, Учлн [Исмагилов и др., 2022; Горбунов, 2023]. Преимущественно в старовозрастных лесах и посадках.
7760. *Brachionycha nubeculosa* (Esper, [1785]) – на всей территории. В сыроватых лесах и старых посадках.
7761. *Brachionycha sajana* Draudt, 1934 – Абзл [Исмагилов и др., 2021б]. В лесах с участием лиственницы (*Larix sibirica*).
7762. *Feralia sauberi* (Graeser, 1892) – Бурз, Кгрч, Блрц [Свиридов и др., 2006; Трофимова, 2006б; Исмагилов и др., 2021б; Горбунов, 2023]. Преимущественно в горных хвойных лесах.

Подсемейство Heliothinae

7763. *Helicoverpa armigera* (Hübner, [1808]) – на всей территории. Эвритопный лугово-полевой вид, мигрант.
7764. *Heliothis adaucta* Butler, 1878 (*maritima* auct.) – на всей территории. Преимущественно по остепненным участкам, сухим боровым полянам и прилегающим пустошам.
7765. *Heliothis incarnata* Freyer, [1838] – Хайб [Nupponen, Fibiger, 2002]. По открытым прогреваемым участкам с травянистой растительностью.
7766. *Heliothis nubigera* Herrich-Schäffer, [1851] – Хайб, Учлн, Блрц [Ахола и др., 1997]. В засушливых регионах Палеарктики, в республике мигрант.
7767. *Heliothis ononis* ([Denis et Schiffermüller], 1775) – Байм, Учлн [Nupponen, Fibiger, 2002]. По остепненным участкам.
7768. *Heliothis viriplaca* (Hufnagel, 1766) (=*dipsacea* (Linnaeus, 1767)) – на всей территории. Преимущественно по прогреваемым лугам и прилегающим пустырям.
7769. *Periphanes cora* (Eversmann, 1837) – Альш, Зиан [Круликовский, 1904; Nupponen, Fibiger, 2002]. Степной вид.
7770. *Protoschinia scutosa* ([Denis et Schiffermüller], 1775) – на всей территории. Преимущественно по сухим лугам и прилегающим пустошам.

7771. *Pyrrhia exprimens* (Walker, 1857) – Учлн, Бурз, Абзл, Блрц, Чекм [Nupponen, Fibiger, 2002; Ahola et al., 2012; Горбунов, 2023; Исмагилов, 2025б]. В бореальных лесах.

7772. *Pyrrhia umbra* (Hufnagel, 1766) – на всей территории. По прогреваемым лугам и прилегающим пустырям.

Подсемейство Condicinae

7773. *Acosmetia caliginosa* (Hübner, [1813]) – Уфмс, Кушн [Исмагилов, 2023, 2025б]. По остепненным и луговым участкам.

7774. *Eucarta amethystina* (Hübner, [1803]) – Кушн [Исмагилов и др., 2021а; Исмагилов, 2025б]. Приурочен к хвойно-широколиственным и широколиственным лесам с элементами остепнения.

7775. *Eucarta virgo* (Treitschke, 1835) **–** Блвр [Исмагилов, 2025б]. Приурочен к хвойно-широколиственным и широколиственным лесам с элементами остепнения.

Подсемейство Eriopinae

7776. *Callopistria juventina* (Stoll, [1782]) – Уфмс, Кушн [Исмагилов и др., 2021б]. По опушкам смешанных и остепненных широколиственных лесов с обилием папоротника-орляка.

Подсемейство Bryophilinae

7777. *Bryophila orthogramma* (Boursin, 1954) – Учлн, Блрц, Байм, Абзл [Ахола и др., 1997; Nupponen, Fibiger, 2002; Горбунов, 2023; Исмагилов, 2025б]. По степным склонам с глинистыми обнажениями.

7778. *Bryophila raptricula* ([Denis et Schiffermüller], 1775) – Байм [Nupponen, Fibiger, 2002]. Степной вид.

7779. *Cryphia fraudatricula* (Hübner, [1803]) – Уфа, Кушн [Исмагилов и др., 2020; Исмагилов, 2025б]. В лесах с элементами остепнения, а также в антропогенных ландшафтах.

7780. *Victrix umovii* (Eversmann, 1846) – Блрц [Ахола и др., 1997; Nupponen, Fibiger, 2002]. Характерен для старовозрастных сосняков-беломошников.

Подсемейство Noctuinae (s. l., sensu Fibiger et al., 2011)

(=Xyleninae, Hadeninae)

Триба Pseudeustrotini Beck, 1996

7781. *Pseudeustrotia candidula* ([Denis et Schiffermüller], 1775) (=*pusilla* (Vieweg, 1790)) – на всей территории. Эвритопный лугово-полевой вид.

Триба Prodeniini Frobes, 1954

7782. *Spodoptera exigua* (Hübner, [1808]) – Учлн, Бурз, Уфмс, Кушн, Уфа [Ahola et al., 2012; Хабибуллин, 2017б; Исмагилов и др., 2020; Исмагилов, 2025б]. Эвритопный лугово-полевой вид, нерегулярный мигрант.

Триба Elaphriini Beck, 1996

7783. *Elaphria venustula* (Hübner, 1790) – центральные, южные, горно-лесные, юго-восточные р-ны [Nupponen, Fibiger, 2002; Ahola et al., 2012; Горбунов, 2023; Исмагилов, 2025б]**.** Преимущественно в старовозрастных смешанных и

широколиственных лесах по прогреваемым разнотравным опушкам и полянам.

Триба Caradrinini Boisduval, 1840

7784. *Athetis furvula* (Hübner, [1808]) – Учлн, Байм, Абзл, Уфа [Nupponen, Fibiger, 2002; Ahola et al., 2012; Горбунов, 2023; Исмагилов, 2025б]. По остепненным участкам.

7785. *Athetis gluteosa* (Treitschke, 1835) – северные, центральные, южные, юго-восточные р-ны [Свиридов и др., 2006; Горбунов, 2023; Исмагилов, 2025б]. По остепненным участкам.

7786. *Athetis lepigone* (Möschler, 1860) – Блвр, Уфа [Исмагилов, 2025б]. По остепненным участкам и ксерофитным полянам в сосняках

7787. *Athetis pallustris* (Hübner, [1808]) – центральные, южные, юго-восточные р-ны [Nupponen, Fibiger, 2002; Горбунов, 2023; Исмагилов, 2025б]. Характерен для сырых лугов и болот.

7788. *Caradrina albina* Eversmann, 1848 – центральные, южные, горно-лесные, юго-восточные р-ны [Круликовский, 1904; Nupponen, Fibiger, 2002; Горбунов, 2023; Исмагилов, 2025б]. По прогреваемым лугам.

7789. *Caradrina clavipalpis* (Scopoli, 1763) (=*quadripunctata* (Fabricius, 1775)) – на всей территории. Эвритопный луговой вид.

7790. *Caradrina inumbrata* (Staudinger, 1900) – без местонахождений [Anikin et al., 2017]. Характерен для степных и полупустынных ландшафтов.

7791. *Caradrina montana* Bremer, 1861 – Учлн [Ahola et al., 2012]. По-видимому, характерен для прогреваемых луговых участков в смешанных лесах.

7792. *Caradrina morpheus* (Hufnagel, 1766) – на всей территории. Эвритопный луговой вид.

7793. *Caradrina petraea* Tengström, 1869 (=*grisea* (Eversmann, 1848)) – Чишм, Альш, Белб, Учлн [Круликовский, 1897, 1904, 1910; Горбунов, 2023]. Лесолуговой вид.

7794. *Caradrina selini* Boisduval, 1840 – Уфа, Иглн [Grosser, 1983; Исмагилов, 2025б]. Преимущественно в песчаных сосняках, значительно реже в широколиственных лесах с элементами остепнения.

7795. *Caradrina terrea* Freyer, [1839] – Учлн, Бурз, Кушн, Мелз, Сибай [Ahola et al., 2012; Хабибуллин, 2018а; Исмагилов, 2025б]. Характерен для остепненных участков.

7796. *Caradrina wullschlegeli* Püngeler, 1903 (*flavirena* auct.) – Байм, Шарн, Учлн, Блвр, Уфа [Ahola et al., 2012; Исмагилов и др., 2020; Горбунов, 2023; Исмагилов, 2025б]. В хвойно-широколиственных и широколиственных лесах с элементами остепнения.

7797. *Chilodes distracta* (Eversmann, 1848) – без местонахождений [Anikin et al., 2017]. От южно-таежных лесов до степных и горностепных районов.

7798. *Hoplodrina ambigua* ([Denis et Schiffermüller], 1775) – Нурм, Учлн [Grosser, 1983; Nupponen, Fibiger, 2002]. Характерен для прогреваемых луговых участков.

7799. *Hoplodrina blanda* ([Denis et Schiffermüller], 1775) – на всей территории. По прогреваемым лугам.
7800. *Hoplodrina octogenaria* (Goeze, 1781) (=*alsines* (Brahm, 1791)) – на всей территории. Эвритопный луговой вид.
7801. *Hoplodrina respersa* ([Denis et Schiffermüller], 1775) – без местонахождений [Anikin et al., 2000c, 2017]. Преимущественно по сухим и открытым ландшафтам.
7802. *Hoplodrina superstes* (Ochsenheimer, 1816) – Ишмб, Нурм [Grosser, 1983]. Характерен для прогреваемых луговых участков (в лесной зоне – по-видимому, в сосняках на песках).
7803. *Rusina ferruginea* (Esper, [1785]) – на всей территории. Преимущественно в старовозрастных хвойно-широколиственных и широколиственных лесах.

Триба Dypterygiini Forbes, 1954

7804. *Dypterygia scabriuscula* (Linnaeus, 1758) (=*pinastri* (Linnaeus, [1760])) – на всей территории. В лесах и посадках различных типов по разнотравным опушкам и полянам.
7805. *Trachea atriplicis* (Linnaeus, 1758) – на всей территории. Эвритопный луговой вид

Триба Actinotiini Beck, 1996

7806. *Actinotia polyodon* (Clerck, 1759) – на всей территории. По разнотравным лесным опушкам, полянам и лугам.
7807. *Actinotia radiosa* (Esper, 1804) – Учлн [Nupponen, Fibiger, 2006; Горбунов, 2023; Исмагилов, 2023]. Преимущественно по степным участкам.

Триба Phlogophorini Hampson, 1918

7808. *Euplexia lucipara* (Linnaeus, 1758) – на всей территории. Эвритопный лесолуговой вид.

? *Phlogophora meticulosa* (Linnaeus, 1758) – без местонахождений [Мигранов, Саттаров, 2006] (?). Наличие этого редкого мигранта в РБ требует подтверждения.

Триба Apameini Boisduval, 1828

7809. *Amphipoea asiatica* (Burrows, 1911) – Учлн [Ahola et al., 2012].
7810. *Amphipoea crinanensis* (Burrows, 1908) – Учлн [Nupponen, Fibiger, 2011; Горбунов, 2023]. По лесным полянам близ водоемов с участием ириса ложноаирового (*Iris pseudacorus*).
7811. *Amphipoea fucosa* (Freyer, 1830) (=*paludis* (Tutt, 1888)) – на всей территории. Преимущественно по прогреваемым лугам и пустырям.
7812. *Amphipoea lucens* (Freyer, 1845) – Учлн [Ahola et al., 2012]. По сыроватым лесным опушкам и полянам.
7813. *Amphipoea oculea* (Linnaeus, [1760]) (=*nictitans* (Linnaeus, 1761)*;* =*erythrostigma* (Haworth, 1809)) – Чишм, Белб (?), Архн, Блвр, Нефтекамск [Круликовский, 1897, 1910 (?); Исмагилов и др., 2021б; Исмагилов, 2025б]. В старовозрастных лесах по разнотравным опушкам и полянам.

7814. *Apamea anceps* ([Denis et Schiffermüller], 1775) (=*sordida* (Borkhausen, 1792)) – Учлн, Ишмб, Мелз, Стмк [Nupponen, Fibiger, 2002; Петров и др., 2019]. Характерен для прогреваемых луговых участков.
7815. *Apamea crenata* (Hufnagel, 1766) (=*rurea* (Fabricius, 1775)) – на всей территории. Эвритопный лесолуговой вид.
7816. *Apamea ferrago* (Eversmann, 1837) – Зиан, Учлн, Бурз, Абзл, Блвр [Nupponen, Fibiger, 2002; Ahola et al., 2012; Исмагилов, 2025б]. По прогреваемым разнотравным лугам и прилегающим пустырям.
7817. *Apamea furva* ([Denis et Schiffermüller], 1775) – Кгрч, Байм, Учлн, Кигн [Grosser, 1983; Nupponen, Fibiger, 2002; Исмагилов, 2025б]. Характерен для прогреваемых опушек смешанных лесов и луговых участков.
7818. *Apamea illyria* Freyer, 1846 – Блрц, Кгрч, Учлн [Ахола и др., 1997; Nupponen, Fibiger, 2002; Свиридов и др., 2006; Горбунов, 2023]. Характерен для старовозрастных смешанных лесов, лесолуговой вид.
7819. *Apamea lateritia* (Hufnagel, 1766) – на всей территории. По прогреваемым лугам и пустошам.
7820. *Apamea lithoxylaea* ([Denis et Schiffermüller], 1775) – Кушн [Исмагилов, 2023]. Преимущественно по степным участкам.
7821. *Apamea monoglypha* (Hufnagel, 1766) (=*polyodon* (Linnaeus, [1760])) – на всей территории. Эвритопный луговой вид.
7822. *Apamea oblonga* (Haworth, [1809]) (*nigricans* auct.) – центральные, южные, юго-восточные р-ны [Grosser, 1983; Nupponen, Fibiger, 2002; Ahola et al., 2012; Исмагилов, 2025б]. Преимущественно по остепненным участкам, реже по прогреваемым лесным опушкам и пустошам.
7823. *Apamea remissa* (Hübner, [1809]) – Бурз, Байм, Нефтекамск [Свиридов и др., 2006; Трофимова, 2006б; Ahola et al., 2012; Исмагилов, 2025б]. Умеренно эвритопный луговой мезофил.
7824. *Apamea rubrirena* (Treitschke, 1825) – Блрц, Учлн, Бурз, Абзл [Ахола и др., 1997; Nupponen, Fibiger, 2002; Ahola et al., 2012; Горбунов, 2023; Исмагилов, 2025б]. Характерен для луговых участков в лесах таежного типа.
7825. *Apamea sordens* (Hufnagel, 1766) (=*basilinea* ([Denis et Schiffermüller], 1775)) – на всей территории. Эвритопный луговой вид.
7826. *Apamea unanimis* (Hübner, [1813]) – Блрц, Кушн, Уфа [Ахола и др., 1997; Исмагилов и др., 2022; Исмагилов, 2025б]. Характерен для прибрежных ивняков.
7827. *Archanara dissoluta* (Treitschke, 1825) – Кушн [Исмагилов, 2023]. Прибрежно-луговой вид.
7828. *Arenostola phragmitidis* (Hübner, [1803]) – Блвр [Исмагилов, 2025б]. Прибрежно-луговой вид.
7829. *Argyrospila succinea* (Esper, 1798) – южные, юго-восточные р-ны [Nupponen, Fibiger, 2002; Свиридов и др., 2006; Ahola et al., 2012; Исмагилов и др., 2020; Горбунов, 2023; Исмагилов, 2025б]. По степям.

7830. *Calamia tridens* (Hufnagel, 1766) (=*virens* (Linnaeus, 1767)) – на всей территории. По прогреваемым лугам.
7831. *Celaena haworthii* (Curtis, 1829) – Уфа [Исмагилов и др., 2022]. По сфагновым болотам с обилием пушиц.
7832. *Cervyna cervago* (Eversmann, 1844) – Учлн [Nupponen, Fibiger, 2002]. Преимущественно по остепненным участкам.
7833. *Denticucullus pygmina* (Haworth, [1809]) – Учлн, Иглн [Nupponen, Fibiger, 2006; Исмагилов, 2025б]. В лесных ландшафтах по заболоченным травянистым участкам.
? *Eremobia ochroleuca* ([Denis et Schiffermüller], 1775) – Чишм [Круликовский, 1897] (?). Наличие современных популяций в РБ требует подтверждения. Характерен для остепненных участков.
7834. *Eremobina pabulatricula* (Brahm, 1791) – Зиан, Учлн, Нефтекамск [Nupponen, Fibiger, 2002; Ahola et al., 2012; Исмагилов и др., 2022; Горбунов, 2023]. В смешанных лесах.
7835. *Globia sparganii* (Esper, 1790) – Нефтекамск, Блвр, Туйм [Исмагилов и др., 2021б; Исмагилов, 2025б]. Прибрежно-луговой вид.
7836. *Gortyna flavago* ([Denis et Schiffermüller], 1775) – Бурз, Мелз, Иглн [Трофимова, 2003; Исмагилов, 2025б]. Эвритопный луговой вид.
7837. *Helotropha leucostigma* (Hübner, [1808]) – Учлн, Туйм, Кушн, Чишм, Уфа, Сибай [Nupponen, Fibiger, 2002; Ahola et al., 2012; Исмагилов и др., 2022]. Преимущественно по заболоченным участкам старовозрастных лесов.
7838. *Hydraecia micacea* (Esper, 1789) – Учлн, Блвщ, Блвр [Nupponen, Fibiger, 2006; Ahola et al., 2012; Исмагилов и др., 2022; Горбунов, 2023; Исмагилов, 2025б]. Эвритопный лугово-полевой вид.
7839. *Hydraecia nordstroemi* Horke, 1952 – Учлн [Nupponen, Fibiger, 2002]. По влажным лугам.
7840. *Hydraecia osseola* (Staudinger, 1882) – Байм [Исмагилов и др., 2022]. В околоводных биотопах лесостепи.
7841. *Hydraecia ultima* Holst, 1965 – Учлн, Блвщ, Кушн, Нефтекамск [Nupponen, Fibiger, 2002; Исмагилов, 2025б]. Характерен для прибрежных лугов.
7842. *Lateroligia ophiogramma* (Esper, 1794) – Кушн [Исмагилов и др., 2022]. В смешанных и широколиственных лесах с заболоченными участками.
7843. *Litoligia literosa* (Haworth, [1809]) – Учлн, Абзл [Nupponen, Fibiger, 2002; Ahola et al., 2012; Горбунов, 2023; Исмагилов, 2023]. Характерен для прогреваемых луговых участков в смешанных лесах и остепненных участков
7844. *Loscopia scolopacina* (Esper, 1788) – Блрц [Исмагилов и др., 2022]. В смешанных и широколиственных лесах с заболоченными участками.
7845. *Mesapamea moderata* (Eversmann, 1843) – Учлн [Горбунов, 2023]. Степной вид.
7846. *Mesapamea secalis* (Linnaeus, 1758) – на всей территории. Эвритопный лесолуговой вид.

7847. *Mesoligia furuncula* ([Denis et Schiffermüller], 1775) – на всей территории. Преимущественно по прогреваемым и остепненным лугам, реже по прилегающим пустырям.
7848. *Nonagria typhae* (Thunberg, 1784) – Туйм, Учлн [Исмагилов и др., 2022; Горбунов, 2023]. Прибрежно-луговой вид.
7849. *Oligia latruncula* ([Denis et Schiffermüller], 1775) – на всей территории. Эвритопный лесолуговой мезофил.
7850. *Oligia strigilis* (Linnaeus, 1758) – на всей территории. Эвритопный лесолуговой мезофил.

? *Oligia versicolor* (Borkhausen, 1792*)* – Бурз [Хабибуллин, 2017б, 2018а] (?). Вид определяется по гениталиям и требует проверки материала. Основной ареал O. versicolor, по-видимому, не ближе Белоруссии и Прибалтики.

? *Oria musculosa* (Hübner, [1808]) – без местонахождений [Круликовский, 1893] (?). Наличие вида в РБ требует подтверждения современным материалом. Степной вид.

7851. *Photedes captiuncula* (Treitschke, 1825) – Бурз [Свиридов и др., 2006]. По-видимому, характерен для заболоченных травянистых участков.
7852. *Photedes extrema* (Hübner, [1809]) – Байм [Свиридов и др., 2006]. Прибрежно-луговой вид.
7853. *Photedes fluxa* (Hübner, [1809]) – северные, центральные, южные, юго-восточные р-ны [Nupponen, Fibiger, 2002; Трофимова, 2006б; Ahola et al., 2012; Горбунов, 2023; Исмагилов, 2025б]. В лесных ландшафтах по заболоченным травянистым участкам.
7854. *Resapamea vulpecula* (Eversmann, 1852) (=*hedeni* (Graeser, 1888)) – центральные, южные, горно-лесные, юго-восточные р-ны [Nupponen, Fibiger, 2002; Ahola et al., 2012; Исмагилов, 2025б]. По прогреваемым лугам.
7855. *Rhizedra lutosa* (Hübner, [1803]) – на всей территории. Прибрежно-луговой вид.
7856. *Sedina buettneri* (E. Hering, 1858) – Учлн [Nupponen, Fibiger, 2006]. Прибрежно-луговой вид.
7857. *Sidemia spilogramma* (Rambur, 1871) – Туйм, Давл, Блвр [Исмагилов и др., 2022; Исмагилов, 2025б]. Степной вид.
7858. *Staurophora celsia* (Linnaeus, 1758) – Учлн, Бурз, Мелз, Абзл, Кгрч [Nupponen, Fibiger, 2002; Трофимова, 2003; Бакалова, 2016; Горбунов, 2023; Исмагилов, 2025б]. В старовозрастных смешанных лесах.

Триба Xylenini Guinée, 1837

7859. *Ammoconia caecimacula* ([Denis et Schiffermüller], 1775) – Учлн, Блрц, Блвр, Иглн, Крмс [Nupponen, Fibiger, 2002; Свиридов и др., 2006; Исмагилов, 2025б]. Преимущественно в смешанных лесах.
7860. *Anchoscelis helvola* (Linnaeus, 1758) – Учлн [Горбунов, 2023]. В сухих сосняках и остепненных лиственных лесах по опушкам и полянам.
7861. *Antitype chi* (Linnaeus, 1758) – Учлн [Исмагилов и др., 2022]. Характерен для смешанных и изреженных лиственных лесов.

7862. *Apterogenum ypsillon* ([Denis et Schiffermüller], 1775) (=*fissipuncta* (Haworth, 1809)) – Белб, Уфа, Нефтекамск [Круликовский, 1910; Исмагилов, 2025б]. Эвритопный лесной вид.
7863. *Atypha pulmonaris* (Esper, 1790) – Нурм, Зиан, Блрц, Кушн [Grosser, 1983; Nupponen, Fibiger, 2002; Исмагилов и др., 2021а; Исмагилов, 2025б]. В основном в старовозрастных смешанных и широколиственных лесах по разрежениям, разнотравным опушкам и полянам.
7864. *Blepharita amica* (Treitschke, 1825) – Учлн, Бурз [Горбунов, 2023; Исмагилов, 2023]. Эвритопный лесной вид.
7865. *Brachylomia viminalis* (Fabricius, [1777]) – Зиан, Учлн [Nupponen, Fibiger, 2002, 2006; Горбунов, 2023]. Преимущественно в старовозрастных лесах.
7866. *Cirrhia icteritia* (Hufnagel, 1766) – на всей территории. Эвритопный лесолуговой вид.
7867. *Cirrhia ocellaris* (Borkhausen, 1792) – Учлн, Иглн, Чишм [Горбунов, 2023; Исмагилов, 2025б]. В изреженных лесах и посадках лесостепного типа.
7868. *Conistra erythrocephala* ([Denis et Schiffermüller], 1775) – Крмс, Кушн, Мелз, Уфа [Исмагилов и др., 2020; Исмагилов, 2025б]. В хвойно-широколиственных и широколиственных лесах с элементами остепнения.
7869. *Conistra rubiginea* ([Denis et Schiffermüller], 1775) – на всей территории [Свиридов и др., 2006; Исмагилов, 2025б]. Преимущественно в старовозрастных хвойно-широколиственных и широколиственных лесах.
7870. *Conistra vaccinii* (Linnaeus, [1760]) – на всей территории. Преимущественно в смешанных, реже в лиственных лесах.
7871. *Cosmia affinis* (Linnaeus, 1767) – северные, центральные, южные, горно-лесные р-ны [Nupponen, Fibiger, 2002; Хабибуллин, 2017б; Исмагилов, 2025б]. В лесах и посадках с участием вязов *(Ulmus* spp.).
7872. *Cosmia diffinis* (Linnaeus, 1767) – северные, центральные, южные, горно-лесные р-ны [Nupponen, Fibiger, 2002; Трофимова, 2003; Паженков и др., 2005; Хабибуллин, 2017б; Исмагилов, 2025б]. В лесах и посадках с участием вязов (*Ulmus* spp.).
7873. *Cosmia pyralina* ([Denis et Schiffermüller], 1775) – Бурз, Мелз, Блвщ, Блрц, Уфмс, Сибай [Трофимова, 2003, Паженков и др., 2005; Исмагилов и др., 2020; Исмагилов, 2025б]. В широколиственных и хвойно-широколиственных лесах.
7874. *Cosmia trapezina* (Linnaeus, 1758) – на всей территории. Эвритопный лесной мезофил.
7875. *Dasypolia templi* (Thunberg, 1792) – Учлн, Блвр, Слвт, Иглн, Уфа [Nupponen, Fibiger, 2002; Исмагилов и др., 2021а; Исмагилов, 2025б]. По горным склонам, каменистым степям и оврагам.
7876. *Dicycla oo* (Linnaeus, 1758) – Уфа, Чекм [Исмагилов и др., 2020; Исмагилов, 2025б]. В лесах с участием дуба (*Quercus robur*).

7877. *Enargia abluta* (Hübner, [1808]) (=*imbuta* (Boisduval, 1840)) – Альш, Уфмс, Сибай [Круликовский, 1904; Исмагилов и др., 2020; Исмагилов, 2025б]. Характерен для перелесков и лесопосадок степной зоны.
7878. *Enargia paleacea* (Esper, [1788]) (=*fulvago* (Hübner, [1803])) – на всей территории. Эвритопный лесной вид.
7879. *Eremohadena immunda* (Eversmann, 1842) – Блрц, Байм, Учлн, Уфа [Ахола и др., 1997; Nupponen, Fibiger, 2002; Исмагилов, 2025б]. По прогреваемым лугам.
7880. *Eupsilia transversa* (Hufnagel, 1766) – на всей территории. Эвритопный лесной вид.
7881. *Griposia aprilina* (Linnaeus, 1758) – Уфа, Иглн [Исмагилов и др., 2022; Исмагилов, 2025б]. В широколиственных и хвойно-широколиственных лесах с участием дуба (*Quercus robur*).
7882. *Hyppa rectilinea* (Esper, 1788) – Блрц, Учлн [Ахола и др., 1997; Nupponen, Fibiger, 2002; Горбунов, 2023]. Преимущественно в смешанных лесах с болотами.
7883. *Ipimorpha retusa* (Linnaeus, [1760]) – Учлн, Бурз, Мелз, Клтс, Ишмб, Уфа [Nupponen, Fibiger, 2002, 2006; Трофимова, 2003; Ahola et al., 2012; Исмагилов, 2025б]. Преимущественно в старовозрастных лесах.
7884. *Ipimorpha subtusa* ([Denis et Schiffermüller], 1775) – Бурз, Мелз, Стмк [Трофимова, 2003; Исмагилов и др., 2020]. Преимущественно в старовозрастных лесах и посадках.
7885. *Leptologia lota* (Clerck, 1759) – Иглн [Исмагилов, 2025б]. По смешанным и широколиственным лесам.
7886. *Lithophane consocia* (Borkhausen, 1792) – Учлн, Мелз, Бурз, Дувн, Уфа [Nupponen, Fibiger, 2002; Трофимова, 2003; Свиридов и др., 2006; Горбунов, 2023; Исмагилов, 2025б]. Преимущественно в смешанных лесах и прибрежных перелесках с участием ольхи черной (*Alnus glutinosa*).
7887. *Lithophane furcifera* (Hufnagel, 1766) – Абзл, Учлн, Уфа [Исмагилов и др., 2021б; Горбунов, 2023; Исмагилов, 2025б]. В лесах и прибрежных перелесках с участием ольхи черной (*Alnus glutinosa*).
7888. *Lithophane ornitopus* (Hufnagel, 1766) – Уфмс, Крмс, Гафр, Дувн, Уфа [Исмагилов и др., 2020; Исмагилов, 2025б]. Преимущественно в широколиственных, реже в смешанных лесах неморального типа.
7889. *Lithophane socia* (Hufnagel, 1766) – северные, центральные, южные, юго-восточные р-ны [Nupponen, Fibiger, 2002, 2006; Горбунов, 2023; Исмагилов, 2025б]. Эвритопный лесной вид.
7890. *Mesogona acetosellae* ([Denis et Schiffermüller], 1775) – Учлн, Блвр [Nupponen, Fibiger, 2002; Исмагилов, 2023]. Характерен для лесов неморального и лесостепного типов.
7891. *Mesogona oxalina* (Hübner, [1803]) – Учлн [Горбунов, 2023]. В старовозрастных смешанных и широколиственных лесах.

7892. *Mniotype adusta* (Esper, 1790) – Бурз (?), Байм [Трофимова, 2003; Ahola et al., 2012]. В первой двух цит. работе указан из междуречья Нугуша и Урюк, однако в последующих работах данное указание не подтверждено. В старовозрастных смешанных лесах.

7893. *Mniotype bathensis* (Lützau, 1901) – Блрц, Бурз [Ахола и др., 1997; Nupponen, Fibiger, 2002; Ahola et al., 2012]. По бореальным лесам со сфагновыми болотами.

7894. *Mniotype satura* ([Denis et Schiffermüller], 1775) – Учлн, Кгрч, Нефтекамск [Nupponen, Fibiger, 2002; Горбунов, 2023; Исмагилов, 2025б] Преимущественно в старовозрастных смешанных, реже в широколиственных лесах.

7895. *Orbona fragariae* (Vieweg, 1790) – без местонахождений [Anikin et al., 2000c, 2017]. Преимущественно по прогреваемым склонам и остепненным лугам.

7896. *Parastichtis suspecta* (Hübner, [1817]) – центральные, южные, горно-лесные, юго-восточные р-ны [Grosser, 1983; Ahola et al., 2012; Исмагилов и др., 2022; Горбунов, 2023; Исмагилов, 2025б]. Эвритопный лесной мезофил.

7897. *Propenistra laevis* (Hübner, [1803]) – Кушн [Исмагилов, 2023]. Характерен для перелесков и лесонасаждений лесостепной и степной зон.

7898. *Sunira circellaris* (Hufnagel, 1766) – Уфа, Блвщ, Учлн [Исмагилов и др., 2022; Горбунов, 2023]. Эвритопный лесной вид.

7899. *Tiliacea citrago* (Linnaeus, 1758) – Учлн, Уфа, Иглн, Туйм [Nupponen, Fibiger, 2006; Исмагилов, 2025б]. В смешанных и широколиственных лесах с обилием липы.

7900. *Xanthia togata* (Esper, [1788]) (=*lutea* (Ström, 1783)) – Уфа, Нефтекамск, Учлн, Бурз, Иглн [Исмагилов и др., 2021а; Горбунов, 2023; Исмагилов, 2025б]. Преимущественно в старовозрастных лесах по редколесьям и опушкам.

7901. *Xylena exsoleta* (Linnaeus, 1758) – северо-восточные, центральные, южные, горно-лесные, юго-восточные р-ны [Исмагилов и др., 2020; Горбунов, 2023; Исмагилов, 2025б]. Характерен для прогреваемых луговых участков.

7902. *Xylena solidaginis* (Hübner, [1803]) – Учлн [Горбунов, 2023]. В смешанных лесах бореального типа.

7903. *Xylena vetusta* (Hübner, [1813]) – Учлн, Абзл, Иглн, Уфа [Nupponen, Fibiger, 2002; Исмагилов, 2025б]. В лесных ландшафтах по разрежениям, опушкам, прилегающим лугам.

Триба Orthosiini Guinée, 1837

7904. *Anorthoa munda* ([Denis et Schiffermüller], 1775) – Бурз, Ишмб, Крмс, Кушн, Уфа [Хабибуллин, 2018а; Исмагилов и др., 2022; Исмагилов, 2025б]. Эвритопный лесной вид.

7905. *Egira conspicillaris* (Linnaeus, 1758) – Учлн [Nupponen, Fibiger, 2002; Горбунов, 2023]. Преимущественно по прогреваемым лугам и прилегающим пустошам.

7906. *Orthosia cerasi* (Fabricius, 1775) – Учлн [Горбунов, 2023]. Преимущественно в хвойно-широколиственных и широколиственных лесах.
7907. *Orthosia cruda* ([Denis et Schiffermüller], 1775) – Бурз, Кушн, Стмк, Уфа, Октябрьский [Хабибуллин, 2017б, 2018а; Исмагилов, 2025б]. Преимущественно в хвойно-широколиственных и широколиственных лесах.
7908. *Orthosia ella* (Butler, 1878) – Учлн [Nupponen, Fibiger, 2011]. Лиственные и смешанные леса, долины рек.
7909. *Orthosia gothica* (Linnaeus, 1758) – на всей территории. Преимущественно в хвойно-широколиственных и широколиственных лесах.
7910. *Orthosia gracilis* ([Denis et Schiffermüller], 1775) – Уфа, Учлн, Крмс [Исмагилов и др., 2020; Горбунов, 2023; Исмагилов, 2025б]. В лесах и посадках различных типов по редколесьям и опушкам.
7911. *Orthosia incerta* (Hufnagel, 1766) (=*instabilis* ([Denis et Schiffermüller], 1775)) – на всей территории. Эвритопный лесной вид
7912. *Orthosia miniosa* ([Denis et Schiffermüller], 1775) – Уфа [Исмагилов и др., 2020]. По прогреваемым разнотравным лесным полянам в широколиственных лесах с участием дуба (*Quercus robur*).
7913. *Orthosia opima* (Hübner, [1809]) – Абзл [Исмагилов и др., 2021б]. Характерен для смешанных лесов.
7914. *Orthosia populeti* (Fabricius, 1781) – Бурз, Уфа [Хабибуллин, 2017б; Исмагилов и др., 2020]. Эвритопный лесной вид.
7915. *Panolis flammea* ([Denis et Schiffermüller], 1775) – на всей территории. В сосняках.
7916. *Perigrapha circumducta* (Lederer, 1855) – Байм, Абзл, Учлн [Ahola et al., 2012; Исмагилов и др., 2021б; Горбунов, 2023]**.** По степям.

Триба Tholerini Beck, 1996

7917. *Cerapteryx graminis* (Linnaeus, 1758) – Нурм, Учлн [Grosser, 1983; Мигранов и др., 2020а; Горбунов, 2023; Исмагилов, Валуев, 2023б]. По разнотравным лесным опушкам и полянам.
7918. *Tholera cespitis* ([Denis et Schiffermüller], 1775) – на всей территории. Умеренно эвритопный лесолуговой вид.
7919. *Tholera decimalis* (Poda, 1761) – на всей территории. Эвритопный луговой вид.

Триба Hadenini Guinée, 1837

7920. *Anarta colletti* (Sparre-Schneider, 1876) – Учлн [Nupponen, Fibiger, 2002]. Характерен для ксерофитных склонов.
7921. *Anarta dianthi* (Tauscher, 1809) – Учлн, Стмк [Nupponen, Fibiger, 2002; Исмагилов, 2023]. Характерен для степных участков.
7922. *Anarta odontites* (Boisduval, [1828]) – Блвр [Исмагилов, 2023]. По каменистым степям и склонам.
7923. *Anarta stigmosa* (Christoph, 1887) – Байм [Исмагилов и др., 2020]. По степным участкам.

7924. *Anarta trifolii* (Hufnagel, 1766) (=*chenopodii* ([Denis et Schiffermüller], 1775)) – на всей территории. Эвритопный лугово-полевой вид.
7925. *Ceramica pisi* (Linnaeus, 1758) – на всей территории. Эвритопный лесолуговой вид.
7926. *Conisania literata* (Fischer von Waldheim, 1840) – Учлн, Байм [Nupponen, Fibiger, 2002; Исмагилов и др., 2022]. Степной вид.
7927. *Conisania luteago* ([Denis et Schiffermüller], 1775) – на всей территории. Преимущественно по сухим боровым опушкам, остепненным участкам, отчасти по прилегающим лугам и пустошам.
7928. *Coranarta cordigera* (Thunberg, 1788) – Блрц [Ольшванг, Малоземов, 1987]. Характерен для лесов таежного типа по сфагновым болотам с обилием голубики.
7929. *Hada plebeja* (Linnaeus, [1760]) (=*dentina* ([Denis et Schiffermüller], 1775); =*nana* (Hufnagel, 1766)) – на всей территории. Эвритопный лесолуговой вид.
7930. *Hadena albimacula* (Borkhausen, 1792) – Альш, Учлн, Абзл, Блвр [Круликовский, 1904; Nupponen, Fibiger, 2002; Ahola et al., 2012; Горбунов, 2023; Исмагилов, 2025б]. По ксерофитным боровым опушкам и остепненным участкам.
7931. *Hadena capsincola* ([Denis et Schiffermüller], 1775) (?*bicruris* (Hufnagel, 1766)) – Белб, Учлн, Блвр, Зиан, Кгрч [Круликовский, 1910; Nupponen, Fibiger, 2002; Свиридов и др., 2006; Трофимова, 2006б; Ahola et al., 2012; Горбунов, 2023; Исмагилов, 2025б]. Преимущественно в лесных ландшафтах по прогреваемым разнотравным и остепненным участкам.
7932. *Hadena christophi* (Möschler, 1862) – Учлн [Nupponen, Fibiger, 2002]. По галофильным степям.
7933. *Hadena compta* ([Denis et Schiffermüller], 1775) – Учлн, Байм, Бурз, Уфа [Nupponen, Fibiger, 2002; Ahola et al., 2012; Горбунов, 2023; Исмагилов, 2025б]. По прогреваемым лугам и опушкам.
7934. *Hadena confusa* (Hufnagel, 1766) (=*conspersa* ([Denis et Schiffermüller], 1775)) – на всей территории. По прогреваемым лесным полянам и опушкам.
7935. *Hadena corrupta* (Herz, 1898) – Учлн [Rybalkin et al., 2022; Горбунов, 2023]. По степям.
7936. *Hadena filograna* (Esper, 1788) (=*filigrama* (Esper, 1796)) – Байм, Учлн, Зиан [Nupponen, Fibiger, 2002; Горбунов, 2023]. По степям и в сосняках на песчаных почвах.
7937. *Hadena irregularis* (Hufnagel, 1766) – Байм, Учлн, Мелз, Чишм [Nupponen, Fibiger, 2002; Горбунов, 2023; Исмагилов, 2025б]. По остепненным участкам.
7938. *Hadena magnolii* (Boisduval, [1828]) – Стмк [Исмагилов и др., 2021а]. По степям.
7939. *Hadena perplexa* ([Denis et Schiffermüller], 1775) (=*carpophaga* (Brahm, 1791)) – центральные, южные, юго-восточные р-ны [Grosser, 1983; Nupponen, Fibiger, 2002; Горбунов, 2023; Исмагилов, 2025б]. Преимущественно по

сухим боровым полянам, прилегающим пустошам, а также по остепненным участкам.

7940. *Hadena persimilis* Hacker, 1996 – Учлн, Бурз [Nupponen, Fibiger, 2002; Ahola et al., 2012; Горбунов, 2023; Рыбалкин, 2024]. По степям.

7941. *Hadena variolata* (Smith, 1888) – Учлн [Горбунов, 2023; Исмагилов, 2023]. По степям.

7942. *Hecatera bicolorata* (Hufnagel, 1766) – центральные, южные, юго-восточные р-ны [Nupponen, Fibiger, 2002; Ahola et al., 2012; Горбунов, 2023; Исмагилов, 2025б]. По прогреваемым лугам и опушкам.

7943. *Hecatera dysodea* ([Denis et Schiffermüller], 1775) – Хайб, Учлн, Кушн, Уфа, Нефтекамск [Ахола и др., 1997; Nupponen, Fibiger, 2002; Ahola et al., 2012; Горбунов, 2023; Исмагилов, 2025б]. В изреженных лесах и посадках, чаще с элементами остепнения.

7944. *Hyssia cavernosa* (Eversmann, 1842) – Учлн, Байм, Бурз, Кушн [Ахола и др., 1997; Nupponen, Fibiger, 2002; Ahola et al., 2012; Горбунов, 2023; Исмагилов, 2025б]. По прогреваемым лугам и прилегающим пустырям.

7945. *Lacanobia aliena* (Hübner, [1809]) – на всей территории. По прогреваемым лугам и пустошам.

7946. *Lacanobia blenna* (Hübner, [1824]) – Крмс [Исмагилов, 2025б]. Временно укореняющийся вид, характерный для открытых ксерофитных биотопов с лебедой (*Atriplex* spp.).

7947. *Lacanobia contigua* ([Denis et Schiffermüller], 1775) – на всей территории. В смешанных и широколиственных лесах по прогреваемым разнотравным опушкам и полянам.

7948. *Lacanobia oleracea* (Linnaeus, 1758) – на всей территории. Эвритопный луговой вид.

7949. *Lacanobia splendens* (Hübner, [1808]) – Ишмб [Nupponen, Fibiger, 2002]. По прогреваемым лугам и пустошам.

7950. *Lacanobia suasa* ([Denis et Schiffermüller], 1775) (=*dissimilis* (Knoch, 1781)) – на всей территории. Эвритопный лугово-полевой вид.

7951. *Lacanobia thalassina* (Hufnagel, 1766) – на всей территории. Эвритопный лесолуговой мезофил.

7952. *Lacanobia w-latinum* (Hufnagel, 1766) – на всей территории. По опушкам сосняков и широколиственных лесов с элементами остепнения.

7953. *Mamestra brassicae* (Linnaeus, 1758) – на всей территории. Преимущественно в агроценозах с посевами крестоцветных.

7954. *Melanchra persicariae* (Linnaeus, [1760]) – на всей территории. Эвритопный лесолуговой вид.

7955. *Pachetra sagittigera* (Hufnagel, 1766) (=*bombycina* (Eversmann, 1847)) – Хайб, Блрц, Учлн, Байм [Ахола и др., 1997; Nupponen, Fibiger, 2002; Свиридов и др., 2006; Мигранов и др., 2020б; Горбунов, 2023; Исмагилов, Валуев, 2023б]. Характерен для открытых ксерофитных биотопов.

7956. *Papestra biren* (Goeze, 1781) – Блрц, Мелз, Учлн [Ахола и др., 1997; Nupponen, Fibiger, 2002; Горбунов, 2023]. В сырых хвойных лесах.
7957. *Polia bombycina* (Hufnagel, 1766) (=*advena* ([Denis et Schiffermüller], 1775)) – на всей территории. Умеренно эвритопный лесолуговой вид.
7958. *Polia hepatica* (Clerck, 1759) (=*trimaculosa* (Esper, 1788)) – Нурм, Блрц [Grosser, 1983; Ahola et al., 2012; Хабибуллин, 2017б]. В смешанных лесах с обширными черничниками.
7959. *Polia nebulosa* (Hufnagel, 1766) – на всей территории. Эвритопный лесной мезофил.
7960. *Polia serratilinea* Ochsenheimer, 1816 – Альш, Учлн, Байм, Бурз [Круликовский, 1904; Ахола и др., 1997; Nupponen, Fibiger, 2002; Ahola et al., 2012; Горбунов, 2023]. Степной вид.
7961. *Polia subcontigua* (Eversmann, 1852) (=*altaica* (Lederer, 1853)) – Байм, Блрц, Учлн [Nupponen, Fibiger, 2002; Ahola et al., 2012]. Характерен для ксерофитных склонов и оврагов.
7962. *Polia vespertilio* (Draudt, 1934) – Бурз [Ahola et al., 2012]. Характерен для светлохвойной тайги в среднем поясе гор.
7963. *Saragossa siccanorum* (Staudinger, 1870) – Кгрч [Свиридов и др., 2006; Трофимова, 2006б]. Степной вид.
7964. *Sideridis egena* (Lederer, 1853) – без местонахождений [Anikin et al., 2000c, 2017]. Степной вид.
7965. *Sideridis kitti* (Schawerda, 1914) – Учлн, Блвр [Ahola et al., 2012; Исмагилов, 2025б]. Характерен для степных участков.
7966. *Sideridis lampra* (Schawerda, 1913) (=*evidens* (Hübner, [1808])) – Кгрч, Хайб, Байм, Учлн, Блвр [Grosser, 1983; Ахола и др., 1997; Nupponen, Fibiger, 2002; Ahola et al., 2012; Горбунов, 2023; Исмагилов, 2025б]. Характерен для открытых ксерофитных биотопов.
7967. *Sideridis reticulata* (Goeze, 1781) (=*saponariae* (Borkhausen, 1792)) – на всей территории. Преимущественно по прогреваемым разнотравным лесным полянам и опушкам, отчасти по прилегающим лугам и пустошам.
7968. *Sideridis rivularis* (Fabricius, 1775) (=*cucubali* ([Denis et Schiffermüller], 1775)) – на всей территории. Преимущественно по прогреваемым лесным полянам и опушкам.
7969. *Sideridis turbida* (Esper, 1790) (=*albicolon* (Hübner, [1813])) – Туйм, Учлн, Байм [Nupponen, Fibiger, 2002; Ahola et al., 2012; Горбунов, 2023]. Преимущественно по ксерофитным опушкам смешанных лесов и остепненным участкам.

Триба Leucaniini Guinée, 1837

7970. *Leucania comma* (Linnaeus, [1760]) – на всей территории. Эвритопный луговой вид.
7971. *Leucania obsoleta* (Hübner, [1803]) – Кушн [Исмагилов и др., 2021а]. Прибрежно-луговой вид.

7972. *Mythimna albipuncta* ([Denis et Schiffermüller], 1775) – центральные, южные, горно-лесные, юго-восточные р-ны [Nupponen, Fibiger, 2002; Трофимова, 2003; Исмагилов, 2025б]. По прогреваемым и остепненным лугам, отчасти по прилегающим пустошам.

? *Mythimna alopecuri* (Boisduval, 1840) – без местонахождений [Ménétries, 1849]. Наличие вида в РБ вполне вероятно, но требует подтверждения современным материалом. Степной вид.

7973. *Mythimna anderreggii* (Boisduval, 1840) – Туйм, Учлн [Nupponen, Fibiger, 2002; Горбунов, 2023]. Степной вид.

7974. *Mythimna conigera* ([Denis et Schiffermüller], 1775) – на всей территории. По прогреваемым лугам, прилегающим полям и пустырям.

7975. *Mythimna deserticola* (Bartel, 1903) – Блвр [Исмагилов, 2025б]. По степям и ксерофитным опушкам песчаных сосняков.

7976. *Mythimna ferrago* (Fabricius, 1787) – на всей территории. По прогреваемым разнотравным лугам и прилегающим пустырям.

7977. *Mythimna impura* (Hübner, [1808]) – на всей территории. Преимущественно по сыроватым луговым участкам.

7978. *Mythimna l-album* (Linnaeus, 1767) – северные, центральные, южные р-ны [Исмагилов и др., 2020; Исмагилов, 2025б]. По остепненным участкам, прилегающим сухим лугам и пустырям.

7979. *Mythimna opaca* (Staudinger, 1900) – Учлн [Ахола и др., 1997; Nupponen, Fibiger, 2002; Горбунов, 2023]. По степям.

7980. *Mythimna pallens* (Linnaeus, 1758) – на всей территории. Эвритопный луговой мезофил.

7981. *Mythimna pudorina* ([Denis et Schiffermüller], 1775) – Ермк, Давл [Исмагилов и др., 2020; Исмагилов, 2025б]. В основном в лесных ландшафтах и по облесненным берегам водоемов с участием тростника (*Phragmites australis*).

? *Mythimna straminea* (Treitschke, 1825) – Стмк [Петров и др., 2019] (?). Вид довольно сложен в определении для неспециалистов и требует проверки материала. По прибрежным участкам с тростником.

7982. *Mythimna turca* (Linnaeus, [1760]) – на всей территории. В старовозрастных лесах по тенистым опушкам и полянам, а также по прилегающим сыроватым закустаренным лугам.

7983. *Mythimna velutina* (Eversmann, 1846) – центральные, южные, горно-лесные, юго-восточные р-ны [Nupponen, Fibiger, 2002; Ahola et al., 2012; Горбунов, 2023; Исмагилов, 2025б]. Степной вид.

7984. *Senta flammea* (Curtis, 1828) – Нефтекамск [Исмагилов и др., 2021б]. Прибрежно-луговой вид.

Триба Eriopygini Fibiger et Lafontaine, 200

7985. *Eriopygodes imbecilla* (Fabricius, 1794) – центральные, южные, горно-лесные, юго-восточные р-ны [Nupponen, Fibiger, 2002; Ahola et al., 2012; Исмагилов, 2025б]. По прогреваемым лугам.

7986. *Lasionhada proxima* (Hübner, [1809]) – северные, южные, горно-лесные, юго-восточные р-ны [Grosser, 1983; Nupponen, Fibiger, 2002; Ahola et al., 2012; Хабибуллин, 2018а; Горбунов, 2023; Исмагилов, 2025б]. Характерен для опушек смешанных лесов и степей.

Триба Agrotini Rambur, 1848

? *Actebia fennica* (Tauscher, 1806) – без местонахождений («Лесное Оренбуржье») [Eversmann, 1844] (?). Требуется подтверждение современным материалом. Характерен для смешанных лесов.

7987. *Actebia praecox* (Linnaeus, 1758) – без местонахождений [Anikin et al., 2000c, 2017]. Характерен для ксерофитных полян в смешанных лесах бореального типа.

7988. *Actebia squalida* (Guenée, 1852) – Байм, Блрц, Учлн, Зиан [Nupponen, Fibiger, 2002]. В степях.

7989. *Agrotis bigramma* (Esper, 1790) (=*crassa* (Hübner, [1803])) – Уфа [Кожанчиков, 1937]. По остепненным участкам и прилегающим сухим пустошам.

7990. *Agrotis cinerea* ([Denis et Schiffermüller], 1775) – Блрц, Учлн, Абзл, Байм, Блвр [Ахола и др., 1997; Nupponen, Fibiger, 2002; Горбунов, 2023; Исмагилов, 2025б]. По остепненным участкам.

7991. *Agrotis clavis* (Hufnagel, 1766) (=*corticea* ([Denis et Schiffermüller]), 1775)) – северные, центральные, южные, юго-восточные р-ны [Круликовский, 1897; Grosser, 1983; Горбунов, 2023; Исмагилов, 2025б]. Умеренно эвритопный луговой вид.

7992. *Agrotis exclamationis* (Linnaeus, 1758) – на всей территории. Эвритопный луговой вид.

7993. *Agrotis frater* Fibiger, Ahola et K. Nupponen, 2006 – Учлн, Бурз [Nupponen, Fibiger, 2006; Ahola et al., 2012]. По степям, лугам и солончакам.

7994. *Agrotis ipsilon* (Hufnagel, 1766) – северо-восточные, центральные, южные, юго-восточные р-ны [Круликовский, 1904; Nupponen, Fibiger, 2002; Исмагилов, 2025б]. Эвритопный лугово-полевой вид, мигрант.

7995. *Agrotis iremeli* K. Nupponen, Ahola et Kullberg, 2001 – Блрц [Nupponen et al., 2001b; Nupponen, Fibiger, 2002]. В травянистой, сухой горной тундре с редкими скалами и камнями на высоте 1300–1400 м.

7996. *Agrotis segetum* ([Denis et Schiffermüller], 1775) – на всей территории. Эвритопный лугово-полевой вид.

7997. *Agrotis trifurca* Eversmann, 1837 – Уфа, Учлн, Бурз, Ишмб [Кожанчиков, 1937; Nupponen, Fibiger, 2002; Ahola et al., 2012; Горбунов, 2023; Исмагилов, 2025б]. Степной вид.

7998. *Agrotis vestigialis* (Hufnagel, 1766) – Уфмс, Уфа [Хабибуллин, 2018а]. Преимущественно по песчаным боровым опушкам, полянам и прилегающим пустошам.

7999. *Dichagyris forcipula* ([Denis et Schiffermüller], 1775) – Хайб [Ахола и др., 1997; Nupponen, Fibiger, 2002]. Степной вид.

8000. *Dichagyris musiva* (Hübner, [1803]) – северные, центральные, южные, юго-восточные р-ны [Nupponen, Fibiger, 2002; Ahola et al., 2012; Ишбирдина и др., 2020; Горбунов, 2023; Исмагилов, 2025б]. По ксерофитным опушкам смешанных лесов и остепненным участкам.

8001. *Dichagyris signifera* ([Denis et Schiffermüller], 1775) – на всей территории. По прогреваемым луговым и остепненным участкам.

8002. *Dichagyris squalorum* (Eversmann, 1856) – Зиан, Бурз [Nupponen, Fibiger, 2002; Ahola et al., 2012]. По степям.

8003. *Dichagyris truculenta* (Lederer, 1853) – Кгрч, Байм [Свиридов и др., 2006]. По степям.

8004. *Dichagyris vallesiaca* (Boisduval, 1837) – без местонахождений [Anikin et al., 2000c, 2017]. Степной вид.

? *Dichagyris candelisequa* ([Denis et Schiffermüller], 1775) – Бурз [Хабибуллин, 2018a] (?). Указывался со ссылкой на студенческую дипломную работу. Виды данного рода в РБ сложны для неспециалиста и указание требует проверки. Характерен для степей.

8005. *Euxoa adumbrata* (Eversmann, 1842) – Байм, Учлн [Nupponen, Fibiger, 2002; Ahola et al., 2012; Горбунов, 2023]. Характерен для прогреваемых луговых участков в смешанных лесах бореального типа.

8006. *Euxoa aquilina* ([Denis et Schiffermüller], 1775) – Чишм, Зиан, Абзл, Байм, Крмс [Круликовский, 1897; Nupponen, Fibiger, 2002; Исмагилов, 2025б]. Луговой термофильный вид.

8007. *Euxoa basigramma* (Staudinger, 1870) – Мелз [Трофимова, 2003; Свиридов и др., 2006]. Степной вид.

? *Euxoa cursoria* (Hufnagel, 1766) – без местонахождений [Anikin et al., 2000c, 2017]. Указан со знаком «?» без каких-либо подробностей, вероятно, по старым данным. Наличие вида в РБ требует подтверждения. Характерен для прогреваемых луговых участков в смешанных лесах бореального типа.

8008. *Euxoa nigricans* (Linnaeus, [1760]) (=*rustica* (Eversmann, 1842)) – центральные, южные, горно-лесные, юго-восточные р-ны [Круликовский, 1904; Nupponen, Fibiger, 2002; Исмагилов, 2025б]. По прогреваемым лугам, прилегающим полям и пустошам.

8009. *Euxoa obelisca* ([Denis et Schiffermüller], 1775) – Зиан, Учлн, Байм, Кушн [Nupponen, Fibiger, 2002; Горбунов, 2023; Исмагилов, 2025б]. По опушкам сухих сосняков, прилегающим пустошам, а также по остепненным участкам.

8010. *Euxoa ochrogaster* (Guenée, 1852) – Байм, Учлн, Туйм, Абзл [Nupponen, Fibiger, 2002; Ahola et al., 2012; Исмагилов и др., 2022]. Характерен для прогреваемых луговых участков в смешанных лесах бореального типа.

8011. *Euxoa recussa* (Hübner, [1817]) – Чишм, Зиан, Учлн, Байм [Круликовский, 1897; Nupponen, Fibiger, 2002; Ahola et al., 2012; Горбунов, 2023; Исмагилов, 2025б]. Степной вид.

8012. *Euxoa tristis* (Staudinger, 1898) (=*varia* (Alphéraky, 1889)) – Учлн, Байм [Nupponen, Fibiger, 2002; Свиридов и др., 2006; Трофимова, 2006б]. По степным склонам.
8013. *Euxoa tritici* (Linnaeus, [1760]) (=*eruta* (Hübner, [1817]) – на всей территории. Видовые статусы *E. nigrofuca* (Esper, 1788) и *E. eruta* (Hübner, 1827) не подтверждены несколькими молекулярными исследованиями. Все 3 формы перекрываются по внешности и во многих регионах встречаются симбиотопично, поэтому трудно рассчитывать и на репродуктивную изоляцию между ними. По опушкам сухих сосняков, прилегающим пустошам, а также по остепненным участкам.
8014. *Euxoa vitta* (Esper, 1789) – Учлн [Nupponen, Fibiger, 2002]. Степной вид.

Триба Noctuini Latreille, 1809

8015. *Anaplectoides prasina* ([Denis et Schiffermüller], 1775) – на всей территории. Умеренно эвритопный лесолуговой вид.
8016. *Axylia putris* (Linnaeus, [1760]) – на всей территории. Эвритопный луговой мезофил.
8017. *Cerastis leucographa* ([Denis et Schiffermüller], 1775) – Учлн, Бурз, Уфа [Nupponen, Fibiger, 2002; Свиридов и др., 2006; Трофимова, 2006б; Исмагилов и др., 2021б; Горбунов, 2023]. Преимущественно в старовозрастных лесах.
8018. *Cerastis rubricosa* ([Denis et Schiffermüller], 1775) – Учлн, Абзл, Кушн, Уфа [Nupponen, Fibiger, 2002; Свиридов, 2018; Горбунов, 2023; Исмагилов, 2025б]. Преимущественно в старовозрастных лесах.
8019. *Chersotis andereggii* (Boisduval, 1832) (*rectangula* auct.) – Туйм, Учлн [Nupponen, Fibiger, 2002]. По ксерофитным опушкам смешанных лесов и степным участкам.
8020. *Chersotis capnistis* (Lederer, 1870) – Учлн [Ahola et al., 2012]. По каменистым горным степям.
8021. *Chersotis cuprea* ([Denis et Schiffermüller], 1775) – северные, центральные, южные, юго-восточные р-ны [Круликовский, 1897; Nupponen, Fibiger, 2002; Ahola et al., 2012; Горбунов, 2023; Исмагилов, 2025б]. По прогреваемым разнотравным лесным опушкам и лугам.
8022. *Chersotis deplanata* (Eversmann, 1843) – Бурз, Учлн [Свиридов и др., 2006; Трофимова, 2006б; Ahola et al., 2012; Горбунов, 2023]. Разреженные лиственные и смешанные леса, степи.
8023. *Chersotis stridula* (Hampson, 1903) – Учлн [Nupponen, Fibiger, 2006]. По степям.
8024. *Chersotis transiens* (Staudinger, 1897) – центральные, южные, горно-лесные, юго-восточные р-ны [Nupponen, Fibiger, 2002, 2006; Ahola et al., 2012; Горбунов, 2023; Исмагилов, 2025б]. По ксерофитным опушкам смешанных лесов и степным участкам.
8025. *Cryptocala chardinyi* (Boisduval, [1828]) – Учлн, Бурз [Nupponen, Fibiger, 2002; Ahola et al., 2012; Горбунов, 2023]. По разнотравным лесным полянам и опушкам.

8026. *Diarsia brunnea* ([Denis et Schiffermüller], 1775) – Бурз, Учлн [Свиридов и др., 2006; Трофимова, 2006б; Ahola et al., 2012]. Преимущественно в старовозрастных лесах по редколесьям и опушкам.
8027. *Diarsia dahlii* (Hübner, [1813]) – северные, центральные, южные, юго-восточные р-ны [Круликовский, 1910; Ahola et al., 2012; Горбунов, 2023; Исмагилов, 2025б]. Преимущественно в старовозрастных лесах по редколесьям и опушкам.
8028. *Diarsia mendica* (Fabricius, 1775) – Блрц, Бурз, Учлн [Ахола и др., 1997; Nupponen, Fibiger, 2002; Ahola et al., 2012; Хабибуллин, 2017б, 2018а; Горбунов, 2023]. В старовозрастных смешанных лесах по разрежениям и опушкам.
8029. *Diarsia rubi* (Vieweg, 1790) – Байм [Nupponen, Fibiger, 2002]. Преимущественно в старовозрастных лесах по опушкам и полянам.
8030. *Eugnorisma depuncta* (Linnaeus, [1760]) – Крмс [Исмагилов, 2023]. В старовозрастных смешанных лесах.
8031. *Eugraphe sigma* ([Denis et Schiffermüller], 1775) – на всей территории. Преимущественно в старовозрастных смешанных лесах.
8032. *Eurois occulta* (Linnaeus, 1758) – на всей территории. Умеренно эвритопный лесолуговой вид.
8033. *Graphiphora augur* (Fabricius, 1775) – северные, центральные, южные, горно-лесные, юго-восточные р-ны [Grosser, 1983; Nupponen, Fibiger, 2011; Исмагилов, 2025б]. Эвритопный лесолуговой вид.
8034. *Miniphila miniago* (Freyer, [1839]) – Учлн, Байм [Nupponen, Fibiger, 2002; Свиридов и др., 2006; Горбунов, 2023]. По степям.
8035. *Naenia typica* (Linnaeus, 1758) – Нурм, Блвщ [Grosser, 1983]. Умеренно эвритопный лесолуговой вид.
8036. *Netrocerocora quadrangula* (Eversmann, 1844) – Учлн, Мелз [Ахола и др., 1997; Свиридов и др., 2006]. По сухим опушкам сосняков, прилегающим пустошам, а также по остепненным участкам.
8037. *Noctua fimbriata* (Schreber, 1759) – на всей территории. Преимущественно в лесных ландшафтах.
8038. *Noctua interposita* (Hübner, 1790) – центральные, южные, горно-лесные, юго-восточные р-ны [Nupponen, Fibiger, 2002; Ahola et al., 2012; Горбунов, 2023; Исмагилов, 2025б]. Преимущественно по прогреваемым разнотравным лугам и прилегающим пустошам.
8039. *Noctua orbona* (Hufnagel, 1766) – Мелз [Nupponen, Fibiger, 2002]. По-видимому, луговой термофильный вид.
8040. *Noctua pronuba* (Linnaeus, 1758) – Уфа [Кожанчиков, 1937]. Преимущественно в лесных ландшафтах.
8041. *Ochropleura plecta* (Linnaeus, [1760]) – северные, центральные, южные, юго-восточные р-ны [Grosser, 1983; Исмагилов и др., 2020; Горбунов, 2023; Исмагилов, 2025б]. Умеренно эвритопный лесолуговой вид.

8042. *Opigena polygona* ([Denis et Schiffermüller], 1775) – Зиан, Учлн, Кушн, Крмс [Nupponen, Fibiger, 2002; Исмагилов и др., 2022]. По прогреваемым луговым участкам.
8043. *Paradiarsia punicea* (Hübner, [1803]) – Кгрч, Байм, Бурз [Свиридов и др., 2006; Ahola et al., 2012]. В старовозрастных смешанных лесах по разрежениям и опушкам.
8044. *Protolampra sobrina* (Duponchel, [1843]) – Нурм, Учлн [Grosser, 1983; Nupponen, Fibiger, 2002; Горбунов, 2023]. Преимущественно в старовозрастных смешанных лесах.
8045. *Pseudohermonassa melancholica* (Lederer, 1853) – Учлн, Абзл, Иглн, Кушн [Nupponen, Fibiger, 2011; Исмагилов и др., 2020; Горбунов, 2023; Исмагилов, 2025б]. По степям.
8046. *Rhyacia simulans* (Hufnagel, 1766) (=*pyrophila* ([Denis et Schiffermüller], 1775)) – северные, южные, юго-восточные р-ны [Круликовский, 1910; Nupponen, Fibiger, 2002; Исмагилов, 2025б]. Преимущественно по остепненным участкам, реже по прогреваемым лугам и пустошам лесной зоны.
8047. *Spaelotis deplorata* (Staudinger, 1897) – Учлн [Nupponen, Fibiger, 2011]. По степям.
8048. *Spaelotis ravida* ([Denis et Schiffermüller], 1775) (=*obscura* (Brahm, 1791)) – на всей территории. Преимущественно по прогреваемым лугам.
8049. *Spaelotis suecica* (Aurivillius, [1890]) – Учлн [Горбунов, 2023]. В смешанных лесах подтаежной полосы.
8050. *Xestia albuncula* (Eversmann, 1851) – Блрц [Nupponen, Fibiger, 2002]. По лугам и остепненным участкам.
8051. *Xestia ashworthii* (Doubleday, 1855) – Байм, Учлн, Бурз [Nupponen, Fibiger, 2002; Ahola et al., 2012; Свиридов, 2018; Горбунов, 2023]. По ксерофитным участкам.
8052. *Xestia atrata* (Morrison, 1874) – Блрц [Nupponen, Fibiger, 2002]. Характерен для горных тундр и болот.
8053. *Xestia baja* ([Denis et Schiffermüller], 1775) – на всей территории. Умеренно эвритопный лесолуговой вид.
8054. *Xestia borealis* (Nordström, 1933) – Блрц [Nupponen, Fibiger, 2002]. В хвойных и смешанных лесах среднего пояса гор.
8055. *Xestia c-nigrum* (Linnaeus, 1758) – на всей территории. Эвритопный лугово-полевой вид.
8056. *Xestia collina* (Boisduval, 1840) – Блрц, Байм [Ахола и др., 1997; Nupponen, Fibiger, 2002; Свиридов и др., 2006]
8057. *Xestia ditrapezium* ([Denis et Schiffermüller], 1775) – на всей территории. Умеренно эвритопный лесолуговой вид.
8058. *Xestia kollari* (Lederer, 1853) – Учлн, Абзл, Кгрч [Nupponen, Fibiger, 2002; Nupponen, Fibiger, 2011; Исмагилов и др., 2022; Исмагилов, 2025б]. По разреженным лесам и полянам.

8059. *Xestia rhaetica* (Staudinger, 1871) – Блрц [Nupponen, Fibiger, 2002]. В разреженных лесах и остепненные лугах нижнего и среднего пояса гор.
8060. *Xestia sexstrigata* (Haworth, [1809]) – Учлн, Ермк [Ahola et al., 2012; Исмагилов, 2025б]. Преимущественно в смешанных, реже в лиственных лесах по прогреваемым разнотравным опушкам и полянам, отчасти по прилегающим лугам и пустошам.
8061. *Xestia sincera* (Herrich-Schäffer, [1851]) – Блрц [Nupponen, Fibiger, 2002; Nupponen, Fibiger, 2011]. В горных смешанных лесах горные смешанные леса.
8062. *Xestia speciosa* (Hübner, [1813]) – Блрц [Nupponen, Fibiger, 2002]. В светлохвойной и темнохвойной тайге.
8063. *Xestia triangulum* (Hufnagel, 1766) – на всей территории. Умеренно эвритопный лесолуговой вид.
8064. *Xestia wockei* (Möschler, 1862) – Блрц [Ахола и др., 1997; Nupponen, Fibiger, 2002]. Горно- тундровый вид.
8065. *Xestia xanthographa* ([Denis et Schiffermüller], 1775) – Кушн [Исмагилов, 2023]. Преимущественно по опушкам сосново-широколиственных лесов.

Серия Papilionoformes (=Rhopalocera, =Diurna) (Мигранов М.Г.)

Надсемейство Papilionoidea

Семейство Hesperiidae – Толстоголовки

Подсемейство Pyrginae

8066. *Carcharodus alceae* (Esper, 1780) – Толстоголовка альцея. Обычный
8067. *Carcharodus floccifera* (Zeller, 1847) – Толстоголовка шандровая. Обычный
8068. *Carcharodus lavatherae* (Esper, 1783) – Толстоголовка чистецовая. Редкий, локальный
8069. *Erynnis tages* (Linnaeus, 1758) – Толстоголовка черноватая. Редкий, локальный
8070. *Muschampia cribrellum* (Eversmann, 1841) – Толстоголовка решётчатая. Редкий, локальный
8071. *Muschampia tessellum* (Hubner, 1803) – Толстоголовка мозаичная. Обычный
8072. *Pyrgus alveus* (Hubner, 1803) – Толстоголовка альвеус. Обычный
8073. *Pyrgus carthami* (Hubner, [1813]) *ssp. moeschleri* (Herrich-Schäffer, 1854) – Толстоголовка сафроловая. Редкий, локальный
8074. *Pyrgus cinarae* (Rambur, 1839) – Толстоголовка цинара. Редкий, локальный
8075. *Pyrgus malvae* (Linnaeus, 1758) – Толстоголовка мальвовая. Обычный
8076. *Pyrgus serratulae* (Rambur, 1839) – Толстоголовка серпуховая. Обычный
8077. *Pyrgus sidae* (Esper, [1784]) – Толстоголовка сида. Редкий, локальный. Кгрч и Зиан
8078. *Pyrgus armoricanus* (Oberthur, 1910) – Толстоголовка арморикская, или земляничнаа. Редкий, локальный
8079. *Spialia orbifer* (Hubner, 1823) – Толстоголовка круглопятнистая. Редкий, локальный

Подсемейство Hesperiinae

8080. *Carterocephalus palaemon* (Pallas, 1771) *ssp. albiguttata* Christoph, 1893 –

Толстоголовка палемон. Обычный
8081. *Carterocephalus silvicola* (Meigen, 1829) – Толстоголовка лесная. Обычный
8082. *Hesperia comma* (Linnaeus, 1758) – Толстоголовка запятая. Обычный
8083. *Heteropterus morpheus* (Pallas, 1771) – Толстоголовка морфей. Обычный
8084. *Ochlodes sylvanus* (Esper, 1777) – Толстоголовка лесовик. Обычный
8085. *Thymelicus lineola* (Ochsenheimer, 1808) – Толстоголовка тире. Обычный
8086. *Thymelicus sylvestris* (Poda, 1761) – Толстоголовка сельская. Обычный

Семейство Papilionidae – Парусники

Подсемейство Zerynthiinae

8087. *Zerynthia polyxena* ([Denis & Schiffermuller], 1775) – Поликсена. Единичный. Кркм и Дюрт

Подсемейство Parnassiinae

8088. *Parnassius apollo* (Linnaeus, 1758) *ssp. limicola* Stichel, 1906 – Аполлон. Обычен в горно-лесной зоне
8089. *Parnassius mnemosyne* (Linnaeus, 1758) *ssp. ugrjumovi* Bryk, 1914 - Чёрный аполлон, или мнемозина. Обычный

Подсемейство Papilioninae

8090. *Iphiclides podalirius* (Linnaeus, 1758) – Подалирий. Обычный
8091. *Papilio machaon* Linnaeus, 1758 – Махаон. Обычный

Семейство Pieridae – Белянки

Подсемейство Dismorphinae

8092. *Leptidea juvernica* Williams, 1946 *ssp. yakovlevi* Mazel, 2001 = reali auct. (nec Reissinger, 1989). Беляночка ирландская. Сведений о встречаемости нет. Внешне трудно отличим от *Leptidea sinapis*. Необходимо исследование гениталий. По этой причине их объединяют в видовой комплекс *L. sinapis / L. juvernica*.
8093. *Leptidea morsei* (Fenton, 1882) – Беляночка восточная. Обычный в горно-лесной зоне.
8094. *Leptidea sinapis* (Linnaeus, 1758) – Беляночка горошковая. Обычный

Подсемейство Pierinae

8095. *Anthocharis cardamines* (Linnaeus, 1758) – Зорька. Обычный
8096. *Aporia crataegi* (Linnaeus, 1758) – Боярышница. Обычный
8097. *Euchloe ausonia* (Hubner, 1803) *ssp. volgensis* Krulikowsky, 1897 – Зорька белая. Обычный
8098. *Pieris brassicae* (Linnaeus, 1758) – Капустница. Обычный
8099. *Pieris napi* (Linnaeus, 1758) – Брюквенница. Обычный
8100. *Pieris rapae* (Linnaeus, 1758) – Репница. Обычный
8101. *Pontia callidice* (Hubner, 1800) – Белянка альпийская. Единственный экз. Бурз
8102. *Pontia chloridice* (Hubner, 1813) – Белянка степная. Обычный
8103. *Pontia edusa* (Fabricius, 1777) – Белянка рапсовая. Обычный

Подсемейство Coliadinae

8104. *Colias chrysotheme* (Esper, 1781) – Желтушка золотистая. Обычный
8105. *Colias croceus* (Fourcroy, 1785) – Желтушка шафранная. Обычный
8106. *Colias erate* (Esper, 1803) – Желтушка степная. Обычный
8107. *Colias hyale* (Linnaeus, 1758) – Желтушка луговая. Массовый
8108. *Colias myrmidone* (Esper, 1777) – Желтушка ракитниковая. Обычный
8109. *Colias palaeno* (Linnaeus, 1761) – Желтушка торфяниковая. Единично, гора Иремель (Тыгынские болота), Блрц
8110. *Gonepteryx rhamni* (Linnaeus, 1758) – Крушинница. Обычный

Семейство Lycaenidae – Голубянки

Подсемейство Theclinae

8111. *Callophrys butlerovi* (Migranov, 1991) – Малинница Бутлерова. Редкий, локальный. Куюр
8112. *Callophrys rubi* (Linnaeus, 1758) – Малинница. Обычный
8113. *Fixsenia pruni* (Linnaeus, 1758) – Хвостатка черёмуховая, или сливовая. Оычный
8114. *Neolycaena rhymnus* (Eversmann, 1832) – Голубянка римн. Обычный
8115. *Quercusia querqus* (Linnaeus, 1758) – Зефир дубовый. Редкий, локальный. В отдельные годы обычный.
8116. *Satyrium acaciae* (Fabricius, 1787) – Хвостатка акациевая. Обычный в лесостепной зоне
8117. *Satyrium ilicis* (Esper, 1779) – Хвостатка падубовая. Обычный
8118. *Satyrium spini* (Denis & Schiffermuller, 1775) – Хвостатка терновая. Обычный
8119. *Satyrium w-album* (Knoch, 1782) – Хвостатка вязовая. Обычный
8120. *Thecla betulae* (Linnaeus, 1758) – Зефир берёзовый. Редкий, локальный.

Подсемейство Lycaeninae

8121. *Helleia helle* (Denis & Schiffermuller, 1775) – Червонец голубоватый. Обычый
8122. *Lycaena alciphron* (Rottemburg, 1775) – Червонец фиолетовый. Обычный
8123. *Lycaena dispar* (Haworth, 1802) – Червонец непарный. Обычный
8124. *Lycaena hippothoe* (Linnaeus, 1761) – Червонец щавелевый. Обычный
8125. *Lycaena phlaeas* (Linnaeus, 1761) – Червонец пятнистый. Обычный
8126. *Lycaena thersamon* (Esper, [1784]) – Червонец блестящий. Обычный
8127. *Lycaena tityrus* (Poda, 1761) – Червонец бурый. Обычный
8128. *Lycaena virgaureae* (Linnaeus, 1758) – Червонец огненный. Обычный

Подсемейство Polyommatinae

8129. *Agriades optilete* (Knoch, 1781) – Голубянка торфяниковая, Редкий, локальный
8130. *Agriades orbitulus* (de Prunner, 1798) – Голубянка круглопятнистая, или альпийская. Единственный экз. Блрц
8131. *Aricia artaxerxes* (Fabricius, 1793) *ssp. allous* (Geyer, 1837) – Голубянка изменчивая. Обычный
8132. *Aricia nicias* (Meigen, 1830) – Голубянка никий, или чёрно-голубая. Редкий,

локальный.
8133. *Celastrina argiolus* (Linnaeus, 1758) – Голубянка весенняя, или крушинная. Обычный
8134. *Cupido alcetas* (Hoffmannsegg, 1804) – Голубянка альцет. Обычный в горно-лесной зоне
8135. *Cupido argiades* (Pallas, 1771) – Голубянка аргиад, или короткохвостая. Обычный
8136. *Cupido minimus* (Fuessly, 1775) – Голубянка карликовая. Обычный
8137. *Cupido osiris* (Meigen, 1829) – Голубянка осирис. Обычный
8138. *Cyaniris semiargus* (Rottemburg, 1775) – Голубянка лесная. Обычный
8139. *Eumedonia eumedon* (Esper, 1780) – Голубянка эвмед. Обычный
8140. *Glaucopsyche alexis* (Poda, 1761) – Голубянка алексис. Обычный
8141. *Kretania pylaon* (Fischer von Waldheim, 1832) – Голубянка пилаон, или поволжская. Единственный экз. Куюр
8142. *Lampides boeticus* (Linnaeus, 1767) – Голубянка гороховая, или длиннохвостая. Единично. Куюр, Хайб. Мигрант
8143. *Lysandra bellargus* (Rottemburg, 1775) – Голубянка красивая. По одному экз. из Стмк и Ишмб
8144. *Lysandra coridon* (Poda, 1761) – Голубянка серебристая. Обычный
8145. *Neolysandra coelestinus* (Eversmann, 1843) – Голубянка небесная. Редкий, локальный
8146. *Phengaris alcon* (Denis & Schiffermuller, 1775) – Голубянка алькон. Обычный.
8147. *Phengaris arion* (Linnaeus, 1758) – Голубянка арион. Обычный
8148. *Phengaris nausithous* (Bergstrasser, 1779) – Голубянка черноватая. Обычный
8149. *Phengaris teleius* (Bergstrasser, 1779) – Голубянка совершенная. Обычный
8150. *Plebejidea cyane* (Eversmann, 1837) – Голубянка циана. Редкий, локальный. Абзл
8151. *Plebejus argus* (Linnaeus, 1758) – Голубянка аргус. Обычный
8152. *Plebejus argyrognomon* (Bergstrasser, 1779) – Голубянка аргирогномон. Обычный
8153. *Plebejus idas* (Linnaeus, 1761) – Голубянка идас. Обычный
8154. *Polyommatus amandus* (Schneider, 1792) – Голубянка аманда, или приятная. Обычный
8155. *Polyommatus damocles* (Herrich-Schäffer, 1844) – Голубянка дамокл. Редкий, локальный. Зиан
8156. *Polyommatus damon* (Denis & Schiffermuller, 1775) – Голубянка дамон. Обычный
8157. *Polyommatus damone* (Eversmann, 1841) – Голубянка дамона. Редкий, локальный
8158. *Polyommatus daphnis* (Denis & Schiffermuller, 1775) – Голубянка дафнис. Обычный
8159. *Polyommatus eros* (Ochsenheimer, 1808) – Голубянка эрос. Редкий,

локальный
8160. *Polyommatus icarus* (Rottemburg, 1775) – Голубянка икар. Обычный
8161. *Polyommatus ripartii* (Freyer, 1830) – Голубянка рипперта. Редкий, локальный
8162. *Polyommatus thersites* (Cantener, [1835]) – Голубянка Терсит. Обычный
8163. *Pseudophilotes bavius* (Eversmann, 1832) – Голубянка бавий, или красноватая. Единственная находка. Альш
8164. *Pseudophilotes vicrama* (Moore, 1865) *ssp. schiffermuelleri* Hemming, 1929 – Голубянка викрама. Редкий, локальный.
8165. *Scolitantides orion* (Pallas, 1771) – Голубянка орион. Обычный
8166. *Tongeia fischeri* (Eversmann, 1843) – Голубянка Фишера. Редкий, локальный

Семейство Nymphalidae – Нимфалиды

Подсемейство Apaturinae

8167. *Apatura ilia* (Denis & Schiffermuller, 1775) – Переливница тополевая. Обычный
8168. *Apatura iris* (Linnaeus, 1758) – Переливница ивовая. Обычный

Подсемейство Nymphalinae

Триба Limenitidini

8169. *Limenitis camilla* (Linnaeus, 1764) – Ленточник Камилла. Редкий, локальный
8170. *Limenitis populi* (Linnaeus, 1758) – Ленточник тополевый. Обычный
8171. *Neptis rivularis* (Scopoli, 1763) – Пеструшка таволговая. Обычный
8172. *Neptis sappho* (Pallas, 1771) – Пеструшка тёмнокрылая. Обычный

Триба Nymphalini

8173. *Aglais urticae* (Linnaeus, 1758) – Крапивница. Обычный
8174. *Araschnia levana* (Linnaeus, 1758) – Пестрокрыльница изменчивая. Обычный
8175. *Inachis io* (Linnaeus, 1758) – Дневной павлиний глаз. Обычный
8176. *Nymphalis antiopa* (Linnaeus, 1758) – Траурница. Обычный
8177. *Nymphalis polychloros* (Linnaeus, 1758) – Многоцветница. Обычный
8178. *Nymphalis vaualbum* ([Denis & Schiffermüller], 1775) (= *l-album* Esper, 1780) - Многоцветница l-белое. Обычный
8179. *Nymphalis xanthomelas* (Esper, 1781) – Многоцветница чёрно-рыжая. Обычный
8180. *Polygonia c-album* (Linnaeus, 1758) – Углокрыльница с-белое. Обычный
8181. *Vanessa atalanta* (Linnaeus, 1758) – Адмирал. Обычный
8182. *Vanessa cardui* (Linnaeus, 1758) – Репейница. Обычный

Триба Melitaeini

8183. *Euphydryas aurinia* (Rottemburg, 1775) *ssp. sareptana* Staudinger, 1871 – Шашечница авриния. Редкий, локальный. Байм и Учлн.
? *Euphydryas intermedia* (Menetries, 1859) – Шашечница средняя, или промежуточная. Редкий, локальный. Блрц.
8184. *Euphydryas maturna* (Linnaeus, 1758) – Шашечница матурна, или большая. Обычный

8185. *Melitaea arduinna* (Esper, 1783) – Шашечница горная. Редкий, локальный
8186. *Melitaea athalia* (Rottemburg, 1775) – Шашечница аталия. Обычный
8187. *Melitaea aurelia* Nickerl, 1850 – Шашечница аврелия, или рыжеватая. Обычный
8188. *Melitaea britomartis* Assmann, 1847 – Шашечница бритомарта, или вероникова. Обычный
8189. *Melitaea cinxia* (Linnaeus, 1758) – Шашечница цинкция, или обыкновенная. Обычный
8190. *Melitaea diamina* (Lang, 1789) *ssp. hebe* (Borkhausen, 1793) – Шашечница черноватая. Обычный
8191. *Melitaea didyma* (Esper, 1778) *ssp. neera* (Fischer von Waldheim, 1840) – Шашечница красная. Обычный
8192. *Melitaea phoebe* (Denis & Schiffermuller, 1775) – Шашечница феба. Обычный
8193. *Melitaea trivia* (Denis & Schiffermuller, 1775) *ssp. uvarovi* P.Gorbunov, 1995 – Шашечница тривия, или степная. Редкий, локальный

Триба Argynnini

8194. *Argynnis adippe* (Denis & Schiffermuller, 1775) – Перламутровка красная. Обычный
8195. *Argynnis aglaja* (Linnaeus, 1758) – Перламутровка аглая. Обычный
8196. *Argynnis laodice* (Pallas, 1771) – Перламутровка зеленоватая. Единственная достоверная находка. Мишк
8197. *Argynnis niobe* (Linnaeus, 1758) – Перламутровка ниоба. Обычный
8198. *Argynnis paphia* (Linnaeus, 1758) – Перламутровка большая. Обычный
8199. *Boloria aquilonaris* (Stichel, 1908) – Перламутровка болотная, или тундровая. Единственная находка. Блрц (гора Иремель, тыгынские болота).
8200. *Brenthis daphne* (Bergstrasser, 1780) – Перламутровка малинная. Обычный
8201. *Brenthis hecate* (Denis & Schiffermuller, 1775) – Перламутровка геката. Обычный
8202. *Brenthis ino* (Rottemburg, 1775) – Перламутровка таволговая. Обычный
8203. *Clossiana dia* (Linnaeus, 1767) – Перламутровка малая. Обычный
8204. *Clossiana eunomia* (Esper, 1799) – Перламутровка эвномия. Обычный
8205. *Clossiana euphrosyne* (Linnaeus, 1758) – Перламутровка эвфросина. Обычный
8206. *Clossiana selene* (Denis & Schiffermuller, 1775) – Перламутровка селена. Обычный
8207. *Clossiana selenis* (Eversmann, 1837) – Перламутровка селена восточная. Редкий, локальный. Блрц и Дюрт
8208. *Clossiana thore* (Hubner, 1803) *ssp. transuralensis* (Sheljuzhko, 1931) – Перламутровка альпийская. Обычный для горно-лесной зоны
8209. *Clossiana titania* (Esper, 1793) *ssp. bivina* (Fruhstorfer, 1908) – Перламутровка красивая. Обычный
8210. *Issoria lathonia* (Linnaeus, 1758) – Перламутровка блестящая, или полевая. Обычный

Семейство Satyridae – Сатириды

Подсемейство Elymniinae

Триба Elymniini

8211. *Lasiommata maera* (Linnaeus, 1758) – Буроглазка большая. Обычный
8212. *Lasiommata petropolitana* (Fabricius, 1787) – Буроглазка петербургская, или малая. Обычный.
8213. *Lopinga achine* (Scopoli, 1763) – Краеглазка придорожная. Обычный.
8214. *Lopinga deidamia* (Eversmann, 1851) – Бархатница дейдамия или Краеглазка каменистая. Редкий, локальный. Блрц.
8215. *Pararge aegeria* (Linnaeus, 1758) – Краеглазка Эгерия. Редкий, локальный

Подсемейство Satyrinae

Триба Melanargiini

8216. *Melanargia galathea* (Linnaeus, 1758) – Пестроглазка галатея. Обычный
8217. *Melanargia russiae* (Esper, 1783) – Пестроглазка русская. Обычный

Триба Coenonymphini

8218. *Coenonympha amaryllis* (Stoll, 1782) – Сенница амариллис. Редкий, локаьный
8219. *Coenonympha arcania* (Linnaeus, 1761) – Сенница аркания. Обычный
8220. *Coenonympha glycerion* (Borkhausen, 1788) – Сенница луговая. Обычный
8221. *Coenonympha hero* (Linnaeus, 1761) – Сенница геро. Обычный
8222. *Coenonympha leander* (Esper, 1784) – Сенница леандер. Обычный для степной зоны
8223. *Coenonympha pamphilus* (Linnaeus, 1758) – Сенница обыкновенная. Обычный
8224. *Triphysa phryne* (Pallas, 1771) – Бархатница (Сенница) фрина. Редкий, локальный

Триба Maniolini

8225. *Aphantopus hyperantus* (Linnaeus, 1758) – Глазок цветочный. Обычный
8226. *Hyponephele lupina* (Costa, 1836) – Бархатница волчья. Редкий, локальный.
8227. *Hyponephele lycaon* (Rottemburg, 1775) – Бархатница ликаон. Обычный
8228. *Maniola jurtina* (Linnaeus, 1758) – Воловий глз. Обычный

Триба Erebiini

8229. *Erebia aethiops* (Esper, 1777) – Чернушка эфиопка. Обычный
8230. *Erebia cyclopius* (Eversmann, 1844) – Чернушка циклоп. Редкий, локалный
8231. *Erebia euryale* (Esper, 1805) – Чернушка эвриала. Обычный
8232. *Erebia ligea* (Linnaeus, 1758) *ssp. kamensis* Krulikowsky, 1909 – Чернушка лигея. Обычный
8233. *Erebia medusa* (Denis & Schiffermuller, 1775) *ssp. uralensis* Staudinger, 1871 – Чернушка медуза. Обычный
8234. *Proterebia afra* (Fabricius, 1787) – Чернушка степная. Редкий, локальный

Триба Oeneini

8235. *Oeneis jutta* (Hubner, 1806) – Бархатница болотная. Единственный экз. Блрц

(гора Иремель, тыгынские болота)

8236. *Oeneis tarpeia* (Pallas, 1771) – Бархатница тарпея. Обычный

Триба Satyrini

8237. *Arethusana arethusa* (Denis & Schiffermuller, 1775) – Бархатница аретуза. Обычный

8238. *Chazara persephone* (Hubner, 1805) – Бархатница персефона. Редкий, локальный

8239. *Chazara briseis* (Linnaeus, 1764) *ssp. ianthe* (Pallas, 1771) – Бархатница бризеида. Обычный

8240. *Hipparchia autonoe* (Esper, 1783) – Бархатница автоноя. Обычный

8241. *Minois dryas* (Scopoli, 1763) – Сатир лесной. Обычный

8242. *Pseudochazara hippolyte* (Esper, 1783) – Бархатница гипполита. Обычный

8243. *Satyrus ferula* (Fabricius, 1793) *ssp. altaica* Grum-Grshimailo, 1893 – Сатир горный. Обычный

Отряд Hymenoptera – Перепончатокрылые

Подотряд Symphyta – Сидячебрюхие

Надсемейство Tenthredinoidea

Семейство Argidae

8244. *Aproceros leucopoda* Takeuchi, 1939 – ЗШТ 2020 (Летопись…, 2021).

8245. *Arge berberidis* Schrank, 1802 – Уфа 2024

8246. *Arge ciliaris* (Linnaeus, 1767)

8247. *Arge cyanocrocea* (Forster, 1771) – Малинный желтый пилильщик

8248. *Arge dimidiata* (Fallén, 1808)

8249. *Arge enodis* (Linnaeus, 1767) – Хайб 2023

8250. *Arge gracilicornis* (Klug, 1814) – Пестрый малинный пилильщик

8251. *Arge nigripes* (Retzius, 1783) – Черноногий шиповниковый пилильщик

8252. *Arge ochropus* (Gmelin, 1790) – Розанный обыкновенный пилильщик

8253. *Arge pagana* (Panzer, 1798) – Розанный изменчивый пилильщик

8254. *Arge pullata* (Zaddach, 1859) – Березовый бородавчатый пилильщик

8255. *Arge ustulata* (Linnaeus, 1758) – Ивовый бородавчатый пилильщик

Семейство Cimbicidae

8256. *Abia fasciata* (Linnaeus, 1758) – Жимолостный полосатый пилильщик

8257. *Abia sericea* (Linnaeus, 1767) – Шелковистая абия

8258. *Cimbex connatus* (Schrank, 1776) – Ишмб 2023

8259. *Cimbex femoratus* (Linnaeus, 1758) – Березовый большой пилильщик

8260. *Cimbex luteus* (Linnaeus, 1758) – Зилр 2022

8261. *Corynis obscura* (Fabricius, 1775)

8262. *Trichiosoma sylvaticum* Leach, 1817 – Ивовый пилильщик

8263. *Trichiosoma villosum* (Motschulsky, 1860)

8264. *Trichiosoma vitellina* (Linnaeus, 1761)

Семейство Diprionidaae

8265. *Diprion pini* (Linnaeus, 1758) – Сосновый обыкновенный пилильщик

8266. *Neodiprion sertifer* (Geoffroy, 1785) – Рыжий сосновый пилильщик – Кгрч 2023

Семейство Tenthredinidae – Настоящие пилильщики

Подсемейство Allantinae

8267. *Adamas ermak* Zhelochovtsev, 1968 – БГПЗ 1948 (голотип) (Желоховцев, 1968)
8268. *Allantus calceatus* (Klug, 1818) – Земляничный чернопятнистый пилильщик
8269. *Allantus cinctus* (Linnaeus, 1758) – Опоясанный земляничный пилильщик
8270. *Allantus cingillum* (Klug, 1818) – Дубовый бородавчатый пилильщик
8271. *Ametastegia carpini* (Hartig, 1837) – Щавелевый пилильщик
8272. *Athalia circularis* (Klug, 1815) –Травяной кольцевой пилильщик
8273. *Athalia rosae* (Linnaeus, 1758) – Рапсовый пилильщик
8274. *Athalia rufoscutellata* Mocsary, 1879
8275. *Empria alector* Benson, 1938
8276. *Empria candidata* (Fallen, 1808) – Березняковый пилильщик
8277. *Empria liturata* (Gmelin, 1790)
8278. *Empria pallimacula* (Serville, 1823)
8279. *Empria tridens* (Konow, 1896)
8280. *Eriocampa ovata* (Linnaeus, 1761) – Уфмс 2023

Подсемейство Blennocampinae

8281. *Ardis pallipes* (Serville, 1823) – Розанный нисходящий пилильщик – Уфмс (Зей-Нечаева, Сибиряк, 1970).
8282. *Blennocampa phyllocolpa* Viitasaari & Vikberg, 1985 – Розанный бородавчатый пилильщик
8283. *Claremontia tenuicornis* (Klug, 1816)
8284. *Eutomostethus ephippium* (Panzer, 1798)
8285. *Eutomostethus punctatus* (Konow, 1887) – РБ (Аннотированный каталог…, 2012).
8286. *Monophadnus pallescens* (Gmelin, 1790) – Бледный пилильщик
8287. *Periclista lineolata* (Klug, 1816) – Дубовый черноголовый пилильщик
8288. *Phymatocera aterrima* (Klug, 1816) – Ишимбай, 2025

Подсемейство Heterarthrinae

8289. *Caliroa annulip*es (Klug, 1816) – Липовый слизистый пилильщик
8290. *Caliroa cerasi* (Linnaeus, 1758) – Слизистый вишневый пилильщик
8291. *Caliroa cinxia* (Klug, 1816) – Дубовый слизистый пилильщик
8292. *Endelomyia aethiops* (Gmelin, 1790) – Розанный слизистый пилильщик – в оранжереях Уфы
8293. *Fenusa dohrnii* (Tischbein, 1846) – Ольховый минирующий пилильщик Дорна
8294. *Fenusa pumila* Leach, 1817 – Березовый малый пилильщик
8295. *Fenusa ulmi* Sundevall, 1847 – Вязовый минирующий пилильщик
8296. *Fenusella hortulana* (Klug, 1818) – Кленовый пузырчатый пилильщик
8297. *Fenusella nana* (Klug, 1816)

8298. *Heterarthrus nemoratus* (Fallen, 1808)
8299. *Heterarthrus ochropoda* (Klug, 1818)
8300. *Heterarthrus vagans* (Fallen, 1808)
8301. *Parna tenella* (Klug, 1816)
8302. *Profenusa pygmaea* (Klug, 1816) – Дубовый минирующий пилильщик
8303. *Scolioneura betuleti* (Klug, 1816)

Подсемейство Nematinae

8304. *Cladius grandis* (Serville, 1823) – Тополевый волосистый пилильщик
8305. *Cladius nubilus* (Konow, 1897) – РБ (Аннотированный каталог…, 2012).
8306. *Cladius rufipes* (Serville, 1823) – Ишмб 2022
8307. *Craesus septentrionalis* (Linnaeus, 1758) – Березовый северный пилильщик
8308. *Euura amerinae* (Linnaeus, 1758) – Ивовый губчатый пилильщик
8309. *Euura mucronata* (Hartig, 1837) – Ивовый почковый пилильщик
8310. *Euura proxima* (Serville, 1823) – Уфмс 2023, Ишмб 2022
8311. *Euura ribesii* (Scopoli, 1763) – Крмс 2020, Шарн 2023
8312. *Euura testaceipes* (Brischke, 1883)
8313. *Euura venusta* (Zaddach, 1883) – Ивовый черешковожилковый пилильщик
8314. *Hemichroa australis* (Serville, 1823) – Уфа 2019
? *Hoplocampa flava* (Linnaeus, 1760)
8315. *Hoplocampa fulvicornis* (Panzer, 1801) – Терновый плодовый пилильщик
8316. *Hoplocampa testudinea* (Klug, 1816) – Яблонный пилильщик
8317. *Nematus caeruleocarpus* Hartig, 1837 – Голубой пилильщик
8318. *Nematus nigricornis* Serville, 1823 –Тополевый черноусый пилильщик
8319. *Nematus ribesii* (Scopoli, 1763) – Желтый крыжовниковый пилильщик
8320. *Nematus septentrionalis* (Linnaeus, 1758) – Блвр 2022-2025
8321. *Nematus tibialis* Newman, 1837 – Голенастый пилильщик
8322. *Pachynematus itoi* Okutani, 1955
8323. *Pachynematus scutellatus* (Hartig, 1837) – Еловый полосатый пилильщик
8324. *Phyllocolpa anglica* (Cameron, 1877)
8325. *Phyllocolpa oblita* (Serville, 1823)
8326. *Platycampus luridiventris* (Fallen, 1808) – Ольховый плоский пилильщик
8327. *Pontania pedunculi* (Hartig, 1837)
8328. *Pontania proxima* (Serville, 1823) – Ивовый красногалловый пилильщик
8329. *Pristiphora conjugata* (Dahlbom, 1835) – Хайб 2025
8330. *Pristiphora erichsonii* (Hartig, 1837) – Лиственничный большой пилильщик
8331. *Pristiphora laricis* (Hartig, 1837) – Лиственничный обыкновенный пилильщик
8332. *Pristiphora leucopus* Hellén, 1948 – Уфа 2023
8333. *Pristiphora maesta* (Zaddach, 1876) – Листовой яблонный пилильщик
8334. *Pristiphora subbifida* (C. G. Thomson, 1871) – Кленовый минирующий пилильщик

Подсемейство Selandriinae

8335. *Brachythops flavens* (Klug, 1816) – Туймазы

8336. *Dolerus genucinctus* Zaddach, 1859
8337. *Dolerus gonager* (Fabricius, 1771) – Травяной пилильщик
8338. *Dolerus nigratus* (O. F. Muller 1776) – Черный пшеничный пилильщик
8339. *Dolerus pratorum* (Fallen, 1808)
8340. *Dolerus vestigialis* (Klug, 1818)
8341. *Dulophanes m*orio (Fabricius, 1781) – Черно-бурый пилильщик
8342. *Selandria melanosterna* (Serville, 1823)
8343. *Selandria serva* (Fabricius, 1793) – Осоковый пилильщик
8344. *Strongylogaster filicis* (Klug, 1817)
8345. *Strongylogaster multifasciata* (Geoffroy, 1785)
8346. *Strongylogaster xanthocera* (Stephens, 1835) – Крмс 2022, Кушн 2020

Подсемейство Tenthredininae

8347. *Aglaostigma aucupariae* (Klug, 1817)
8348. *Aglaostigma fulvipes* (Scopoli, 1763) – Буроногий пилильщик
8349. *Macrophya albipuncta* (Fallen, 1808)
8350. *Macrophya annulata* (Geoffroy, 1785)
8351. *Macrophya carinthiaca* (Klug, 1817)
8352. *Macrophya diversipes* (Schrank, 1782)
8353. *Macrophya duodecimpunctata* (Linnaeus, 1758)
8354. *Macrophya infumata* Rohwer, 1925 – Уфа 2023
8355. *Macrophya montana* (Scopoli, 1763) – Травяной горный пилильщик – Иглн 2025
8356. *Macrophya sanguinolenta* (Gmelin, 1790)
8357. *Pachyprotasis rapae* (Linnaeus, 1767)
8358. *Rhogogaster chlorosoma* (Benson, 1943) – Ермк 2018
8359. *Rhogogaster scalaris* (Klug, 1817) – Уфа 2019
8360. *Rhogogaster viridis* (Linnaeus, 1758) – Зеленый пилильщик – Уфа
8361. *Tenthredo arcuata* Forster, 1771 – Обыкновенный пилильщик
8362. *Tenthredo atra* Linnaeus, 1758 – Пасленовый черный пилильщик
8363. *Tenthredo bifasciata rossii* (Panzer, 1804)
8364. *Tenthredo campestris* Linnaeus, 1758 – Зиан 2020, Крмс 2023
8365. *Tenthredo colon* Klug, 1817 – Кипрейный пилильщик
8366. *Tenthredo crassa* Scopoli, 1763
8367. *Tenthredo decens* Zhelochovtsev, 1939
8368. *Tenthredo excellens* (Konow, 1886) – Уфа 2018
8369. *Tenthredo fagi* Panzer, 1798 – Рябиновый бородавчатый пилильщик
8370. *Tenthredo ferruginea* Schrank, 1776 – Ивовый бурый пилильщик
8371. *Tenthredo livida* Linnaeus, 1758 – Уфа 2023
8372. *Tenthredo mandibularis* Fabricius, 1804 – Ишмб 2023
8373. *Tenthredo mesomela* Linnaeus, 1758 – Лесной пилильщик
8374. *Tenthredo obsoleta* Klug, 1817
8375. *Tenthredo omissa* (Foerster, 1844) – Иглн 2024
8376. *Tenthredo sabariensis* (Mocsary, 1880) – Шарн 2024

8377. *Tenthredo scrophulariae* Linnaeus, 1758 – Уфа 2024
8378. *Tenthredo temula* Scopoli, 1763
8379. *Tenthredo vespa* Retzius, 1783 – Осовидный пилильщик
8380. *Tenthredo zona* Klug, 1817 – Поясковый пилильщик
8381. *Tenthredo zonula* Klug, 1817 – Гафур 2020
8382. *Tenthredopsis auriculata* (Thomson, 1870) – РБ (Аннотированный каталог…, 2012).
8383. *Tenthredopsis nassata* (Linnaeus, 1767)
8384. *Tenthredopsis ornata* (Serville, 1823) – Точечный ивовый пилильщик
8385. *Tenthredopsis stigma* (Fabricius, 1798)
8386. *Tenthredopsis tessellata* (Klug, 1817)

Надсемейство Pamphilioidea

Семейство Megalodontesidae

8387. *Megalodontes fabricii* (Leach, 1817) – Ишмб 2023
8388. *Megalodontes plagiocephalus* (Fabricius, 1804) – Кушн 2024
8389. *Megalodontes spiraeae* (Klug, 1824) – Кушн 2024

Семейство Pamphiliidae – Паутинные пилильщики

8390. *Acantholyda erythrocephala* (Linnaeus, 1758) – Красноголовый пилильщик-ткач
8391. *Acantholyda hieroglyphica* (Christ, 1791) – Одиночный (разрисованный) пилильщик
8392. *Acantholyda posticalis* (Matsumura, 1912) – Звездчатый пилильщик-ткач
8393. *Cephalcia abietis* (Linnaeus, 1758) – Еловый пилильщик-ткач
8394. *Cephalcia lariciphila* (Wachtl, 1898) – Альпийский лиственничный пилильщик-ткач
8395. *Neurotoma nemoralis* (Linnaeus, 1758) – Кмск 2020, Кушн 2020
8396. *Neurotoma saltuum* (Linnaeus, 1758) – Желтобрюхий пилильщик
8397. *Pamphilius stramineipes* (Hartig, 1837) – Желтоногий пилильщик-ткач
8398. *Pamphilius sylvaticus* (Linnaeus, 1758) – Краевой пилильщик-ткач
8399. *Pamphilius varius* (Serville, 1823) – Зеленый березовый пилильщик-ткач

Надсемейство Cephoidea

Семейство Cephidae – Злаковые, или стеблевые пилильщики

8400. *Cephus fumipennis* Eversmann, 1847 – Ишмб 2024
8401. *Cephus nigrinus* C. G. Thomson, 1871
8402. *Cephus pygmeus* (Linnaeus, 1767) – Хлебный обыкновенный пилильщик
8403. *Cephus spinipes* (Panzer, 1800) – Нурм 2023
8404. *Pachycephus sp.*
8405. *Phylloecus etorofensis* (Takeuchi, 1955)
8406. *Trachelus tabidus* (Fabricius, 1775) – Черный хлебный пилильщик

Семейство Cimbicidae

8407. *Cimbex connatus* (Schrank, 1776) – Ишмб 2023
8408. *Cimbex luteus* (Linnaeus, 1758) – Бурз 2022
8409. *Pseudoclavellaria amerinae* (Linnaeus, 1758) – Архн 2023

Семейство Diprionidaae

8410. *Gilpinia virens* (Klug, 1812) – Ишмб 2024

Надсемейство Siricoidea

Семейство Siricidae – Рогохвосты

8411. *Sirex juvencus* (Linnaeus, 1758) – Синий рогохвост
8412. *Sirex noctilio* Fabricius, 1773 – Фиолетовый рогохвост
8413. *Tremex fuscicornis* (Fabricius, 1787)
8414. *Urocerus gigas* (Linnaeus, 1758) – Большой хвойный рогохвост
8415. *Xeris spectrum* (Linnaeus, 1758) – Черный рогохвост

Надсемейство Xiphydrioidea

Семейство Xiphydriidae

8416. *Xiphydria camelus* (Linnaeus, 1758) – Ольховый (березово-ольховый) рогохвост
8417. *Xiphydria longicollis* (Geoffroy, 1785) – Длинношеий рогохвост
8418. *Xiphydria prolongata* (Geoffroy, 1785) – Вязовый рогохвост

Подотряд Apocrita – Стебельчатобрюхие

Aculeata – Жалящие перепончатокрылые

Надсемейство Apoidea – Пчелиные

Семейство Ampulicidae

8419. *Dolichurus sp.* – Уфмс

Семейство Andrenidae – Андрены или Короткохоботные пчелы

Подсемейство Andreninae

8420. *Andrena aeneiventris* Morawitz, 1872 – Хайб 1955 (Никифорук, 1957).
8421. *Andrena albopunctata* (Rossi, 1792) – Хайб 1955 (Никифорук, 1957).
8422. *Andrena alfkenella* Perkins, 1914
8423. *Andrena apicata* Smith, 1847
8424. *Andrena argentata* Smith, 1844
8425. *Andrena atrata* Friese, 1887 – Уфа 1952; Куюр 1954; Хайб 1955 (Никифорук, 1957).
8426. *Andrena barbilabris* (Kirby, 1802)
8427. *Andrena bicolor* Fabricius, 1775
8428. *Andrena bimaculata* (Kirby, 1802)
8429. *Andrena capillosa* Morawitz, 1876 – Хайб 1955 (Никифорук, 1957).
8430. *Andrena carantonica* Pérez, 1902
8431. *Andrena chrysopus* Pérez, 1903
8432. *Andrena chrysopyga* Schenck, 1853
8433. *Andrena chrysosceles* (Kirby, 1802)
8434. *Andrena cineraria* (Linnaeus, 1758)
8435. *Andrena cinereophila* Warncke, 1965
8436. *Andrena clarkella* (Kirby, 1802)
8437. *Andrena coitana* (Kirby, 1802)
8438. *Andrena combinata* (Christ, 1791)

8439. *Andrena comta* Eversmann, 1852
8440. *Andrena congruens* Schmiedeknecht, 1883
8441. *Andrena cordialis* Morawitz, 1877 – Хайб 1955 (Никифорук, 1957).
8442. *Andrena curvungula* Thomson, 1870
8443. *Andrena decipiens* Schenck, 1861
8444. *Andrena denticulata* (Kirby, 1802)
8445. *Andrena derbentina* Morawitz, 1886
8446. *Andrena dorsata* (Kirby, 1802)
8447. *Andrena ehnbergi* Morawitz, 1888 – Уфмс 1952; Учлн, 1954; Абзл 1954 (Никифорук, 1957).
8448. *Andrena enslinella* Stoeckhert, 1924 – Хайб 1953; Куюр 1954; Уфа, 1954 (Никифорук, 1957).
8449. *Andrena falsifica* Perkins, 1915
8450. *Andrena ferox* Smith, 1847
8451. *Andrena figurata* Morawitz, 1866
8452. *Andrena flavipes* Panzer, 1799
8453. *Andrena florea* Fabricius, 1793
8454. *Andrena floricola* Eversmann, 1852
8455. *Andrena florivaga* Eversmann, 1852
8456. *Andrena fucata* Smith, 1847
8457. *Andrena fulvago* (Christ, 1791)
8458. *Andrena fulvida* Schenck, 1853
8459. *Andrena fuscipes* (Kirby, 1802) – Абзл 1954; Блрц, 1954 (Никифорук, 1957).
8460. *Andrena gallica* Schmiedeknecht, 1883
8461. *Andrena gelriae* van der Vecht, 1927
8462. *Andrena haemorrhoa* (Fabricius, 1781)
8463. *Andrena hattorfiana* (Fabricius, 1775)
8464. *Andrena helvola* (Linnaeus, 1758) – Уфа, 1953; Куюр 1954; Хайб 1955 (Никифорук, 1957).
8465. *Andrena humilis* Imhoff, 1832 – Хайб 1955 (Никифорук, 1957).
8466. *Andrena hypopolia* Schmiedeknecht, 1884 – Хайб 1953 (Никифорук, 1957).
8467. *Andrena impunctata* Perez, 1895
8468. *Andrena incisa* Eversmann, 1852 – Куюр 1954 (Никифорук, 1957).
8469. *Andrena labiata* Fabricius, 1781
8470. *Andrena lapponica* Zetterstedt, 1838 – Уфа, 1953; Куюр 1954 (Никифорук, 1957).
8471. *Andrena lepida* Schenk, 1861 – Уфа 1952; Хайб 1953 (Никифорук, 1957); Предуралье РБ
8472. *Andrena limata* Smith, 1853
8473. *Andrena limbata* Eversmann, 1852 – Куюр 1954 (Никифорук, 1957).
8474. *Andrena majalis* Morawitz, 1876 – Хайб 1955 (Никифорук, 1957).
8475. *Andrena minutula* (Kirby, 1802) – Белб 1952; Куюр 1952; Хайб 1953 (Никифорук, 1957).

8476. *Andrena minutuloides* Perkins, 1914
8477. *Andrena nana* (Kirby, 1802)
8478. *Andrena nanaeiformis* Noskiewicz, 1925 – Уфа 1953; Куюр 1954; Хайб 1953; Абзл 1954 (Никифорук, 1957).
8479. *Andrena nanula* Nylander, 1848
8480. *Andrena nasuta* Giraud, 1863
8481. *Andrena nigriceps* (Kirby, 1802)
8482. *Andrena nigroaenea* (Kirby, 1802)
8483. *Andrena nitida* (Müller, 1776)
8484. *Andrena niveata* Friese, 1887 – Уфа 1952; Куюр 1954; Хайб 1953 (Никифорук, 1957).
8485. *Andrena nobilis* Morawitz, 1874 – Куюр 1954; Хайб 1953 (Никифорук, 1957).
8486. *Andrena nycthemera* Imhoff, 1868
8487. *Andrena oralis* Morawitz, 1876 – Хайб 1955 (Никифорук, 1957).
8488. *Andrena ornata* Morawitz, 1866
8489. *Andrena ovatula* (Kirby, 1802)
8490. *Andrena pilipes* Fabricius, 1781 – Уфа 1954, Бижб 1953; Куюр 1954; Хайб 1955 (Никифорук, 1957).
8491. *Andrena polita* Smith, 1847
8492. *Andrena proxima* (Kirby, 1802) – Кард 1955; Гафр 1954 (Никифорук, 1957).
8493. *Andrena rosae* Panzer, 1801 – Дюртюли 1954; Куюр 1954; Абзл 1954; Хайб 1955 (Никифорук, 1957).
8494. *Andrena rudolfae* Osytshnjuk, 1986
8495. *Andrena ruficrus* Nylander, 1848
8496. *Andrena rufizona* Imhoff, 1834
8497. *Andrena rugulosa* Stoeckhert, 1935
8498. *Andrena schencki* Morawitz 1866
8499. *Andrena semilaevis* Perez, 1903
8500. *Andrena sericata* Imhoff, 1868 – Хайб 1955 (Никифорук, 1957).
8501. *Andrena sibirica* Morawitz, 1888 – Уфмс 1954 (Никифорук, 1957).
8502. *Andrena simillima* Smith, 1851
8503. *Andrena subopaca* Nylander, 1848
8504. *Andrena suerinensis* Friese, 1884
8505. *Andrena susterai* Alfken, 1914
8506. *Andrena taraxaci* Giraud, 1861 – Хайб 1955; Чишм 1956 (Никифорук, 1957).
8507. *Andrena tarsata* Nylander, 1848
8508. *Andrena thoracica* (Fabricius, 1775)
8509. *Andrena tibialis* (Kirby, 1802)
8510. *Andrena tridentata* (Kirby, 1802)
8511. *Andrena trimmerana* (Kirby, 1802)
8512. *Andrena tringa* Warncke, 1973
8513. *Andrena truncatilabris* Morawitz, 1877 – Уфмс 1952; Хайб 1953 (Никифорук, 1957).

8514. *Andrena varians* (Kirby, 1802) – Уфа 1953; Гафр 1954; Хайб 1953 (Никифорук, 1957).
8515. *Andrena ventralis* Imhoff, 1832 – Уфа 1953; Куюр 1954; Хайб 1955 (Никифорук, 1957).
8516. *Andrena verae* Osytshnjuk, 1986
8517. *Andrena wilkella* (Kirby, 1902)

Подсемейство Panurginae

8518. *Camptopoeum friesei* Mocsary, 1894 – Куюр 1952; Зиан 1955 (Никифорук, 1957).
8519. *Camptopoeum frontale* (Fabricius, 1804)
8520. *Clavipanurgus sculpturatus* (Morawitz, 1872) – Хайб 1953 (Никифорук, 1957).
8521. *Melitturga clavicornis* (Latreille, 1806)
8522. *Melitturga praestans* Giraud, 1861 – Уфа 1959, Чишм 1956
8523. *Panurginus labiatus* Eversmann, 1852
8524. *Panurginus lactipennis* Friese, 1897 – Предуралье РБ
8525. *Panurginus montanus* Giraud, 1861 – Гафр 1954, Куюр 1954, Хайб 1953 (Никифорук, 1957).
8526. *Panurgus banksianus* (Kirby, 1802)
8527. *Panurgus calcaratus* (Scopoli, 1763) – Крмс 1953, Бижб 1953, Абзл 1954 (Никифорук, 1957).

Семейство Apidae – Пчелиные

Подсемейство Apinae

8528. *Anthophora balassogloi* (Radoszkowski, 1877)
8529. *Anthophora bimaculata* (Panzer, 1798)
8530. *Anthophora borealis* Morawitz, 1865
8531. *Anthophora erschowi* Fedtschenko, 1875 – Уфа 1954, Куюр 1954, Хайб 1955 (Никифорук, 1957).
8532. *Anthophora fulvitarsis* Brullé, 1832 – Уфа 1953 (Никифорук, 1957).
8533. *Anthophora furcata* (Panzer, 1798)
8534. *Anthophora pedata* Eversmann, 1852 – Хайб 1955 (Никифорук, 1957).
8535. *Anthophora plagiata* (Illiger, 1806)
8536. *Anthophora plumipes* (Pallas, 1772)
8537. *Anthophora podagra* Lepeletier, 1841 – Куюр 1952; Мелеуз 1955, Зиан 1955 (Никифорук, 1957).
8538. *Amegilla quadrifasciata* (de Villers, 1789) – Уфмс 1951, Куюр 1952, Зиан 1955, Байм 1929 (Никифорук, 1957).
8539. *Anthophora quadrimaculata* (Panzer, 1798)
8540. *Anthophora retusa* (Linnaeus, 1758)
8541. *Amegilla savignyi* (Lepeletier, 1841) – Зиан 1955 (Никифорук, 1957).
8542. *Anthophora testaceipes* Morawitz, 1888 – Уфа 1953, Хайб 1955 (Никифорук, 1957).
8543. *Anthophora vernalis* Morawitz, 1879 – Иглн 1953, Хайб 1955 (Никифорук, 1957).

8544. *Apis mellifera* Linnaeus, 1758 – Медоносная пчела
8545. *Bombus armeniacus* Radoszkowski, 1877
8546. *Bombus cingulatus* Wahlberg, 1855 – Уфмс
8547. *Bombus confusus* Schenck, 1861
8548. *Bombus consobrinus* Dahlbom, 1832
8549. *Bombus cullumanus* (Kirby, 1802)
8550. *Bombus cullumanus serrisquama* Morawitz, 1888
8551. *Bombus distinguendus* Morawitz, 1869
8552. *Bombus fragrans* (Pallas, 1771)
8553. *Bombus hortorum* (Linnaeus, 1761) – Садовый шмель
8554. *Bombus humilis* Illiger, 1806
8555. *Bombus hypnorum* (Linnaeus, 1758)
8556. *Bombus jonellus* (Kirby, 1802)
8557. *Bombus laesus* Morawitz, 1875
8558. *Bombus lapidarius* (Linnaeus, 1758) – Каменный шмель
8559. *Bombus lucorum* (Linnaeus, 1761)
8560. *Bombus muscorum* (Linnaeus, 1758) – Моховый шмель
8561. *Bombus pascuorum* (Scopoli, 1763) – Полевой шмель
8562. *Bombus patagiatus* Nylander, 1848
8563. *Bombus pomorum* (Panzer, 1805)
8564. *Bombus pratorum* (Linnaeus, 1761)
8565. *Bombus ruderarius* (Müller, 1776)
8566. *Bombus ruderatus* (Fabricius, 1775)
8567. *Bombus schrencki* Morawitz, 1881
8568. *Bombus semenoviellus* Skorikov, 1910
8569. *Bombus sichelii* Radoszkowski, 1860
8570. *Bombus soroeensis* (Fabricius, 1776)
8571. *Bombus subterraneus* (Kirby, 1802) – Бурз, Куюр, Кгрч, Блгв, Аург (Валуев, 2018)
8572. *Bombus sylvarum* (Linnaeus, 1761)
8573. *Bombus terrestris* (Linnaeus, 1758) – Земляной шмель
8574. *Bombus veteranus* (Fabricius, 1793)
8575. *Bombus wurflenii* Radoszkowski, 1860 – Кигн 2022 (Валуев, 2024а).
8576. *Bombus (Psithyrus) barbutellus* (Kirby, 1802)
8577. *Bombus (Psithyrus) bohemicus* Seidl, 1838
8578. *Bombus (Psithyrus) campestris* (Panzer, 1801)
8579. *Bombus (Psithyrus) flavidus* Eversmann, 1852
8580. *Bombus (Psithyrus) norvegicus* (Sparre-Schneider, 1918)
8581. *Bombus (Psithyrus) quadricolor* (Lepeletier, 1832)
8582. *Bombus (Psithyrus) rupestris* (Fabricius, 1793)
8583. *Bombus (Psithyrus) sylvestris* (Lepeletier, 1832)
8584. *Bombus (Psithyrus) vestalis* (Geoffroy, 1785)
8585. *Epeoloides coecutiens* (Fabricius, 1775)

8586. *Eucera atricornis* Fabricius, 1793 – Хайб 1953 (Никифорук, 1957).
8587. *Eucera dalmatica* Lepeletier, 1841 – Далматская пчела
8588. *Eucera hungarica* Friese, 1895 – Хайб 1953; Зиан 1956 (Никифорук, 1957).
8589. *Eucera interrupta* Baer, 1850 – Уфмс 1953 (Никифорук, 1957).
8590. *Eucera longicornis* (Linnaeus, 1758) – Длинноусая пчела
8591. *Eucera nigripes* Klug, 1845 – Зиан 1955; Хайб 1955 (Никифорук, 1957).
8592. *Eucera proxima* Morawitz, 1875
8593. *Eucera tricincta* (Erichson, 1835)
8594. *Eucera velutina* (Morawitz, 1874)
8595. *Melecta albifrons* (Forster, 1771)
8596. *Melecta duodecimmaculata* (Rossi, 1790) – РБ (Proshchalykin et al., 2019)
8597. *Melecta luctuosa* (Scopoli, 1770)
8598. *Tetralonia malvae* (Rossi, 1790) – Уфмс 1952; Уфа 1954; Мелеуз 1955; Куюр 1952 (Никифорук, 1957).
8599. *Tetraloniella dentata* (Germar, 1839)
8600. *Tetraloniella fulvescens* (Giraud, 1863) – Белб 1953, Мелеуз, 1955, Зиан 1955, Абзл 1954, Хайб 1955 (Никифорук, 1957).
8601. *Tetraloniella nana* (Morawitz, 1874) – Уфа 1952, Белеб 1953; Куюр 1952; Хайб 1955 (Никифорук, 1957).
8602. *Tetraloniella pollinosa* (Lepeletier, 1841) – Куюр 1952, Хайб 1933 (Никифорук, 1957).
8603. *Tetraloniella ruficornis* (Fabricius, 1804)
8604. *Tetraloniella salicariae* (Lepeletier, 1841) – Уфа 1954, Бакл 1952, Мелеуз 1955, Зиан 1955 (Никифорук, 1957).
8605. *Thyreus affinis* (Morawitz, 1874) – Уфа 1954, Бижб 1953 (Никифорук, 1957).
8606. *Thyreus histrionicus* (Illiger, 1806)

Подсемейство Nomadinae

8607. *Ammobates punctatus* (Fabricius, 1804)
8608. *Ammobates vinctus* Gerstaecker, 1869 – Уфа 1954, Зиан 1955, Хайб 1955
8609. *Ammobatoides abdominalis* (Eversmann, 1852)
8610. *Biastes brevicornis* (Panzer, 1798)
8611. *Biastes emarginatus* (Schenck, 1853)
8612. *Biastes truncatus* (Nylander, 1848)
8613. *Epeolus alpinus* Friese, 1893
8614. *Epeolus productus* Bischoff, 1930 – Гафр 1954, Дюртюли 1954 (Никифорук, 1957).
8615. *Epeolus variegatus* (Linnaeus, 1758) – Уфмс 1953, Бижб 1953, Зиан 1955, Учалы 1954, Абзл 1954, Хайб 1955 (Никифорук, 1957).
8616. *Nomada alboguttata* Herrich-Schäffer, 1839
8617. *Nomada argentata* Herrich-Schäffer, 1839
8618. *Nomada armata* Herrich-Schäffer, 1839
8619. *Nomada baccata* Smith, 1844
8620. *Nomada coxalis* Morawitz, 1877 – Зиан 1956

8621. *Nomada emarginata* Morawitz, 1877
8622. *Nomada fabriciana* (Linnaeus, 1767) – Иглн 1953
8623. *Nomada femoralis* Morawitz, 1869
8624. *Nomada ferruginata* (Linnaeus, 1767)
8625. *Nomada flava* Panzer, 1798
8626. *Nomada flavoguttata* (Kirby, 1802)
8627. *Nomada flavopicta* (Kirby, 1802)
8628. *Nomada fucata* Panzer, 1798
8629. *Nomada fulvicornis* Fabricius, 1793
8630. *Nomada furva* Panzer, 1798 – Хайб 1953
8631. *Nomada fuscicornis* Nylander, 1848
8632. *Nomada goodeniana* (Kirby, 1802)
8633. *Nomada guttulata* Schenck, 1861
8634. *Nomada hungarica* Dalla Torre & Friese, 1894 – Уфа 1954, Куюр 1954 (Никифорук, 1957).
8635. *Nomada integra* Brullé, 1832*Nomada ecarinata* Morawitz, 1888 – Бижб 1953 (Никифорук, 1957).
8636. *Nomada lathburiana* (Kirby, 1802)
8637. *Nomada leucophthalma* (Kirby, 1802)
8638. *Nomada marshamella* (Kirby, 1802)
8639. *Nomada moeschleri* Alfken, 1913
8640. *Nomada mutabilis* Morawitz, 1870
8641. *Nomada nobilis* Herrich-Schäffer, 1839 – Чишм 1953
8642. *Nomada obscura* Zetterstedt, 1838 – Куюр 1954
8643. *Nomada obtusifrons* Nylander, 1848
8644. *Nomada panzeri* Lepeletier, 1841
8645. *Nomada pectoralis* Morawitz, 1877 – Хайб 1934 (Никифорук, 1957).
8646. *Nomada pulchra* Arnold, 1888
8647. *Nomada roberjeotiana* Panzer, 1799
8648. *Nomada ruficornis* (Linnaeus, 1758)
8649. *Nomada rufipes* Fabricius, 1793
8650. *Nomada sexfasciata* (Panzer, 1799) – Уфа 1954, Уфмс 1952 (Никифорук, 1957).
8651. *Nomada stigma* Fabricius, 1804 – Уфа 1953, Куюр 1954 (Никифорук, 1957).
8652. *Nomada striata* Fabricius, 1793 – Уфа 1953 (Никифорук, 1957).
8653. *Nomada succincta* Panzer, 1798
8654. *Nomada sybarita* Schmiedeknecht, 1882 – Куюр 1954 (Никифорук, 1957).
8655. *Nomada zonata* Panzer, 1798
8656. *Pasites maculatus* Jurine, 1807
8657. *Triepeolus tristis* (Smith, 1854) – Уфа 1952; Дюртюли 1954, Бижб 1953, Куюр 1952 (Никифорук, 1957).

Подсемейство Xylocopinae

8658. *Ceratina cyanea* (Kirby, 1802)

8659. *Xylocopa valga* Gerstaecker, 1872 – Пчела-плотник
8660. *Xylocopa violacea* (Linnaeus, 1758) – Пчела-древогрыз

Семейство Colletidae – Коллетиды

Подсемейство Colletinae

8661. *Colletes caspicus* Morawitz, 1874
8662. *Colletes collaris* Dours, 1872
8663. *Colletes cunicularius* (Linnaeus, 1761) – Подземный коллетес
8664. *Colletes daviesanus* Smith, 1846
8665. *Colletes eous* Morice, 1904
8666. *Colletes floralis* Eversman, 1852
8667. *Colletes fodiens* (Fourcroy, 1785)
8668. *Colletes hylaeiformis* Eversmann, 1852
8669. *Colletes jankowskyi* Radoszkowski, 1891 – Учал, Хайб 1934, Уфа, Абзл 1954 (Никифорук, 1957)
8670. *Colletes lebedewi* Noskiewicz, 1936
8671. *Colletes marginatus* Smith, 1846 – Окаймленный коллетес
8672. *Colletes pallescens* Noskiewicz, 1936
8673. *Colletes similis* Schenck, 1853
8674. *Colletes succinctus* (Linnaeus, 1758) – Опоясанный коллетес

Подсемейство Hylaeinae

8675. *Hylaeus angustatus* (Schenck, 1861)
8676. *Hylaeus annularis* (Kirby, 1802)
8677. *Hylaeus annulatus* (Linnaeus, 1758)
8678. *Hylaeus brevicornis* Nylander, 1852
8679. *Hylaeus clypearis* (Schenck, 1853) – Уфа 1952
8680. *Hylaeus communis* Nylander, 1852 – Голая пчела
8681. *Hylaeus confusus* Nylander, 1852
8682. *Hylaeus difformis* (Eversmann, 1852)
8683. *Hylaeus dilatatus* (Kirby, 1802) – Дюртюли 1954, Гафр 1954, Бижб 1953 (Никифорук, 1957)
8684. *Hylaeus gibbus* Saunders, 1850
8685. *Hylaeus gracilicornis* (Morawitz, 1867)
8686. *Hylaeus leptocephalus* (Morawitz, 1870)
8687. *Hylaeus lineolatus* (Schenck, 1861)
8688. *Hylaeus moricei* (Strand, 1898)
8689. *Hylaeus nigritus* (Fabricius, 1798) – Черный гилеус
8690. *Hylaeus nivalis* (Morawitz, 1867) – Гафр 1951 (Никифорук, 1957)
8691. *Hylaeus pictipes* Nylander, 1852
8692. *Hylaeus punctulatissimus* Smith, 1842
8693. *Hylaeus rinki* (Gorski, 1852)
8694. *Hylaeus signatus* (Panzer, 1798)
8695. *Hylaeus sinuatus* (Schenck, 1853)
8696. *Hylaeus styriacus* Foerster, 1871

8697. *Hylaeus variegatus* (Fabricius, 1798)

Семейство Crabronidae – Песочные осы

Подсемейство Astatinae

8698. *Astata boops* (Schrank, 1781) – Шумный сфекс
8699. *Astata minor* Kohl, 1885

Подсемейство Bembicinae – Бембексы

8700. *Argogorytes mystaceus* (Linnaeus, 1761) – Бурз/Абзл 2020 (Антропов, Валуев, 2020)
8701. *Bembecinus sp*. – Благовещ 2017
8702. *Bembix rostrata* (Linnaeus, 1758) – Носатый бембекс – Предуралье
8703. *Didineis lunicornis* (Fabricius, 1798) (Mokrousov, Danilov, 2017)
8704. *Gorytes quadrifasciatus* (Fabricius, 1804) – Толстоголовая четырехзначковая оса
8705. *Gorytes quinquecinctus* (Fabricius, 1793)
8706. *Harpactus tauricus* Radoszkowski, 1884 – Уфмс
8707. *Nysson maculosus* (Gmelin, 1790) – ЗШТ, Октябрьский (Рудоискатель, 2010)
8708. *Nysson spinosus* (J. Forster, 1771)

Подсемейство Crabroninae – Песочные осы

8709. *Crabro cribrarius* (Linnaeus, 1758)
8710. *Crabro ingricus* (F. Morawitz, 1888)
8711. *Crabro peltarius* (Schreber, 1784)
8712. *Crossocerus assimilis* (F. Smith, 1856) – ЗШТ, Октябрьский (Рудоискатель, 2010)
8713. *Crossocerus cetratus* (Shuckard, 1837)
8714. *Crossocerus elongatulus* (Vander Linden, 1829) – ЗШТ, Октябрьский (Рудоискатель, 2010)
8715. *Crossocerus vagabundus* (Panzer, 1798) – Кочевая толстоголовая оса
8716. *Ectemnius borealis* (Zetterstedt, 1838)
8717. *Ectemnius cavifrons* (Thomson, 1870) – ЗШТ, Октябрьский (Рудоискатель, 2010)
8718. *Ectemnius continuus* (Fabricius, 1804) – Бродячая толстоголовая оса
8719. *Ectemnius fossorius* (Linnaeus, 1758) – ЗШТ, Октябрьский (Рудоискатель, 2010)
8720. *Ectemnius lapidarius* (Panzer, 1803)
8721. *Ectemnius ruficornis* (Zetterstedt, 1838) – Клтс 2023 (Антропов, Валуев, 2023).
8722. *Ectemnius sexcinctus* (Fabricius, 1775)
8723. *Ectemnius spinipes* (A. Morawitz, 1866)
8724. *Entomognathus brevis* (Vander Linden, 1829)
8725. *Lestica alata* (Panzer, 1797)
8726. *Lestica camelus* (Eversmann, 1849)
8727. *Lestica clypeata* (Schreber, 1759)
8728. *Lindenius albilabris* (Fabricius, 1793) – ЗШТ, Октябрьский (Рудоискатель, 2010)

8729. *Nitela sp.* – Уфа 2024
8730. *Oxybelus trispinosus* (Fabricius, 1787) – ЗШТ, Октябрьский (Рудоискатель, 2010)
8731. *Oxybelus uniglumis* (Linnaeus, 1758) – ЗШТ, Октябрьский (Рудоискатель, 2010)
8732. *Rhopalum clavipes* (Linnaeus, 1758)
8733. *Tachysphex latifrons* Kohl, 1884
8734. *Tachysphex obscuripennis* (Schenck, 1857)
8735. *Tachysphex pompiliformis* (Panzer, 1804)
8736. *Tachysphex psammobius* (Kohl, 1880) – Песчаный тахисфекс
8737. *Tachytes panzeri* (Dufour, 1841) – ЗШТ, Октябрьский (Рудоискатель, 2010)
8738. *Trypoxylon figulus* (Linnaeus, 1758) – Обыкновенная оса-горшечница

Подсемейство Dinetinae

8739. *Dinetus sp.* – Бгвщ 2017

Подсемейство Mellininae – Медовики

8740. *Mellinus arvensis* (Linnaeus, 1758) – Полевой меллин

Подсемейство Pemphredoninae – Пемфредоны

8741. *Passaloecus eremita* Kohl, 1893 – Ишмб 2024
8742. *Pemphredon inornata* Say, 1824 – Неокрашенный пемфредон
8743. *Pemphredon lethifer* (Shuckard, 1837) – ЗШТ, Октябрьский (Рудоискатель, 2010)
8744. *Pemphredon lugubris* (Fabricius, 1793)
8745. *Pemphredon montana* Dahlbom, 1845
8746. *Psenulus pallipes* (Panzer, 1798)

Подсемейство Philanthinae

8747. *Cerceris arenaria* (Linnaeus, 1758) – Песчаная церцерис
8748. *Cerceris flavilabris* (Fabricius, 1793) – ЗШТ, Октябрьский (Рудоискатель, 2010), Кушн

? *Cerceris interrupta* (Panzer, 1799)

8749. *Cerceris quadricincta* (Panzer, 1799) – ЗШТ, Октябрьский (Рудоискатель, 2010); Уфа
8750. *Cerceris quadrifasciata* (Panzer, 1799)
8751. *Cerceris quinquefasciata* (Rossi, 1792) – ЗШТ, Октябрьский (Рудоискатель, 2010)
8752. *Cerceris rybyensis* (Linnaeus, 1771) – Роющая оса
8753. *Cerceris sabulosa* (Panzer, 1799)
8754. *Cerceris tuberculata* (de Villers, 1789) – Бугорчатая церцерис
8755. *Philanthus triangulum* (Fabricius, 1775) – Пчелиный волк – Иглн 2024
8756. *Philanthus sp.* – Чишм 2024

Семейство Halictidae – Галиктиды

Подсемейство Halictinae

8757. *Halictus confusus* Smith, 1853

8758. *Halictus compressus* (Walckenaer, 1802)
8759. *Halictus gavarnicus tartaricus* (Bluethgen, 1933)
8760. *Halictus leucaheneus arenosus* Ebmer, 1976
8761. *Halictus maculatus* (Smith, 1848) – Пятнистый галикт
8762. *Halictus patellatus* Morawitz, 1873 – Предуралье РБ
8763. *Halictus pollinosus* Sichel, 1860
8764. *Halictus quadricinctus* (Fabricius, 1777)
8765. *Halictus rubicundus* (Christ, 1791)
8766. *Halictus scabiosae* (Rossi, 1790)
8767. *Halictus seladonius* (Fabricius, 1794)
8768. *Halictus sexcinctus* (Fabricius, 1775) – Шестиполосый галикт
8769. *Halictus simplex* Bluethgen, 1923
8770. *Halictus smaragdulus* Vachal, 1895
8771. *Halictus subauratus* (Rossi, 1792)
8772. *Halictus tumulorum* (Linnaeus, 1758)
8773. *Halictus vestitus* (Lepeletier, 1841)
8774. *Lasioglossum aeratum* (Kirby, 1802)
8775. *Lasioglossum albipes* (Fabricius, 1781) – Белоногий галикт
8776. *Lasioglossum brevicorne* (Schenck, 1870)
8777. *Lasioglossum calceatum* (Scopoli, 1763) – Рыжеватый галикт
8778. *Lasioglossum clypeare* (Schenck, 1853) – Куюр 1954
8779. *Lasioglossum convexiusculum* (Schenck, 1853) – Уфа 1954, Уфмс 1956 (Никифорук, 1957)
8780. *Lasioglossum costulatum* (Kriechbaumer, 1873)
8781. *Lasioglossum discum* (Smith, 1854)
8782. *Lasioglossum fratellum* (Perez, 1903)
8783. *Lasioglossum fulvicorne* (Kirby, 1802)
8784. *Lasioglossum intermedium* (Schenck, 1870)
8785. *Lasioglossum interruptum* (Panzer, 1798)
8786. *Lasioglossum laeve* (Kirby, 1802)
8787. *Lasioglossum laevigatum* (Kirby, 1802)
8788. *Lasioglossum laticeps* (Schenck, 1870)
8789. *Lasioglossum lativentre* (Schenck, 1853)
8790. *Lasioglossum leucopus* (Kirby, 1802)
8791. *Lasioglossum leucozonium* (Schrank, 1781)
8792. *Lasioglossum lineare* (Schenck, 1869)
8793. *Lasioglossum lissonotum* (Noskiewicz, 1926)
8794. *Lasioglossum lucidulum* (Schenck, 1861)
8795. *Lasioglossum majus* (Nylander, 1852)
8796. *Lasioglossum malachurum* (Kirby, 1802)
8797. *Lasioglossum mandibulare* (Morawitz, 1866)
8798. *Lasioglossum marginatum* (Brulle, 1832)
8799. *Lasioglossum minutissimum* (Kirby, 1802) – Уфа 1952 (Никифорук, 1957)

8800. *Lasioglossum minutulum* (Schenck, 1853)
8801. *Lasioglossum monstrificum* (Morawitz, 1891)
8802. *Lasioglossum morio* (Fabricius, 1793)
8803. *Lasioglossum nigripes* (Lepeletier, 1841)
8804. *Lasioglossum nitidiusculum* (Kirby, 1802)
8805. *Lasioglossum nitidulum nitidulum* (Fabricius, 1804)
8806. *Lasioglossum pallens* (Brulle, 1832)
8807. *Lasioglossum pauxillum* (Schenck, 1853)
8808. *Lasioglossum podolicum* (Noskiewicz, 1925)
8809. *Lasioglossum politum* (Schenck, 1853) – Куюр 1954
8810. *Lasioglossum prasinum* (Smith, 1848)
8811. *Lasioglossum punctatissimum* (Schenck, 1853)
8812. *Lasioglossum puncticolle* (Morawitz, 1872) – Гафр 1954, Уфа 1955 (Никифорук, 1957)
8813. *Lasioglossum quadrinotatulum* (Schenck, 1861)
8814. *Lasioglossum quadrinotatum* (Kirby, 1802)
8815. *Lasioglossum rostratum* (Moure, 1947) – Хайб 1953 (Никифорук, 1957)
8816. *Lasioglossum rufitarse* (Zetterstedt, 1838)
8817. *Lasioglossum semilucens* (Alfken, 1914)
8818. *Lasioglossum setulellum* (Strand, 1909)
8819. *Lasioglossum sexmaculatum* (Schenck, 1853)
8820. *Lasioglossum sexnotatulum* (Nylander, 1852)
8821. *Lasioglossum sexnotatum* (Kirby, 1802)
8822. *Lasioglossum sexstrigatum* (Schenck, 1870)
8823. *Lasioglossum smeathmanellum* (Kirby, 1802)
8824. *Lasioglossum subfasciatum* (Imhoff, 1832)
8825. *Lasioglossum tarsatum* (Schenck, 1870)
8826. *Lasioglossum tricinctum* (Schenck, 1874)
8827. *Lasioglossum villosulum* (Kirby, 1802)
8828. *Lasioglossum xanthopus* (Kirby, 1802)
8829. *Lasioglossum zonulum* (Smith, 1848)
8830. *Sphecodes albilabris* (Fabricius, 1793)
8831. *Sphecodes crassus* Thomson, 1870
8832. *Sphecodes cristatus* Hagens, 1882
8833. *Sphecodes ephippius* (Linnaeus, 1767)
8834. *Sphecodes ferruginatus* von Hagens, 1882
8835. *Sphecodes geoffrellus* (Kirby, 1802)
8836. *Sphecodes gibbus* (Linnaeus, 1758)
8837. *Sphecodes hyalinatus* Hagens, 1882
8838. *Sphecodes longulus* von Hagens, 1882
8839. *Sphecodes marginatus* von Hagens, 1882
8840. *Sphecodes miniatus* von Hagens, 1882
8841. *Sphecodes monilicornis* (Kirby, 1802)

8842. *Sphecodes niger* von Hagens, 1874
8843. *Sphecodes pellucidus* Smith, 1845
8844. *Sphecodes puncticeps* Thomson, 1870
8845. *Sphecodes reticulatus* Thomson, 1870
8846. *Sphecodes rufiventris* (Panzer, 1798)
8847. *Sphecodes scabricollis* Wesmael, 1835

Подсемейство Nomiinae

8848. *Pseudapis femoralis* (Pallas, 1773) – Уфа, Хайб 1954, Чишм 1955, Гафр 1954 (Никифорук, 1957)

Подсемейство Rophitinae

8849. *Dufourea dentiventris* (Nylander, 1848)
8850. *Dufourea inermis* (Nylander, 1848)
8851. *Dufourea minuta* Lepeletier, 1841
8852. *Rophites canus* Eversmann, 1852 – Уфа, Учлн
8853. *Rophites hartmanni* Friese, 1902
8854. *Rophites quinquespinosus* Spinola, 1808 – Уфа, Учлн, Бижб, Блрц, Хайб
8855. *Rophites trispinosus* Schummel, 1829
8856. *Systropha curvicornis* (Scopoli, 1770) – Спиральноусая систрофа
8857. *Systropha planidens* Giraud, 1861 – Чишм 2024

Семейство Megachilidae – Пчелы-листорезы

8858. *Aglaoapis tridentata* (Nylander, 1848)
8859. *Anthidiellum strigatum* (Panzer, 1804)
8860. *Anthidium cingulatum* Latreille, 1809
8861. *Anthidium florentinum* (Fabricius, 1775)
8862. *Anthidium manicatum* (Linnaeus, 1758) – Манжетная антидия
8863. *Anthidium oblongatum* (Illiger, 1806)
8864. *Anthidium punctatum* Latreille, 1809 – Уфа, Гафр, Абзл
8865. *Anthidium septemspinosum* Lepeletier, 1841
8866. *Chelostoma campanularum* (Kirby, 1802)
8867. *Chelostoma distinctum* (Stoeckhert, 1929)
8868. *Chelostoma florisomne* (Linnaeus, 1758)
8869. *Chelostoma rapunculi* (Lepeletier, 1841)
8870. *Coelioxys alatus* Forster, 1853
8871. *Coelioxys aurolimbatus* Forster, 1853
8872. *Coelioxys conicus* (Linnaeus, 1758)
8873. *Coelioxys conoideus* (Illiger, 1806)
8874. *Coelioxys elongatus* (Lepeletier, 1841)
8875. *Coelioxys emarginata* Foerster, 1853 – Зиан 1955, Хайб 1955 (Никифорук, 1957)
8876. *Coelioxys inermis* (Kirby, 1802)
8877. *Coelioxys mandibularis* Nylander, 1848
8878. *Coelioxys rufescens* Lepeletier & Serville, 1825
8879. *Heriades truncorum* (Linnaeus, 1758)

8880. *Hoplitis acuticornis* (Dufour & Perris, 1840) – Чишм 1956 (Никифорук, 1957)
8881. *Hoplitis adunca* (Panzer, 1798)
8882. *Hoplitis anthocopoides* (Schenck, 1853)
8883. *Hoplitis caularis* (Morawitz, 1875) – Чишм 1956
8884. *Hoplitis claviventris* (Thomson, 1872)
8885. *Hoplitis leucomelana* (Kirby, 1802)
8886. *Hoplitis mitis* (Nylander, 1852) – Куюр 1954, Кард 1955, Абзл 1954 (Никифорук, 1957)
8887. *Hoplitis papaveris* (Latreille, 1799) – Уфмс 1952, Усть-Айск 1955 (Никифорук, 1957)
8888. *Hoplitis robusta* (Nylander, 1848)
8889. *Hoplitis tridentata* (Dufour & Perris, 1840) – Уфа 1954, Бижб 1953, Мелз 1955, Блрц 1954 (Никифорук, 1957)
8890. *Hoplitis tuberculata* (Nylander, 1848)
8891. *Icteranthidium laterale* (Latreille, 1809) – Уфа 1954, Куюр 1952, Хайб 1934 (Никифорук, 1957)
8892. *Lithurgus chrysurus* Fonscolombe, 1834 – Уфа 1954, Бижб 1953, Учалы 1953, Зиан 1955, Мелз 1955 (Никифорук, 1957)
8893. *Lithurgus cornutus* (Fabricius, 1787)
8894. *Megachile alpicola* Alfken, 1924
8895. *Megachile analis* Nylander, 1852
8896. *Megachile bombycina* Radoszkowki, 1874 – Шмелевидная мегахила
8897. *Megachile centuncularis* (Linnaeus, 1758) – Розанная мегахила
8898. *Megachile circumcincta* (Kirby, 1802)
8899. *Megachile ericetorum* Lepeletier, 1841 Крмс, Куюр, Блрц
8900. *Megachile fulvimana* Eversmann, 1852
8901. *Megachile genalis* Morawitz, 1880
8902. *Megachile lagopoda* (Linnaeus, 1761) – Заячьеногая мегахила
8903. *Megachile lapponica* Thomson, 1872
8904. *Megachile leachella* Curtis, 1828 – Уфмс 1951, Бижб 1953, Куюр 1952, Мелз 1955, Зиан 1955 (Никифорук, 1957)
8905. *Megachile ligniseca* (Kirby, 1802)
8906. *Megachile maritima* (Kirby, 1802)
8907. *Megachile melanogaster* Eversmann, 1852
8908. *Megachile melanopyga* Costa, 1863
8909. *Megachile nigriventris* Schenck, 1870 – Уфа 1953, Бижб 1953, Учалы 1953 (Никифорук, 1957)
8910. *Megachile octosignata* Nylander, 1852
8911. *Megachile pilicrus* Morawitz, 1879
8912. *Megachile rotundata* (Fabricius, 1787) – Округленная мегахила
8913. *Megachile versicolor* Smith, 1844 – Разноцветная мегахила
8914. *Megachile willughbiella* (Kirby, 1802) – Белолапая мегахила
8915. *Osmia aurulenta* (Panzer, 1799)

8916. *Osmia bicolor* (Schrank, 1781)
8917. *Osmia bicornis* (Linnaeus, 1758) – Рыжая осмия – Уфа 2020, Иглн 2025
8918. *Osmia brevicornis* (Fabricius, 1798)
8919. *Osmia caerulescens* (Linnaeus, 1758)
8920. *Osmia cornuta* (Latreille, 1805)
8921. *Osmia inermis* (Zetterstedt, 1838)
8922. *Osmia leaiana* (Kirby, 1802)
8923. *Osmia parietina* Curtis, 1828
8924. *Osmia pilicornis* Smith, 1846
8925. *Osmia spinulosa* (Kirby, 1802) – Уфа 1953, Дюртюли 1954, Мелз 1955 (Никифорук, 1957), Нурм 2023
8926. *Osmia uncinata* Gerstaecker, 1869
8927. *Pseudoanthidium nanum* (Mocsáry, 1880) – Уфа 1953, Абзл 1954, Куюр 1954, Хайб 1953 (Никифорук, 1957)
8928. *Rhodanthidium septemdenlatum* (Latreille, 1809)
8929. *Stelis breviuscula* (Nylander, 1848)
8930. *Stelis minima* Schenck, 1861
8931. *Stelis minuta* Lepeletier & Serville, 1825
8932. *Stelis ornatula* (Klug, 1807)
8933. *Stelis phaeoptera* (Kirby, 1802)
8934. *Stelis punctulatissima* (Kirby, 1802)
8935. *Stelis scutellaris* Morawitz, 1894
8936. *Stelis simillima* Morawitz, 1876 – Уфа 2023
8937. *Trachusa byssina* (Panzer, 1798)

Семейство Melittidae

8938. *Dasypoda argentata* Panzer, 1809
8939. *Dasypoda aurata* Rudow, 1881
8940. *Dasypoda hirtipes* (Fabricius, 1793) – Мохноногая пчела
8941. *Macropis europaea* Warncke, 1973
8942. *Macropis fulvipes* (Fabricius, 1804) – Мохноногий макропис
8943. *Macropis labiata* (Fabricius, 1804)
8944. *Melitta dimidiata* Morawitz, 1876 – Уфмс 1952, Зиан 1955
8945. *Melitta haemorrhoidalis* (Fabricius, 1775)
8946. *Melitta leporina* (Panzer, 1799)
8947. *Melitta melanura* (Nylander, 1852)
8948. *Melitta nigricans* Alfken, 1905
8949. *Melitta tricincta* Kirby, 1802

Семейство Sphecidae – Роющие осы

8950. *Ammophila campestris* Latreille, 1809 – Кркм 2023 (Антропов, Валуев, 2023).
8951. *Ammophila pubescens* Curtis, 1836 – Пушистый пескорой
8952. *Ammophila sabulosa* (Linnaeus, 1758) – Песчаный пескорой
8953. *Podalonia affinis* (W. Kirby, 1798) – Слвт 2022 (Антропов, Валуев, 2022б)
8954. *Podalonia hirsuta* (Scopoli, 1763)

8955. *Prionyx nudatus* (Kohl, 1885) – Уфмс 2024
8956. *Sceliphron curvatum* (F. Smith, 1870) – Туйм 2018
8957. *Sceliphron deforme* (F. Smith, 1856) – Ишмб 2019 (Антропов и др., 2019); Туйм 2018, Ермк 2019 (Герасимов 2021а), Уфмс 2020
8958. *Sceliphron destillatorium* (Illiger, 1807) – Обыкновенный пелопей
8959. *Sphex funerarius* Gussakovskij, 1934 – Зубастый сфекс – Предуралье (Антропов, Валуев, 2023)

Надсемейство Chrysidoidea

Семейство Chrysididae – Осы блестянки, или золотые осы

8960. *Chrysis brevitarsis* Thomson, 1870
8961. *Chrysis decora* Mocsary, 1887 – РБ (Rosa et al., 2019).
8962. *Chrysis erivanensis* Radoszkowski, 1880 – ЗШТ (Rosa et al., 2019).
8963. *Chrysis fasciata* Olivier, 1790
8964. *Chrysis fulgida* (Linnaeus, 1761) – Сверкающая оса
8965. *Chrysis ignita* (Linnaeus, 1761)
8966. *Chrysis indigotea* Dufour & Perris, 1840
8967. *Chrysis iris* Christ, 1791 – Бурз (Rosa et al., 2019).
8968. *Chrysis longula* Abeille de Perrin, 1879
8969. *Chrysis mesasiatica* Semenov, 1912 – РБ (Rosa et al., 2019).
8970. *Chrysis ruddii* Shuckard, 1838 – Уфа
8971. *Chrysis rutilans* Olivier, 1790
Chrysis rutilans rutilans Olivier, 1791 – ЗШТ (Rosa et al., 2019).
8972. *Chrysura cuprea* (Rossi, 1790) – Медная оса
8973. *Chrysura hirsuta* (Gerstaecker, 1869) – РБ (Rosa et al., 2019).
8974. *Chrysura radians* (Harris, 1776)
8975. *Cleptes nitidulus* (Fabricius, 1793)
8976. *Cleptes semiauratus* (Linnaeus, 1761) – Бирск (Rosa et al., 2019).
8977. *Euchroeus purpuratus* (Fabricius, 1787) – Пурпурная оса-блестянка
8978. *Hedychridium adventicium* Zimmermann, 1962 – Стмк (Rosa et al., 2019).
8979. *Hedychridium ardens ardens* (Cocuebert, 1801) – Чишм (Rosa et al., 2019).
8980. *Hedychridium gerstaeckeri gerstaeckeri* Chevrier, 1869 – Стмк (Rosa et al., 2019).
8981. *Hedychridium roseum* (Rossi, 1790)
8982. *Hedychridium valesiense* Linsenmaier, 1959 – Уфа
8983. *Hedychrum nobile* (Scopoli, 1763) – Туйм 2018
8984. *Hedychrum rutilans* Dahlbom, 1854 – Давл 2010, Хайб 2015, Иглн 2015, Туйм 2018
8985. *Holopyga amoenula* Dahlbom, 1845
8986. *Holopyga chrysonota chrysonota* (Forster, 1853) – РБ (Rosa et al., 2019).
8987. *Omalus aeneus* (Fabricius, 1787) – Бурз (Rosa et al., 2019).
8988. *Parnopes grandior* (Pallas, 1771) – Крупный парнопес
8989. *Philoctetes bidentulus* (Lepeletier, 1806) – Белебей (Rosa et al., 2019).
8990. *Pseudomalus auratus* (Linnaeus, 1758) – Золотая оса-блестянка

8991. *Pseudomalus pusillus pusillus* (Fabricius, 1804) – Стмк
8992. *Pseudospinolia neglecta* (Shuckard, 1836)
8993. *Stilbum calens* (Fabricius, 1781) – Зиан 2008 (Антропов и др., 2021)
8994. *Trichrysis cyanea* (Linnaeus, 1758) – Синяя оса

Надсемейство Vespoidea

Семейство Eumenidae – Одиночные осы

8995. *Discoelius dufourii* Lepeletier, 1841
8996. *Discoelius zonalis* (Panzer, 1801)
8997. *Euodynerus notatus* (Jurine, 1807)
8998. *Euodynerus quadrifasciatus* (Fabricius, 1793)
8999. *Gymnomerus laevipes* (Shuckard, 1837)
9000. *Leptochilus alpestris* (de Saussure, 1856)
9001. *Microdynerus timidus* (de Saussure, 1856)
9002. *Polistes albellus* Giordani Soika, 1976 – Бурв 2018 (Валуев, 2019б), Предуралье и Учлн (Антропов, Валуев, 2021)
9003. *Polistes biglumis* (Linnaeus, 1758)
9004. *Polistes dominula* (Christ, 1791) – Уфмс 2018, Предуралье и Блрц (Антропов, Валуев, 2021)
9005. *Polistes gallicus* (Linnaeus, 1767)
9006. *Polistes nimpha* (Christ, 1791) – обычен, повсеместно
9007. *Polistes riparius* Sk. Yamane et S. Yamane, 1987 – Чекм 2018 (Антропов, Валуев, 2019), Абзл
9008. *Psiliglossa sp*.
9009. *Rhynchalastor punctifrons* (Thomson, 1874)
9010. *Symmorphus bifasciatus* (Linnaeus, 1761)
9011. *Symmorphus crassicornis* (Panzer, 1796)
9012. *Symmorphus fuscipes* (Herrich-Schäffer, 1838)
9013. *Symmorphus gracilis* (Brullé, 1832) – Чишм 2016
9014. *Symmorphus murarius* (Linnaeus, 1758)

Семейство Mutillidae – Осы-немки

9015. *Dasylabris maura* (Linnaeus, 1758) – Байм 2015 (Герасимов, 2021а)
9016. *Mutilla europaea* Linnaeus, 1758 – Европейская немка
9017. *Myrmilla sp*. – Ишмб 2022.
9018. *Myrmosa atra* Panzer, 1801 – Октябрьский 2025
9019. *Physetopoda halensis* (Fabricius, 1787)
9020. *Smicromyrme rufipes* (Fabricius, 1787) – Красноногая немка

Семейство Pompilidae – Дорожные осы

9021. *Agenioideus cinctellus* (Spinola, 1808) – Уфа 2025, Иглн 2025
9022. *Anoplius viaticus* (Linnaeus, 1758)
9023. *Auplopus carbonarius* (Scopoli, 1763) – Уфа 2022; Уфмс и Дувн 2022 (Антропов, Валуев, 2022б)
9024. *Ceropales maculatus* (Fabricius, 1775)
9025. *Episyron arrogans* (Smith, 1873) – Уфа 2020

9026. *Episyron rufipes* (Linnaeus, 1758) – Уфмс 2015 и Учлн 2020 (Антропов, Валуев, 2021).
9027. *Evagetes pectinipes* (Linnaeus, 1758) – Кушн 2023
9028. *Lophopompilus samariensis* (Pallas, 1771)
9029. *Parabatozonus lacerticida* (Pallas, 1771) – Давл 2016, Кркм 2023 (Антропов, Валуев, 2023)
9030. *Pepsis cyanea* Palisot-Beauvais, 1809
9031. *Priocnemis hyalinata* (Fabricius, 1793) – Каликург
9032. *Priocnemis perturbator* (Harris, 1780)

Семейство Sapygidae – Осы-сапиги

9033. *Monosapyga clavicornis* (Linnaeus, 1758) – Чекм 2017
9034. *Sapyga similis* (Fabricius, 1793) – Сходная сапига

Семейство Scoliidae – Сколии

9035. *Megascolia maculata* (Drury, 1773)
Megascolia maculata flavifrons (Fabricius, 1775) – Сколия желтолобая
9036. *Scolia hirta* (Schrank, 1781) – Уфмс 2015 (Антропов, Валуев, 2021)
9037. *Scolia sexmaculata* (O. F. Muller, 1766)

Семейство Tiphiidae

9038. *Tiphia femorata* Fabricius, 1775 – из личинок майского жука – Уфа, Шарн

Семейство Vespidae – Настоящие осы

9039. *Ancistrocerus antilope* (Panzer, 1798)
9040. *Ancistrocerus gazella* (Panzer, 1798)
9041. *Ancistrocerus ichneumonideus* (Ratzeburg, 1844)
9042. *Ancistrocerus nigricornis* (Curtis, 1826)
9043. *Ancistrocerus oviventris* (Wesmael, 1836)
9044. *Ancistrocerus parietinus* (Linnaeus, 1761)
9045. *Ancistrocerus parietum* (Linnaeus, 1758)
9046. *Ancistrocerus trifasciatus* (Muller, 1776)
9047. *Dolichovespula adulterina* (de Buysson, 1905)
9048. *Dolichovespula media* (Retzius, 1783) – Средняя оса
9049. *Dolichovespula norwegica* (Fabricius, 1781) – Норвежская оса
9050. *Dolichovespula omissa* (Bischoff, 1931)
9051. *Dolichovespula saxonica* (Fabricius, 1793) – Саксонская оса – обычна
9052. *Dolichovespula sylvestris* (Scopoli, 1763) – Лесная оса
9053. *Eumenes coarctatus* (Linnaeus, 1758) – Пилюльная оса
9054. *Eumenes coronatus* (Panzer, 1799)
9055. *Eumenes pedunculatus* (Panzer, 1799)
9056. *Odynerus poecilus* Saussure, 1856
9057. *Odynerus reniformis* (Gmelin, 1790)
9058. *Odynerus simillimus* Morawitz, 1867
9059. *Odynerus spinipes* (Linnaeus, 1758) – Шипоногий одинер
9060. *Pseudepipona herrichii* (Schulthess, 1855) – Шарн 2024
9061. *Vespa crabro* Linnaeus, 1758 – Шершень – обычен

9062. *Vespula austriaca* (Panzer, 1799) – Австрийская оса
9063. *Vespula germanica* (Fabricius, 1793) – Германская оса – обычна
9064. *Vespula rufa* (Linnaeus, 1758) – Рыжая оса
9065. *Vespula vulgaris* (Linnaeus, 1758) – Обыкновенная оса – обычна

Надсемейство Formicoidea

Семейство Formicidae – Муравьи

Подсемейство Dolichoderinae

9066. *Dolichoderus quadripunctatus* (Linnaeus, 1771) – Крмс 2021, Уфа
9067. *Tapinoma erraticum* (Latreille, 1798) – Блуждающий муравей

Подсемейство Formicinae

9068. *Camponotus fallax* (Nylander, 1856) – Блестящий муравей-древоточец
9069. *Camponotus herculeanus* (Linnaeus, 1758) – Красногрудый муравей-древоточец
9070. *Camponotus ligniperdus* (Latreille, 1802) – Европейский муравей-древоточец
9071. *Camponotus saxatilis* Ruzsky, 1895 – Золотистоволосый муравей-древоточец
9072. *Camponotus vagus* (Scopoli, 1763) – Черный муравей-древоточец
9073. *Cataglyphis aenescens* (Nylander, 1849) – Степной бегунок
9074. *Formica aquilonia* Yarrow, 1951 – Северный лесной муравей
9075. *Formica cinerea* Mayr, 1853 – Песчаный муравей
9076. *Formica cunicularia* Latreille, 1798 – Прыткий степной муравей
9077. *Formica exsecta* Nylander, 1846 – Тонкоголовый муравей
9078. *Formica fusca* Linnaeus, 1758 – Бурый лесной муравей
9079. *Formica gagates* Latreille, 1798 – БГПЗ (Гридина, 2003)
9080. *Formica gagatoides* Ruzsky, 1904 – М.Иремель Блрц (Гридина, 1997)
9081. *Formica glauca* Ruzsky, 1895 – Бурз 2020 (Валуев, 2024в).
9082. *Formica imitans* Ruzsky, 1902 – ЗШТ (Гридина, 2003)
9083. *Formica lugubris* Zetterstedt, 1838 – Волосистый лесной муравей
9084. *Formica picea* Nylander, 1846 – Чёрный блестящий (болотный) муравей
9085. *Formica polyctena* Forster, 1850 – Малый лесной (голоспинный) муравей
9086. *Formica pratensis* Retzius, 1783 – Луговой муравей
9087. *Formica pressilabris* Nylander, 1846
9088. *Formica rufa* Linnaeus, 1761 – Рыжий лесной муравей
9089. *Formica rufibarbis* Fabricius, 1793 – Краснощекий муравей
9090. *Formica rufomaculata* Ruzsky, 1895 – БГПЗ (Гридина, 2003)
9091. *Formica sanguinea* Latreille, 1798 – Кровавый муравей-рабовладелец
9092. *Formica truncorum* Fabricius, 1804 – Ишмб 2019 (Валуев, 2019г)
9093. *Formica uralensis* Ruzsky, 1895 – Черноголовый муравей
9094. *Lasius alienus* (Foerster, 1850) – Бледноногий садовый муравей
9095. *Lasius citrinus* Emery, 1922
9096. *Lasius emarginatus* (Olivier, 1792) – Стерлитамак (Гридина, 2003)
9097. *Lasius flavus* (Fabricius, 1782) – Желтый земляной муравей
9098. *Lasius fuliginosus* (Latreille, 1798) – Пахучий муравей-древоточец
9099. *Lasius niger* (Linnaeus, 1758) – Черный садовый муравей

9100. *Lasius umbratus* (Nylander, 1946)
9101. *Polyergus rufescens* (Latreille, 1798) – Жёлтый муравей-амазонка

Подсемейство Myrmicinae

9102. *Formicoxenus nitidulus* (Nylander, 1846) – Блестящий муравей-малютка
9103. *Leptothorax acervorum* (Fabricius, 1793) – Подкорный муравей
9104. *Leptothorax muscorum* (Nylander, 1846)
9105. *Messor denticulatus* Santschi, 1927 – Мелз 2019
9106. *Messor muticus* (Nylander, 1849) – Уфа 2022
9107. *Messor structor* (Latreille, 1798) – Зерноядный муравей (Степной муравей-жнец)
9108. *Monomorium pharaonis* (Linnaeus, 1758) – Фараонов муравей (в помещениях)
9109. *Myrmica constricta* Karavajev, 1934 – Блрц 2020 (Валуев, 2024в).
9110. *Myrmica curvithorax* Bondroit, 1920 – Бурз 2020, Гфур 2020 (Валуев, 2021а)
9111. *Myrmica gallienii* Bondroit, 1920 – Шарн 2019, Уфмс 2019, Гафр 2020 (Валуев, 2021а)
9112. *Myrmica lobicornis* Nylander, 1846 – БГПЗ, ЗШТ, Иремель; Учлн (Гилёв, Тунёва, 2015)
9113. *Myrmica rubra* (Linnaeus, 1758) – Рыжая мирмика
9114. *Myrmica ruginodis* Nylander, 1846 – Морщинистая мирмика
9115. *Myrmica rugulosa* Nylander, 1849 – Ермк 2017 (Валуев, Крутилин, 2017)
9116. *Myrmica sabuleti* Meinert, 1861 – БГПЗ (Гридина, 2003)
9117. *Myrmica salina* Ruzsky, 1905 – Стерлитамак (Гридина, 2003)
9118. *Myrmica scabrinodis* Nylander, 1846 – Моховая мирмика
9119. *Myrmica schencki* Viereck, 1903
9120. *Stenamma debile* (Foerster, 1850) – Уфа 2023
9121. *Tetramorium caespitum* (Linnaeus, 1758) – Дерновой муравей
9122. *Temnothorax crassispinus* (Karavajev, 1926) – Уфа 2024
9123. *Temnothorax nassonovi* (Ruzsky, 1895) – Мияк 2023, Крмс 2023

Parasitica – Паразитические перепончатокрылые

Надсемейство Chalcidoidea

Семейство Chalcididae

9124. *Brachymeria minuta* (Linnaeus, 1767) – Мелз 2022
9125. *Brachymeria parvula* (Walker, 1834)
9126. *Brachymeria tibialis* (Walker, 1834)
9127. *Brachymeria tristis* Nikol'skaya, 1952 – Альш 1908 (Никольская, 1960)

Семейство Encyrtidae

9128. *Ageniaspis fuscicollis* (Dalman, 1820)
9129. *Ooencyrtus kuvanae* (Howard, 1910)
9130. *Ooencyrtus masii* (Mercet, 1921) – из кольчатого шелкопряда (Яфаева, Гирфанова, 1977).
9131. *Ooencyrtus neustriae* Mercet, 1925 – из кольчатого шелкопряда (Яфаева, Гирфанова, 1977).

9132. *Ooencyrtus pinicolus* (Matsumura, 1926)
9133. *Ooencyrtus tardus* (Ratzeburg, 1844)

Семейство Eulophidae

9134. *Euplectrus sp*. – Кмск 2025

Семейство Eupelmidae – Яйцееды

9135. *Anastatus bifasciatus* (Geoffroy, 1785) – паразит яиц непарного шелкопряда Нефтекамск
9136. *Anastatus japonicus* Ashmead, 1904
9137. *Eupelmus sp*. – Уфа 2021

Семейство Eurytomidae

9138. *Bruchophagus gibbus* (Boheman, 1836) – Клеверная толстоножка (Ганиев, Недорезков, 2008)
9139. *Bruchophagus roddi* Gussakovskiy, 1933 – Люцерновая толстоножка (Ганиев, Недорезков, 2008)
9140. *Eurytoma caraganae* Nikol'skaya, 1952 – Акациевый наездник
9141. *Eurytoma noxialis* (Portshinsky, 1881) – Хлебная толстоножка
9142. *Tetramesa sp*.

Семейство Mymaridae

9143. *Mymaridae gen.sp*.

Семейство Ormyridae

9144. *Ormyrus sp.* – Давл 2022

Семейство Perilampidae

9145. *Perilampus ruficornis* (Fabricius, 1793)

Семейство Pteromalidae

9146. *Cheiropachus quadrum* (Fabricius, 1787) – из *Hylesinus varius* – Уфа 1986; Уфмс 2006 (Герасимов, 2021б); Иглн 2025
9147. *Homoporus sp.* – Иглн 2025
9148. *Pteromalus puparum* (Linnaeus, 1758) – Куколочный птеромал

Семейство Torymidae

9149. *Megastigmus aculeatus* (Swederus, 1795) – Шиповниковый длиннохвостый семяед
9150. *Megastigmus rosae* Boucek, 1971 – Уфа 2024
9151. *Megastigmus strobilobius* Ratzeburg, 1848 – Еловый семяед
9152. *Megastigmus suspectus* Borries, 1895 – Пихтовый шишковый наездник
9153. *Monodontomerus sp*. – Кушн 2023, Шарн
9154. *Torymus aucupariae* (Rodzianko, 1908) – Рябиновый большой семяед
9155. *Torymus azureus* Boheman, 1834 – Уфа 2024
9156. *Torymus druparum* Boheman, 1834 – Яблоневый семяед – Уфа 2024

Семейство Trichogrammatidae

9157. *Trichogramma cacaeciae* Marchal, 1927
9158. *Trichogramma embryophagum* (Hartig, 1838)
9159. *Trichogramma euproctidis* (Girault, 1911)

9160. *Trichogramma evanescens* Westwood, 1833

Надсемейство Proctotrupoidea

Семейство Diapriidae

9161. *Basalys sp.* – Иглн 2025
9162. *Trichopria sp*. – Уфа 2022-2024, Мелз 2024

Семейство Heloridae

9163. *Helorus sp.* – Крмс 2021

Семейство Proctotrupidae

9164. *Proctotrupidae g.sp*.

Надсемейство Cynipoidea

Семейство Cynipidae – Орехотворки

9165. *Andricus curvator* Hartig, 1840 – Стягивающая орехотворка (дуб)
9166. *Andricus foecundatrix* (Hartig, 1840) – Шишковая орехотворка
9167. *Andricus testaceipes* Hartig, 1840 – Конусовидная орехотворка
9168. *Aulacidea hieracii* (Bouché, 1834) – Зилр 2023
9169. *Biorhiza pallida* (Olivier, 1791) – Корневая орехотворка
9170. *Cynips longiventris* Hartig, 1840 – Крмс 2021
9171. *Cynips quercusfolii* Linnaeus, 1758 – Дубовая орехотворки
9172. *Diastrophus rubi* (Bouché, 1834) – Малинная орехотворка
9173. *Diplolepis eglanteriae* (Hartig, 1840) – Октябрьский 2023
9174. *Diplolepis folii* (Linnaeus, 1758)
9175. *Diplolepis mayri* (Schlechtendal, 1877) – Орехотворка Майра
9176. *Diplolepis rosae* (Linnaeus, 1758) – Розанная орехотворка
9177. *Diplolepis spinosissimae* (Giraud, 1859) – Шиповатая орехотворка (шиповник)
9178. *Liposthenes glechomae* (Linnaeus, 1758) – Янул 2020, Ермк 2021, Мелз 2011-2022
9179. *Neuroterus anthracinus* (Curtis, 1838) – Уфа 2021
9180. *Neuroterus numismalis* (Fourcroy, 1785) – Нумизматическая орехотворка
9181. *Neuroterus quercusbaccarum* (Linnaeus, 1758) – Виноградообразная орехотворка
9182. *Neuroterus tricolor* (Hartig, 1841) – Уфа 2019
9183. *Panteliella fedtschenkoi* (Rubsaamen, 1896) – Ермк 2021
9184. *Pediaspis aceris* (Gmelin, 1790) – Кленовая орехотворка
9185. *Synergus umbraculus* (Olivier, 1791)
9186. *Xestophanes brevitarsis* (Thomson, 1877)

Надсемейство Ichneumonoidea

Семейство Braconidae – Наездники–бракониды

Подсемейство Agathidinae

9187. *Agathis anglica* Marshall, 1885 – РБ (Samartsev, 2019)
9188. *Vipio longicauda* (Boheman, 1853)

Подсемейство Aphidiinae

9189. *Aphidius colemani* Viereck, 1912 – Уфа 2023

Подсемейство Braconinae

9190. *Bracon atrator* Nees, 1834 – РБ (Samartsev, 2019)
9191. *Bracon biimpressus* Telenga, 1936 – РБ (Костромина, 2010)
9192. *Bracon exhilarator* Nees, 1834 – РБ (Samartsev, 2019)
9193. *Bracon fulvipes* Nees, 1834
9194. *Bracon intercessor* Nees, 1834 – обычен (Костромина, 2010)
9195. *Bracon pineti* Thomson, 1892 – обычен (Костромина, 2010)
9196. *Bracon subcylindricus* (Wesmael, 1838) – РБ (Samartsev, 2019)
9197. *Bracon urinator* (Fabricius, 1798) – обычен (Костромина, 2010)
9198. *Glyptomorpha discolor* (Thunberg, 1822) – Уфмс 2024
9199. *Habrobracon s*p. – Уфа 2019
9200. *Iphiaulax impostor* (Scopoli, 1763) – обычен (Костромина, 2010)
9201. *Iphiaulax mactator* (Klug, 1817) – Ермк

Подсемейство Cheloninae

9202. *Phanerotoma sp.* – Иглн 2025

Подсемейство Doryctinae

9203. *Heterospilus zaykovi* van Achterberg, 1992 – редкий (Костромина, 2010)
9204. *Doryctes leucogaster* (Nees, 1834) – обычен (Костромина, 2010)
9205. *Doryctes striatellus* (Nees, 1834) – обычен (Костромина, 2010)

Подсемейство Euphorinae

9206. *Meteorus pendulus* (Muller, 1776)
9207. *Meteorus pulchricornis* (Wesmael, 1835)
9208. *Meteorus versicolor* (Wesmael, 1835)
9209. *Zele deceptor* (Wesmael, 1835)

Подсемейство Helconinae

9210. *Diospilus melanoscelus* (Nees, 1834)

Подсемейство Hormiinae

9211. *Hormius moniliatus* (Nees, 1811) – обычен (Костромина, 2010)

Подсемейство Macrocentrinae

9212. *Macrocentrus sp.*

Подсемейство Microgastrinae

9213. *Apanteles melanoscelus* (Ratzeburg, 1844)
9214. *Choeras avus* (Tobias et Kotenko, 1984) – РБ (Аннотированный каталог…, 2012).
9215. *Cotesia cajae* (Nees, 1834)
9216. *Cotesia glomerata* (Linnaeus, 1758)
9217. *Cotesia melanoscela* (Ratzeburg, 1844)
9218. *Cotesia sericea* (Nees, 1834) – Нефтекамск
9219. *Cotesia sessilis* (Geoffroy, 1785)
9220. *Cotesia tibialis* (Curtis, 1830)
9221. *Diolcogaster hinzi* (Nixon, 1965) – РБ (Аннотированный каталог…, 2012).

9222. *Microgaster messoria* Haliday, 1834
9223. *Microplitis fulvicornis* (Wesmael, 1837) – РБ (Аннотированный каталог…, 2012).
9224. *Microplitis impressus* (Wesmael, 1837)
9225. *Microplitis tristis* (Nees, 1834) – РБ (Аннотированный каталог…, 2012).
9226. *Protapanteles callidus* (Haliday, 1834) – из кольчатого шелкопряда и медведицы кая (Яфаева, Гирфанова, 1977)
9227. *Protapanteles fulvipes* (Haliday, 1834)
9228. *Protapanteles inclusus* (Ratzeburg, 1844)
9229. *Protapanteles liparidis* (Bouché, 1834)
9230. *Sathon falcatus* (Nees, 1834) – Абзл 2018

Подсемейство Pambolinae

9231. *Dimeris mira* Ruthe, 1854 – редкий (Костромина, 2010)

Подсемейство Rhyssalinae

9232. *Oncophanes minutus* (Wesmael, 1838) – обычен (Костромина, 2010)

Подсемейство Rogadinae

9233. *Aleiodes bicolor* (Spinola, 1808) – обычен (Костромина, 2010)
9234. *Aleiodes circumscriptus* (Nees, 1834) – обычен (Костромина, 2010)

Семейство Gasteruptiidae

9235. *Gasteruption tournieri* Schletterer, 1885
9236. *Gasteruption sp.* – Иглн 2024

Семейство Ichneumonidae – Настоящие наездники

Подсемейство Acaenitinae

9237. *Acaenitus dubitator* (Panzer, 1800) – Нурм 2022 (Антропов, Валуев, 2022а), Уфа 2019,
9238. *Coleocentrus excitator* (Poda, 1761) – Белебей 2018

Подсемейство Alomyinae

9239. *Alomya debellator* (Fabricius, 1775)

Подсемейство Anomaloninae

9240. *Barylypa delictor* (Thunberg, 1824)
9241. *Therion circumflexum* (Linnaeus, 1758) – Согнутая серновка

Подсемейство Banchinae

9242. *Banchus falcatorius* Fabricius, 1775 – Банх
9243. *Exetastes sp.* – Блгщ 2019

Подсемейство Campopleginae

9244. *Campoletis agilis* (Holmgren, 1860)
9245. *Campoletis fuscipes* (Holmgren, 1856)
9246. *Campoplex difformis* (Gmelin, 1790)
9247. *Casinaria tenuiventris* (Gravenhorst, 1829)
9248. *Cymodusa sp.* – Уфа 2024
9249. *Diadegma armillatum* (Gravenhorst, 1829)
9250. *Diadegma chrysostictos* (Gmelin, 1790)

9251. *Dusona sp.*
9252. *Echthronomas tricincta* (Gravenhorst, 1829)
9253. *Eriborus braccatus* (Gmelin, 1790)
9254. *Hyposoter validus* (Pfankuch, 1921)
9255. *Sinophorus geniculatus* (Gravenhorst, 1829)

Подсемейство Cryptinae

9256. *Aritranis sp.* – Нурм 2023
9257. *Buathra laborator* (Thunberg, 1822)
9258. *Cryptus viduatorius* Fabricius, 1804
9259. *Echthrus reluctator* (Linnaeus, 1758) – Уфмс 2020
9260. *Gelis pulicarius* (Fabricius, 1793)
9261. *Latibulus argiolus* Rossi, 1790 – Уфмс 2022 (Антропов, Валуев, 2022а)
9262. *Oresbius subguttatus* (Gravenhorst, 1829) – Дюртюли 1993 год
9263. *Stenarella domator* (Poda, 1761) – Ермк 2015, Туйм 2017, Крск 2022, Блгв 2022

Подсемейство Ctenopelmatinae

9264. *Ctenopelma luciferum* (Gravenhorst, 1829) – из звездчатого пилильщика
9265. *Opheltes glaucopterus* (Linnaeus, 1758) – Офельт

Подсемейство Diplazontinae

9266. *Diplazon laetatorius* (Fabricius, 1781) – Уфа 2020-2024, Туйм 2024

Подсемейство Eucerotinae

9267. *Euceros albitarsus* Curtis, 1837 – Бурз 1899 (Каспарян, Толканиц, 1999)

Подсемейство Ichneumoninae

9268. *Amblyjoppa fuscipennis* (Wesmael, 1845) – Клтс 2018 (Валуев, 2019в)
9269. *Amblyteles armatorius* (Forster, 1771) – Стерлитамак
9270. *Callajoppa cirrogaster* (Schrank, 1781)
9271. *Ctenichneumon panzeri* (Wesmael, 1845)
9272. *Diphyus palliatorius* (Gravenhorst, 1829)
9273. *Diphyus trifasciatus* (Gravenhorst, 1829) – Уфа 2024
9274. *Dolichomitus sp.* – Клтс 2018 (Валуев, 2019в)
9275. *Eutanyacra crispatoria* (Linnaeus, 1758) – Уфа 2019
9276. *Eutanyacra picta* (Schrank, 1776)
9277. *Exephanes ischioxanthus* (Gravenhorst, 1829) – Слвт 2022
9278. *Habronyx gigas* Kriechbaumer, 1886
9279. *Herpestomus brunnicornis* (Gravenhorst, 1829)
9280. *Ichneumon deliatorius* Linnaeus, 1758 – Уфа 2024, Блрц 2024
9281. *Ichneumon extensorius* Linnaeus, 1758 – Наездник дневных бабочек
9282. *Ichneumon gracilentus* Wesmael, 1845
9283. *Ichneumon gracilicornis* Gravenhorst, 1829
9284. *Ichneumon intricator* Wesmael, 1855
9285. *Ichneumon primatorius* Forster, 1771 – Крск 2020
9286. *Ichneumon sarcitorius* Linnaeus, 1758

9287. *Ichneumon stramentor* Rasnitsyn, 1981 – Уфа 2024
9288. *Lymantrichneumon disparis* (Poda, 1761) – Уфа 2024
9289. *Protichneumon fusorius* (Linnaeus, 1761) – Бражниковый наездник
9290. *Protichneumon pisorius* (Linnaeus, 1758) – Ночницевый наездник
9291. *Stenichneumon culpator* (Schrank, 1802) – Уфмс 2024
9292. *Syspasis albiguttata* (Gravenhorst, 1820) – Стерлитамак
9293. *Syspasis lineator* (Fabricius, 1781)
9294. *Syspasis scutellator* (Gravenhorst, 1829)
9295. *Thyrateles camelinus* (Wesmael, 1845)
9296. *Trogus sp.*
9297. *Virgichneumon albosignatus* (Gravenhorst, 1829)
9298. *Virgichneumon faunus* (Gravenhorst, 1829)

Подсемейство Metopiinae

9299. *Metopius anxius* Wesmael, 1849

Подсемейство Ophioninae

9300. *Ophion luteus* (Linnaeus, 1758) – Офион желтый

Подсемейство Pimplinae

9301. *Apechthis capulifera* (Kriechbaumer, 1887)
9302. *Apechthis compunctor* (Linnaeus, 1758)
9303. *Ephialtes manifestator* (Linnaeus, 1758) – Эфиальт-обнаруживатель
9304. *Clistopyga sp.* – Иглн 2025
9305. *Gregopimpla inquisitor* (Scopoli, 1763)
? Iseropus stercorator (Fabricius, 1793)
9306. *Perithous divinator* (Rossi, 1790) – Наездник-предсказатель
9307. *Pimpla arctica* Zetterstedt, 1838 – Нефтекамск 2020
9308. *Pimpla insignatoria* (Gravenhorst, 1807)
9309. *Pimpla rufipes* Brulle, 1846
9310. *Pimpla spuria* Gravenhorst, 1829
9311. *Pimpla turionellae* (Linnaeus, 1758)
9312. *Theronia atalantae* (Poda, 1761)

Подсемейство Phygadeuontinae

9313. *Gelis melanocephalus* (Schrank, 1781) – Давл 2019
9314. *Mesoleptus sp*.– Крмск 2021

Подсемейство Rhyssinae

9315. *Megarhyssa perlata* (Christ, 1791) – Жемчужная мегарисса – Крдл 1972, Бурз 2007, Крмс 2016 (Герасимов, 2016), Учлн 2025
9316. *Rhyssa persuasoria* (Linnaeus, 1758) – Наездник Рисса

Подсемейство Tryphoninae

9317. *Cycasis rubiginosa* (Gravenhorst, 1829) – РБ (Каспарян, 1990)
9318. *Excavarus apiarius* (Gravenhorst, 1829) – Бурз 1899 (Каспарян, 1990)
9319. *Exyston sponsorius* (Fabricius, 1781) – РБ (Каспарян, 1990)
9320. *Netelia cristata* (Thomson, 1888) – РБ (Каспарян, 1990)

9321. *Netelia fuscicornis* (Holmgren, 1860)
9322. *Netelia melanura* (Thomson, 1888) – Уфмс
9323. *Netelia testacea* (Gravenhorst, 1829)
9324. *Phytodietus polyzonias* (Forster, 1771) – паразит лугового мотылька
9325. *Tryphon signator* Gravenhorst, 1829 – Трифон-отметчик

Надсемейство Orussoidea

Семейство Orussidae

9326. *Orussus abietinus* (Scopoli, 1763)

Надсемейство Platygastroidea

Семейство Scelionidae

9327. *Telenomus chloropus* (Thomson, 1861)
9328. *Telenomus laeviusculus* (Ratzeburg, 1844)
9329. *Telenomus terebrans* (Ratzeburg, 1844) – из кольчатого шелкопряда (Яфаева, Гирфанова, 1977)
9330. *Telenomus tetratomus* Kieffer, 1906
9331. *Trissolcus semistriatus* (Nees, 1834) – Полуштриховатый теленомус
9332. *Trissolcus vassilliewi* (Mayr, 1879) – Теленомус Васильева

Отряд Siphonaptera – Блохи

Семейство Ceratophyllidae

9333. *Citellophilus tesquorum* (Wagner, 1898) – паразит сусликов
9334. *Nosopsyllus fasciatus* (Bosc d'Antic, 1800) – паразит крыс

Семейство Ctenophthalmidae

9335. *Ctenophthalmus agyrtes* (Heller, 1896)
9336. *Palaeopsylla minor* (Dale, 1878)

Семейство Hystrichopsyllidae

9337. *Typhloceras poppei* Wagner, 1903

Семейство Ischnopsyllidae

9338. *Ischnopsyllus hexactenus* (Kolenati, 1856) – у бурого ушана, ночницы Брандта, усатой ночницы
9339. *Ischnopsyllus obscurus* (Wagner, 1989) – у северного кожанка

Семейство Leptopsyllidae

9340. *Leptopsylla segnis* (Schönherr, 1811)

Семейство Pulicidae

9341. *Ctenocephalides canis* (Curtis, 1826) – Собачья блоха
9342. *Ctenocephalides felis* (Bouché, 1835) – Кошачья блоха
9343. *Pulex irritans* Linnaeus, 1758 – Человеческая блоха
9344. *Spilopsyllus cuniculi* (Dale, 1878)
9345. *Xenopsylla cheopis* (Rothschild, 1903) – Крысиная блоха

Отряд Diptera – Двукрылые

Подотряд Nematocera – Длинноусые

Инфраотряд Tipulomorpha

Семейство Cylindrotomidae – Насечницы

9346. *Phalacrocera replicata* (Linnaeus, 1758)

Семейство Limoniidae – Болотницы, или луговики

9347. *Achyrolimonia decemmaculata* (Loew, 1873) – Уфа 2019
9348. *Chionea araneoides* Dalman, 1816 – Бескрылый комарик (на снегу)
9349. *Chionea lutescens* Lundstrom, 1907 – Зимний комарик (на снегу)
9350. *Dicranomyia sp.* – пещера Шульган-Таш, Иглн 2025 (Капралов, 2010)
9351. *Discobola annulata* (Linnaeus, 1758) – Иглн 2025
9352. *Eloeophila mundata* (Loew, 1871) – РБ (Przhiboro, 2017)
9353. *Limnophila schranki* Oosterbroek, 1992 – Блкт 2025
9354. *Limonia phragmitidis* (Schrank, 1781) – Уфа 2020, Давл 2020, Кгрч 2020
9355. *Limonia nigropunctata* (Schummel, 1829) – Мелз 2024
9356. *Metalimnobia quadrimaculata* (Linnaeus, 1760)
9357. *Metalimnobia quadrinotata* (Meigen, 1818) – Крск 2019
9358. *Rhipidia maculata* Meigen, 1818 – Уфа 2022, Иглн 2025
9359. *Symplecta sp.*

Семейство Pediciidae

9360. *Dicranota bimaculata* (Schummel, 1829)
9361. *Pedicia rivosa* (Linnaeus, 1758) – Блрц

Семейство Tipulidae – Долгоножки

9362. *Ctenophora fastuosa* Loew, 1871 – Уфа 2023
9363. *Ctenophora flaveolata* (Fabricius, 1794) – Уфа 2019-2024
9364. *Ctenophora guttata* Meigen & Wiedemann, 1818 – Уфа 2024, Нефтекамск 2021
9365. *Dictenidia bimaculata* (Linnaeus, 1761) – Уфа, запад, Кард, высокогорья
9366. *Dolichopeza sp.*
9367. *Nephrotoma cornicina* (Linnaeus, 1758) – высокогорья Южного Урала (Малоземов, 1990)
9368. *Nephrotoma crocata* (Linnaeus, 1758) – высокогорья Южного Урала, Бурз
9369. *Nephrotoma lunulicornis* (Schummel, 1833)
9370. *Nephrotoma parvirostra* Alexander, 1924 – Блрц
9371. *Nephrotoma pratensis* (Linnaeus, 1758) – высокогорья Южного Урала (Малоземов, 1990)
9372. *Nephrotoma rossica* (Riedel, 1910) – высокогорья Южного Урала (Малоземов, 1990)
9373. *Nephrotoma stackelbergi* (Savchenko, 1957) – высокогорья Южного Урала (Малоземов, 1990)
9374. *Nigrotipula nigra* (Linnaeus, 1758) – высокогорья Южного Урала; реки Узян, Нугуш
9375. *Prionocera pubescens* Loew, 1844 – Блрц
9376. *Prionocera subserricornis* (Zetterstedt, 1851) – высокогорья Южного Урала (Малоземов, 1990)
9377. *Tanyptera atrata* (Linnaeus, 1758) – высокогорья Южного Урала, Уфа, Уфмс, Блгщ, Кушн, Клтс, Крмс

9378. *Tanyptera nigricornis* (Meigen, 1818) – Блрц
9379. *Tipula affinis* Schummel, 1833 – высокогорья Южного Урала (Малоземов, 1990)
9380. *Tipula benesignata* Mannheims, 1954 – Блрц
9381. *Tipula caesia* Schummel, 1833 – высокогорья Южного Урала (Малоземов, 1990)
9382. *Tipula excisa* Schummel, 1833 – Блрц
9383. *Tipula fenestrella* Theowald, 1980 – высокогорья Южного Урала (Малоземов, 1990)
9384. *Tipula fulvipennis* De Geer, 1776 – Блрц
9385. *Tipula gimmerthali* Lackschewitz, 1925 – Блрц
9386. *Tipula irrorata* Macquart, 1826 – высокогорья Южного Урала (Малоземов, 1990)
9387. *Tipula kaisilai* Mannheims, 1954 – Блрц
9388. *Tipula laccata* Lundstrom & Frey, 1916 – высокогорья Южного Урала (Малоземов, 1990)
9389. *Tipula lateralis* Meigen, 1804 – высокогорья Южного Урала (Малоземов, 1990)
9390. *Tipula limbata* Zetterstadt, 1838 – Блрц
9391. *Tipula limitata* Schummel, 1833 – Блрц
9392. *Tipula lunata* Linnaeus, 1758 – высокогорья Южного Урала (Малоземов, 1990)
9393. *Tipula luridorostris* Schummel, 1833 – Блрц
9394. *Tipula montium* Egger, 1863 – высокогорья Южного Урала (Малоземов, 1990)
9395. *Tipula mutila* Wahlgren, 1905 – Блрц
9396. *Tipula nubeculosa* Meigen, 1804 – высокогорья Южного Урала (Малоземов, 1990)
9397. *Tipula paludosa* Meigen, 1830 – Огородная долгоножка
9398. *Tipula pseudovariipennis* Czizek, 1912 – Блрц
9399. *Tipula scripta* Meigen, 1830 – Блрц
9400. *Tipula subcunctans* Alexander, 1921 – высокогорья Южного Урала (Малоземов, 1990) (Малоземов, 1990)
9401. *Tipula subexcisa* Lundstrom, 1907 – Блрц
9402. *Tipula subnodicornis* Zetterstedt, 1838 – Блрц
9403. *Tipula trispinosa* Lundstrom, 1907 – Блрц
9404. *Tipula tristriata* Lundstrom, 1915 – высокогорья Южного Урала (Малоземов, 1990)
9405. *Tipula truncorum* Meigen, 1830 – высокогорья Южного Урала (Малоземов, 1990)
9406. *Tipula unca* Wiedemann, 1817 – Блрц
9407. *Tipula variicornis* Schummel, 1833 – Блрц

9408. *Tipula varipennis* Meigen, 1818 – высокогорья Южного Урала (Малоземов, 1990)
9409. *Tipula vernalis* Meigen, 1804 – Уфа 2024
9410. *Tipula wahlgreni* Lackshewitz, 1925 – Блрц
9411. *Tipula winthemi* Lackshewitz, 1932 – Блрц

Инфраотряд Psychodomorpha

Семейство Anisopodidae

9412. *Sylvicola punctatus* (Fabricius, 1787) – Блгщ 2023

Семейство Psychodidae – Бабочницы

9413. *Clogmia albipunctata* (Williston, 1893) – повсеместно
9414. *Pericoma sp.*
9415. *Phlebotomus papatasi* (Scopoli, 1786)
9416. *Psychoda alternata* Say, 1824 – Бурз 2023
9417. *Psychoda phalaenoides* Linnaeus, 1758

Семейство Trichoceridae – Зимние комары

9418. *Trichocera annulata* Meigen, 1818
9419. *Trichocera hiemalis* (De Geer, 1776) – Пещерный комар

Инфраотряд Ptychopteromorpha

Семейство Ptychopteridae

9420. *Ptychoptera sp.*

Инфраотряд Culicomorpha

Семейство Ceratopogonidae – Мокрецы

9421. *Atrichopogon sp.*
9422. *Culicoides obsoletus* (Meigen, 1818)
9423. *Culicoides festivipenis* Kieffer, 1914
9424. *Culicoides nubeculosus* (Meigen, 1830)
9425. *Culicoides pallidicornis* Kieffer, 1919
9426. *Culicoides pictipennis* (Staeger, 1839)
9427. *Culicoides pulicaris* (Linnaeus, 1758) – Жгучий мокрец
9428. *Culicoides riethi* Kieffer, 1914
9429. *Culicoides simulator* Edwards, 1939
9430. *Culicoides subfasciipennis* Kieffer, 1919
9431. *Leptoconops borealis* Gutsevich, 1945
9432. *Sphaeromias sp.*

Семейство Chaoboridae – Хаоборид

9433. *Chaoborus crystallinus* (De Geer, 1776) – Перистоусый комар
9434. *Chaoborus flavicans* (Meigen, 1830)
9435. *Mochlonyx velutinus* (Ruthe, 1831) – Комаровидный комарик

Семейство Chironomidae – Хирономиды (комары-звонцы)

Подсемейство Chironominae

Триба Chironomini

9436. *Beckidia zabolotzkyi* (Goetghebuer, 1938)

9437. *Chernovskiia orbicus* (Townes, 1945)
9438. *Chironomus agilis* Shobanov et Dyomin, 1988 – р. Белая (Андреевка), 2008 (Зеленцов и др., 2015).
9439. *Chironomus annularius* Kieffer, 1926
9440. *Chironomus anthracinus* Zetterstedt, 1860
9441. *Chironomus aprilinus* Meigen, 1830
9442. *Chironomus cingulatus* Meigen, 1830 – Кигн р. Киги, 2009 (Зеленцов и др., 2015).
9443. *Chironomus dorsalis* Meigen, 1818
9444. *Chironomus entis* Shobanov, 1989
9445. *Chironomus heterodentatus* Konstantinov, 1956
9446. *Chironomus muratensis* Ryser & Scholl, 1983
9447. *Chironomus nigrocaudata* Erbaeva, 1968
9448. *Chironomus nudiventris* Ryser & Scholl, 1983
9449. *Chironomus obtusidens* Goetghebuer, 1921
9450. *Chironomus pallidivittatus* Edwards, 1929
9451. *Chironomus plumosus* (Linnaeus, 1758)
9452. *Chironomus riparius* Meigen, 1804
9453. *Chironomus salinarius* Kieffer, 1915
9454. *Chironomus solitus* Linevich, 1971
9455. *Chironomus tentans* Fabricius, 1805
9456. *Cladopelma fridmanae* (Chernovskij, 1949)
9457. *Cladopelma virescens* (Meigen, 1818)
9458. *Cladopelma viridulum* (Linnaeus, 1767)
9459. *Cladotanytarsus lepidocalcar* Krueger, 1938 – Брск, оз. Монастырское, 2008 (Зеленцов и др., 2015).
9460. *Cryptochironomus crassiforceps* Goetghebuer, 1931 – Блвщ, р. Белая, 2008 (Зеленцов и др., 2015).
9461. *Cryptochironomus defectus* (Kieffer, 1913)
9462. *Cryptochironomus dneprinus* Pankratova, 1964
9463. *Cryptochironomus obreptans* (Walker, 1856)
9464. *Cryptochironomus redekei* (Kruseman, 1933)
9465. *Cryptochironomus rostratus* Kieffer, 1921 – Блрц р.Арша 2009; Кушн р. Белая 2008; Нурм р. Уфа 2008 (Зеленцов и др., 2015).
9466. *Cryptochironomus supplicans* (Meigen, 1830)
9467. *Cryptochironomus ussouriensis* (Goetghebuer, 1933)
9468. *Cryptotendipes nigronitens* (Edwards, 1929)
9469. *Cryptotendipes usmaensis* (Pagast, 1931) – Гафр оз. Белое 2008 (Зеленцов и др., 2015).
9470. *Demeijerea rufipes* (Linnaeus, 1761) – Уфа 2022
9471. *Demicryptochironomus vulneratus* (Zetterstedt, 1838)
9472. *Dicrotendipes lobiger* Kieffer, 1921
9473. *Dicrotendipes nervosus* Staeger, 1939

9474. *Dicrotendipes tritomus* (Thienemann & Kieffer, 1916)
9475. *Einfeldia carbonaria* (Meigen, 1804)
9476. *Einfeldia longipes* (Staeger, 1839) – оз. Атес-Куль
9477. *Einfeldia pagana* (Meigen, 1838)
9478. *Endochironomus albipennis* (Meigen, 1830)
9479. *Endochironomus impar* (Walker, 1856)
9480. *Endochironomus tendens* (Fabricius, 1775)
9481. *Fleuria lacustris* Kieffer, 1924
9482. *Glyptotendipes barbipes* (Staeger, 1839)
9483. *Glyptotendipes glaucus* (Meigen, 1818)
9484. *Glyptotendipes gripekoveni* (Kieffer, 1913) – оз. Толкас, Ускуль, Сакмарское вдхр. (Зеленцов и др., 2014).
9485. *Glyptotendipes imbecilis* Walker, 1856
9486. *Glyptotendipes pallens* (Meigen, 1804)
9487. *Glyptotendipes paripes* (Edwards, 1929)
9488. *Harnischia burganadzae* (Chernovsky, 1949)
9489. *Harnischia curtilamellata* (Malloch, 1915)
9490. *Harnischia fuscimanus* Kieffer, 1921
9491. *Kloosia pusillus* (Linnaeus, 1767)
9492. *Lauterborniella agrayloides* (Kieffer, 1911)
9493. *Lipiniella araenicola* Shilova, 1961
9494. *Lipiniella moderata* Kalugina, 1970
9495. *Microchironomus deribae* (Freeman, 1957)
9496. *Microchironomus tener* (Kieffer, 1918)
9497. *Micropsectra atrofasciata* (Kieffer, 1911) – Гафр д. Ташла и р.Усолка, 2009 (Зеленцов и др., 2015), Сакмарское вдхр. (Зеленцов и др., 2014).
9498. *Microtendipes chloris* (Meigen, 1818)
9499. *Microtendipes pedellus* (De Geer, 1776)
9500. *Microtendipes tarsalis* (Walker, 1856)
9501. *Parachironomus arcuatus* (Goetghebuer, 1919) – Кушн р. Белая, 2008 (Зеленцов и др., 2015), Байм оз. Толкас 2009; оз. Атес-Куль 2009, Хайб, Учлн
9502. *Parachironomus biannulatus* (Staeger, 1839)
9503. *Parachironomus gracilior* (Keiffer, 1918)
9504. *Parachironomus kuzini* Shilova, 1969
9505. *Parachironomus monochromus* (Wulp, 1858)
9506. *Parachironomus pararostratus* (Harnisch, 1923)
9507. *Parachironomus varus* (Goetghebuer, 1921)
9508. *Parachironomus vitiosus* (Goetghebuer, 1921)
9509. *Paracladopelma camptolabis* (Kieffer, 1913)
9510. *Paracladopelma rolli* (Chernovsky, 1949)
9511. *Paralauterborniella nigrohalterale* (Malloch, 1915)
9512. *Paratendipes albimanus* (Meigen, 1804)
9513. *Paratendipes nudisquama* (Edward, 1929)

9514. *Phaenopsectra flavipes* (Meigen, 1818)
9515. *Polypedilum bicrenatum* Kieffer, 1921
9516. *Polypedilum convictum* (Walker, 1856)
9517. *Polypedilum cultellatum* Goetghebuer, 1931 – река Белая
9518. *Polypedilum exsectum* (Kieffer, 1916)
9519. *Polypedilum laetum* (Meigen, 1818) – Нурм р. Уфа, 2008 (Зеленцов и др., 2015).
9520. *Polypedilum nubeculosum* (Meigen, 1804)
9521. *Polypedilum nubifer* (Skuse, 1889)
9522. *Polypedilum pedestre* (Meigen, 1830)
9523. *Polypedilum scalaenum* (Schrank, 1803)
9524. *Polypedilum sordens* (van der Wulp, 1875)
9525. *Polypedilum tatracrenatum* Hirvenoja, 1962
9526. *Pseudochironomus prasinatus* (Staeger, 1839)
9527. *Rheotanytarsus curtistylus* (Goetghebuer, 1921) – Кушн р. Белая 2008, Нурм 2008, Кигн р. Киги 2009, Блрц р. Большая Саргая 2009, Гафр р.Усолка 2009 (Зеленцов и др., 2015).
9528. *Robackia demeijerei* (Kruseman, 1933)
9529. *Sergentia coracina* (Zetterstedt, 1850)
9530. *Sergentia prima* Proviz & Proviz, 1997
9531. *Stenochironomus gibbus* (Fabricius, 1794)
9532. *Stictochironomus crassiforceps* (Kieffer, 1921)
9533. *Stictochironomus pictulus* (Meigen, 1830)
9534. *Stictochironomus psammophilus* Chernovskij, 1949
9535. *Stictochironomus sticticus* (Fabricius, 1781)
9536. *Synendotendipes luridus* Meigen, 1830
9537. *Tanytarsus brundini* Lindeberg, 1963 – Кушн р. Белая 2008; Ишмб р. Б. Шишеняк 2009 (Зеленцов и др., 2015).
9538. *Tanytarsus buchonius* Reiss, 1971 – Блрц 2009 (Зеленцов и др., 2015).
9539. *Tanytarsus eminulus* (Walker, 1856) – Кушн р. Белая 2008 (Зеленцов и др., 2015).
9540. *Tanytarsus heusdensis* Goetghebuer, 1923 – Ишмб 2009 (Зеленцов и др., 2015).

Триба Pseudochironomini

9541. *Pseudochironomus prasinatus* (Staeger, 1839)

Триба Tanytarsini

9542. *Constempellina brevicosta* (Edwards, 1937)
9543. *Cladotanytarsus atridorsum* Kieffer, 1924
9544. *Cladotanytarsus bicornutus* (Kieffer, 1922) – Сакмарское вдхр. (Зеленцов и др., 2014).
9545. *Cladotanytarsus mancus* (Walker, 1856)
9546. *Cladotanytarsus sexdentatus* (Chernovsky, 1949)
9547. *Cladotanytarsus vanderwulpi* (Edwards, 1929)
9548. *Corynocera ambigua* Zetterstedt, 1838

9549. *Micropsectra apposita* (Walker, 1856)
9550. *Micropsectra curvicornis* Chernovskij, 1949
9551. *Micropsectra junci* (Meigen, 1818)
9552. *Micropsectra pallidula* (Meigen, 1830)
9553. *Micropsectra radialis* Goetghebuer, 1939
9554. *Micropsectra recurvata* Goetghebuer, 1928
9555. *Micropsectra viridscutellata* Goetghebuer, 1931 – р. Белая
9556. *Paratanytarsus austriacus* (Kieffer, 1924)
9557. *Paratanytarsus confusus* Palmén, 1960 – р. Белая
9558. *Paratanytarsus dimorphis* Reiss, 1965
9559. *Paratanytarsus inopertus* (Walker, 1856)
9560. *Paratanytarsus lauterborni* (Kieffer, 1909)
9561. *Rheotanytarsus exiguus* (Johannsen, 1905)
9562. *Rheotanytarsus muscicola* Thienemann, 1929 – Сакмарское вдхр. (Зеленцов и др., 2014).
9563. *Rheotanytarsus photophilus* (Goetghebuer, 1921)
9564. *Stempellina bausei* (Kieffer, 1911)
9565. *Stempellinella edwardsi* Spies & Saether, 2004
9566. *Tanytarsus aberrans* Lindeberg, 1970 – Павловское вдхр. (Зеленцов и др., 2014).
9567. *Tanytarsus arduennensis* Goetghebuer, 1922
9568. *Tanytarsus bathophilus* Kieffer, 1911
9569. *Tanytarsus dissimilis* Johannsen, 1905
9570. *Tanytarsus excavatus* Edwards, 1929
9571. *Tanytarsus glabrescens* Edwards, 1929
9572. *Tanytarsus gregarius* Kieffer, 1909
9573. *Tanytarsus lactescens* Edwards, 1929
9574. *Tanytarsus lestagei* Goetghebuer, 1922
9575. *Tanytarsus medius* Reiss, 1971
9576. *Tanytarsus mendax* Kieffer, 1925 – Верхне-Иремельское вдхр. (Зеленцов и др., 2014).
9577. *Tanytarsus occultus* Brundin, 1949
9578. *Tanytarsus pallidicornis* (Walker, 1856)
9579. *Tanytarsus usmaensis* Pagast, 1931
9580. *Tanytarsus verralli* Goetghebuer, 1928

Подсемейство Diamesinae

9581. *Diamesa carpatica* (Botnariuc & Cindea-Cure, 1954)
9582. *Diamesa insignipes* Kieffer, 1908
9583. *Potthastia gaedii* (Meigen, 1838)
9584. *Potthastia longimanus* Kieffer, 1922
9585. *Pseudodiamesa arctica* (Malloch, 1919)
9586. *Pseudodiamesa branickii* (Nowicki, 1873)
9587. *Pseudodiamesa nivosa* (Goetghebuer, 1928)

9588. *Sympotthastia zavreli* Pagast, 1947

Подсемейство Orthocladiinae

9589. *Acricotopus dilatatus* (Zetterstedt, 1850)
9590. *Acricotopus lucens* (Zetterstedt, 1850)
9591. *Brillia bifida* (Kieffer, 1909)
9592. *Brillia flavifrons* (Johannsen, 1905)
9593. *Brillia longifurca* Kieffer, 1921
9594. *Bryophaenocladius scanicus* (Brundin, 1947)
9595. *Bryophaenocladius xanthogyne* (Edwards, 1929) – Блрц, р. Белая, 2009 (Зеленцов и др., 2015).
9596. *Corynoneura celeripes* Winnertz, 1852
9597. *Corynoneura celtica* Edwards, 1924
9598. *Corynoneura scutellata* Winnertz, 1846
9599. *Cricotopus algarum* (Kieffer, 1911)
9600. *Cricotopus annulator* Goetghebuer, 1927
9601. *Cricotopus arcuatus* Hirvenoja, 1973
9602. *Cricotopus bicinctus* (Meigen, 1818)
9603. *Cricotopus brevipalpis* Kieffer, 1909
9604. *Cricotopus curtus* Hirvenoja, 1973
9605. *Cricotopus cylindraceus* (Kieffer, 1908) – Кушн, р. Белая, 2008 (Зеленцов и др., 2015).
9606. *Cricotopus flavocinctus* (Kieffer, 1924)
9607. *Cricotopus fuscus* (Kieffer, 1909)
9608. *Cricotopus intersectus* (Staeger, 1939)
9609. *Cricotopus latidentatus* Chernovskij, 1949
9610. *Cricotopus obtusus* Hirvenoja, 1973
9611. *Cricotopus perniger* (Zetterstedt, 1850)
9612. *Cricotopus pilitarsis* (Zetterstedt, 1850) – Бурз, с. Байназарово, р. Белая, 2009 (Зеленцов и др., 2015).
9613. *Cricotopus rufiventris* (Meigen, 1830) – Блрц, р. Большая Саргая, 2009 (Зеленцов и др., 2015).
9614. *Cricotopus sylvestris* (Fabricius, 1794)
9615. *Cricotopus tibialis* (Meigen, 1804)
9616. *Cricotopus tremulus* (Linnaeus, 1758)
9617. *Cricotopus triannulatus* (Macquart, 1826)
9618. *Cricotopus trifascia* Edwards, 1929
9619. *Diplocladius cultriger* Kieffer, 1908
9620. *Epoicocladius flavens* (Malloch, 1915)
9621. *Eukiefferiella alpestris* Goetghebuer, 1941
9622. *Eukiefferiella atrofasciata* Goetghebuer, 1934
9623. *Eukiefferiella claripennis* (Lundbeck, 1898)
9624. *Eukiefferiella clypeata* (Kieffer, 1923)
9625. *Eukiefferiella cyanea* Thienemann, 1936

9626. *Eukiefferiella devonica* (Edwards, 1929)
9627. *Eukiefferiella gracei* (Edwards, 1929)
9628. *Eukiefferiella longipes* Chernovsky, 1949
9629. *Eukiefferiella similis* Goetghebuer, 1939
9630. *Eukiefferiella tirolensis* Goetghebuer, 1938
9631. *Eurycnemus crassipes* (Meigen, 1809) – Кушн, р. Белая, 2008; Нурм, р. Уфа, 2008 (Зеленцов и др., 2015).
9632. *Hydrobaenus lapponicus* (Brundin, 1956)
9633. *Limnophyes asquamatus* Andersen, 1937
9634. *Limnophyes eltoni* (Edwards, 1922) – Блрц, руч. Черный, 2009 (Зеленцов и др., 2015).
9635. *Limnophyes habilis* (Walker, 1856) – Блрц, р. Белая, 2009 (Зеленцов и др., 2015).
9636. *Limnophyes minimus* (Meigen, 1818)
9637. *Limnophyes prolongatus* (Kieffer, 1921)
9638. *Limnophyes torulus* Saether, 1990 – Блрц, руч. Черный, 2009 (Зеленцов и др., 2015).
9639. *Limnophyes transcaucasicus* Tschernovskij, 1949
9640. *Nanocladius dichromus* (Kieffer, 1906)
9641. *Orthocladius consobrinus* (Holmgren, 1869)
9642. *Orthocladius oblidens* (Walker, 1856)
9643. *Orthocladius obumbratus* Johannsen, 1905 – Нурм р. Уфа, 2008 (Зеленцов и др., 2015).
9644. *Orthocladius rivicola* Kieffer, 1911
9645. *Orthocladius rivulorum* Kieffer, 1909
9646. *Orthocladius rubicundus* (Meigen, 1818)
9647. *Orthocladius thienemanni* Kieffer & Thienemann, 1906
9648. *Paracladius alpicola* (Zetterstedt, 1850) – Блрц руч. Черный 2009; Блрц р.Арша, 2009 (Зеленцов и др., 2015).
9649. *Paracladius conversus* (Walker, 1856) – Кигн р. Киги, 2009 (Зеленцов и др., 2015).
9650. *Parakiefferiella bathophila* (Kieffer, 1912)
9651. *Parakiefferiella triquetra* (Pankratova, 1970)
9652. *Parametriocnemus stylatus* (Spaerck, 1923)
9653. *Paratrichocladius inaequalis* Kieffer, 1926
9654. *Parorthocladius tridentifer* Makarchenko, 1977 – река Белая
9655. *Psectrocladius barbimanus* (Edwards, 1929)
9656. *Psectrocladius delatoris* Zelentsov, 1980
9657. *Psectrocladius fabricus* Zelentsov, 1980
9658. *Psectrocladius limbatellus* (Holmgren, 1869)
9659. *Psectrocladius psilopterus* (Kieffer & Thienemann, 1906)
9660. *Psectrocladius simulans* (Johannsen, 1937)
9661. *Psectrocladius sordidellus* (Zetterstedt, 1838)

9662. *Psectrocladius ventricosus* Kieffer, 1925
9663. *Pseudorthocladius curtistylus* Goetghebuer, 1921
9664. *Pseudosmittia danconai* (Marcuzzi, 1947) – Блрц, р.Арша, 2009 (Зеленцов и др., 2015).
9665. *Pseudosmittia nanseni* (Kieffer, 1926) – Блрц, р.Арша, 2009 (Зеленцов и др., 2015).
9666. *Pseudosmittia oxoniana* (Edwards, 1922) – оз. Балыклы-Куль
9667. *Pseudosmittia smolandica* Brundin, 1947
9668. *Pseudosmittia trilobata* (Edwards, 1929) – Блрц, руч. Черный, 2009 (Зеленцов и др., 2015).
9669. *Rheocricotopus chalybeatus* (Edwards, 1929)
9670. *Rheocricotopus effusus* (Walker, 1856)
9671. *Smittia edwardsi* Goetghebuer, 1932
9672. *Smittia extrema* (Holmgren, 1869) – Блрц, руч. Черный, 2009 (Зеленцов и др., 2015).
9673. *Smittia leucopogon* (Meigen, 1804)
9674. *Smittia nudipennis* (Goetghebuer, 1913) – Блрц, р.Арша, 2009 (Зеленцов и др., 2015).
9675. *Synorthocladius semivirens* (Kieffer, 1909)
9676. *Thienemanniella acuticornis* (Kieffer, 1912)
9677. *Thienemanniella clavicornis* (Kieffer, 1911)
9678. *Trissocladius fontinalis* (Chernovskij, 1949)
9679. *Tvetenia bavarica* (Goetghebuer, 1934)
9680. *Tvetenia calvescens* (Edwards, 1929) – Кушн, р. Белая, 2008 (Зеленцов и др., 2015).
9681. *Tvetenia discoloripes* (Goetghebuer & Thienemann, 1936)
9682. *Tvetenia tshernovskii* (Pankratova, 1968)
9683. *Zalutschia mucronata* (Brundin, 1949)

Подсемейство Prodiamesinae

9684. *Monodiamesa bathyphila* (Kieffer, 1918)
9685. *Odontomesa fulva* (Kieffer, 1919)
9686. *Prodiamesa olivacea* (Meigen, 1818)

Подсемейство Tanypodinae

9687. *Ablabesmyia longistyla* Fittkau, 1962
9688. *Ablabesmyia monilis* (Linnaeus, 1758)
9689. *Ablabesmyia phatta* (Egger, 1864)
9690. *Anatopynia plumipes* (Fries, 1823)
9691. *Apsectrotanypus trifascipennis* (Zetterstedt, 1838)
9692. *Clinotanypus nervosus* (Meigen, 1818)
9693. *Conchapelopia sp.*
9694. *Labrundinia longipalpis* (Goetghebuer, 1921) – оз. Атес-Куль
9695. *Larsia atrocincta* (Goetghebuer, 1942)
9696. *Larsia curticalcar* (Kieffer, 1918)

9697. *Macropelopia nebulosa* (Meigen, 1804)
9698. *Monopelopia tenuicalcar* (Kieffer, 1918)
9699. *Natarsia punctata* (Meigen, 1804)
9700. *Nilotanypus dubius* (Meigen, 1804)
9701. *Procladius choreus* (Meigen, 1804)
9702. *Procladius culiciformis* (Linnaeus, 1767)
9703. *Procladius ferrugineus* (Kieffer, 1918)
9704. *Procladius imicola* Kieffer, 1922
9705. *Procladius signatus* (Zetterstedt, 1850)
9706. *Psectrotanypus varius* (Fabricius, 1787)
9707. *Tanypus kraatzi* (Kieffer, 1912)
9708. *Tanypus punctipennis* Meigen, 1818
9709. *Tanypus vilipennis* (Kieffer, 1918)
9710. *Telmatopelopia nemorum* (Goetghebuer, 1921)
9711. *Thienemannimyia geijskesi* (Goetghebuer, 1934)
9712. *Thienemannimyia lentiginosa* (Fries, 1823)
9713. *Trissopelopia flavida* Kieffer, 1923
9714. *Trissopelopia longimanus* (Staeger, 1839) – река Белая
9715. *Zavrelimyia melanura* (Meigen, 1804)

Семейство Culicidae – Настоящие комары

Подсемейство Anophelinae

9716. *Anopheles claviger* (Meigen, 1804) – Малярийный родниковый, или лесной комар
9717. *Anopheles maculipennis* Meigen, 1818 – Малярийный комар
9718. *Anopheles messeae* Falleroni, 1926

Подсемейство Culicinae

9719. *Aedes annulipes* (Meigen, 1830) – Кольчатый кусака
9720. *Aedes cantans* (Meigen,1818) – Поющий кусака
9721. *Aedes cataphylla* Dyar, 1916 – Покорный кусака
9722. *Aedes cinereus* Meigen, 1818 – Серый кусака
9723. *Aedes communis* (De Geer, 1776) – Двуполосый кусака
9724. *Aedes cyprius* Ludlow, 1920 – Кипрский кусака
9725. *Aedes diantaeus* Howard, Dyar & Knab, 1913
9726. *Aedes dorsalis* (Meigen, 1830) – Пятнистоспинный кусака
9727. *Aedes esoensis* Yamada, 1921
9728. *Aedes euedes* Howard, Dyar & Knab, 1913
9729. *Aedes excrucians* (Walker, 1856) – Кусака-мучитель
9730. *Aedes flavescens* (Muller, 1764) – Блестящий кусака – Уфа 2022
9731. *Aedes geniculatus* (Olivier, 1791)
9732. *Aedes hexodontus* Dyar, 1916 – Шестизубый кусака
9733. *Aedes intrudens* Dyar, 1919 – Навязчивый кусака
9734. *Aedes leucomelas* (Meigen, 1804)
9735. *Aedes nigrinus* (Eckstein, 1918)

9736. *Aedes pionips* (Dyar, 1919) – Карающий кусака
9737. *Aedes pullatus* (Coquiliett, 1904)
9738. *Aedes punctor* (Kirby, 1837) – Колющий кусака
9739. *Aedes riparius* Dyar & Knab, 1907 – Береговой кусака
9740. *Aedes rusticus* (Rossi, 1790)
9741. *Aedes sticticus* (Meigen, 1835)
9742. *Aedes vexans* (Meigen, 1830) – Кусака мучитель
9743. *Coquillettidia richiardii* (Ficalbi, 1889)
9744. *Culex modestus* Ficalbi, 1947 – Скромный комар
9745. *Culex pipiens* Linnaeus, 1758 – Обыкновенный (=писклявый*)* комар
9746. *Culex pusillus* Macquart, 1850
9747. *Culex territans* Walker, 1856
9748. *Culex torrentium* Martini, 1925
9749. *Culiseta alaskaensis* (Ludlow, 1906) – Аляскинская кулизета
9750. *Culiseta bergrothi* (Edwards, 1921)
9751. *Culiseta longiareolata* (Macquart, 1838)
9752. *Culiseta morsitans* (Theobald, 1901)
9753. *Culiseta ochroptera* (Peus, 1935)

Семейство Dixidae – Земноводные комары

9754. *Dixa maculata* Meigen, 1818
9755. *Dixella amphibia* (De Geer, 1776) – Земноводный комар

Семейство Simuliidae – Мошки

9756. *Cnephia intermedia* Rubtsov, 1956
9757. *Metacnephia lyra* (Lundstrom, 1911)
? *Simulium angustipes* Edwards, 1915
9758. *Simulium aureum* Fries, 1824
9759. *Simulium costatum* Friederichs, 1920
9760. *Simulium equinum* (Linnaeus, 1758)
9761. *Simulium erythrocephalum* (De Geer, 1776) **–** Красноголовая мошка
9762. *Simulium latipes* (Meigen, 1804)
9763. *Simulium longipalpe* Beltyukova, 1955
9764. *Simulium maculatum* (Meigen, 1804)
9765. *Simulium morsitans* Edwards, 1915
9766. *Simulium ornatum* Meigen, 1818
9767. *Simulium paramorsitans* Rubtsov, 1956
9768. *Simulium promorsitans* Rubtsov, 1956
9769. *Simulium reptans* (Linnaeus, 1758)
9770. *Simulium variegatum* Meigen, 1818
9771. *Stegopterna duodecimata* (Rubtsov, 1940) – Хайб р. Азям
? *Wilhelmia tertia* (Baranov, 1926)

Инфраотряд Bibionomorpha

Семейство Bibionidae

9772. *Bibio clavipes* Meigen, 1818 – Иглн 2025

9773. *Bibio hortulanus* (Linnaeus, 1758) – Белебей 2020
9774. *Bibio marci* (Linnaeus, 1758) – вся территория РБ.
9775. *Bibio pomonae* (Fabricius, 1775) – Агидель

Семейство Bolitophilidae

9776. *Bolitophila sp.* – пещера Шульган-Таш (Капралов, 2010)

Семейство Cecidomyiidae – Галлицы

9777. *Asphondylia cytisi* Frauenfeld, 1873 – Ракитниковая галлица
9778. *Atrichosema aceris* Kieffer, 1904 – Кленовая черешковая галлица
9779. *Contarinia floriperda* Rubsaamen, 1917 – Рябиновая цветочная галлица
9780. *Contarinia medicaginis* Kieffer, 1895 – Люцерновая цветочная галлица
9781. *Contarinia petioli* (Kieffer, 1898) – Осиновая черешковая галлица
9782. *Contarinia pisi* (Winnertz, 1854) – Гороховая галлица
9783. *Contarinia tiliarum* (Kieffer, 1890) – Липовая галлица
9784. *Contarinia tritici* (Kirby, 1798) – Желтый пшеничный комарик
9785. *Cystiphora sonchi* (Bremi, 1847) – Уфа 2021
9786. *Cystiphora taraxaci* (Kieffer, 1888) – Уфа 2019
9787. *Dasineura mali* (Kieffer, 1904) – Яблоковая галлица
9788. *Dasineura napi* (Loew, 1850) – Рапсовый комарик
9789. *Dasineura tiliae* (Schrank, 1803) – Ишмб 2020
9790. *Dasineura tortilis* (Bremi, 1847) – Ольховая галлица
9791. *Dasineura urticae* (Perris, 1840) – Уфа 2024, Ишмб 2024
9792. *Didymomyia tiliacea* (Bremi, 1847) – Блвщ 2023
9793. *Harmandiola cavernosa* (Rubsaamen, 1899) – Осиновая двусторонняя галлица
9794. *Harmandiola globuli* (Rubsaamen, 1889) – Осиновая шарообразующая галлица
9795. *Harmandiola tremulae* (Winnertz, 1853) – Осиновая красная галлица
9796. *Hybolasioptera fasciata* (Kieffer, 1904) – Ржаной стеблевой комарик
9797. *Iteomyia capreae* (Winnertz, 1853) – Ивовая галлица
9798. *Janetiella lemeei* (Kieffer, 1904) – Вязовая галлица
9799. *Kaltenbachiola strobi* (Winnertz, 1853) – Шишковая еловая галлица
9800. *Lasioptera artemisiae* Dombrovskaya, 1940 – Уфмс 2019
9801. *Lasioptera rubi* (Schrank, 1803) – Малиновая галлица
9802. *Macrodiplosis pustularis* (Bremi, 1847) – Дубовая широкополосная галлица
9803. *Macrodiplosis volvens* Kieffer, 1895 – Дубовая краевая галлица
9804. *Mayetiola destructor* (Say, 1817) – Гессенская муха
9805. *Oligotrophus szepligetii* (Kieffer, 1909) – Галлица Чеплигети
9806. *Physemocecis hartigi* (Liebel, 1892) – Галлица Гартига (на липе)
9807. *Rabdophaga clausilia* (Bremi, 1847) – Ивовая трубковая галлица
9808. *Rabdophaga marginemtorquens* (Bremi, 1847) – Ивовая краевая галлица
9809. *Rabdophaga salicis* (Schrank, 1803) – Ивовая галлица – обычна
9810. *Semudobia betulae* (Winnertz, 1853) – Березовая галлица-семяед
9811. *Sitodiplosis mosellana* (Gehin, 1857) – Оранжевый злаковый комарик
9812. *Stenodiplosis panici* Plotnikov, 1926 – Просяной комарик

9813. *Thecodiplosis brachyntera* (Schwagrichen, 1835) – Сосновая красная галлица
9814. *Trotteria obtusa* (Loew, 1845) – Ракитниковая розовидная галлица
9815. *Wachtliella rosae* (Bremi, 1847) – Ивовая розообразующая галлица

Семейство Mycetophilidae – Грибные комары

9816. *Exechia sp.* – пещера Шульган-Таш
9817. *Mycetophila fungorum* (De Geer, 1776)
9818. *Speolepta leptogaster* (Winnertz, 1863) – пещера Шульган-Таш (Капралов, 2010)

Семейство Ptychopteridae

9819. *Ptychoptera contaminata* (Linnaeus, 1758) – Уфа 2024

Семейство Sciaridae

9820. *Sciara hemerobioides* (Scopoli, 1763) – ЗШТ

Подотряд Brachycera – Короткоусые

Инфраотряд Asilomorpha

Семейство Asilidae – Ктыри

Подсемейство – Asilinae

9821. *Antipalus varipes* (Meigen, 1820)
9822. *Antiphrisson trifarius* (Loew, 1849)
9823. *Asilus crabroniformis* Linnaeus, 1758 – Шершневидный ктырь
9824. *Cerdistus graminicola* Lehr, 1967 – Бурз, БГПЗ
9825. *Didysmachus picipes* (Meigen, 1820)
9826. *Dysmachus bimucronatus* (Loew, 1854)
9827. *Echthistus rufinervis* (Meigen, 1820)
9828. *Epitriptus cingulatus* (Fabricius, 1781)
9829. *Eutolmus rufibarbis* (Meigen, 1820)
9830. *Lamyra fuliginosa* (Panzer, 1803) – Уфа 2023, Бурз 2023
9831. *Machimus atricapillus* (Fallen, 1814)
9832. *Machimus fimbriatus* (Meigen, 1804)
9833. *Machimus poecilogaster* (Loew, 1849)
9834. *Machimus rusticus* (Meigen, 1820)
9835. *Neoitamus cyanurus* (Loew, 1849) – Синебрюхий ктырь
? *Pamponerus germanicus* (Linnaeus, 1758) – Кркм 2023
9836. *Satanas gigas* (Eversmann, 1855) – Гигантский ктырь

Подсемейство Dasypogoninae

9837. *Dasypogon diadema* (Fabricius, 1781) – Диадема ктырь

Подсемейство Laphriinae

9838. *Andrenosoma albibarbe* (Meigen, 1820)
9839. *Choerades fulvus* (Meigen, 1804)
9840. *Laphria ephippium* (Fabricius, 1777) – Бурз 2023, Мелз 2020-2022
9841. *Laphria flava* (Linnaeus, 1761) – Рыжая ляфрия
9842. *Laphria gibbosa* (Linnaeus, 1758) – Горбатая лафрия
9843. *Laphria gilva* (Linnaeus, 1758) – Буровато-желтая ляфрия

9844. *Laphria vulpina* Meigen, 1820

Подсемейство Leptogastrinae

9845. *Leptogaster cylindrica* (De Geer, 1776) – Тонкобрюхий ктырь

Подсемейство Stenopogoninae

9846. *Cyrtopogon lateralis* (Fallen, 1814)
9847. *Dioctria atricapilla* Meigen, 1804 – Ктырь-ястребница
9848. *Dioctria hyalipennis* (Fabricius, 1794)
9849. *Dioctria linearis* (Fabricius, 1787)
9850. *Dioctria oelandica* (Linnaeus, 1758)
9851. *Dioctria rufipes* (Scopoli, 1763)
9852. *Dioctria speculifrons* Wiedemann, 1820
9853. *Stenopogon sabaudus* (Fabricius, 1794) – Рыжий ктырь

Семейство Bombyliidae – Мухи-жужжалы

Подсемейство Anthracinae

9854. *Anthrax anthrax* (Schrank, 1781) – Шарн 2024, Блрц 2023
9855. *Anthrax chionostigma* Tsacas, 1962 – Мелз 2021
9856. *Hemipenthes maura* (Linnaeus, 1758) – Уфа, Уфмс, Шарн
9857. *Hemipenthes morio* (Linnaeus, 1758) – Уфа, Уфмс, Чишм, Иглн, Ишмб, Кюрг, Мелз, Бурз, Кгрч
9858. *Hemipenthes velutina* (Meigen, 1820) – Ишмб 2023

Подсемейство Bombyliinae

9859. *Bombylella atra* (Scopoli, 1763)
9860. *Bombylius discolor* Mikan, 1796 – Уфа, Уфмс, Ишмб, Мелз
9861. *Bombylius fimbriatus* Meigen, 1820 – Стмк 2020, Уфа 2023, Ишмб 2023
9862. *Bombylius fulvescens* Meigen & Wiedemann, 1820
9863. *Bombylius medius* Linnaeus, 1758 – Средний жужжало
9864. *Bombylius minor* Linnaeus, 1758 – Малый жужжало
9865. *Bombylius posticus* Fabricius, 1805
9866. *Conophorus virescens* (Fabricius, 1789) – на север до Уфы
9867. *Systoechus ctenopterus* (Mikan, 1796)

Подсемейство Lomatiinae

9868. *Lomatia lateralis* (Meigen, 1820) – Туйм 2024

Семейство Dolichopodidae – Мухи-зеленушки

9869. *Chrysotus amurensis* Negrobov, 1980 (Negrobov et al., 2013)
9870. *Chrysotus gramineus* (Fallen, 1823) – РБ (Негробов и др., 2013)
9871. *Chrysotus laesus* (Wiedemann, 1817) – РБ (Негробов и др., 2013)
9872. *Chrysotus femoratus* Zetterstedt, 1843 – Бурз 1899; БГПЗ 1979 (Маслова, 2006)
9873. *Chrysotus gramineus* (Fallen, 1823) – Белб 1904; БГПЗ 1979 (Маслова, 2006)
9874. *Chrysotus laesus* (Wiedemann, 1817) – БГПЗ; Чишм 1908 (Маслова, 2006)
9875. *Dolichopus claviger* Stannius, 1831 – р. Белая 1935 (Родионова, 2004)
9876. *Dolichopus metallica* (Bezzi, 1908) – ЗШТ 1979 (Нечай, 2011)

9877. *Dolichopus pennatus* Meigen, 1824 – Уфимская губерния 1925 (Родионова, 2004)
9878. *Dolichopus simius* Parent, 1927 – БГПЗ 1979 (Корнев и др., 2013)
9879. *Dolichopus ungulatus* (Linnaeus, 1758) – Уфимская губерния 1907 (Родионова, 2004)
9880. *Hercostomus aerosus* (Fallen, 1823) – БГПЗ 1979; ЗШТ 1979 (Нечай, 2011)
9881. *Hercostomus angustifrons* (Stæger, 1842) – ЗШТ 1979 (Нечай, 2011)
9882. *Hercostomus brevicornis* (Stæger, 1842) – БГПЗ 1979; ЗШТ 1979 (Нечай, 2011)
9883. *Hercostomus celer* (Meigen, 1824) – БГПЗ 1979; ЗШТ 1979 (Нечай, 2011)
9884. *Hercostomus germanus* (Wiedemann, 1817) – Уфа 1925 (Нечай, 2011)
9885. *Hercostomus rothi* (Zetterstedt, 1859) – ЗШТ 1979 (Нечай, 2011)
9886. *Hercostomus rusticus* (Meigen, 1824) – Уфмс, Белб, ЗШТ 1979, Белорецк 1975 (Нечай, 2011)
9887. *Hercostomus sahlbergi* (Zetterstedt, 1838) – Блрц, Иремель 1991 (Нечай, 2011)
9888. *Medetera abstrusa* Thuneberg, 1955
9889. *Medetera mixta* Negrobov, 1967 – РБ (Негробов и др., 2013)
9890. *Poecilobothrus chrysozygos* (Wiedemann, 1817) – ЗШТ 1979 (Нечай, 2011)
9891. *Rhaphium caliginosum* Meigen, 1824 – БГПЗ, 1979 (Maslova et al., 2020)
9892. *Xanthochlorus tenellus* (Wiedemann, 1817) – Абзл 2008

Семейство Empididae – Толкунчики

9893. *Empis hyalipennis* Fallén, 1816 – РБ (Шамшев, 2016)
9894. *Empis stercorea* Linnaeus, 1761 – РБ (Шамшев, 2016)
9895. *Empis tessellata* Fabricius, 1794 – Большой толкунчик – ЗШТ 2020 (Летопись…, 2021)
9896. *Empis trigramma* Meigen & Wiedemann, 1822 – РБ (Шамшев, 2016)
9897. *Rhamphomyia tipularia* (Fallén, 1816) – РБ (Шамшев, 2016)

Семейство Hybotidae

9898. *Crossopalpus curvinervis* (Zetterstedt, 1842)
9899. *Hybos femoratus* (Müller, 1776) – РБ (Шамшев, 2016)
9900. *Platypalpus cursitans* (Fabricius, 1775) – РБ (Шамшев, 2016)

Семейство Scenopinidae

9901. *Scenopinus fenestralis* (Linnaeus, 1758) – Чишм 2025

Семейство Therevidae – Лжектыри

9902. *Thereva sp.*

Инфраотряд Muscomorpha

Семейство Agromyzidae

9903. *Phytomyza lappae* Goureau, 1851 – Слвт 2025

Семейство Anthomyiidae – Цветочницы

9904. *Anthomyia liturata* Robineau-Desvoidy, 1830 – Блрц
9905. *Delia antiqua* (Meigen, 1826) – Луковая муха
9906. *Delia coarctata* (Fallen, 1825) – Озимая муха

9907. *Delia floralis* (Fallen, 1824) – Летняя капустная муха
9908. *Delia florilega* (Zetterstedt, 1845) – Люпиновая муха (на фасоли)
9909. *Delia longicauda* (Strobl, 1898) – Блрц
9910. *Delia platura* (Meigen, 1826) – Ростковая муха (на ржи)
9911. *Delia radicum* (Linnaeus, 1758) – Весенняя капустная муха
9912. *Delia subalpina* (Ringdahl, 1926) – Блрц
9913. *Paradelia intersecta* (Meigen, 1826)
9914. *Pegomya betae* (Curtis, 1847) – Свекловичная минирующая муха (Ганиев, Недорезков, 2008)
9915. *Pegomya haemorrhoum* (Zetterstedt, 1837) – Блрц
9916. *Pegomya hyoscyami* (Meigen & Panzer, 1809) – Западная свекловичная муха (на пасленовых; на столовой свекле)
9917. *Phorbia curvicauda* (Zetterstedt, 1845) – Блрц
9918. *Phorbia fascicularis* Tiensuu, 1935 – Блрц
9919. *Phorbia fumigata* (Meigen, 1826) – Черная пшеничная муха (Ганиев, Недорезков, 2008)
9920. *Phorbia genitalis* (Schnabl, 1911) – Яровая муха
9921. *Strobilomyia laricicola* (Karl, 1928) – Лиственничная муха – БГПЗ, массово (Ханисламов, 1961)

Семейство Calliphoridae – Падальные мухи

9922. *Bellardia sp.* – Бурз 2023
9923. *Calliphora uralensis* Villeneuve, 1922 – Уральская падальная муха
9924. *Calliphora vicina* Robineau-Desvoidy, 1830 – Уфа 2024
9925. *Calliphora vomitoria* (Linnaeus, 1758)
9926. *Cynomya mortuorum* (Linnaeus, 1761) – Падальная муха (муха мертвых)
9927. *Lucilia caesar* (Linnaeus, 1758) – Падальная муха – обычна
9928. *Lucilia sericata* (Meigen, 1826) – Зеленая падальная муха
9929. *Lucilia silvarum* (Meigen, 1826)
9930. *Protophormia terraenovae* (Robineau-Desvoidy, 1830) – Первовесенняя муха
9931. *Trypocalliphora braueri* (Hendel, 1901) – ЮУГПЗ, 2016 у пеночек *Phyllocopus collybita* (Квартальнов, 2017)

Семейство Chamaemyiidae

9932. *Chamaemyia juncorum* (Fallen, 1823)

Семейство Chloropidae – Злаковые мухи или Зеленоглазки

9933. *Chlorops ornatus* (Wieldemann, 1817)
9934. *Chlorops pumilionis* (Bjerkander, 1778) – Зеленоглазка
9935. *Meromyza femorata* Macquart, 1835
9936. *Meromyza mosquensis* Fedoseeva, 1960
9937. *Meromyza nigriseta* Fedoseeva, 1960
9938. *Meromyza nigriventris* Macquart, 1835
9939. *Meromyza palposa* Fedoseeva, 1960
9940. *Meromyza pluriseta* Peterfi, 1961
9941. *Meromyza saltatrix* (Linnaeus, 1761)

9942. *Oscinella frit* (Linnaeus, 1758) – Овсяная шведская муха
9943. *Oscinella pusilla* (Meigen, 1830) – Ячменная шведская муха

Семейство Conopidae

9944. *Conops flavipes* Linnaeus, 1758
9945. *Myopa buccata* (Linnaeus, 1758)
9946. *Physocephala vittata* (Fabricius, 1794) – берег оз. Кандры-Куль, 2017 (Герасимов, 2017б)
9947. *Sicus ferrugineus* (Linnaeus, 1761)
9948. *Zodion cinereum* (Fabricius, 1794)

Семейство Drosophilidae – Плодовые мушки

9949. *Chymomyza amoena* (Loew, 1862) – Крмс 2021, Иглн 2025
9950. *Drosophila busckii* Coquillett, 1901 – Гафр 2021, Уфа 2019
9951. *Drosophila funebris* (Fabricius, 1787) – синантроп (космополит)
9952. *Drosophila immigrans* Sturtevant, 1921 – Уфа 2019, Мелз 2024
9953. *Drosophila melanogaster* Meigen, 1830 – Чернобрюхая дрозофила, по всему миру (космополит)
9954. *Drosophila repleta* Wollaston, 1858 – Уфа 2021
9955. *Gitona distigma* Meigen, 1830 – Уфа 2020-2021, Иглн 2025
9956. *Scaptomyza graminum* (Fallen, 1823)

Семейство Ephydridae – Мухи-береговушки

9957. *Ephydra riparia* Fallén, 1813 – Куюр (Krivosheina, Ozerov, 2021)
9958. *Hydrellia griseola* (Fallen, 1813) – Ячменный минёр
9959. *Setacera aurata* (Stenhammar 1844) – Куюр, у р. М. Юшатырь (Кривошеина, Озеров, 2020)

Семейство Fanniidae

9960. *Fannia canicularis* (Linnaeus, 1761) – Комнатная малая муха
9961. *Fannia postica* (Stein, 1895) – Блрц

Семейство Heleomyzidae

9962. *Allophyla atricornis* (Meigen, 1830) Блрц
9963. *Gymnomus amplicornis* (Czerny, 1924) – пещера Шульган-Таш (Капралов, 2010)
9964. *Heleomyza modesta* Meigen, 1835
9965. *Heleomyza serrata* (Linnaeus, 1758)
9966. *Scoliocentra brachypterna* (Loew, 1873) – пещера Шульган-Таш (Капралов, 2010)
9967. *Suillia bicolor* (Zetterstedt, 1838) – Блрц
9968. *Suillia flava* (Meigen, 1830)
9969. *Suillia fuscicornis* (Zetterstedt, 1847) – Блрц
9970. *Suillia laevifrons* (Loew, 1862)
9971. *Suillia nemorum* (Meigen, 1830)
9972. *Suillia pallida* (Fallen, 1820)
9973. *Suillia vaginata* (Loew, 1862)

Семейство Hippoboscidae – Кровососки

9974. *Crataerina pallida* (Latreille, 1812) – Уфмс 2021, Уфа 2021-2023
9975. *Hippobosca equina* Linnaeus, 1758 – Лошадиная кровососка
9976. *Melophagus ovinus* (Linnaeus, 1758) – Овечий рунец
9977. *Nycteribia kolenatii* Theodor, 1954 **–** паразит *M. daubentonii* в Каповой пещере (Орлова, Орлов, 2013)
9978. *Ornithomya avicularia* (Linnaeus, 1758)
9979. *Pseudolynchia canariensis* (Macquart, 1839) – Уфа 2023-2024

Семейство Lauxaniidae

9980. *Lauxania minor* Martinek, 1974 – Альш 2016
9981. *Meiosimyza decempunctata* (Fallén, 1820) – Уфа 2024
9982. *Minettia longipennis* (Fabricius, 1794) – Ишимбай 2021
9983. *Sapromyza quadripunctata* (Gimmerthal, 1842) – Крмс 2025

Семейство Lonchopteridae

9984. *Lonchoptera bifurcata* (Fallén, 1810) – Иглн 2025

Семейство Megamerinidae

9985. *Megamerina dolium* (Fabricius, 1805) – Уфа 2019

Семейство Micropezidae – Ходуленожки

9986. *Micropeza corrigiolata* (Linnaeus, 1767) – Альш 2019, Ишмб 2024
9987. *Rainieria calceata* (Fallén, 1820) – Уфа 2019-2023

Семейство Muscidae – Настоящие мухи

Подсемейство Azeliinae

9988. *Azelia nebulosa* Robineau-Desvoidy, 1830 – Блрц, р. Нура (Vikhrev, 2015).
9989. *Azelia zetterstedtii* Rondani, 1866 – Блрц (Vikhrev, 2015).
9990. *Hydrotaea sp.* – Иглн 2025
9991. *Muscina levida* (Harris, 1780) – Стерлитамак, Дюрт 1993
9992. *Muscina stabulans* (Fallen, 1817) – Домовая рыжая муха
9993. *Thricops semicinereus* (Wiedemann, 1817) – Кркм 2020

Подсемейство Coenosiinae

9994. *Caricea alma* (Meigen, 1826) – Блрц
9995. *Coenosia pumila* (Fallen, 1825) – Блрц
9996. *Macrorchis meditata* (Fallen, 1825) – Блрц
9997. *Spilogona contractifrons* (Zetterstedt, 1837) – Блрц

Подсемейство Muscinae

9998. *Haematobosca stimulans* (Meigen, 1824) – Коровья жигалка
9999. *Mesembrina meridiana* (Linnaeus, 1758) – Чёрная полуденная навозница
10000. *Mesembrina mystacea* (Linnaeus, 1758) – Слвт 2025, Гафр 2024, Бирс 2024, Блрц 2022, Крск 2021
10001. *Musca autumnalis* De Geer, 1776 – Уфа 2020
10002. *Musca domestica* Linnaeus, 1758 – Комнатная муха
10003. *Musca larvipara* Portschinsky, 1910 – Белебей (Зимин, 1951)
10004. *Neomyia cornicina* (Fabricius, 1775)

10005. *Polietes lardaria* (Fabricius, 1781) – Мелз 2021
10006. *Pyrellia vivida* Robineau-Desvoidy, 1830 – Лошадиная навозница
10007. *Stomoxys calcitrans* (Linnaeus, 1758) – Осенняя жигалка

Подсемейство Mydaeinae

10008. *Mydaea anicula* (Zetterstedt, 1860) – Блрц
10009. *Mydaea corni* (Scopoli, 1763) – Блрц
10010. *Mydaea urbana* (Meigen, 1826) – Блрц

Подсемейство Phaoniinae

10011. *Helina annosa* (Zetterstedt, 1837) – Блрц
10012. *Helina daicles* (Walker, 1849) – Блрц
10013. *Helina depuncta* (Fallen, 1825) – Блрц
10014. *Helina evecta* (Harris, 1780) – Блрц
10015. *Helina flavisquama* (Zetterstedt, 1837) – Блрц
10016. *Helina obscurata* (Meigen, 1826) – Блрц
10017. *Helina pubiseta* (Zetterstedt, 1845) – Блрц
10018. *Helina reversio* (Harris, 1780) – Бурз 2025
10019. *Lophosceles cinereiventris* (Zetterstedt, 1845) – Блрц
10020. *Lophosceles frenatus* (Holmgren, 1872) – Блрц
10021. *Lophosceles mutatus* (Fallen, 1825) – Блрц
10022. *Phaonia errans* (Meigen, 1826) – Блрц
10023. *Phaonia fuscata* (Fallen, 1825) – Уфа 2016, Давл
10024. *Phaonia hybrida* (Schnabl, 1888) – Блрц
10025. *Phaonia incana* (Wiedemann, 1817) – Блрц
10026. *Phaonia lugubris* (Meigen, 1826) – Блрц
10027. *Phaonia nymphaearum* (Robineau –Desvoidy, 1830) – Блрц
10028. *Phaonia palpata* (Stein, 1897) – Давл

Семейство Oestridae – Оводы

Подсемейство Oestrinae – Носоглоточные оводы

10029. *Oestrus ovis* Linnaeus, 1758 – Овечий овод
10030. *Rhinoestrus latifrons* (Gan, 1947)
10031. *Rhinoestrus purpureus* (Brauer, 1880) – Багряный носоглоточник, или Белоголовик

Подсемейство Hypodermatinae – Подкожные оводы

10032. *Hypoderma bovis* (Linnaeus, 1758) – Бычий овод, или Строка
10033. *Hypoderma lineatum* (Villers, 1789) – Южный подкожник (пищеводник)

Подсемейство Gastrophilidae – Желудочные оводы

10034. *Gasterophilus haemorrhoidalis* (Linnaeus, 1758) – Краснобрюшковый овод
10035. *Gasterophilus intestinalis* (De Geer, 1776) – Большой желудочный овод
10036. *Gasterophilus nasalis* (Linnaeus, 1758) – Овод-двенадцатиперстник
10037. *Gasterophilus pecorum* (Fabricius, 1794) – Овод-травник

Семейство Opomyzidae – Опомизиды

10038. *Opomyza florum* (Fabricius, 1794) – Обыкновенная опомиза

Семейство Phoridae – Мухи-горбатки

10039. *Megaselia sp.*

Семейство Piophilidae

10040. *Allopiophila sp.* – Иглн 2025

10041. *Piophila casei* (Linnaeus, 1758) – Сырная муха

Семейство Polleniidae

10042. *Pollenia amentaria* (Scopoli, 1763) – Иглн 2025

10043. *Pollenia pectinata* Grunin, 1966

10044. *Pollenia rudis* (Fabricius, 1794) – Уфмс 1954 (Гирфанова, 1962а)

Семейство Psilidae – Голотелки

10045. *Psila rosae* Fabricius, 1794 – Морковная муха

Семейство Sarcophagidae – Серые мясные мухи

Подсемейство Miltogramminae

10046. *Metopia argyrocephala* (Meigen, 1824)

10047. *Metopia campestris* (Fallen, 1810)

10048. *Taxigramma hilarella* (Zetterstedt, 1844) – Уфмс 1953-55 (Гирфанова, 1962а)

Подсемейство Paramacronychiinae

10049. *Agria affinis* (Fallen, 1817)

10050. *Nyctia halterata* (Panzer, 1797) – Уфмс 1955 ((Гирфанова, 1962а)

10051. *Wohlfahrtia magnifica* (Schiner, 1862) – Вольфартова муха

Подсемейство Sarcophaginae

10052. *Blaesoxipha filipjevi* Rohdendorf, 1928 – Байм, Абзл, Белорецк 1953-59 (Гирфанова, 1962а)

10053. *Blaesoxipha laticornis* (Meigen, 1826)

10054. *Blaesoxipha plumicornis* (Zetterstedt, 1859)

10055. *Blaesoxipha rossica* Villeneuve, 1912

10056. *Blaesoxipha unicolor* (Villeneuve, 1912)

10057. *Ravinia pernix* (Harris, 1780)

10058. *Sarcophaga africa* (Wiedemann, 1824)

10059. *Sarcophaga albiceps* Meigen, 1826 – из куколок непарного шелкопряда (Гирфанова, 1962б)

10060. *Sarcophaga argyrostoma* (Robineau-Desvoidy, 1830)

10061. *Sarcophaga caerulescens* Zetterstedt, 1838 – из куколок непарного шелкопряда ((Гирфанова, 1962б)

10062. *Sarcophaga carnaria* (Linnaeus, 1758) – Обыкновенная мясная муха

10063. *Sarcophaga crassipalpis* Macquart, 1839

10064. *Sarcophaga dissimilis* Meigen, 1826

10065. *Sarcophaga haemorrhoides* Bottcher, 1913

10066. *Sarcophaga harpax* Pandelle, 1896

10067. *Sarcophaga incisilobata* Pandelle, 1896

10068. *Sarcophaga lehmanni* Muller, 1922

10069. *Sarcophaga melanura* Meigen, 1826

10070. *Sarcophaga portschinskyi* (Rohdendorf, 1937) – из куколок непарного шелкопряда (Гирфанова, 1962б)
10071. *Sarcophaga pseudoscoparia* Kramer, 1911
10072. *Sarcophaga schuetzei* Kramer, 1909
10073. *Sarcophaga similis* Meade, 1876
10074. *Sarcophaga subulata* Pandelle, 1896
10075. *Sarcophaga subvicina* Rohdendorf, 1937
10076. *Sarcophaga tuberosa* Pandelle, 1896
10077. *Sarcophaga uliginosa* Kramer, 1908

Семейство Scathophagidae – Навозные мухи

10078. *Amaurosoma armillatum* (Zetterstedt, 1846) – Колосовая муха
10079. *Chaetosa punctipes* (Meigen, 1826) – Блрц 2012 (Ozerov, 2019), Иглн 2025
10080. *Coniosternum obscurum* (Fallén, 1819) – Абзл 2008 (Ozerov, Krivosheina, 2020б).
10081. *Cordilura aberrans* Becker, 1894 – Абзл 2008 (Ozerov, Krivosheina, 2020б).
10082. *Cordilura ciliata* Meigen, 1826 – Белорецк 2012; Блрц 2015
10083. *Cordilura impudica* Rondani, 1866 – Белорецк 2012 (Ozerov, Krivosheina, 2020б).
10084. *Cordilura pudica* Meigen, 1826 – Абзл 2008 (Ozerov, Krivosheina, 2020б).
10085. *Norellisoma lituratum* (Meigen, 1826) – Блрц 2015 (Ozerov, Krivosheina, 2020a).
10086. *Norellisoma spinimanum* (Fallén, 1819) – БГПЗ 1975 (Ozerov, Krivosheina, 2020a).
10087. *Pogonota barbata* (Zetterstedt, 1838) – Абзл 2008 (Ozerov, 2016)
10088. *Scathophaga furcata* (Say, 1823)
10089. *Scathophaga inquinata* Meigen, 1826 – Блрц 2015; БГПЗ 1975; Уфа, 1975; Иглн 1975 (Ozerov, Krivosheina, 2020б).
10090. *Scathophaga lutaria* (Fabricius, 1794) – БГПЗ 1975; Абзл 2008; Уфа 1975 (Ozerov, Krivosheina, 2020б).
10091. *Scathophaga spurca* (Meigen, 1826) – БГПЗ 1975; Белорецк 2012; Уфа 1975 (Ozerov, Krivosheina, 2020б).
10092. *Scathophaga stercoraria* (Linnaeus, 1758) – Рыжая навозница
10093. *Scatomyza scybalaria* (Linnaeus, 1758) – Мелз 2012

Семейство Sciomyzidae – Тенницы

10094. *Coremacera marginata* (Fabricius, 1775) – Крмс 2019, Уфа 2014, Туйм 2025, Иглн 2025, Чишм 2025 Октябрьский 2025
10095. *Limnia unguicornis* (Scopoli, 1763) – Иглн 2025
10096. *Trypetoptera punctulata* (Scopoli, 1763) – Шарн 2019, Гафр, Уфа 2020, Ишмб 2023

Семейство Sepsidae

10097. *Nemopoda nitidula* (Fallén, 1820) – РБ (Озеров, 2003)
10098. *Sepsis cynipsea* (Linnaeus, 1758) – РБ (Озеров, 2003)
10099. *Sepsis fulgens* Meigen, 1826 – РБ (Озеров, 2003), Уфа 2025

10100. *Sepsis violacea* Meigen, 1826 – РБ (Озеров, 2003)
10101. *Themira leachi* (Meigen, 1826) – РБ (Озеров, 2003)
10102. *Themira pubera* (Linnaeus, 1758) – Бурз 1899; Абзл 2020 (Ozerov, Krivosheina, 2020б)
10103. *Themira putris* (Linnaeus, 1758) – РБ (Озеров, 2003)

Семейство Sphaeroceridae

10104. *Copromyza sp.* – Иглн 2025
10105. *Rachispoda sp.* – Иглн 2025

Семейство Syrphidae – Мухи-журчалки

Подсемейство Eristalinae

10106. *Anasimyia sp.* – Иглн 2025
10107. *Arctophila superbiens* (Muller, 1776)
10108. *Brachypalpoides lenta* (Meigen, 1822)
10109. *Brachypalpus valgus* (Panzer, 1797)
10110. *Caliprobola speciosa* (Rossi, 1790)
10111. *Ceriana conopsoides* (Linnaeus, 1758)
10112. *Chalcosyrphus femoratus* (Linnaeus, 1758)
10113. *Chalcosyrphus nemorum* (Fabricius, 1805)
10114. *Chalcosyrphus rufipes* (Loew, 1873)
10115. *Chalcosyrphus valgus* (Gmelin, 1790) – Блрц 2016
10116. *Cheilosia albipila* Meigen, 1838
10117. *Cheilosia albitarsis* (Meigen, 1822)
10118. *Cheilosia barbata* Loew, 1857
10119. *Cheilosia carbonaria* Egger, 1860
10120. *Cheilosia cynocephala* Loew, 1840
10121. *Cheilosia flavipes* (Panzer, 1797)
10122. *Cheilosia illustrata* (Harris, 1780)
10123. *Cheilosia impressa* Loew, 1840
10124. *Cheilosia longula* (Zetterstedt, 1838)
10125. *Cheilosia morio* (Zetterstedt, 1838)
10126. *Cheilosia motodomariensis* Matsumura, 1916
10127. *Cheilosia nigripes* (Meigen, 1822)
10128. *Cheilosia pagana* (Meigen, 1822)
10129. *Cheilosia proxima* (Zetterstedt, 1843)
10130. *Cheilosia variabilis* (Panzer, 1798)
10131. *Cheilosia velutina* Loew, 1840
10132. *Cheilosia vernalis* (Fallen, 1817)
10133. *Cheilosia vicina* (Zetterstedt, 1849)
10134. *Cheilosia vulpina* (Meigen, 1822)
10135. *Chrysogaster solstitialis* (Fallen, 1817)
10136. *Chrysogaster virescens* Loew, 1854
10137. *Criorhina asilica* (Fallen, 1816) – БГПЗ 1948 (Зимина, 1968), Блрц
10138. *Eristalinus aeneus* (Scopoli, 1763)

10139. *Eristalinus sepulchralis* (Linnaeus, 1758)
10140. *Eristalis anthophorina* (Fallen, 1817)
10141. *Eristalis arbustorum* (Linnaeus, 1758) – Лесная пчеловидка
10142. *Eristalis fraterculus* (Zetterstedt, 1838)
10143. *Eristalis hirta* Loew, 1866
10144. *Eristalis intricaria* (Linnaeus, 1758) – Разноцветная ильница
10145. *Eristalis obscura* Loew, 1866 – Куюр 2023
10146. *Eristalis rossica* Stackelberg, 1958
10147. *Eristalis rupium* Fabricius, 1805 – Буропполосая ильница
10148. *Eristalis tenax* (Linnaeus, 1758) – Цепкая ильница – обычна
10149. *Eristalis vitripennis* Strobl, 1893
10150. *Eumerus strigatus* (Fallén, 1817) – Луковая журчалка
10151. *Ferdinandea cuprea* (Scopoli, 1763)
10152. *Helophilus affinis* Wahlberg, 1844
10153. *Helophilus hybridus* Loew, 1846
10154. *Helophilus lapponicus* Wahlberg, 1844
10155. *Helophilus pendulus* (Linnaeus, 1758)
10156. *Helophilus trivittatus* (Fabricius, 1805)
10157. *Lejogaster tarsata* (Meigen, 1822)
10158. *Lejops lunulatus* Meigen, 1822
10159. *Merodon serrulatus* Meigen & Wiedemann, 1822
10160. *Neoascia meticulosa* (Scopoli, 1763)
10161. *Neoascia tenur* (Harris, 1780)
10162. *Orthonevra elegans* (Wiedemann, 1822) – БГПЗ 1948 (Зимина, 1968)
10163. *Philhelius citrofasciata* (De Geer, 1776)
10164. *Philhelius pedissequum* (Harris, 1778)
10165. *Rhingia campestris* Meigen, 1822
10166. *Sphecomyia vespiformis* (Gorski, 1852)
10167. *Sphegina sibirica* Stackelberg, 1953 – Уфа 2021
10168. *Spilomyia diophthalma* (Linnaeus, 1758)
10169. *Syritta pipiens* (Linnaeus, 1758)
10170. *Xylota abiens* Meigen, 1822
10171. *Xylota caeruleiventris* Zetterstedt, 1838 – БГПЗ 1948 (Зимина, 1968)
10172. *Xylota florum* (Fabricius, 1805) – БГПЗ 1948 (Зимина, 1968)
10173. *Xylota segnis* (Linnaeus, 1758) – 1790) – Блрц 2016
10174. *Xylota xanthocnema* Collin, 1939

Подсемейство Milesiinae

10175. *Microdon devius* (Linnaeus, 1761)
10176. *Myathropa florea* (Linnaeus, 1758)
10177. *Myathropa semenovi* Smirnov, 1925

Подсемейство Syrphinae

10178. *Baccha elongata* (Fabricius, 1775) – Продолговатая журчалка
10179. *Chrysotoxum arcuatum* (Linnaeus, 1758)

10180. *Chrysotoxum baphyrum* Walker, 1849
10181. *Chrysotoxum bicinctum* (Linnaeus, 1758) – Двухполосая журчалка
10182. *Chrysotoxum cautum* (Harris, 1776)
10183. *Chrysotoxum elegans* Loew, 1841
10184. *Chrysotoxum fasciolatum* (De Geer, 1776)
10185. *Chrysotoxum festivum* (Linnaeus, 1758) – Красивая журчалка
10186. *Chrysotoxum vernale* Loew, 1841
10187. *Chrysotoxum verralli* Collin, 1940
10188. *Dasysyrphus albostriatus* (Fallen, 1817) – Иглн 2025
10189. *Dasysyrphus friuliensis* (van der Goot, 1960)
10190. *Dasysyrphus hilaris* (Zetterstedt, 1843)
10191. *Dasysyrphus postclaviger* (Stys & Moucha, 1962)
10192. *Dasysyrphus tricinctus* (Fallen, 1817)
10193. *Dasysyrphus venustus* (Meigen 1822)
10194. *Didea alneti* (Fallén, 1817)
10195. *Didea fasciata* Macquart, 1834
10196. *Epistrophe annulitarsis* (Stackelberg, 1918)
10197. *Epistrophe diaphana* (Zetterstedt, 1843)
10198. *Epistrophe grossulariae* (Meigen, 1822) – Крыжовниковый сирф
10199. *Epistrophe melanostoma* (Zetterstedt, 1843)
10200. *Epistrophe nitidicollis* (Meigen, 1822)
10201. *Epistrophe ochrostoma* (Zetterstedt, 1849)
10202. *Episyrphus balteatus* (De Geer, 1776)
10203. *Eupeodes corollae* (Fabricius, 1794)
10204. *Eupeodes flaviceps* (Rondani, 1857)
10205. *Eupeodes latifasciatus* (Macquart, 1829)
10206. *Eupeodes lundbecki* (Soot Ryen, 1946)
10207. *Eupeodes luniger* (Meigen, 1822) – Луноносный сирф
10208. *Eupeodes nitens* (Zetterstedt, 1843)
10209. *Hammerschmidtia ferruginea* (Fallen, 1817) – БГПЗ 1948 (Зимина, 1968)
10210. *Lapposyrphus lapponicus* (Zetterstedt, 1838)
10211. *Leucozona glaucia* (Linnaeus, 1758)
10212. *Leucozona laternaria* (Müller, 1776) – Ермк 2018
10213. *Leucozona lucorum* (Linnaeus, 1758)
10214. *Mallota bicolor* Sack, 1910
10215. *Mallota eurasiatica* Stackelberg, 1950
10216. *Mallota megilliformis* (Fallen, 1817)
10217. *Mallota rossica* Portschinsky, 1877
10218. *Mallota tricolor* Loew, 1871
10219. *Megasyrphus erratica* (Linnaeus, 1758)
10220. *Melangyna arctica* (Zetterstedt, 1838)
10221. *Melangyna quadrimaculata* (Verrall, 1873) – БГПЗ 1948 (Зимина, 1968)
10222. *Melangyna sexguttata* (Meigen, 1835)

10223. *Melangyna umbellatarum* (Fabricius, 1794)
10224. *Melanostoma mellina* (Linnaeus, 1758)
10225. *Melanostoma scalare* (Fabricius, 1794) – Уфа 2020
10226. *Meliscaeva cinctella* (Zetterstedt, 1843)
10227. *Parasyrphus malinellus* (Collin, 1952)
10228. *Parasyrphus nigritarsis* (Zetterstedt, 1843)
10229. *Pipiza aurantipes* (Bigot, 1857)
10230. *Pipiza bimaculata* Meigen, 1822
10231. *Pipiza festiva* Meigen, 1822
10232. *Pipiza quadrimaculata* (Panzer, 1802)
10233. *Pipizella annulata* (Macquart, 1829)
10234. *Pipizella viduata* (Linnaeus, 1758) – Уфмс 1980
10235. *Pipizella virens* (Fabricius, 1805)
10236. *Platycheirus albimanus* (Fabricius, 1781)
10237. *Platycheirus ambiguum* (Fallen, 1817)
10238. *Platycheirus clypeatus* (Meigen, 1822)
10239. *Platycheirus fulviventris* (Macquart, 1829)
10240. *Platycheirus peltatus* (Meigen, 1822)
10241. *Platycheirus scutatus* (Meigen, 1822)
10242. *Scaeva pyrastri* (Linnaeus, 1758) – Лобастая журчалка
10243. *Sphaerophoria interrupta* (Fabricius, 1805)
10244. *Sphaerophoria philantha* (Meigen, 1822)
10245. *Sphaerophoria rueppelli* (Wiedemann, 1830)
10246. *Sphaerophoria scripta* (Linnaeus, 1758) – Украшенная шароноска – обычна
10247. *Sphaerophoria turkmenica* Bankowska, 1964
10248. *Syrphus ribesii* (Linnaeus, 1758) – Перевязанный сирф
10249. *Syrphus sexmaculatus* (Zetterstedt, 1838)
10250. *Syrphus torvus* Osten-Sacken, 1875
10251. *Syrphus vitripennis* Meigen, 1822 – Стекляннокрылая журчалка
10252. *Temnostoma apiforme* (Fabricius, 1794)
10253. *Temnostoma bombylans* (Fabricius, 1805)
10254. *Temnostoma meridionale* Krivosheina & Mamayev, 1962
10255. *Temnostoma vespiforme* (Linnaeus, 1758)
10256. *Volucella bombylans* (Linnaeus, 1758) – Шмелевидка
10257. *Volucella inanis* (Linnaeus, 1758)
10258. *Volucella pellucens* (Linnaeus, 1758) – Прозрачная журчалка – локально
10259. *Volucella zonaria* (Poda, 1761) – Уфа 2018-2024, Шарн 2024
10260. *Xanthandrus comtus* (Harris, 1780) – Абзл 2018, Ишмб 2024

Семейство Tachinidae – Ежемухи

Подсемейство Dexiinae

10261. *Athrycia trepida* (Meigen, 1824) – из капустной совки
10262. *Blepharomyia pagana* (Meigen, 1824)
10263. *Dexia rustica* (Fabricius, 1775) – из майского хруща

10264. *Dexia vacua* (Fallen, 1817) – из майского хруща
10265. *Dinera carinifrons* (Fallen, 1817) – Уфмс 1960 (Гирфанова, 1962а)
10266. *Eriothrix rufomaculatus* (De Geer, 1776) – Уфмс, Бклн, Бижб, Белебей 1950-е (Гирфанова, 1962а)
10267. *Estheria petiolata* (Bonsdorff, 1866) – из июньского хруща
10268. *Macquartia chalconota* (Meigen, 1824) – Блрц, БГПЗ 1959 (Гирфанова, 1962а)
10269. *Macquartia praefica* (Meigen, 1824)
10270. *Macquartia tenebricosa* (Meigen, 1824) – Блрц 1959-60 (Гирфанова, 1962а)
10271. *Peteina erinaceus* (Fabricius, 1794) – Уфмс 1954 (Гирфанова, 1962а)
10272. *Rondania dimidiata* (Meigen, 1824)
10273. *Thelaira nigripes* (Fabricius, 1794) – Уфмс, Уфа 1953-54 (Гирфанова, 1962а)
10274. *Trixa alpina* Meigen, 1824 – Блрц 1956; Уфмс, 1960 (Гирфанова, 1962а)
10275. *Voria ruralis* (Fallen, 1810) – из капустной совки
10276. *Wagneria sp*. – Блрц 1960 (Гирфанова, 1962а)
10277. *Zeuxia cinerea* Meigen, 1826 – Уфмс 1952 (Гирфанова, 1962а)

Подсемейство Exoristinae

10278. *Bessa parallela* (Meigen, 1824)
10279. *Blepharipa pratensis* (Meigen, 1824)
10280. *Blepharipa schineri* (Mesnil, 1939)
10281. *Blondelia nigripes* (Fallen, 1810)
10282. *Bothria frontosa* (Meigen, 1824) – Уфмс 1954 (Гирфанова, 1962а), Ишмб 2023
10283. *Carcelia bombylans* Robineau-Desvoidy, 1830
10284. *Carcelia gnava* (Meigen, 1824)
10285. *Carcelia laxifrons* Villeneuve, 1912
10286. *Carcelia lucorum* (Meigen, 1824)
10287. *Ceromasia rubrifrons* (Macquart, 1834) – многоядный паразит
10288. *Chetogena acuminata* Rondani, 1859 – паразит чернотелок
10289. *Clemelis pullata* (Meigen, 1824) – из лугового мотылька
10290. *Compsilura concinnata* (Meigen, 1824) – многоядный паразит гусениц
10291. *Drino atropivora* (Robineau-Desvoidy, 1830) – из шелкопрядов и бражника
10292. *Drino vicina* (Zetterstedt, 1849) – из пилильщиков
10293. *Ectophasia crassipennis* (Fabricius, 1794)
10294. *Erythrocera nigripes* (Robineau-Desvoidy, 1830) – Стрлк 2020
10295. *Eumea mitis* (Meigen, 1824) – многоядный паразит гусениц бабочек
10296. *Exorista civilis* (Rondani, 1859) – из лугового мотылька
10297. *Exorista fasciata* (Fallen, 1820) – многоядный паразит гусениц бабочек
10298. *Exorista larvarum* (Linnaeus, 1758) – многоядный паразит гусениц бабочек и личинок пилильщиков
10299. *Exorista rustica* (Fallen, 1810)
10300. *Exorista segregata* (Rondani, 1859) – Зилр 1954 (Гирфанова, 1962а)

10301. *Exorista xanthaspis* (Wiedemann, 1830) – Блрц 1954 – из сибирского шелкопряда (Гирфанова, 1962а)
10302. *Gonia bimaculata* Wiedemann, 1819 – Давл 1953, Уфмс 1961 (Гирфанова, 1962а)
10303. *Gonia ornata* Meigen, 1826
10304. *Gonia picea* (Robineau-Desvoidy, 1830) – Крмс 2020
10305. *Hubneria affinis* (Fallen, 1810) – Бижб 1953 (Гирфанова, 1962а)
10306. *Lecanipa bicincta* (Meigen, 1824) – Зилр 1959 (Гирфанова, 1962а)
10307. *Lydella grisescens* Robineau-Desvoidy, 1830 – Уфмс, Бижб, Уфа 1953-1960 (Гирфанова, 1962а)
10308. *Masicera silvatica* (Fallen, 1810) – из чешуекрылых и пилильщиков
10309. *Medina collaris* (Fallen, 1820) – Зилр 1959 (Гирфанова, 1962а)
10310. *Oswaldia spectabilis* (Meigen, 1824) – Уфа 1957, Уфмс 1960 (Гирфанова, 1962а)
10311. *Pales pavida* (Meigen, 1824) – многоядный паразит гусениц
10312. *Pales pumicata* (Meigen, 1824) – Зилр, Уфмс 1959-1960 (Гирфанова, 1962а)
10313. *Parasetigena silvestris* (Robineau-Desvoidy, 1863) – из непарного шелкопряда, Бурз 2023
10314. *Paratryphera bisetosa* (Brauer & Bergenstamm, 1891) – Уфмс 1960 (Гирфанова, 1962а)
10315. *Phorocera assimilis* (Fallen, 1810) – многоядный паразит гусениц бабочек и личинок пилильщиков
10316. *Phorocera obscura* (Fallen, 1810)
10317. *Phryno vetula* (Meigen, 1824)
10318. *Phryxe erythrostoma* (Hartig, 1838) – Уфмс, 1954-1955 (Гирфанова, 1962а)
10319. *Phryxe nemea* (Meigen, 1824) – Зилр 1959 (Гирфанова, 1962а)
10320. *Phryxe vulgaris* (Fallen, 1810)
10321. *Platymya fimbriata* (Meigen, 1824) – Уфа 1957; Уфмс 1960 (Гирфанова, 1962а)
10322. *Pseudogonia rufifrons* (Wiedemann, 1830) – паразит гусениц совок
10323. *Senometopia pollinosa* (Mesnil, 1941) – Уфмс 1960 (Гирфанова, 1962а)
10324. *Smidtia amoena* (Meigen, 1824) – Блрц 1959-1960 обычен (Гирфанова, 1962а)
10325. *Spallanzania hebes* (Fallen, 1820) – Блрц, БГПЗ 1959-1960 (Гирфанова, 1962а)
10326. *Sturmia bella* (Meigen, 1824) – паразит гусениц крапивницы и других бабочек
10327. *Thelymorpha marmorata* (Fabricius, 1805) – Зилр 1959 (Гирфанова, 1962а)
10328. *Winthemia quadripustulata* (Fabricius, 1794)
10329. *Winthemia venusta* (Meigen, 1824)
10330. *Zenillia libatrix* (Panzer, 1798)

Подсемейство Phasiinae

10331. *Cylindromyia brassicaria* (Fabricius, 1775)

10332. *Cylindromyia intermedia* (Meigen, 1824) – Бакл, Уфмс 1953-1959 (Гирфанова, 1962а)
10333. *Cylindromyia interrupta* (Meigen, 1824) – Уфа 2023
10334. *Cylindromyia auriceps* (Meigen, 1838)
10335. *Cylindromyia pusilla* (Meigen, 1824) – Мияк, Бакл, Бижб 1953, Уфмс, Белебей 1953-1954 (Гирфанова, 1962а)
10336. *Ectophasia crassipennis* (Fabricius, 1794) – Толстокрылая ежемуха
10337. *Ectophasia oblonga* (Robineau-Desvoidy, 1830)
10338. *Elomya lateralis* (Meigen, 1824)
10339. *Gymnosoma clavatum* (Rohdendorf, 1947) – Уфа 2023
10340. *Gymnosoma nudifrons* Herting, 1966
10341. *Gymnosoma rotundatum* (Linnaeus, 1758)
10342. *Phasia aurigera* (Egger, 1860) – Иглн 2019-2023
10343. *Phasia obesa* (Fabricius, 1798) – Ишмб 2023
10344. *Phasia subcoleoptrata* (Linnaeus, 1767) – Стрк 2020
10345. *Subclytia rotundiventris* (Fallén, 1820) – Кушн 2023

Подсемейство Tachininae

10346. *Actia crassicornis* (Meigen, 1824) – Уфмс 1954 (Гирфанова, 1962а)
10347. *Demoticus plebejus* (Fallén, 1810) – Шарн 2024
10348. *Dexiosoma caninum* (Fabricius, 1781) – паразит личинок хрущей
10349. *Eurithia consobrina* (Meigen, 1824)
10350. *Goniocera versicolor* (Fallen, 1820)
10351. *Linnaemya olsufjevi* Zimin, 1954
10352. *Linnaemya vulpina* (Fallen, 1810) – Чишм 2024
10353. *Lypha dubia* Fallén, 1810 – Уфа 2020
10354. *Microphthalma europaea* Egger 1860 – паразит июльского хруща
10355. *Nemoraea pellucida* (Meigen, 1824) – Ишмб 2022
10356. *Nowickia ferox* (Panzer, 1809) – Мишк 2019, Нефтекамск 2019
10357. *Panzeria truncata* (Zetterstedt, 1838)
10358. *Panzeria vagans* (Meigen, 1824) – БГПЗ 1960, обычен (Гирфанова, 1962а)
10359. *Peleteria rubescens* (Robineau-Desvoidy, 1830)
10360. *Siphona sp.* – Кмск 2020
10361. *Solieria pacifica* (Meigen, 1824) – Блрц 1959 (Гирфанова, 1962а)
10362. *Tachina fera* (Linnaeus, 1761) – Бурз
10363. *Tachina grossa* (Linnaeus, 1758) – паразит личинок пилильщиков
10364. *Tachina lurida* (Fabricius, 1781) – Уфа 2020
10365. *Tachina ursina* Meigen, 1824 – Уфмс 1960 (Гирфанова, 1962а)

Семейство Tephritidae – Мухи-пестрокрылки

Подсемейство Tephritinae

10366. *Acinia biflexa* (Loew, 1844)
10367. *Acinia corniculata* (Zetterstedt, 1819)
10368. *Campiglossa absinthii* (Fabricius, 1805) – Полынная кампиглосса
10369. *Campiglossa argyrocephala* (Loew, 1844) – Октябрьский 2024

10370. *Campiglossa contingens* (Becker, 1907)
10371. *Campiglossa irrorata* (Fallen, 1814) – на соцветиях полыни *Artemesia campestris*
10372. *Campiglossa loewiana* (Hendel, 1927) – на соцветиях крестовника Якова
10373. *Campiglossa misella* (Loew, 1869) – Уфа 2019
10374. *Campiglossa sp.* – из соцветий *Galatella rossica*
10375. *Chaetorellia jaceae* (Robineau-Desvoidy, 1830) – на соцветиях васильков
10376. *Chaetorellia loricata* (Rondani, 1870) – на соцветиях василька чешуйчатого
10377. *Chaetostomella cylindrica* (Robineau-Desvoidy, 1830) – минер соцветий и цветолож васильков
10378. *Dioxyna bidentis* (Robineau-Desvoidy, 1830) – заселяет семена череды трехраздельной *Bidens tripartita*
10379. *Dithryca guttularis* (Meigen, 1826) – на корнях тысячелистника
10380. *Ensina sonchi* (Linnaeus, 1767) – заселяет различные виды сложноцветных
10381. *Myopites inulaedyssentericae* Blot, 1827 – личинки развиваются в галлах в соцветиях *Inula hirta*
10382. *Noeeta pupillata* (Fallen, 1814) – на *Hyeraceum umbellatum*
10383. *Oxyna flavipennis* (Loew, 1844) – образуют галлы на корнях тысячелистника обыкновенного
10384. *Oxyna parietina* (Linnaeus, 1758) – в стеблях полыни обыкновенной
10385. *Tephritis angustipennis* (Loew, 1844) – на соцветиях *Ptarmica cartilaginea*
10386. *Tephritis bardanae* (Schrank, 1803) – на лопухах
10387. *Tephritis cometa* (Loew, 1840) – на бодяках *Cirsium oleraceum* и *Crepis sibirica*
10388. *Tephritis crepidis* Hendel, 1927 – на соцветиях скерды сибирской *Crepis sibirica*
10389. *Tephritis dilacerata* (Loew, 1846) – на разных луговых растениях
10390. *Tephritis dioscurea* (Loew, 1856) – из соцветий *Pyretrum corymbosum*
10391. *Tephritis fallax* (Loew, 1844)
10392. *Tephritis hendeliana* Hering, 1944 – заселяет соцветия *C. thoermeri*
10393. *Tephritis hyoscyami* (Linnaeus, 1758) – в соцветиях чертополоха кудрявого *C.crispus*
10394. *Tephritis neesii* (Meigen, 1830) – кормовое растение *Leucanthemum ircutianum*
10395. *Tephritis tanaceti* Hering, 1956 – на соцветиях *Tanacetum vulgare*
10396. *Terellia ceratocera* (Hendel, 1913) – на цветоложе *C.scabiosa*
10397. *Terellia colon* (Meigen, 1826) – заселяет соцветия *C.scabiosa*
10398. *Terellia longicauda* (Meigen, 1838) – заселяет *C.vulgare* и *C.serrulatum*
10399. *Terellia ruficauda* (Fabricius, 1794) – на бодяках двух видов
10400. *Terellia serratulae* (Linnaeus, 1758) – минер соцветий и цветоложа *C.thoermeri*
10401. *Terellia tussilaginis* (Fabricius, 1775) – на татарнике и чертополохе
10402. *Terellia virens* (Loew, 1846) – в соцветиях *C.pseudomaculosa*

10403. *Terellia winthemi* (Meigen, 1826) – в соцветиях *C.crispus* и *C.acanthoides*
10404. *Terellia sp.* – из соцветий *C.acanthoides*
10405. *Trupanea stellata* (Fuessly, 1775) – на 12 видах сложноцветных Уфа 2016, Гафр 2021, Байм 2025
10406. *Urophora affinis* (Frauenfeld, 1857) – заселяет соцветия *Centaurea pseudomaculosa*
10407. *Urophora cardui* (Linnaeus, 1758) – Чертополоховая пестрокрылка, заселяет только *Cirsium setosum*
10408. *Urophora christophi* Loew, 1869 – на бодяке *C.setosum*
10409. *Urophora coronata* Bassov, 1990 – в соцветиях василька русского (*Centaurea ruthenica*)
10410. *Urophora cuspidata* (Meigen, 1826) – Остроконечная урофора, на васильке русском
10411. *Urophora jaceana* (Hering, 1934) – Васильковая урофора, на *Centauria jacena*, *C.pseudophrigia*
10412. *Urophora maura* (Frauenfeld, 1857) – образует многокамерные галлы в соцветиях *Inula hirta*
10413. *Urophora quadrifasciata* (Meigen, 1826) – на васильке
10414. *Urophora solstitialis* (Linnaeus, 1758) – на соцветиях василька русского
10415. *Urophora stigma* (Loew, 1840) – на кормовых растениях *Achillea millefolium, A.nobilis*
10416. *Urophora stylata* (Fabricius, 1775) – на серпухе *Serratula coronata*
10417. *Urophora variabilis* Loew, 1869 – на *Cardus thoermeri*
10418. *Xanthomyia alpestris* (Pokorny, 1887)
10419. *Xyphosia miliaria* (Schrank, 1781) – Пестрокрылка овсяная, на соцветиях бодяка и чертополоха

Подсемейство Trypetinae

10420. *Carpomya schineri* (Loew, 1856) – Зилр 2021
10421. *Myoleja lucida* (Fallen, 1826) – Миолия секироносная
10422. *Philophylla caesio* (Harris, 1780)
10423. *Rhagoletis alternata* (Fallen, 1814) – в плодах разных видов шиповника
10424. *Rhagoletis cerasi* (Linnaeus, 1758) – личинки питаются мякотью плодов кормового растения

Семейство Ulidiidae – Лентокрылки

10425. *Ceroxys hyalinata* (Panzer, 1798) – Мелз 2022
10426. *Ceroxys munda* (Loew, 1868) – Кгрч 2020, Уфа 2018
10427. *Ceroxys urticae* (Linnaeus, 1758) – Уфа 2022-2023, Шарн 2024.
10428. *Myennis octopunctata* (Coquebert, 1798) – Давл 2019
10429. *Otites centralis* (Fabricius, 1805) – Уфа 2023
10430. *Otites formosa* (Panzer, 1798) – Байм 2022, Чишм 2024, Стбш 2025
10431. *Physiphora alceae* (Preyssler, 1791) – Шарн 2024
10432. *Seioptera vibrans* (Linnaeus, 1758) – Уфа 2022, Кушн 2022, Уфмс 2021, Ермк 2019

Инфраотряд Tabanomorpha

Семейство Athericidae

10433. *Atherix ibis* (Fabricius, 1798) – Ибисовая муха

Семейство Rhagionidae – Мухи-бекасницы

10434. *Chrysopilus nubecula* (Fallen, 1814)
10435. *Rhagio scolopaceus* (Linnaeus, 1758) – Обыкновенная бекасница
10436. *Rhagio tringarius* (Linnaeus, 1758)
10437. *Symphoromyia immaculata* (Meigen, 1804) – Агидель

Семейство Tabanidae – Слепни

10438. *Atylotus fulvus* (Meigen, 1804) – Рыжий слепень
10439. *Atylotus rusticus* (Linnaeus, 1767) – Деревенский слепень
10440. *Chrysops caecutiens* (Linnaeus, 1758) – Лесной пестряк – обычен
10441. *Chrysops flavipes* Meigen, 1804 – Желтоногий пестряк
10442. *Chrysops nigripes* Zetterstedt, 1838 – Черноногий пестряк
10443. *Chrysops relictus* Meigen, 1820 – Обыкновенный пестряк – обычен
10444. *Chrysops rufipes* Meigen, 1820 – Иглн 2025
10445. *Chrysops sepulcralis* (Fabricius, 1794) – Траурный пестряк
10446. *Chrysops viduatus* (Fabricius, 1794) – Украшенный пестряк – обычен
10447. *Haematopota crassicornis* Wahlberg, 1848 – Черноусая дождёвка
10448. *Haematopota italica* Meigen, 1804 – Западная дождёвка
10449. *Haematopota pallidula* (Krober, 1922) – Ранняя дождёвка
10450. *Haematopota pluvialis* (Linnaeus, 1758) – Обыкновенная дождёвка – обычна
10451. *Haematopota subcylindrica* Pandelle, 1883 – Светлая дождёвка
10452. *Haematopota turkestanica* (Krober, 1922) – Туркестанская дождёвка
10453. *Heptatoma pellucens* (Fabricius, 1777) – Обыкновенная длинноуска – Ермк 2018
10454. *Hybomitra arpadi* (Szilady, 1923) – Слепень Арпада
10455. *Hybomitra bimaculata* (Macquart, 1826) – Полуденный слепень – обычен
10456. *Hybomitra borealis* (Fabricius, 1779) – Бурз, БГПЗ (Кучеров, 1986)
10457. *Hybomitra distinguenda* (Verrall, 1909) – Лесной слепень
10458. *Hybomitra expollicata* (Pandelle, 1883) – Чернополосый слепень
10459. *Hybomitra kauri* Chvala & Lyneborg, 1970 – Слепень Каури
10460. *Hybomitra lundbecki* Lyneborg, 1959 – Слепень Лундбека – обычен
10461. *Hybomitra lurida* (Fallen, 1817) – Ранний слепень
10462. *Hybomitra montana* (Meigen, 1820) – Обычный слепень
10463. *Hybomitra muehlfeldi* (Brauer, 1880) – Слепень Мюльфельда
10464. *Hybomitra nigricornis* (Zetterstedt, 1838) – Черноусый слепень
10465. *Hybomitra nitidifrons* (Szilady, 1914) – Гололобый слепень
Hybomitra nitidifrons confiformis Chvala & Moucha, 1971 – Зилр, хребет Шайтан-Тау (Кучеров, 1986)
10466. *Hybomitra solstitialis* (Meigen, 1820) – Узколобый слепень
10467. *Hybomitra tarandina* (Linnaeus, 1758) – Олений слепень
10468. *Philipomyia graeca* (Fabricius, 1794)

10469. *Silvius alpinus* (Scopoli, 1763) – Золотистый сильвий
10470. *Tabanus autumnalis* Linnaeus, 1761 – Большой слепень
10471. *Tabanus bovinus* Linnaeus, 1758 – Бычий слепень – обычен
10472. *Tabanus bromius* Linnaeus, 1758 – Серый слепень
10473. *Tabanus cordiger* Meigen & Wiedemann, 1820 – Широколобый слепень
10474. *Tabanus glaucopis* Meigen, 1820 – Поздний слепень
10475. *Tabanus maculicornis* Zetterstedt, 1842 – Черно-серый слепень
10476. *Tabanus miki* Brauer, 1880 – Слепень Мика
10477. *Tabanus sudeticus* Zeller, 1842 – Судетский слепень – обычен

Инфраотряд Stratiomyomorpha

Семейство Stratiomyidae – Мухи-львинки

10478. *Chloromyia formosa* (Scopoli, 1763) – Чишм 2017, Уфа, Иглн
10479. *Chloromyia speciosa* (Macquart, 1834)
10480. *Hermetia illucens* (Linnaeus, 1758) – Давл 2020
10481. *Microchrysa polita* (Linnaeus, 1758) – Уфа, Иглн, Шарн
10482. *Nemotelus sp.* – Чишм 2024
10483. *Odontomyia angulata* (Panzer, 1798) – Ермк 2021
10484. *Oplodontha viridula* (Fabricius, 1775) – Иглн 2025, Стбш 2025
10485. *Oxycera trilineata* (Linnaeus, 1767) – Дюрт 2025
10486. *Sargus cuprarius* (Linnaeus, 1758)
10487. *Stratiomys chamaeleon* (Linnaeus, 1758) – Муха-львинка
10488. *Stratiomys longicornis* (Scopoli, 1763) – Салават 2009, Уфа 2024
10489. *Stratiomys singularior* (Harris, 1776) – Ермк 2021

Инфраотряд Xylophagomorpha

Семейство Xylophagidae

10490. *Coenomyia ferruginea* (Scopoli, 1763) – Бурз

Deuterostomia – Вторичноротые

Тип Chordata – Хордовые

Подтип Vertebrata – Позвоночные

Надкласс Osteichthyes – Костные рыбы

Класс Actinopterygii – Лучеперые рыбы

Подкласс Chondrostei – Хрящекостные рыбы

Отряд Acipenseriformes – Осетрообразные

Семейство Acipenseridae – Осетровые

– *Acipenser gueldenstaedtii* (Brandt, 1833) – Русский осетр (нет встреч более 50 лет)

10491. *Acipenser ruthenus* Linnaeus, 1758 – Стерлядь

Подкласс Neopterygii – Новоперые рыбы

Надотряд Teleostei – Костистые рыбы

Отряд Clupeiformes – Сельдеобразные

Семейство Clupeidae – Сельдевые

10492. *Clupeonella cultriventris* (Nordmann, 1840) – Черноморско-каспийская тюлька

Отряд Cypriniformes – Карпообразные

Семейство Cobitidae – Вьюновые

10493. *Cobitis melanoleuca* Nichols, 1925 – Сибирская щиповка
10494. *Cobitis taenia* Linnaeus, 1758 – Обыкновенная щиповка
10495. *Misgurnus fossilis* (Linnaeus, 1758) – Обыкновенный вьюн

Семейство Cyprinidae – Карповые

10496. *Abramis brama* (Linnaeus, 1758) – Лещ
10497. *Alburnoides rossicus* Berg, 1924 – Русская быстрянка
10498. *Alburnus alburnus* (Linnaeus, 1758) – Обыкновенная уклея – массово
10499. *Ballerus ballerus* (Linnaeus, 1758) – Синец
10500. *Ballerus sapa* (Pallas, 1814) – Белоглазка (сапа, глазач)
10501. *Blicca bjoerkna* (Linnaeus, 1758) – Густера
10502. *Carassius auratus* (Linnaeus, 1758) – Золотой карась – интродуцент
10503. *Carassius carassius* (Linnaeus, 1758) – Обыкновенный карась – обычен
10504. *Carassius gibelio* (Bloch, 1782) – Серебряный карась – интродуцент
10505. *Chondrostoma variabile* Yakovlev, 1870 – Волжский подуст
10506. *Cyprinus carpio* Linnaeus, 1758 – Сазан (его одомашненная форма – карп)
10507. *Gobio volgensis* Vasil'eva, Mendel, Vasil'ev, Lusk & Lusková, 2008 – Волжский пескарь
10508. *Leucaspius delineatus* (Heckel, 1843) – Обыкновенная верховка
10509. *Leuciscus aspius* (Linnaeus, 1758) – Обыкновенный жерех
10510. *Leuciscus idus* (Linnaeus, 1758) – Язь
10511. *Leuciscus leuciscus* (Linnaeus, 1758) – Обыкновенный елец
10512. *Pelecus cultratus* (Linnaeus, 1758) – Чехонь
10513. *Phoxinus isetensis* (Georgi, 1775) – Северный гольян
10514. *Romanogobio albipinnatus* (Lukasch, 1933) – Белоперый пескарь – редок
10515. *Rutilus rutilus* (Linnaeus, 1758) – Плотва (сорожка)
10516. *Scardinius erythrophthalmus* (Linnaeus, 1758) – Красноперка
10517. *Squalius cephalus* (Linnaeus, 1758) – Голавль
10518. *Tinca tinca* (Linnaeus, 1758) – Линь

Семейство Nemacheilidae

10519. *Barbatula barbatula* (Linnaeus, 1758) – Усатый голец

Отряд Siluriformes – Сомообразные

Семейство Siluridae – Сомовые

10520. *Silurus glanis* Linnaeus, 1758 – Европейский сом

Отряд Salmoniformes – Лососеобразные

Семейство Coregonidae – Сиговые

10521. *Coregonus albula* (Linnaeus, 1758) – Европейская ряпушка
10522. *Coregonus lavaretus* (Linnaeus, 1758) – Обыкновенный сиг (в оз. Банное гибридные формы: *Coregonus lavaretus ludoga* (Polyakov, 1874) – Сиг-лудога х *Coregonus laveratus maraenoides* (Poljakov, 1874) – Чудской сиг)
10523. *Coregonus peled* (Gmelin, 1789) – Пелядь

Семейство Salmonidae – Лососевые

10524. *Hucho taimen* (Pallas, 1773) – Таймень
10525. *Salmo caspius* (Kessler, 1877) – Ручьевая форель (резидентная форма каспийской кумжи)

Семейство Thymallidae – Хариусовые

10526. *Thymallus arcticus* (Pallas, 1776) – Западносибирский хариус
10527. *Thymallus thymallus* (Linnaeus, 1758) – Европейский хариус

Отряд Esociformes – Щукообразные

Семейство Esocidae – Щуковые

10528. *Esox lucius* Linnaeus, 1758 – Обыкновенная щука – обычна

Отряд Gadiformes – Трескообразные

Семейство Lotidae – Налимовые

10529. *Lota lota* (Linnaeus, 1758) – Налим

Отряд Gasterosteiformes – Колюшкообразные

Семейство Gasterosteidae – Колюшковые

10530. *Pungitius platygaster* (Kessler, 1859) – Малая южная колюшка

Отряд Syngnathiformes – Иглообразные

Семейство Syngnathidae – Игловые

10531. *Syngnathus abaster* Risso, 1827 – Черноморская пухлощекая игла-рыба

Отряд Scorpaeniformes – Скорпенообразные

Семейство Cottidae – Керчаковые

10532. *Cottus koshewnikowi* Gratzianov, 1907– Русский подкаменщик

Отряд Perciformes – Окунеобразные

Семейство Gobiidae – Бычковые

10533. *Neogobius melanostomus* (Pallas, 1814) – Бычок-кругляк
10534. *Ponticola ratan* (Nordmann, 1840) – Бычок ратан

Семейство Odontobutidae – Головешковые

10535. *Perccottus glenii* Dybowski 1877 – Головешка-ротан

Семейство Percidae – Окуневые

10536. *Gymnocephalus cernuus* (Linnaeus, 1758) – Обыкновенный ерш
10537. *Perca fluviatilis* Linnaeus, 1758 – Речной окунь – обычен
10538. *Sander lucioperca* (Linnaeus, 1758) – Обыкновенный судак
10539. *Sander volgensis* (Gmelin, 1789) – Берш

Разводятся в аквакультуре и могут быть встречены в водоемах: *Ctenopharyngodon idella* (Vallenciennes, 1844) – Белый амур; *Hypophthalmichthys molitrix* (Valenciennes, 1844) –

Белый толстолобик; *Aristichthys nobilis* (Richardson, 1846) – Пестрый толстолобик; *Ictalurus punctatus* (Rafinesque, 1818) – Канальный сомик; *Oncorhynchus mykiss* (Walbaum, 1792) – Камчатская микижа (= стальноголовый лосось)

Класс Amphibia – Земноводные

Отряд Caudata – Хвостатые

Семейство Hynobiidae – Углозубые

10540. *Salamandrella keyserlingii* Dybowski, 1870 – Сибирский углозуб – север

Семейство Salamandridae – Саламандровые

10541. *Lissotriton vulgaris* (Linnaeus, 1758) – Обыкновенный тритон
10542. *Triturus cristatus* (Laurenti, 1768) – Гребенчатый тритон – редок

Отряд Anura – Бесхвостые

Семейство Bombinatoridae – Жерлянки

10543. *Bombina bombina* (Linnaeus, 1758) – Краснобрюхая жерлянка

Семейство Bufonidae – Настоящие жабы

10544. *Bufo bufo* (Linnaeus, 1758) – Серая жаба – леса, редка
10545. *Bufotes viridis* (Laurenti, 1768) – Зеленая жаба – обычна, синантроп

Семейство Pelobatidae – Чесночницы

10546. *Pelobates vespertinus* (Pallas, 1771) – Чесночница Палласа

Семейство Ranidae – Настоящие лягушки

10547. *Pelophylax esculentus* (Linnaeus, 1758) – Съедобная лягушка – запад, редка
10548. *Pelophylax lessonae* (Camerano, 1882) – Прудовая лягушка
10549. *Pelophylax ridibundus* (Pallas, 1771) – Озерная лягушка – обычна
10550. *Rana arvalis* Nilsson, 1842 – Остромордая лягушка – обычна
10551. *Rana temporaria* Linnaeus, 1758 – Травяная лягушка

Класс Reptilia – Пресмыкающиеся

Отряд Testudines – Черепахи

Семейство Emydidae – Пресноводные черепахи

10552. *Emys orbicularis* (Linnaeus, 1758) – Болотная черепаха – юг

Отряд Squamata – Чешуйчатые

Подотряд Lacertilia – Ящерицы

Семейство Anguidae – Веретеницевые

10553. *Anguis colchica* (Nordmann, 1840) – Веретеница – леса

Семейство Lacertidae – Настоящие ящерицы

10554. *Lacerta agilis* Linnaeus, 1758 – Прыткая ящерица – обычна, степи, опушки
10555. *Zootoca vivipara* (Lichtenstein, 1823) – Живородящая ящерица – леса

Подотряд Serpentes – Змеи

Семейство Colubridae – Ужеобразные

10556. *Coronella austriaca* Laurenti, 1768 – Медянка – опушки
10557. *Elaphe dione* (Pallas, 1773) – Узорчатый полоз – юг

10558. *Natrix natrix* (Linnaeus, 1758) – Обыкновенный уж – обычен
10559. *Natrix tessellata* (Laurenti, 1768) – Водяной уж

Семейство Viperidae – Гадюковые

10560. *Vipera berus* (Linnaeus, 1758) – Обыкновенная гадюка – леса, лесостепи
10561. *Vipera renardi* (Cristoph, 1861) – Степная гадюка – юг, степи

Класс Aves – Птицы (Валуев В.А.)

Для птиц приведены следующие сведения. Численность: Ст – стабильная, Ув – увеличивается, Сокр – сокращается; указывается по сравнению двух десятилетий: 2004-2013 гг. и 2014-2023 гг. Обилие (для птиц вне населенных пунктов) – приведено по А.П. Кузякину (1962): «Вм» – весьма многочисленный вид (более 100 особей/км²), «Мн» – многочисленный вид (10-100), «Об» – обыкновенный (1-10), «Р» – редкий (0,1-0,9), «Ор» – очень редкий (0,01-0,09), «Чр» – чрезвычайно редкий (0,001-0,009) и В.А. Валуевым (2019), где: «Ги» – на грани исчезновения (0,0001-0,0009) и «Ив» – практически исчезнувший вид (0,00001-0,00009). Численность видов, чьё обилие находится в категории «Ги», для Башкирии находится в пределах 14-129 особей (7-65 пар), в категории «Ив» – в границах 1-13 (т.е. не более 6 пар). Бальная шкала обилия для хищных птиц по В.А. Валуеву (2007в): Весьма многочисленный вид – 1 и более особей/км²; Многочисленный - 0,10-0,99; Обычный - 0,01-0,09, Редкий 0,001-0,009; Очень редкий - 0,0001-0,0009, Чрезвычайно редкий - 0,00001 и меньше.

Отряд Gaviiformes – Гагарообразные

Семейство Gaviidae – Гагаровые

10562. *Gavia arctica* (Linnaeus, 1758) – Чернозобая гагара (Ув, Ив). Чишм, Учлн, Туйм, Бузд, Байм (Валуев, 2008а, 2020а; Галиева, 2009)
10563. *Gavia stellata* (Pontoppidan, 1763) – Краснозобая гагара (пролетный). Мияк 2002 (Валуев, 2016г) и Нурм 2005 (Валуев, 2008)

Отряд Podicipediformes – Поганкообразные

Семейство Podicipedidae – Поганковые

10564. *Podiceps auritus* (Linnaeus, 1758) – Красношейная поганка (Сокр, Ги). Чишм 2002, Иглн 2003, Мелз 2003, Фёдр и Хайб 2004 (Валуев, 2002, 2004в, 2008б, 2014б, 2015в; Торгашов, 2003а). В 2012 г. было предложено внести этот вид в Красную книгу (Валуев, 2012б)
10565. *Podiceps cristatus* (Linnaeus, 1758) – Чомга (Сокр, Ор). Предпочитает открытые большие водоёмы.
10566. *Podiceps grisegena* (Boddaert, 1783) – Серощекая поганка (Сокр, Ги). Ещё в 2007 по 2018 гг. считалась наиболее редким видом республики (Валуев, 2015б, 2019а).
10567. *Podiceps nigricollis* C. L. Brehm, 1831 – Черношейная поганка (Сокр, Чр). Ещё 15 лет назад встречалась почти на всех озёрах республики.

Отряд Pelecaniformes – Веслоногие

Семейство Pelecanidae – Пеликановые

Pelecanus crispus Bruch, 1832 – Кудрявый пеликан (залетный)
Pelecanus onocrotalus Linnaeus, 1758 – Розовый пеликан (залетный)

Семейство Phalacrocoracidae – Баклановые

10568. *Phalacrocorax carbo* (Linnaeus, 1758) – Большой баклан (Ув, Чр). О нахождении этого вида в 1891 г. Башкирии в XIX в. сообщал П.П. Сушкин

(1897). В 2002 г. он появился снова (Баянов, Валуев, 2002). С тех пор большой баклан распространился до северной границы Башкирии (Галиева, 2008в, Валуев, 2013б).

Отряд Ciconiiformes – Аистообразные

Семейство Ardeidae – Цаплевые

10569. *Ardea cinerea* Linnaeus, 1758 – Серая цапля (Сокр, Р)

Ardea purpurea Linnaeus, 1766 – Рыжая цапля (залетный). Впервые обнаружена в 2022 в Давл. До сих пор встречается только там.

Ardeola ralloides (Scopoli, 1769) – Жёлтая цапля (залетный). Впервые обнаружена в Башкирии в 2001 в Брск (Валуев, 2008б).

10570. *Botaurus stellaris* (Linnaeus, 1758) – Большая выпь (Сокр, Ги). Ещё в конце XX в. встречалась почти на всех водоёмах республики. Но уже во втором десятилетии стала считаться редким видом (Валуев, 2023б).

Bubulcus ibis (Linnaeus, 1758) – Египетская цапля (залетный). Впервые наблюдалась в 2025 в Кркм (Подмарёв, 2025).

10571. *Casmerodius albus* (Linnaeus, 1758) – Большая белая цапля (Ув, Ги). Появилась в республике в 1960-х годах в Зауралье республики; с 2002 г. стала гнездиться в Предуралье (Валуев, 2008б). К 2025 г. распространилась до Камы. В 2021 г. отмечена как зимующий вид (Загорская, 2021).

10572. *Ixobrychus minutus* (Linnaeus, 1766) – Волчок (Ст, Ив). На протяжении XX и XXI вв. встречается единично (Валуев, 2025б)

10573. *Nycticorax nycticorax* (Linnaeus, 1758) – Кваква (Ст, Ив). В 1999 г. пара регистрировалась в Чишм (Валуев В., Валуев К., 2001), в 2008 г. в Туйм (Галиева, 2008а), в 2018 г. в Илиш (Валуев, Зернов, 2018) и в 2020 г. в Чекм (Мигранов, Мигранова, 2020).

Plegadis falcinellus (Linnaeus, 1766) – Каравайка (залетный). Впервые обнаружена в 2020 в Давл и Стмк.

Семейство Ciconiidae – Аистовые

10574. *Ciconia ciconia* (Linnaeus, 1758) – Белый аист (Ув, Ив). Распространился на гнездовании до восточных границ Башкирии.

10575. *Ciconia nigra* (Linnaeus, 1758) – Черный аист (Ст, Ив). Несколько пар обитает только в горных ландшафтах республики.

Отряд Phoenicopteriformes – Фламингообразные

Семейство Phoenicopteridae – Фламинговые

Phoenicopterus roseus Pallas, 1811 – Обыкновенный фламинго (залетный)

Отряд Anseriformes – Гусеобразные

Семейство Anatidae – Утиные

Aix galericulata (Linnaeus, 1758) – Мандаринка (залетный)

10576. *Anas acuta* Linnaeus, 1758 – Шилохвость (Сокр, Ги)

10577. *Anas clypeata* Linnaeus, 1758 – Широконоска (Сокр, Ор)

10578. *Anas crecca* Linnaeus, 1758 – Чирок-свистунок (Сокр, Ор)

10579. *Anas penelope* Linnaeus, 1758 – Свиязь (Сокр, Ор)
10580. *Anas platyrhynchos* Linnaeus, 1758 – Кряква (Сокр, Об)
10581. *Anas querquedula* Linnaeus, 1758 – Чирок-трескунок (Ст, Р)
10582. *Anas strepera* Linnaeus, 1758 – Серая утка (Сокр, Ор)
10583. *Anser albifrons* (Scopoli, 1769) – Белолобый гусь (пролетный)
10584. *Anser anser* (Linnaeus, 1758) – Серый гусь (Ув, Ги). Основное место гнездование – Зауралье Башкирии.
10585. *Anser caerulescens* (Linnaeus, 1758) – Белый гусь (пролетный)
10586. *Anser erythropus* (Linnaeus, 1758) – Пискулька (пролетный)
10587. *Anser fabalis* (Latham, 1787) – Гуменник (пролетный)
10588. *Aythya ferina* (Linnaeus, 1758) – Красноголовый нырок (Сокр, Ор)
10589. *Aythya fuligula* (Linnaeus, 1758) – Хохлатая чернеть (Сокр, Ор)
10590. *Aythya marila* (Linnaeus, 1761) – Морская чернеть (пролетный)
10591. *Aythya nyroca* (Guldenstadt, 1770) – Белоглазый нырок (Ув, Ив). В 2007 г. регистрировался в Бузд (Галиева, 2008б), в 2012 г. в Уфмс (Валуев, 2012а), в 2016 г. в Чишм (Валуев, 2016б) и в 2018 г. – в Илиш (Валуев, Зернов, 2018).
10592. *Branta bernicla* (Linnaeus, 1758) – Черная казарка (пролетный). Отмечена в Крмс в 1983 (Валуев, 1984) и в 1985 (Валуев, 1989а). В 2016 г. наблюдалась в Давл (Валуев, 2016а). Наблюдалась в северо-западном регионе (Валуев, 2019а).
10593. *Branta leucopsis* (Bechstein, 1803) – Белощекая казарка (пролетный)
10594. *Branta ruficollis* (Pallas, 1769) – Краснозобая казарка (пролетный)
10595. *Bucephala clangula* (Linnaeus, 1758) – Гоголь (Сокр, Чр)
10596. *Clangula hyemalis* (Linnaeus, 1758) – Морянка (пролетный)
10597. *Cygnus bewickii* Yarrell, 1830 – Малый лебедь (пролетный)
Cygnus columbianus (Ord, 1815) – Американский лебедь (залетный)
10598. *Cygnus cygnus* (Linnaeus, 1758) – Лебедь-кликун (Ув, Ги). После 120-летнего перерыва вновь появился в Башкирии и стал гнездиться.
10599. *Cygnus olor* (Gmelin, 1803) – Лебедь-шипун (Ув, Ор). Обитает почти на всех крупных и средних озёрах республики.
10600. *Melanitta fusca* (Linnaeus, 1758) – Турпан (Сокр, Ив)
10601. *Melanitta nigra* (Linnaeus, 1758) – Синьга (пролетный)
10602. *Mergellus albellus* (Linnaeus, 1758) – Луток (Ув, Ги)
10603. *Mergus merganser* Linnaeus, 1758 – Большой крохаль (Сокр, Ор)
10604. *Mergus serrator* Linnaeus, 1758 – Длинноносый крохаль (пролетный)
10605. *Netta rufina* (Pallas, 1773) – Красноносый нырок (Ув, Ги)
Oxyura leucocephala (Scopoli, 1769) – Савка (залетный). Обитала в Блвр в 1894-1897 гг. (Сушкин, 1897). В сентябре 2022 наблюдалась в Абзл.
10606. *Tadorna ferruginea* (Pallas, 1764) – Огарь (Ст, Ор). Распространился до северных районов Башкирии.
10607. *Tadorna tadorna* (Linnaeus, 1758) – Пеганка (Ув, Ги)

Отряд Falconiformes – Соколообразные

Подотряд Accipitri – Ястребы

Семейство Accipitridae – Ястребиные

Accipiter brevipes (Severtsov, 1850) – Европейский тювик (залетный). Впервые обнаружен в 2013 в Мелз.

10608. *Accipiter gentilis* (Linnaeus, 1758) – Тетеревятник (Сокр, Мн)

Accipiter gularis (Temminck et Schlegel, 1844) – Малый перепелятник (залетный). Уфа (Энгель, 2020).

10609. *Accipiter nisus* (Linnaeus, 1758) – Перепелятник (Ув, Вм)

Aegypius monachus (Linnaeus, 1766) – Черный гриф (залетный). Зарегистрирован в 2025 в Бурз.

10610. *Aquila chrysaetos* (Linnaeus, 1758) – Беркут (Ст, Чр). На протяжении последних 100 лет встречи с ним единичны. Этот вид часто путают с особями могильника, у которых не проявился белый цвет на плечевых перьях (Валуев, 2016в). Молодой обессиленный беркут, прилетевший к людям за едой, был поражен аспергиллезом (Валуев, Файзуллина, 2007).

10611. *Aquila clanga* Pallas, 1811 – Большой подорлик (Ст, Ор)

10612. *Aquila heliaca* Savigny, 1809 – Могильник (Ст, Р)

10613. *Aquila nipalensis* Hodgson, 1833 – Степной орел (Ст, Чр)

10614. *Buteo buteo* (Linnaeus, 1758) – Канюк (Ув, Р)

10615. *Buteo lagopus* (Pontoppidan, 1763) – Зимняк (Ув, Об)

10616. *Buteo rufinus* (Cretzschmar, 1827) – Курганник (Ст, Чр). Встречи с этим видом единичны. В гнездовой период (28 июня) наблюдался в Клтс (Валуев, 2023в).

10617. *Circaetus gallicus* (Gmelin, 1788) – Змееяд (Ст, Ив)

10618. *Circus aeruginosus* (Linnaeus, 1758) – Болотный лунь (Сокр, Об)

10619. *Circus cyaneus* (Linnaeus, 1758) – Полевой лунь (Сокр, Чр)

10620. *Circus macrourus* (S. G. Gmelin, 1771) – Степной лунь (Ув, Чр)

10621. *Circus pygargus* (Linnaeus, 1758) – Луговой лунь (Ув, Ор)

Gyps fulvus (Hablizl, 1783) – Белоголовый сип (залетный). На протяжении столетия периодически встречается на территории Башкирии до 55° с.ш.

10622. *Haliaeetus albicilla* (Linnaeus, 1758) – Орлан-белохвост (Ст, Ги)

Haliaeetus leucoryphus (Pallas, 1771) – Орлан-долгохвост (залетный). Встречается в республике с 2001 (Валуев, 2002, 2012в).

10623. *Hieraaetus pennatus* J.F. (Gmelin, 1788) – Орёл-карлик (Ув, Чр). Вид, появившийся в Башкирии в 2019 г. (Ишбирдин, Ишмуратова, 2019; Валуев, 2019д) и к 2025 г. распространившийся почти по всей республике.

10624. *Milvus migrans* (Boddaert, 1783) – Черный коршун (Ув, Р)

10625. *Pernis apivorus* (Linnaeus, 1758) – Обыкновенный осоед (Ув, Чр).

Семейство Pandionidae – Скопиные

10626. *Pandion haliaetus* (Linnaeus, 1758) – Скопа (Сокр, Ив)

Подотряд Falconi – Соколы

Семейство Falconidae – Соколиные

- *Falco cherrug* Gray, 1834 – Балобан (исчез)

10627. *Falco columbarius* Linnaeus, 1758 – Дербник (Ст, Чр). За последние 50 лет зарегистрировано лишь около десятка встреч с этим соколом (Валуев, 2003б; Галиева, 2003). Встречается по всей территории республики.

10628. *Falco naumanni* Fleischer, 1818 – Степная пустельга (Сокр, Ив)

10629. *Falco peregrinus* Tunstall, 1771 – Сапсан (Ув, Р)

10630. *Falco rustiocolus* Linnaeus, 1758 – Кречет (пролетный)

10631. *Falco subbuteo* Linnaeus, 1758 – Чеглок (Ув, Р)

10632. *Falco tinnunculus* Linnaeus, 1758 – Обыкновенная пустельга (Ст, Чр)

10633. *Falco vespertinus* Linnaeus, 1766 – Кобчик (Сокр, Ги)

Отряд Galliformes – Курообразные

Семейство Tetraonidae – Тетеревиные

10634. *Bonasa bonasia* (Linnaeus, 1758) – Рябчик (Сокр, Ор)

10635. *Lagopus lagopus* (Linnaeus, 1758) – Белая куропатка (Ст, Ги)

10636. *Lyrurus tetrix* (Linnaeus, 1758) – Тетерев (Ув, Ор)

10637. *Tetrao urogallus* Linnaeus, 1758 – Глухарь (Сокр, Чр)

Семейство Phasianidae – Фазановые

10638. *Coturnix coturnix* (Linnaeus, 1758) – Перепел (Сокр, Ор)

10639. *Perdix perdix* (Linnaeus, 1758) – Серая куропатка (Сокр, Ор). Численность вида в республике снижается (Князев, 2021; Валуев, 2024)

Отряд Gruiformes – Журавлеобразные

Подотряд Grui – Журавли

Семейство Gruidae – Журавлиные

10640. *Anthropoides virgo* (Linnaeus, 1758) – Красавка (Сокр, Ги). Впервые зарегистрирован в 2003 в Хайб (Валуев, 2005а). В 2006 г. его наблюдали на хр. Ирендык (Валуев и др., 2006), а в 2021 г. – уже на западе Предуралья (Валуев, 2021а).

10641. *Grus grus* (Linnaeus, 1758) – Серый журавль (Сокр, Чр)

10642. *Grus leucogeranus* Pallas, 1773 – Стерх (пролетный)

Семейство Otididae – Дрофиные

– *Otis tarda* Linnaeus, 1758 – Дрофа (исчез)

10643. *Tetrax tetrax* (Linnaeus, 1758) – Стрепет (Ст, Ив). Впервые зарегистрирован в республике в 2000 г. (Барабашин, 2001) в долине р. Таналык. Второй раз – в 2006 в Байм (Валуев и др., 2006а). Изредка встречается не только в Зауралье, но и в Предуралье (Ишбирдин и др., 2017; Ишбирдин, 2018).

Подотряд Ralli – Пастушки

Семейство Rallidae – Пастушковые

10644. *Crex crex* (Linnaeus, 1758) – Коростель (Сокр, Ор)

10645. *Fulica atra* Linnaeus, 1758 – Лысуха (Ув, Р)

10646. *Gallinula chloropus* (Linnaeus, 1758) – Камышница (Сокр, Чр). Ещё в конце XX в. этот вид встречался почти на каждом водоёме республики. Позднее

численность его стала неуклонно падать. В 2019 г. было предложено внести эту птицу в Красную книгу Республики Башкортостан (Валуев, 2019е).

10647. *Porzana parva* (Scopoli, 1769) – Малый погоныш (Ст, Ги). Впервые этот вид зарегистрирован в Башкирии в 2012 г в Дюрт; затем в 2014 г. в Абзл (Валуев, 2014а). В 2022 г. регистрировался в Слвт (Валуев, 2022) и Давл. В 2025 в Давл и Уфе.

10648. *Porzana porzana* (Linnaeus, 1766) – Погоныш (Сокр, Ги)

10649. *Porzana pusilla* (Pallas, 1776) – Погоныш-крошка (Сокр, Ги)

10650. *Rallus aquaticus* Linnaeus, 1758 – Водяной пастушок (Сокр, Ив). Одиночные особи отмечены в 1891 под Уфой (Сушкин, 1897), в 1931 в Бурз (Кириков, 1952), в 2002 в Мелз (Торгашов, 2003б). Три особи найдены в 2010 в Чишм (Валуев, 2010). Позднее регистрировались в Учлн (2016), Кгрч (2022) и Давл (2025).

Отряд Charadriiformes – Ржанкообразные

Подотряд Charadrii – Кулики

Семейство Burhinidae – Авдотковые

Burhinus oedicnemus (Linnaeus, 1758) – Авдотка (залетный). Добыта в 1928 под Стерлитамаком (Ильичёв, Фомин, 1988). В 2014 зарегистрирована в Байм (Валуев, Загорская, 2014б).

Семейство Charadriidae – Ржанковые

10651. *Arenaria interpres* (Linnaeus, 1758) – Камнешарка (Пр)

Charadrius alexandrinus Linnaeus, 1758 – Морской зуек (залетный). Регистрировался в 2002 в Мелз (Торгашов, 2002).

10652. *Charadrius dubius* Scopoli, 1786 – Малый зуек (Сокр, Ор)

10653. *Charadrius hiaticula* Linnaeus, 1758 – Галстучник (Пр)

Chettusia gregaria (Pallas, 1771) – Кречетка (залетный). На протяжении более 100 лет встречается единично. Последний раз наблюдалась в 2020 в Байм (Артемьев, 2010).

10654. *Eudromias morinellus* (Linnaeus, 1758) – Хрустан. В Башкирии не регистрировался с 1990 г. Последние 10 лет встречается в нац. парке «Зюраткуль» в 20 км от границы с Учлн и в 30 км на восток от Блкт. Вполне возможно, несколько пар хрустана обитает и в горах Башкирии.

10655. *Pluvialis apricaria* (Linnaeus, 1758) – Золотистая ржанка (пролетный)

10656. *Pluvialis squatarola* (Linnaeus, 1758) – Тулес (пролетный)

10657. *Vanellus vanellus* (Linnaeus, 1758) – Чибис (Сокр, Р)

Семейство Recurvirostridae – Шилоклювковые

10658. *Himantopus himantopus* (Linnaeus, 1758) – Ходулочник (Ув, Чр). Впервые обнаружен в 2001 в Хайб, а к 2008 г. распространился и в Предуралье до широты Уфы (Валуев, 2008в).

Recurvirostra avosetta Linnaeus, 1758 – Шилоклювка (залетный)

Семейство Haematopodidae – Кулики-сороки

10659. *Haematopus ostralegus* Linnaeus, 1758 – Кулик-сорока (Сокр, Ор)

Семейство Scolopacidae – Бекасовые

10660. *Actitis hypoleucos* (Linnaeus, 1758) – Перевозчик (Ув, Р)
10661. *Arenaria interpres* (Linnaeus, 1758) – Камнешарка (пролетный)
10662. *Calidris alba* (Pallas, 1764) – Песчанка (пролетный)
10663. *Calidris alpina* (Linnaeus, 1758) – Чернозобик (пролетный)
10664. *Calidris canutus* (Linnaeus, 1758) – Исландский песочник (пролетный)
10665. *Calidris falcinellus* (Pontoppidan, 1763) – Грязовик (пролетный)
10666. *Calidris ferruginea* (Pontoppidan, 1763) – Краснозобик (пролетный)
10667. *Calidris minuta* (Leisler, 1812) – Кулик-воробей (пролетный)
10668. *Calidris temminckii* (Leisler, 1812) – Белохвостый песочник (пролетный)
10669. *Gallinago gallinago* (Linnaeus, 1758) – Бекас (Сокр, Р)
10670. *Gallinago media* (Latham, 1787) – Дупель (Сокр, Чр). В 1891 г. в Башкирии можно было добывать до 100 особей за ночь (Сушкин, 1897). В конце XX в. стал встречаться единично (Валуев, 2007а, 2020б; Захаров, 2006).
10671. *Limosa lapponica* (Linnaeus, 1758) – Малый веретенник (пролетный)
10672. *Limosa limosa* (Linnaeus, 1758) – Большой веретенник (Сокр, Чр)
10673. *Lymnocryptes minimus* (Brünnich, 1764) – Гаршнеп (пролетный)
10674. *Numenius arquata* (Linnaeus, 1758) – Большой кроншнеп (Ст, Ги)
10675. *Numenius phaeopus alboaxillaris* Lowe, 1921 – Средний кроншнеп, южный подвид (Ст, Ив). Многочисленный вид начала XIX в. (Аксаков, 1908), к концу XX-го стал встречаться единично (Морозов, 1998). В 2016 в Абзл, где в начале века гнездилось пять пар, обнаружен лишь один самец (Валуев, Зернов, 2016).
Numenius phaeopus phaeopus (Linnaeus, 1758) – Средний кроншнеп, северный подвид (пролетный)
10676. *Phalaropus lobatus* (Linnaeus, 1758) – Круглоносый плавунчик (пролетный)
10677. *Philomachus pugnax* (Linnaeus, 1758) – Турухтан (Сокр, Р)
10678. *Scolopax rusticola* Linnaeus, 1758 – Вальдшнеп (Ст, Ор)
10679. *Tringa erythropus* (Pallas, 1764) – Щеголь (пролетный)
10680. *Tringa glareola* Linnaeus, 1758 – Фифи (Сокр, Ор)
10681. *Tringa nebularia* (Gunnerus, 1767) – Большой улит (Сокр, Чр)
10682. *Tringa ochropus* Linnaeus, 1758 – Черныш (Сокр, Р)
10683. *Tringa stagnatilis* (Bechstein, 1803) – Поручейник (Сокр, Ор)
10684. *Tringa totanus* (Linnaeus, 1758) – Травник (Сокр, Ор)
10685. *Xenus cinereus* (Guldenstadt, 1775) – Мородунка (Сокр, Чр)

Семейство Glareolidae – Тиркушковые

10686. *Glareola nordmanni* Nordmann, 1842 – Степная тиркушка (Ст, Ив). Очень редкий вид на протяжении более чем 100 лет. В начале этого века около 30 пар гнездились на Маканском вдхр в Хайб. В 2004 г. одна особь наблюдалась в Гафр; токующая птица зарегистрирована в том же году в Кушн (Валуев, Едрёнкин, 2005).

Семейство Stercorariidae – Поморниковые

10687. *Stercorarius parasiticus* (Linnaeus, 1758) – Короткохвостый поморник (пролетный)
10688. *Stercorarius pomarinus (*Temminck, 1815) – Средний поморник (пролетный)

Семейство Laridae – Чайковые

Подсемейство Larinae

10689. *Larus canus* Linnaeus, 1758 – Сизая чайка (Сокр, Ги)
Larus fuscus Linnaeus, 1758 – Клуша (залетный)
10690. *Larus heuglini antelius* Iredale, 1913 – Халей (Ст, Чр)
Larus heuglini barabensis H. Johansen, 1960 – Халей (Ув, Р)
Larus genei Breme, 1840 – Морской голубок (залетный)
10691. *Larus ichthyaetus* Pallas, 1773 – Черноголовый хохотун (Ув, Ги)
Larus marinus Linnaeus, 1758 – Морская чайка (залетный)
10692. *Larus minutus* Pallas, 1776 – Малая чайка (Сокр, ги)
10693. *Larus ridibundus* Linnaeus, 1766 – Озерная чайка (Сокр, Р)
Pagophila eburnea (Phipps, 1774) – Белая чайка (залетный)
10694. *Rissa tridactyla* (Linnaeus, 1758) – Моевка (пролетный)

Подсемейство Sterninae

Chlidonias hybridus (Pallas, 1811) – Белощекая крачка (залетный)
10695. *Chlidonias leucopterus* (Temminck, 1815) – Белокрылая крачка (Сокр, Чр)
10696. *Chlidonias niger* (Linnaeus, 1758) – Черная крачка (Сокр, Чр)
Hydroprogne caspia (Pallas, 1770) – Чеграва (залетный)
10697. *Sterna albifrons* Pallas, 1764 – Малая крачка (Ст, Ги)
10698. *Sterna hirundo* Linnaeus, 1758 – Речная крачка (Сокр, Чр)

Отряд Columbiformes – Голубеобразные

Семейство Columbidae – Голубиные

10699. *Columba livia* Gmelin, 1789 – Сизый голубь – синантроп. Вне населённых пунктов очень редок (Ор); в населённых – весьма многочислен (Вм).
10700. *Columba oenas* Linnaeus, 1758 – Клинтух (Ув, Ор)
10701. *Columba palumbus* Linnaeus, 1758 – Вяхирь. В населённых пунктах увеличивается, вне их сократился на 10%. Балансирует между категориями «Об» и «Р».
10702. *Streptopelia decaocto* (Frivaldszky, 1838) – Кольчатая горлица (Ст, Ив)
10703. *Streptopelia orientalis* (Latham, 1790) – Большая горлица (Ст, Ги)
10704. *Streptopelia turtur* (Linnaeus, 1758) – Обыкновенная горлица (Сокр, Ив). Ещё в конце прошлого века была обыкновенным видом. А в репродуктивный период первых лет XXI в. стала очень редка (Валуев, 2005б); к 2013 г. встречи с ней стали уже единичны и её предложили внести в Красную книгу РБ (Валуев, 2013а).

Отряд Cuculiformes – Кукушкообразные

Семейство Cuculidae – Кукушковые

10705. *Cuculus canorus* Linnaeus, 1758 – Обыкновенная кукушка (Ув, Р)
10706. *Cuculus saturatus* Blyth, 1843 – Глухая кукушка (Сокр, Чр)

Отряд Strigiformes – Совообразные

Семейство Strigidae – Совиные

10707. *Aegolius funereus* (Linnaeus, 1758) – Мохноногий сыч (Ст, Чр)
10708. *Asio flammeus* (Pontoppidan, 1763) – Болотная сова (Ст, Ги)
10709. *Asio otus* (Linnaeus, 1758) – Ушастая сова (Ст, Чр)
10710. *Athene noctua* (Scopoli, 1769) – Домовый сыч (Ст, Ив)
10711. *Bubo bubo* (Linnaeus, 1758) – Филин (Ст, Ги)
10712. *Bubo scandiaca* (Linnaeus, 1758) – Белая сова (зимующий)
10713. *Glaucidium passerinum* (Linnaeus, 1758) – Воробьиный сычик (Сокр, Ги)
10714. *Otus scops* (Linnaeus, 1758) – Сплюшка (Сокр, Чр)
10715. *Strix aluco* Linnaeus, 1758 – Серая неясыть (Сокр, Ги)
10716. *Strix nebulosa* Forster, 1772 – Бородатая неясыть (Сокр, Ги)
10717. *Strix uralensis* Pallas, 1771 – Длиннохвостая неясыть (Сокр, Чр)
10718. *Surnia ulula* (Linnaeus, 1758) – Ястребиная сова (Ст, Ив)

Отряд Caprimulgiformes – Козодоеобразные

Семейство Caprimulgidae – Козодоевые

10719. *Caprimulgus europaeus* Linnaeus, 1758 – Обыкновенный козодой (Ув, Чр)

Отряд Apodiformes – Стрижеобразные

Семейство Apodidae – Стрижиные

10720. *Apus apus* (Linnaeus, 1758) – Черный стриж (Ув, Р)

Отряд Coraciiformes – Ракшеобразные

Подотряд Coracii – Сизоворонки

Семейство Coraciidae – Сизоворонковые

10721. *Coracias garrulus* Linnaeus, 1758 – Сизоворонка (Ст, Ив)

Подотряд Alcedini – Зимородки

Семейство Alcedinidae – Зимородковые

10722. *Alcedo atthis* (Linnaeus, 1758) – Зимородок (Сокр, Чр)

Подотряд Meropi – Щурки

Семейство Meropidae – Щурковые

10723. *Merops apiaster* (Linnaeus, 1758) – Золотистая щурка (Ув, Ор)

Отряд Upupiformes – Удодообразные

Семейство Upupidae – Удодовые

10724. *Upupa epops* Linnaeus, 1758 – Удод (Ст, Ги)

Отряд Picimorphes – Дятлообразные

Семейство Picidae – Дятловые

10725. *Dendrocopos leucotos* (Bechstein, 1803) – Белоспинный дятел (Ст, Ор)
10726. *Dendrocopos major* (Linnaeus, 1758) – Большой пёстрый дятел (Ув, Об)
10727. *Dendrocopos minor* (Linnaeus, 1758) – Малый пёстрый дятел (Сокр, Ор)
10728. *Dendrocoptes medius* (Linnaeus, 1758) – Средний пёстрый дятел (Ст, Ив)
10729. *Dryocopus martius* (Linnaeus, 1758) – Желна (Ст, Ор)

10730. *Jynx torquilla* Linnaeus, 1758 – Вертишейка (Сокр, Ор)
10731. *Picoides tridactylus* (Linnaeus, 1758) – Трехпалый дятел (Сокр, Ги)
10732. *Picus canus* Gmelin, 1788 – Седой дятел (Сокр, Чр)
10733. *Picus viridis* Linnaeus, 1758 – Зелёный дятел (Ст, Ив)

Отряд Passeriformes – Воробьинообразные

Подотряд Passeri – Певчие воробьиные

Семейство Hirundinidae – Ласточковые

10734. *Delichon urbica* (Linnaeus, 1758) – Городская ласточка, воронок (Ст, Ги)
10735. *Hirundo rustica* Linnaeus, 1758 – Деревенская ласточка (Ув, Р)
10736. *Riparia riparia* (Linnaeus, 1758) – Береговая ласточка (Сокр, Об)

Семейство Alaudidae – Жаворонковые

10737. *Alauda arvensis* Linnaeus, 1758 – Полевой жаворонок (Ув, Об)
10738. *Eremophila alpestris* (Linnaeus, 1758) – Рогатый жаворонок (пролетный)
Galerida cristata (Linnaeus, 1758) – Хохлатый жаворонок (залетный)
10739. *Lullula arborea* (Linnaeus, 1758) – Лесной жаворонок (Ув, Ги)
Melanocorypha calandra (Linnaeus, 1766) – Степной жаворонок (залетный)
- *Melanocorypha leucoptera* (Pallas, 1811) – Белокрылый жаворонок (исчез)
- *Melanocorypha yeltoniensis* (J. R. Forster, 1768) – Черный жаворонок (исчез)

Семейство Motacillidae – Трясогузковые

10740. *Anthus campestris* (Linnaeus, 1758) – Полевой конек (Ст, Ив)
10741. *Anthus cervinus* (Pallas, 1811) – Краснозобый конек (пролетный)
Anthus gustavi Swinhoe, 1863 – Сибирский конёк (залетный). Гнездовое поведение было отмечено у особи в Бузд 10 мая 2019 (Валуев, 2021б).
10742. *Anthus hodgsoni* Blackwelder, 1907 – Пятнистый конёк (Ув, Чр). Регистрации этого вида в Башкирии единичны (Валуев, 2007б, 2017; Загорская, 2016).
10743. *Anthus pratensis* (Linnaeus, 1758) – Луговой конек (пролетный)
Anthus spinoletta (Linnaeus, 1758) – Горный конёк (залетный)
Anthus richardi Vieillot, 1818 – Степной конёк (залетный)
10744. *Anthus trivialis* (Linnaeus, 1758) – Лесной конек (Ув, Об)
10745. *Motacilla alba* Linnaeus, 1758 – Белая трясогузка (Ув, Об)
10746. *Motacilla cinerea* Tunstall, 1771 – Горная трясогузка (Сокр, Чр)
10747. *Motacilla citreola* Pallas, 1776 – Желтоголовая трясогузка (Сокр, Р)
10748. *Motacilla flava* Linnaeus, 1758 – Жёлтая трясогузка (Ув, Об)
Motacilla flava lutea (S.G. Gmelin, 1774) – Желтолобая трясогузка (Сокр, Р)

Семейство Laniidae – Сорокопутовые

10749. *Lanius collurio* Linnaeus, 1758 – Обыкновенный жулан (Ув, Р)
10750. *Lanius cristatus* Linnaeus, 1758 – Сибирский жулан (Ув, Ив). На гнездовании обнаружен только в Уфмс (Валуев, 2022а).
10751. *Lanius excubitor* Linnaeus, 1758 – Серый сорокопут (Сокр, Ги)
Lanius minor Gmelin, 1788 – Чернолобый сорокопут (залетный)

Семейство Oriolidae – Иволговые

10752. *Oriolus oriolus* (Linnaeus, 1758) – Иволга (Сокр, Ор)

Семейство Sturnidae – Скворцовые

Sturnus roseus (Linnaeus, 1758) – Розовый скворец (залетный)

10753. *Sturnus vulgaris* Linnaeus, 1758 – Обыкновенный скворец (Сокр, Р)

Семейство Corvidae – Врановые

10754. *Corvus corax* Linnaeus, 1758 – Ворон (Ув, Р)

10755. *Corvus cornix* Linnaeus, 1758 – Серая ворона (Сокр, Р)

10756. *Corvus frugilegus* Linnaeus, 1758 – Грач (Сокр, Р)

10757. *Corvus monedula* Linnaeus, 1758 – Галка (Сокр, Р)

10758. *Corvus orientalis* Eversmann, 1841 – Восточная чёрная ворона (Ст, Ив)

10759. *Garrulus glandarius* (Linnaeus, 1758) – Сойка (Ув, Р)

10760. *Nucifraga caryocatactes* (Linnaeus, 1758) – Кедровка (Ст, Ги)

10761. *Perisoreus infaustus* (Linnaeus, 1758) – Кукша (Ст, Ги)

10762. *Pica pica* (Linnaeus, 1758) – Сорока (Сокр, Р)

Pyrrhocorax pyrrhocorax (Linnaeus, 1758) – Клушица (залетный). Добыта Н.А. Зарудным в XIX (Ильичёв, Фомин, 1988). В 2013 найдены свежие останки в Блрц (Валуев и др., 2014).

Семейство Bombycillidae – Свиристелевые

10763. *Bombycilla garrulus* (Linnaeus, 1758) – Обыкновенный свиристель (зимующий)

Семейство Cinclidae – Оляпковые

10764. *Cinclus cinclus* (Linnaeus, 1758) – Оляпка (Ст, Ги)

Семейство Troglodytidae – Крапивниковые

10765. *Troglodytes troglodytes* (Linnaeus, 1758) – Крапивник (Ст, Ги)

Семейство Prunellidae – Завирушковые

10766. *Prunella modularis* (Linnaeus, 1758) – Лесная завирушка (Ув, Чр)

Prunella montanella (Pallas, 1776) – Сибирская завирушка (залетный)

Семейство Sylviidae – Славковые

10767. *Acrocephalus agricola* (Jerdon, 1845) – Индийская камышевка (Ув, Чр). Впервые обнаружена в 2001 в Чишм (Валуев, 2003а); второй раз в 2010 в Кгрч (Валуев В., Валуев К., 2010). С тех пор распространилась до западных границ республики.

10768. *Acrocephalus arundinaceus* (Linnaeus, 1758) – Дроздовидная камышевка (Ст, Ги)

10769. *Acrocephalus dumetorum* Blyth, 1849 – Садовая камышевка (Сокр, Р)

10770. *Acrocephalus paludicola* (Vieillot, 1817) – Вертлявая камышевка – Крмс 30.05.1987 (Валуев, 1989), Туйм 04.08.2011 (Загорская, 2012).

10771. *Acrocephalus palustris* (Bechstein, 1798) – Болотная камышевка (Ст, Р)

10772. *Acrocephalus schoenobaenus* (Linnaeus, 1758) – Камышевка-барсучок (Сокр, Ор)

10773. *Acrocephalus scirpaceus* (Hermann, 1804) – Тростниковая камышевка (Ст, Ги)

10774. *Cettia cetti* (Temminck, 1820) – Соловьиная широкохвостка (Ст, Ив)
10775. *Hippolais caligata* (Lichtenstein, 1823) – Северная бормотушка (Ув, Р)
10776. *Hippolais icterina* (Vieillot, 1817) – Зеленая пересмешка (Сокр, Ор)
Locustella certhiola (Pallas, 1811) – Певчий сверчок (залетный)
10777. *Locustella fluviatilis* (Wolf, 1810) – Речной сверчок (Сокр, Ор)
10778. *Locustella luscinioides* (Savi, 1824) – Соловьиный сверчок (Ст, Ив)
10779. *Locustella naevia* (Boddaert, 1783) – Обыкновенный сверчок (Сокр, Чр)
10780. *Phragamaticola aedon* (Pallas, 1776) – Толстоклювая камышевка. В 2025 один поющий самец был обнаружен в Ермк, другой – в Туйм (Валуев, 2025а).
10781. *Phylloscopus borealis* (Blasius, 1858) – Пеночка-таловка (Пр). Впервые зарегистрирован в 2020: три особи наблюдались в Гафр (Валуев, 2020в). Вторая регистрация произошла 2023 в Татш (Валуев, 2023г).
10782. *Phylloscopus collybita* (Vieillot, 1817) – Пеночка-теньковка (Ув, Р)
10783. *Phylloscopus inornatus* (Blyth, 1842) – Пеночка-зарничка (Пр)
10784. *Phylloscopus sibilatrix* (Bechstein, 1793) – Пеночка-трещотка (Ув, Чр)
10785. *Phylloscopus trochiloides* (Sundevall, 1837) – Зеленая пеночка (Ув, Ор)
10786. *Phylloscopus trochilus* (Linnaeus, 1758) – Пеночка-весничка (Ув, Р)
10787. *Sylvia atricapilla* (Linnaeus, 1758) – Славка-черноголовка (Ув, Р)
10788. *Sylvia borin* (Boddaert, 1783) – Садовая славка (Сокр, Р)
10789. *Sylvia communis* Latham, 1787 – Серая славка (Ст, Р)
10790. *Sylvia curruca* (Linnaeus, 1758) – Славка-мельничек (Сокр, Ор)
10791. *Sylvia nisoria* (Bechstein, 1795) – Ястребиная славка (Ув, Чр)

Семейство Regulidae – Корольковые

10792. *Regulus regulus* (Linnaeus, 1758) – Желтоголовый королек (зимующий)

Семейство Muscicapidae – Мухоловковые

10793. *Erithacus rubecula* (Linnaeus, 1758) – Зарянка (Сокр, Р)
10794. *Fiscedula albicollis* (Temminck, 1815) – Мухоловка-белошейка (Ст, Чр)
10795. *Fiscedula hypoleuca* (Pallas, 1764) – Мухоловка-пеструшка (Ув, Р)
10796. *Fiscedula parva* (Bechstein, 1794) – Малая мухоловка (Сокр, Чр)
10797. *Luscinia calliope* (Pallas, 1776) – Соловей-красношейка (пролетный). Выраженный пролёт этого вида под Уфой был в середине XX в. (Ильичёв, Фомин, 1988). В последующем он не регистрировался до 2020, когда его обнаружили в Учлн (Валуев, Зернов, 2020а).
Luscinia cyane (Pallas, 1776) – Синий соловей (залетный)
10798. *Luscinia luscinia* (Linnaeus, 1758) – Обыкновенный соловей (Сокр, Р)
10799. *Luscinia megarhynchos* C.L. Brehm, 1831 – Южный соловей (Ст, Ив). Впервые этот вид был встречен в 1985 в Крмс; через 16 лет в окрестностях Салавата, а в 2008 – в окрестностях Уфы (Валуев, 2008). В 2020 г. поющий самец зарегистрирован в Гафр (Валуев, Зернов, 2020.
10800. *Luscinia svecica* (Linnaeus, 1758) – Варакушка (Сокр, Р)
10801. *Muscicapa striata* (Pallas, 1764) – Серая мухоловка (Ув, Р)
10802. *Oenanthe isabellina* (Temminck, 1829) – Каменка-плясунья (Ст, Ги)
10803. *Oenanthe oenanthe* (Linnaeus, 1758) – Обыкновенная каменка (Ув, Ор)

Oenanthe pleschanka (Lepechin, 1770) – Каменка-плешанка (залетный)
10804. *Phoenicurus ochruros* (S.G. Gmelin, 1774) – Горихвостка-чернушка (Ув, Чр)
10805. *Phoenicurus phoenicurus* (Linnaeus, 1758) – Обыкновенная горихвостка (Ув, Р)
10806. *Saxicola ruberta* (Linnaeus, 1758) – Луговой чекан (Ув, Об)
10807. *Saxicola torquata* (Pallas, 1766) – Черноголовый чекан (Ув, Ор)
Tarsiger cyanurus (Pallas, 1773) – Синехвостка (залетный)

Семейство Turdidae – Дроздовые

Monticola saxatilis (Linnaeus, 1766) – Пёстрый каменный дрозд (залетный)
Turdus atrogularis Jarocki, 1819 – Чернозобый дрозд (залетный)
10808. *Turdus iliacus* Linnaeus, 1766 – Белобровик (Ув, Р)
10809. *Turdus merula* Linnaeus, 1758 – Черный дрозд (Ув, Р)
Turdus naumanni Temminck, 1820 – Дрозд Науманна (залетный). Обнаружен в гнездовой период (18 июня 2022) в Кигн (Валуев, 2022).
10810. *Turdus philomelos* C.L. Brehm, 1831 – Певчий дрозд (Ув, Об)
10811. *Turdus pilaris* Linnaeus, 1758 – Рябинник (Сокр, Об)
Turdus ruficollis Pallas, 1776 – Краснозобый дрозд (залетный)
10812. *Turdus viscivorus* Linnaeus, 1758 – Деряба (Ув, Ор)
10813. *Zoothera varia* (Pallas, 1811) – Пёстрый дрозд (Сокр, Ив)

Семейство Panuridae – Усатые синицы

10814. *Panurus biarmicus* (Linnaeus, 1758) – Усатая синица (Ув, Ги)

Семейство Aegithalidae – Длиннохвостые синицы

10815. *Aegithalos caudatus* (Linnaeus, 1758) – Ополовник (Сокр, Р)

Семейство Remizidae – Ремезовые

10816. *Remiz pendulinus* (Linnaeus, 1758) – Ремез (Сокр, Чр)

Семейство Paridae – Синицевые

10817. *Parus ater* Linnaeus, 1758 – Московка (Ув, Р)
10818. *Parus caeruleus* Linnaeus, 1758 – Лазоревка (Ув, Р)
10819. *Parus cristatus* Linnaeus, 1758 – Хохлатая синица (Сокр, Ги)
10820. *Parus cyanus* Pallas, 1770 – Князёк (Сокр, Ги)
10821. *Parus major* Linnaeus, 1758 – Большая синица (Ув, Об)
10822. *Parus montanus* Baldenstein, 1827 – Пухляк (Ув, Об)
10823. *Parus palustris* Linnaeus, 1758 – Черноголовая гаичка (Ст, Ор)

Семейство Sittidae – Поползневые

10824. *Sitta europaea* Linnaeus, 1758 – Обыкновенный поползень (Ув, Р)

Семейство Certhiidae – Пищуховые

10825. *Certhia familiaris* Linnaeus, 1758 – Обыкновенная пищуха (Сокр, Ор)

Семейство Passeridae – Ткачиковые

10826. *Passer domesticus* (Linnaeus, 1758) – Домовый воробей – синантроп (Ув, Ор)
10827. *Passer montanus* (Linnaeus, 1758) – Полевой воробей (Ст, Об)
Petronia petronia (Linnaeus, 1766) – Каменный воробей (залетный)

Семейство Fringillidae – Вьюрковые

10828. *Acanthis cannabina* (Linnaeus, 1758) – Коноплянка (Ув, Р)
10829. *Acanthis flammea* (Linnaeus, 1758) – Обыкновенная чечетка (Зим)
Acanthis flavirostris (Linnaeus, 1758) – Горная чечетка (залетный)
10830. *Acanthis hornemanni* (Holboell, 1843) – Пепельная чечетка (Зим)
10831. *Carduelis carduelis* (Linnaeus, 1758) – Щегол (Ув, Об)
10832. *Carduelis spinus* (Linnaeus, 1758) – Чиж (Ув, Р)
10833. *Carpodacus erythrinus* (Pallas, 1770) – Обыкновенная чечевица (Сокр, Р)
Carpodacus roseus (Pallas, 1776) – Сибирская чечевица (залетный)
10834. *Chloris chloris* (Linnaeus, 1758) – Обыкновенная зеленушка (Ув, Р)
10835. *Coccothraustes coccothraustes* (Linnaeus, 1758) – Обыкновенный дубонос (Сокр, Ор)
10836. *Fringilla coelebs* Linnaeus, 1758 – Зяблик (Ув, Мн)
10837. *Fringilla montifringilla* Linnaeus, 1758 – Юрок (Ув, Ор)
10838. *Loxia curvirostra* Linnaeus, 1758 – Клёст-еловик (Ув, Ор)
10839. *Loxia leucoptera* J.F. Gmelin, 1789 – Белокрылый клёст – Бурз 8 июня 2002 – одна пара (Багаутдинова, 2003); 26 июня 2007 – в Кркм (Фоминых, 2007); 17 сентября 2013 – в Мишк (Валуев, Загорская, 2014а).
10840. *Loxia pytyopsittacus* Borkhausen, 1793 – Клёст-сосновик (зимующий)
10841. *Pinicola enucleator* (Linnaeus, 1758) – Щур (зимующий)
10842. *Pyrrhula cineracea* Cabanis, 1872 – Серый снегирь. В гнездовой период (12 июля 2006) зарегистрирован только однажды – в окрестностях д. Соколки Блкт (Валуев и др., 2006б). В ноябре 2017 отловлен в Кушн и Уфмс (Зернов, 2017).
10843. *Pyrrhula pyrrhula* (Linnaeus, 1758) – Обыкновенный снегирь (Ув, Р)
10844. *Uragus sibiricus* (Pallas, 1773) – Урагус (Ув, Чр)

Семейство Emberizidae – Овсянковые

10845. *Calcarius lapponicus* (Linnaeus, 1758) – Лапландский подорожник (зимующий)
Emberiza buchanani Blyth, 1844 – Скальная овсянка (залетный). Зарегистрирована 15 июня 2003 в Слвт (Валуев, 2009).
10846. *Emberiza citrinella* Linnaeus, 1758 – Обыкновенная овсянка (Сокр, Об)
10847. *Emberiza hortulana* Linnaeus, 1758 – Садовая овсянка (Ув, Р)
Emberiza leucocephalos S. G. Gmelin, 1771 – Белошапочная овсянка (залетный)
Emberiza pallasi (Cabanis, 1872) – Полярная овсянка (залетный)
10848. *Emberiza rusticus* (Pallas, 1776) – Овсянка-ремез (Сокр, Ги)
10849. *Emberiza schoeniclus* (Linnaeus, 1758) – Камышовая овсянка (Сокр, Р)
10850. *Miliaria calandra* (Linnaeus, 1758) – Просянка (Ув, Ив)
10851. *Ocyris aureolus* (Pallas, 1773) – Дубровник (Сокр, Ив)
10852. *Ocyris pusillus* (Pallas, 1776) – Овсянка-крошка (Пр)
10853. *Plectrophenax nivalis* (Linnaeus, 1758) – Пуночка (зимующий)

Класс Mammalia – Млекопитающие

Подкласс Eutheria – Плацентарные звери

Отряд Insectivora – Насекомоядные

Семейство Erinaceidae – Ежовые

10854. *Erinaceus roumanicus* Barrett-Hamilton, 1900 – Южный (белогрудый) еж – обычен
10855. *Hemiechinus auritus* (Gmelin, 1770) – Ушастый еж – крайний юг

Семейство Soricidae – Землеройковые

10856. *Crocidura suaveolens* (Pallas, 1811) – Малая белозубка
10857. *Neomys fodiens* (Pennant, 1771) – Водяная (обыкновенная) кутора
10858. *Sorex araneus* Linnaeus, 1758 – Обыкновенная бурозубка
10859. *Sorex caecutiens* Laxmann, 1788 – Средняя бурозубка
10860. *Sorex isodon* Turov, 1924 – Равнозубая бурозубка
10861. *Sorex minutissimus* Zimmermann, 1780 – Крошечная бурозубка
10862. *Sorex minutus* Linnaeus, 1766 – Малая бурозубка (землеройка)
10863. *Sorex tundrensis* (Merriam, 1900) – Тундряная бурозубка – БГПЗ (Волков, 1986)

Семейство Talpidae – Кротовые

10864. *Talpa europaea* Linnaeus, 1758 – Европейский крот – обычен

Отряд Chiroptera – Рукокрылые

Семейство Vespertilionidae – Гладконосые, или Обыкновенные летучие мыши

10865. *Eptesicus nilssonii* (Keyserling & Bläsius 1839) – Северный кожанок
10866. *Myotis brandtii* (Eversmann, 1845) – Ночница Брандта
10867. *Myotis dasycneme* (Boie, 1825) – Прудовая ночница
10868. *Myotis daubentonii* (Kuhl, 1817) – Водяная ночница
10869. *Myotis mystacinus* (Kuhl, 1817) – Усатая ночница, или русская
10870. *Myotis nattereri* (Kuhl, 1817) – Ночница Наттерера
10871. *Nyctalus lasiopterus* (Schreber, 1780) – Гигантская вечерница – Мелз 2018 (Снитько, Снитько, 2020)
10872. *Nyctalus leisleri* (Kuhl, 1817) – Малая вечерница
10873. *Nyctalus noctula* (Schreber, 1774) – Рыжая вечерница
10874. *Pipistrellus nathusii* (Keyserling & Bläsius, 1839) – Нетопырь Натузиуса
10875. *Pipistrellus pygmaeus* (Leach, 1825) – Малый нетопырь
10876. *Plecotus auritus* (Linnaeus, 1758) – Бурый ушан, или обыкновенный
10877. *Vespertilio murinus* Linnaeus, 1758 – Двуцветный кожан

Отряд Lagomorpha – Зайцеобразные

Семейство Leporidae – Зайцы

10878. *Lepus europaeus* Pallas, 1778 – Заяц-русак
10879. *Lepus timidus* Linnaeus, 1758 – Заяц-беляк

Семейство Ochotonidae – Пищухи, или Сеноставки

10880. *Ochotona pusilla* (Pallas, 1769) – Степная (малая) пищуха

Отряд Rodentia – Грызуны

Семейство Castoridae – Бобровые

10881. *Castor fiber* Linnaeus, 1758 – Обыкновенный бобр – по рекам, обычен

Семейство Cricetidae – Хомяковые

10882. *Allocricetulus eversmanni* (Brandt, 1859) – Хомячок Эверсманна
10883. *Arvicola amphibius* (Linnaeus, 1758) – Водяная полевка (крыса)
10884. *Cricetulus migratorius* (Pallas, 1773) – Серый хомячок
10885. *Cricetus cricetus* (Linnaeus, 1758) – Обыкновенный хомяк – обычен
10886. *Ellobius talpinus* (Pallas, 1770) – Обыкновенная слепушонка
10887. *Lagurus lagurus* (Pallas, 1773) – Степная пеструшка
10888. *Microtus agrestis* (Linnaeus, 1761) – Темная полевка
10889. *Microtus arvalis* (Pallas, 1779) – Обыкновенная полевка
10890. *Microtus gregalis* (Pallas, 1779) – Узкочерепная полевка
10891. *Microtus levis* Miller, 1908 – Восточно-европейская полевка
10892. *Microtus oeconomus* (Pallas, 1776) – Полевка-экономка
10893. *Myodes glareolus* (Schreber, 1780) – Рыжая полевка
10894. *Myodes rufocanus* (Sundevall, 1846) – Красно-серая полевка
10895. *Myodes rutilus* (Pallas, 1779) – Красная полевка
10896. *Myopus schisticolor* (Lilljeborg, 1844) – Лесной лемминг
10897. *Ondatra zibethicus* (Linnaeus, 1766) – Ондатра, или мускусная крыса

Семейство Dipodidae – Тушканчиковые

10898. *Allactaga major* (Kerr, 1792) – Большой тушканчик
10899. *Sicista betulina* (Pallas, 1779) – Лесная мышовка
10900. *Sicista subtilis* (Pallas, 1773) – Степная мышовка

Семейство Gliridae – Соневые

10901. *Dryomys nitedula* (Pallas, 1778) – Лесная соня
10902. *Eliomys quercinus* (Linnaeus, 1766) – Садовая соня

Семейство Muridae – Мышиные

10903. *Apodemus agrarius* (Pallas, 1771) – Полевая мышь
10904. *Apodemus flavicollis* (Melchior, 1834) – Желтогорлая мышь
10905. *Apodemus sylvaticus* (Linnaeus, 1758) – Лесная мышь
10906. *Apodemus uralensis* (Pallas, 1811) – Малая лесная мышь – Уфа, Абзл, Мелз
10907. *Micromys minutus* (Pallas, 1771) – Мышь-малютка
10908. *Mus musculus* Linnaeus, 1758 – Домовая мышь – синантроп
10909. *Rattus norvegicus* (Berkenhout, 1769) – Серая крыса или пасюк – синантроп

Семейство Sciuridae – Беличьи

10910. *Marmota bobak* (Muller, 1776) – Степной сурок или байбак – степи
10911. *Pteromys volans* (Linnaeus, 1758) – Обыкновенная летяга
10912. *Sciurus vulgaris* Linnaeus, 1758 – Обыкновенная белка – леса, обычна
10913. *Spermophilus major* (Pallas, 1778) – Большой, или рыжеватый суслик
10914. *Spermophilus pygmaeus* (Pallas, 1778) – Малый суслик
10915. *Tamias sibiricus* (Laxmann, 1769) – Бурундук – редок

Отряд Carnivora – Хищные

Семейство Canidae – Собачьи

10916. *Canis lupus* (Linnaeus, 1758) – Волк – леса
10917. *Nyctereutes procyonoides* (Gray, 1834) – Енотовидная собака
10918. *Vulpes corsac* (Linnaeus, 1768) – Корсак – юг
10919. *Vulpes vulpes* (Linnaeus, 1758) – Лисица – обычна

Семейство Felidae – Кошачьи

10920. *Lynx lynx* (Linnaeus, 1758) – Рысь – леса

Семейство Mustelidae – Куньи

10921. *Lutra lutra* (Linnaeus, 1758) – Выдра – редка
10922. *Martes martes* (Linnaeus, 1758) – Лесная куница – леса
10923. *Meles leucurus* (Hodgson, 1847) – Азиатский барсук – лесостепи
10924. *Mustela erminea* Linnaeus, 1758 – Горностай
10925. *Mustela eversmanii* Lesson, 1827 – Степной, или светлый хорек
10926. *Mustela lutreola* (Linnaeus, 1761) – Европейская норка – исчезающий вид
10927. *Mustela nivalis* Linnaeus, 1766 – Ласка
10928. *Mustela putorius* Linnaeus, 1758 – Лесной, или темный хорек
10929. *Mustela sibirica* Pallas, 1773 – Колонок – очень редок
10930. *Mustela vison* Schreber, 1777 – Американская норка – обычна

Семейство Ursidae – Медвежьи

10931. *Ursus arctos* Linnaeus, 1758 – Бурый медведь – леса

Отряд Artiodactyla – Парнокопытные

Семейство Cervidae – Олени, или плотнорогие

10932. *Alces alces* (Linnaeus, 1758) – Лось – леса, лесостепи, обычен
10933. *Capreolus pygargus* (Pallas, 1771) – Сибирская косуля – обычна
10934. *Cervus canadensis* (Erxleben, 1777) – Марал – БГПЗ и окрестности

Семейство Suidae – Свиньи

10935. *Sus scrofa* Linnaeus, 1758 – Кабан – леса, обычен

Литература

1. Абдурахманов Г.М., Набоженко М.В. Определитель и каталог жуков-чернотелок (Coleoptera: Tenebrionidae s. str.) Кавказа и юга европейской части России. М.: Товарищество научных изданий КМК, 2011. 361 с.
2. Аксаков С.Т. Записки ружейного охотника Оренбургской губернии. М.: Издание А. А. Карцева, 1908. С. 107–431.
3. Аннотированный каталог насекомых Дальнего Востока России. Том I / Под общей ред. А.С. Лелея. Перепончатокрылые. Владивосток: Дальнаука, 2012. 635 с.
4. Аникин В.В., Трофимова Т.А. Предварительные данные по фауне молей-чехлоносок (Lepidoptera, Coleophoridae) Южного Урала // Энтомологические и паразитологические исследования в Поволжье. 2004. Вып. 3. С. 72–76.
5. Антонова Е.М. Пяденицы Башкирии (Lepidoptera, Geometridae) и их зоогеографические особенности // Морфологические и географические аспекты эволюции насекомых: сб. тр. Зоомузея МГУ. 1985. Т. 23. С. 183–197.
6. Антропов А.В., Валуев В.А. К фауне ос Башкирии // Редкие и исчезающие виды животных и растений Республики Башкортостан. 2019. Вып. 24. С. 3–5.
7. Антропов А.В., Валуев В.А. Оса *Argogorytes mystaceus* в Башкирии // Материалы по флоре и фауне Республики Башкортостан. 2020. Вып. 27. С. 3-12.
8. Антропов А.В., Валуев В.А. О находке нового для Башкирии вида осы *Episyron rufipes* и дополнения к распространению других видов // Материалы по флоре и фауне Республики Башкортостан. 2021. Вып. 33. С. 3–9.
9. Антропов А.В., Валуев В.А. Новые для Башкирии виды наездников: *Acaenitus dubitator* Panzer, 1800 и *Latibulus argiolus* Rossi, 1790 // Материалы по флоре и фауне Республики Башкортостан. 2022а. Вып. 37. С. 3–7.
10. Антропов А.В. Валуев В.А. О регистрации нового для Башкирии вида осы *Auplopus carbonarius* и новых находок *Podalonia affinis* и *Polistes dominula* // Материалы по флоре и фауне Республики Башкортостан. 2022б. Вып. 37. С. 8-14.
11. Антропов А.В., Валуев В.А. Новые данные о находках ос в Республике Башкортостан (2023 г.) // Материалы по флоре и фауне Республики Башкортостан. 2023. Вып. 39. С. 3–8.
12. Антропов А.В., Валуев В.А., Мулдашев А.А. Пелопей безобразный *Sceliphron deforme* (F.Smith, 1856) в Башкирии // Редкие и исчезающие виды животных и растений Республики Башкортостан. 2019. Вып. 25.

С.3–12.
13. Антропов А.В., Валуев В.А., Мулдашев А.А. Первая находка осы-блестянки *Stilbum calens* (Chrysididae) в Башкирии // Редкие и исчезающие виды животных и растений Республики Башкортостан. 2021. Вып. 31. С. 6–8.
14. Ануфриев Г.А. О фауне цикадовых (Homoptera: Cicadina) Башкирского государственного заповедника // Russian Entomol. J. 2006. №15(3). С. 247–251.
15. Ануфриев Г.А. О фауне и населении цикадовых (Insecta, Homoptera, Cicadina) заповедника Шульган-Таш и национального парка Башкирия // Природное наследие России в XXI веке: II междунар. научно-практ. конф.: доклады. Уфа, 2008а. С. 57–61.
16. Ануфриев Г.А. Фауна и население цикадовых (Insecta, Homoptera, Cicadina) Южно-Уральского государственного природного заповедника // Труды Южно-Уральского ГПЗ. 2008б. Вып. 1. С. 127–142.
17. Артемьев А.И. О встрече стрепета *Tetrax tetrax* и кречетки *Chettusia gregaria* в Зауралье Башкирии // Редкие и исчезающие виды животных и растений Республики Башкортостан. 2010. Вып. 2. С. 22.
18. Ахметова Л.А. База данных по экземплярам навозников трибы Aphodiini фауны России (Scarabaeidae) в коллекции ЗИН. [Электронный ресурс], 3.05.2011 (дата создания). – Режим доступа: https://www.zin.ru/Animalia/Coleoptera/rus/aphrucol.htm (дата обращения: 3.03.2019).
19. Ахметова Л.А., Фролов А.В. Обзор пластинчатоусых жуков трибы Aphodiini (Coleoptera, Scarabaeidae) фауны России // Энтомол. обозрение. 2014. Т. XCIII. №2. С. 403–447.
20. Ахола М., Кайтила Й.-П., Нуппонен К., Юннилайнен Й., Ольшванг В.Н., Михайлов Ю.Е. Материалы к познанию бабочек Урала. Научные результаты русско-финской лепидоптерологической экспедиции на Южном Урале в 1996 г. Macrolepidoptera // Успехи энтомологии на Урале. Екатеринбург, 1997. С. 98–104.
21. Багаутдинова З.Т. Птицы Башкирского заповедника // Материалы к распространению птиц на Урале, в Приуралье и Западной Сибири. 2003. №8. С. 8–26.
22. Бакалова М.В. Жесткокрылые (Coleoptera) бортей и ульев заповедника «Шульган-Таш» в Башкортостане, Россия // Евразиатский энтомол. журнал. 2011. № 10(1). С. 45–52.
23. Бакалова М.В. Исследования беспозвоночных восточной части национального парка «Башкирия» // Природа, наука и туризм: сб. мат-лов Всерос. научно-практич. конф., посвященной 30-летию национального парка «Башкирия» / Отв. ред. Н.М. Сайфуллина. Уфа: Гилем, 2016. С. 252–264.
24. Бакалова М.В., Бакалов В.С. Фауна беспозвоночных в бортях

медоносных пчёл заповедника «Шульган-Таш» // Научные основы сохранения полноты биоразнообразия в заповедниках и национальных парках. Перспективные для создания ООПТ территории: мат-лы научно-практич. конф. с междунар. участием, посвященной 40-летию Сочинского национального парка, Сочи, 25–27 октября 2023 года. Ростов-на-Дону. 2023. С. 51–53.
25. Барабашин Т.О. К фауне редких и малоизученных видов Башкирского Зауралья // Материалы к распространению птиц на Урале, в Приуралье и Западной Сибири. 2001. №6. С. 13–15.
26. Баянов М.Г. Зоологические исследования в Башкирии. Уфа: РИЦ БашГУ, 1997. 136 с.
27. Баянов М.Г. Гельминты водных экосистем Южного Урала. Уфа: РИЦ БашГУ, 2017. 300 с.
28. Баянов М.Г., Валуев В.А. Большой баклан в Башкирии // Биоразнообразие и биоресурсы Урала и сопредельных территорий: мат-лы II между-нар. конф. Оренбург, 2002. С. 150.
29. Баянов М.Г., Книсс В.А., Хабибуллин В.Ф. Каталог животных Башкортостана: справочное издание. Уфа: РИЦ БашГУ, 2015. 350 с.
30. Баянов М.Г., Дьяченко И.П., Хабибуллин В.Ф., Биккинин Р.Ф., Боев В.Г., Бурзянцев А.В., Данукалова Г.А., Едренкина Л.А., Книсс В.А., Кучеров Е.В., Маматов А.Ф., Матвеев А.Б., Мигранов М.Г., Осипова Е.М., Островская Ю.В., Сабитова Р.З., Степанова Р.К., Юмагулова Г.Р., Яковлев А.Г. Животные Башкортостана. Уфа: БашГУ, 2016. 388 с.
31. Баянов М.Г., Петрова С.В. Гельминты жаб (Amphibia, Bufonidae) в Башкирии // Итоги биологических исследований. Вып. 6. Уфа, 2001. С. 155–157.
32. Баянов М.Г., Яковлева Т.В. Список пищевых объектов бесхвостых амфибий в Башкортостане // Итоги биологических исследований. Вып. 6. Уфа: БашГУ, 2001. С.153–155.
33. Беньковский А.О. Жуки-листоеды (Coleoptera, Chrysomelidae) европейской части России (по материалам докторской диссертации). Saarbrucken: Lambert Academic Publishing. 2011. 535 с.
34. Беньковский А.О., Орлова-Беньковская М.Я. Каталог местонахождений листоедов (Chrysomelidae) России. Версия 16.10.2017. https://www.zin.ru/ANIMAliA/Coleoptera/rus/benkat15.htm
35. Боев В.Г. Наземные моллюски Башкирии // Фауна и экология животных УАССР и прилежащих районов: сб. мат-лов. Ижевск, 1984. С. 85–89.
36. Боев В.Г. Влияние термальных вод на зообентос и зоопланктон Кармановского водохранилища // Итоги научных исследований биологического факультета Башкирского госун-та за 1994 год: тез. докладов. Уфа: БашГУ, 1995. С. 43–44.
37. Боев В.Г., Баянов М.Г. К познанию пресноводной малакофауны Башкирии // Вопросы экологии Южного Урала. Уфа, 1984. Вып. 2. С. 58–

70 (Деп. в ВИНИТИ. N 3872-84).
38. Боев В.Т., Баянов М.Г. Гидромалакофауна Южного Урала // Редколлегия журнала «Биологические науки». М. 1989. 55 с. (Рук. деп. в ВИНИТИ 1 № 2505-В89).
39. Большаков Л.В., Исмагилов Н.Н. Разноусые чешуекрылые Республики Татарстан. 3. Огневкообразные (Lepidoptera: Pyraloidea) // Эверсманния. Энтомологические исследования в России и соседних регионах. 2019. Вып. 57. С. 40–81.
40. Будашкин Ю.И., Рихтер И. Новые виды молей-чехлоносок рода Casignetella Strand, 1928 (Lepidoptera: Coleophoridae) из России // Эверсманния. Энтомологические исследования в России и соседних регионах. 2015. Вып. 41. С. 6–10.
41. Будашкин Ю.И., Рихтер И., Табель Ю. Новые находки молей-чехлоносок (Lepidoptera: Coleophoridae) в России и в Армении // Эверсманния. Энтомологические исследования в России и соседних регионах. 2015. Вып. 41. С. 11–22.
42. Бурзянцев А.В., Кучеров Е.В., Мигранов М.Г. Животный мир хребта Шайтан-тау // Дубравная лесостепь на хребте Шайтан-тау и вопросы ее охраны. Уфа, 1994. С. 112–149.
43. Быкова С.В., Андреева В.А. Первые сведения о свободноживущих инфузориях планктона озера Аслы-Куль (Республика Башкортостан, Южное Приуралье) // Самарская Лука: проблемы региональной и глобальной экологии. 2020. Т. 29. № 4. С. 23–30.
44. Быкова С.В., Жариков В.В., Андреева В.А., Горбунов М.Ю., Уманская М.В. Инфузории озера Кандры-куль (Респ. Башкортостан): состав, пространственное распределение, сезонная динамика и экологическое состояние водоема по данным их сообщества // Известия Самарского научного центра РАН. 2014. Т. 16. № 5(5). С.1748–1757.
45. Валишин Э. Д., Ватников Ю. А. Паразитофауна желудочно-кишечной системы домашних собак г. Уфа // Теория и практика борьбы с паразитарными болезнями. 2018. № 19. С. 120–122.
46. Валуев В.А. Орнитологические находки в Башкирской АССР // Вопросы экологии животных Южного Урала. Вып. 4. Уфа, 1989. С. 25–27.
47. Валуев В.А. Некоторые результаты изучения редких видов птиц Башкирии // Всес. совещ. по проблеме кадастра и учёта жив. мира. Ч. 3. Уфа: Башкирское книжн. изд-во, 1989. С. 36–37.
48. Валуев В.А. К авифауне лесостепи Предуралья Башкирии // Материалы к распространению птиц на Урале, в Приуралье и Западной Сибири. 2002. №7. С. 69–71.
49. Валуев В.А. Новые данные по авифауне лесостепных районов Предуралья Башкортостана // Итоги биологический исследований 2001 г. Вып. 7. Уфа: РИО БашГУ, 2003а. С. 51–53.
50. Валуев В.А. Данные автоучётов хищных птиц в лесостепной зоне

Башкортостана, проведённых в весенне-осенний периоды 2001-го и 2002-го годов // Итоги биологических исследований 2001 г. Вып. 7. Уфа: РИО БашГУ, 2003б. С. 59–60.
51. Валуев В.А. Обзор летней орнитофауны Предуралья и Южного Урала (отряды: Гагарообразные, Поганкообразные, Веслоногие, Аистообразные, Фламингообразные, Гусеобразные) // Вестник Башкирского ун-та. 2004а. № 1. С. 35–41.
52. Валуев В.А. Обзор птиц отряда Соколообразные Башкортостана // Вестник Башкирского ун-та. 2004б. № 4. С. 34–42.
53. Валуев В.А. К фауне птиц рыборазводных прудов Фёдоровского района Башкортостана // Материалы к распространению птиц на Урале, в Приуралье и Западной Сибири. 2004в. №9. С. 44–49.
54. Валуев В.А. К Журавлеобразным Башкортостана // Животный мир Южного Урала и Северного Прикаспия: тез. и мат-лы V региональной конференции. Оренбург, 26-28 апреля 2005 г. Оренбург: Оренбургская губерния, 2005а. С. 141–144.
55. Валуев В.А. К вопросу об антропогенном влиянии (на примере отрядов Columbiformes, Cuculiformes, Apodiformes, Coraciiformes в Республике Башкортостан) // Объединение субъектов Российской Федерации и проблемы природопользования в Приенисейской Сибири: тез. и мат-лы докладов межрег. научно-практ. конф., 11-13 апреля 2005 г. Красноярск, 2005б. С. 183–186.
56. Валуев В.А. Экология куликов Башкортостана и аспекты их охраны. Уфа: Гилем, 2007а. 156 с.
57. Валуев В.А. К послегнездовому периоду пойменного орнитокомплекса Южного Урала // Горные экосистемы и их компоненты: тр. междунар. конф. Часть 1. М.: Т-во научных изданий КМК, 2007б. С. 119–121.
58. Валуев В.А. Подход к оценке обилия хищных птиц // Сохранение разнообразия животных и охотничье хозяйство России: мат-лы 2-й Междунар. научно-практич. конф. М.: МСХА им. К.А. Тимирязева, 2007в. С. 350–351.
59. Валуев В.А. Экология птиц Башкортостана (1811-2008). Уфа: Гилем, 2008а. 712 с.
60. Валуев В.А. Обзор распространения птиц Башкортостана: отряды Гагарообразные, Поганкообразные, Пеликанообразные и Аистообразные (1840-2007 гг.) // Волжско-Камский орнитол. вестник. 2008б. Вып. 1. С.12–16.
61. Валуев В.А. К распространению ходулочника в Башкортостане // Материалы к распространению птиц на Урале, в Приуралье и Западной Сибири. 2008в. №. 13. С. 18.
62. Валуев В.А. Обзор распространения и численности птиц семейств: Воробьиные, Вьюрковые и Овсянковые // Волжско-Камский орнитол. вестник. 2009. Вып. 3. С. 4–9.

63. Валуев В.А. Пребывание пастушка *Rallus aquaticus* и южного подвида среднего кроншнепа *Numenius phaeopus alboaxillaris* в Башкортостане // Редкие и исчезающие виды животных и растений Республики Башкортостан. 2010. Вып. 2. С. 22–24.
64. Валуев В.А. К гнездованию белоглазой чернети в Башкирии // Материалы к распространению птиц на Урале, в Приуралье и Западной Сибири. 2012а. № 17. С. 16–17.
65. Валуев В.А. О статусе красношейной поганки, кулика-сороки и белощёкой крачки в Республике Башкортостан // Редкие и исчезающие виды животных и растений Республики Башкортостан. 2012б. Вып. 4. С. 13–14.
66. Валуев В.А. Орлан-долгохвост в Башкирии // Редкие и исчезающие виды животных и растений Республики Башкортостан. 2012в. Вып. 4. С. 18.
67. Валуев В.А. О внесении клинтуха и горлиц в Красную книгу РБ // Редкие и исчезающие виды животных и растений Республики Башкортостан. 2013а. Вып. 5. С. 15.
68. Валуев В.А. Наблюдения пискульки и большого баклана в Башкирии // Материалы к распространению птиц на Урале, в Приуралье и Западной Сибири. 2013б. Вып. 18. С. 9–11.
69. Валуев В.А. К распространению малого погоныша *Porzana parva* в Башкирии // Русский орнитол. журнал. 2014а. Т. 23. Экспресс-выпуск 1056. С. 3112-3113.
70. Валуев В.А. К орнитофауне Чишминского района Республики Башкортостан // Авифауна Украины. 2014б. Вып. 5. С. 13–24.
71. Валуев В.А. К биологии и распространению тарантула в Башкирии // Материалы по флоре и фауне Республики Башкортостан. 2015а. Вып. 8. С. 8.
72. Валуев В.А. О состоянии серощёкой поганки *Podiceps grisegena* в Башкирии // Русский орнитол. журнал 2015б. Т. 24. Экспресс-выпуск 1194. С. 3470–3471.
73. Валуев В.А. К распространению красношейной поганки *Podiceps auritus* в Башкирии // Русский орнитол. журнал. 2015в. Т. 24. Экспресс-выпуск 1207. С. 3876–3877.
74. Валуев В.А. Чёрная казарка *Branta bernicla* в Башкирии // Русский орнитол. журнал. 2016а. Т. 25. Экспресс-выпуск 1379. С. 4888–4889.
75. Валуев В.А. К распространению белоглазого нырка *Aythya nyroca*, гоголя *Bucephala clangula* и турпана *Melanitta fusca* в Башкирии // Редкие и исчезающие виды животных и растений Республики Башкортостан. 2016б. Вып. 12. С. 3–7.
76. Валуев В.А. Беркут *Aquila chrysaetos* и могильник *A. heliaca* в Башкирии // Редкие и исчезающие виды животных и растений Республики Башкортостан. 2016в. Вып. 11. С. 7–14.
77. Валуев В.А. Птицы отрядов Гагарообразные – Гусеобразные природного

парка «Аслы-куль» (Башкирия) // Башкирский орнитол. вестник. 2016г. № 20. С. 3–22.
78. Валуев В.А. Пятнистый конёк *Anthus hodgsoni* в Башкирии // Редкие и исчезающие виды животных и растений Республики Башкортостан. 2017. Вып. 18. С. 10–12.
79. Валуев В.А. К шмелям Башкирии // Материалы по флоре и фауне Республики Башкортостан. 2018. Вып. 18. С. 3-12
80. Валуев В.А. Наиболее редкие птицы Башкирии 2007-2018 гг. // Редкие и исчезающие виды животных и растений Республики Башкортостан. 2019а. Вып. 23. С. 3–10.
81. Валуев В.А. *Polistes albellus* Giordani Soika, 1976 (= *Polistes helveticus*) в Башкирии // Редкие и исчезающие виды животных и растений Республики Башкортостан. 2019б. Вып. 23 С.14–16.
82. Валуев В.А. Наездники *Amblyjoppa fuscipennis* и *Dolichomitus* в Башкирии // Редкие и исчезающие виды животны и растений Республики Башкортостан. 2019в. Вып. 24 С.6–9.
83. Валуев В.А. Красноголовый муравей *Formica truncorum* – новый вид в Башкирии // Редкие и исчезающие виды животных и растений Республики Башкортостан. 2019г. Вып. 25. С.13–14.
84. Валуев В.А. Новые данные по орлу-карлику, могильнику и степному орлу в Башкирии // Редкие и исчезающие виды животных и растений Республики Башкортостан. 2019д. Вып. 25. С. 18–23.
85. Валуев В.А. О камышнице *Gallinula chloropus* в Башкирии // Материалы по флоре и фауне Республики Башкортостан. 2019е. Вып. 23. С. 4–5.
86. Валуев В.А. К птицам Учалинского района Башкирии // Башкирский орнитол. вестник. 2020а. № 34. С. 3 –11.
87. Валуев В.А. Регистрация дупеля в Гафурийском районе РБ // Башкирский орнитол. вестник. 2020б. № 35. С. 6–9.
88. Валуев В.А. Находки каменки-плясуньи *Oenanthe isabellina* и пеночки-таловки *Phylloscopus borealis* в Башкирии // Редкие и исчезающие виды животных и растений Республики Башкортостан. 2020в. № 29. С. 9–14.
89. Валуев В.А. Новый для Башкирии вид муравья *Myrmica curvithorax* Bondroit, 1920 (= *M. slovaca* Sadil, 1952) и ещё одна регистрация *M. gallienii* Bondroit, 1920 // Редкие и исчезающие виды животных и растений Республики Башкортостан. 2021а. Вып. 31. С. 12–14.
90. Валуев В.А. Сибирский конёк *Anthus gustavi* Swinhoe, 1863в Башкирии // Редкие и исчезающие виды животных и растений Республики Башкортостан. 2021б. Вып. 31. С.15–17.
91. Валуев В.А. Регистрации пауков (Aranei) и сенокосцев (Opiliones) в центральных районах Республики Башкортостан в 2021 г. // Материалы по флоре и фауне Республики Башкортостан. 2022а. Вып. 34. С. 27–33.
92. Валуев В.А. К паукам Республики Башкортостан (2022 г.) // Материалы по флоре и фауне Республики Башкортостан. 2022б. Вып. 37. С. 15–25.

93. Валуев В.А. Первое указание паука *Pholcus ponticus* (Aranei, Pholcidae) и вторая находка *Aculepeira ceropegia* (Aranei, Araneidae) в Республике Башкортостан // Материалы по флоре и фауне Республики Башкортостан. 2022в. Вып. 34. С. 131–132.
94. Валуев В.А. Птицы некоторых центральных районов Республики Башкортостан в 2021 г. // Материалы по флоре и фауне Республики Башкортостан. 2022г. Вып. 34. С. 3–10.
95. Валуев В.А. К паукам (Arachnida, Araneae) Республики Башкортостан (2022 г.) // Материалы по флоре и фауне Республики Башкортостан. 2023а. Вып. 38. С. 14–17.
96. Валуев В.А. Краткие сведения о редких птицах (Aves) Республики Башкортостан, встреченных с 15 июня по 28 июля 2023 г. // Материалы по флоре и фауне Республики Башкортостан. 2023б. Вып. 39. С. 9–16.
97. Валуев В.А. Курганник *Buteo rufinus* Cretzschmar, 1827 на севере Республики Башкортостан (2023 г.) // Материалы по флоре и фауне Республики Башкортостан. 2023в. Вып. 39. С. 62–67.
98. Валуев В.А. Исследование орнитофауны Республики Башкортостан в 2023 г. // Материалы по флоре и фауне Республики Башкортостан. 2023г. Вып. 40. С. 17–24.
99. Валуев В.А. Результаты изучения шмелей Bombus (Latreille, 1802) Республики Башкортостан 2016-2023 гг. // Материалы по флоре и фауне Республики Башкортостан. 2024а. Вып. 42. С. 03–20.
100. Валуев В.А. Результаты исследований орнитофауны Республики Башкортостан 2004-2023 гг. (кроме населённых пунктов) // Материалы по флоре и фауне Республики Башкортостан. 2024б. Вып. 42. С. 21–33.
101. Валуев В.А. Результаты изучения муравьёв Formicidae (Latreille, 1802) Республики Башкортостан 2017-2023 гг. // Материалы по флоре и фауне Республики Башкортостан. 2024в. Вып. 42. С. 34–56.
102. Валуев В.А. Пролёт пискульки *Anser erythropus* и залёт толстоклювой камышевки *Phragamaticola aedon* (Aves, Acrocephalidae) в Башкирии // Материалы по флоре и фауне Республики Башкортостан. 2025а. Вып. 47. С. 09–13.
103. Валуев В.А. Птицы (Aves) башкирского Урала 2000-2025 гг. // Материалы по флоре и фауне Республики Башкортостан. 2025б. Вып. 48. С. 3–20.
104. Валуев В.А., Артемьев А.И., Валуев В.Д. Орнитофауна хребта Ирендык // Материалы к распространению птиц на Урале, в Приуралье и Западной Сибири. 2006а. №11. С. 39–41.
105. Валуев В.А., Артемьев А.И., Валуев В.Д. К редким видам птиц Башкортостана // Материалы к распространению птиц на Урале, в Приуралье и Западной Сибири. 2006б. №11. С. 42–44.
106. Валуев В.А., Валуев Д.В. Весенняя авифауна Башкирского Зауралья // Сибирская зоологическая конференция: тез. докл. Всерос. конф.,

посвящённой 60-летию Института систематики и экологии животных СО РАН, 15-22 сентября 2004 г., Новосибирск, 2004. С. 112–113.
107. Валуев В.А., Валуев К.В. Новые наблюдения редких птиц в Башкирии // Итоги биологических исследований. Вып. 6. 2000 г. Уфа, 2001. С. 161–163.
108. Валуев В.А., Валуев К.В. Индийская и тростниковая камышевки в Башкортостане // Материалы к распространению птиц на Урале, в Приуралье и Западной Сибири. 2010. №15. С. 36–37.
109. Валуев В.А., Едрёнкин В.А. К антропогенным воздействиям на авифауну: мат-лы III Междунар. научно-практич. конф. 12-13 мая 2005 г. Астрахань: Астраханский университет, 2005. С. 80–82.
110. Валуев В.А., Загорская В.В. Белокрылый клёст *Loxia leucoptera* Башкирии // Русский орнитол. журнал. 2014а. Т. 23. Экспресс-выпуск 980. С. 907.
111. Валуев В.А., Загорская В.В. Авдотка *Burhinus oedicnemus* в Башкирии // Русский орнитол. журнал. 2014б. Т. 23. Экспресс-выпуск 1004. С. 1625–1626.
112. Валуев В.А., Зернов Д.А. К миграции среднего кроншнепа *Numenius phaeopus* и рогатого жаворонка *Eremophila alpestris* через Южный Урал // Башкирский орнитол. вестник. 2016. № 19. С. 14–20.
113. Валуев В.А., Зернов Д.А. Новые находки кваквы *Nycticorax nycticorax* и белоглазого нырка *Aythya nyroca* в Башкирии // Редкие и исчезающие виды животных и растений Республики Башкортостан. 2018. Вып. 21. С.3–5.
114. Валуев В.А., Зернов Д.А. К регистрации серого гуся, южного соловья и урагуса в Башкирии // Редкие и исчезающие виды животных и растений Республики Башкортостан. 2020. Вып. 28. С. 8–10.
115. Валуев В.А., Зернов Д.А. Находки соловья-красношейки *Luscinia calliope* и пятнистого конька *Anthus hodgsoni* в Башкирии // Редкие и исчезающие виды животных и растений Республики Башкортостан. 2020а. Вып. 29. С. 17–21.
116. Валуев В.А., Исмагилов Н.Н. Дополнительные сведения к распространению *Parnassius mnemosyne* (Linnaeus, 1758) и *Nematopogon swammerdamella* (Linnaeus, 1758) (Insecta, Lepidoptera) в Республике Башкортостан // Материалы по флоре и фауне Республики Башкортостан. 2022. Вып. 35. С. 7–10.
117. Валуев В.А., Исмагилов Н.Н. Новые находки редких видов бабочек (Insecta, Lepidoptera) в Республике Башкортостан // Материалы по флоре и фауне Республики Башкортостан. 2023а. Вып. 38. С. 18–27.
118. Валуев В.А., Исмагилов Н.Н. Новые регистрации *Diaphora mendica* и *Hemaris tityus* (Insecta, Lepidoptera) в Республике Башкортостан // Материалы по флоре и фауне Республики Башкортостан. 2023б. Вып. 39. С. 31–35.

119. Валуев В.А., Крутилин А.В. Мирмика луговая *Myrmica rugulosa* – новый для Башкирии вид // Редкие и исчезающие виды животных и растений Республики Башкортостан. 2017. Вып. 18. С.15–17.
120. Валуев В.А., Мулдашев А.А. Редкие для Башкирии нарывники Meloidae Gyllenhal, 1810 // Редкие и исчезающие виды животных и растений Республики Башкортостан. 2020. Вып. 30. С. 8–10.
121. Валуев В.А., Файзуллина М.Ю. Аспергиллёз у беркута *Aquila chrysaetos* // Башкирский орнитол. вестник. 2007. Вып. 4. С. 9–11.
122. Валуев В.А., Яковлева Т.И., Яковлев А.Г. Клушица *Pyrrhocorax pyrrhocorax* на Южном Урале // Русский орнитол. журнал. 2014. Т. 23. Экспресс-выпуск 1048. С. 2867–2869.
123. Василенко С.В. Новый вид пяденицы рода Xanthorhoe (Lepidoptera, Geometridae, Larentiinae) с территории Урала и Западной Сибири // Зоол. журнал. 2007. Т. 86. № 8. С. 1019–1022.
124. Винокуров Н.Н. Полужесткокрылые рода Saldula V.D. (Heteroptera, Saldidae) фауны России и сопредельных стран // Евразиатский энтомол. журнал. 2004. Т.3. №2. С. 101–118.
125. Винокуров Н.Н. Виды рода Chartoscirta Stel (Heteroptera, Saldidae) фауны России и сопредельных стран // Евразиатский энтомол. журнал. 2007. Т.6. №1. С. 51–56.
126. Винокуров Н. Н., Голуб В. Б., Зиновьева А. Н. К фауне цветочных клопов (Heteroptera, Anthocoridae) Южно-Уральского государственного заповедника // Биодиагностика состояния природных и природно-техногенных систем: мат-лы XII Всерос. научно-практич. конф. с междунар. участием. Книга 1. Киров: Веси, 2014. С.230–232.
127. Винокуров Н.Н., Голуб В.Б., Зиновьева А.Н. Клопы-слепняки (Heteroptera, Miridae) Южно-уральского государственного природного заповедника. I. Bryocorinae, Deraeocorinae, Mirinae // Научные ведомости БелГУ. 2015. №15(212). Вып. 32. С. 84–93.
128. Винокуров Н.Н., Голуб В.Б., Зиновьева А.Н. Полужесткокрылые надсемейства Pentatomoidea (Heteroptera) Южно-Уральского гос. природного заповедника // Научные ведомости БелГУ. Серия Естественные науки. 2016. № 11 (232). Вып. 35. С. 57–69.
129. Винокуров Н.Н., Голуб В.Б., Зиновьева А.Н. Клопы-слепняки (Heteroptera, Miridae) Южно-уральского государственного природного заповедника. II. Orthotylinae, Phylinae // Евразиатский энтомол. журнал, 2017. №16(3). С. 247–252
130. Винокуров Н.Н., Голуб В.Б., Зиновьева А.Н. Клопы-охотники (Heteroptera, Nabidae) Южно-Уральского заповедника // Фауна Урала и Сибири. 2018. № 1. С. 74–78.
131. Винокуров Н.Н., Канюкова Е.В., Голуб В.Б. Новые дополнения к фауне полужесткокрылых насекомых (Heteroptera) семейств Dipsocoridae, Corixidae, Saldidae, Microphysidae, Anthocoridae, Tingidae, Reduviidae и

Lygaeidae европейской территории России и Урала // Евразиатский энтомол. журнал. 2019. Т. 18. Вып. 5. С. 348–354.
132. Власов С.В., Есюнин С.Л. Новые указания пауков (Arachnida: Araneae) для фауны Башкортостана // Вестник Пермского университета. Серия Биология. 2025. Вып.4. С. XX–XX.
133. Волков А.М. Изменение видового состава мелких млекопитающих в Башкирском заповеднике за 50 лет // Проблемы охраны генофонда и управления экосистемами в заповедниках лесной зоны. Часть II: тез. докл. Всесоюз. совещания / Отв. ред.: В.Е. Соколов, К.П. Филонов. М., 1986. С.46–48.
134. Всеволодова-Перель Т.С. Дождевые черви фауны России: Кадастр и определитель. М.: Наука, 1997. 102 с.
135. Габидуллин А.Ш. Убежище северных элементов булавоусых чешуекрылых на Южном Урале // Фауна и экология насекомых Урала: информационные мат-лы. Свердловск. 1987. С. 10–12.
136. Галиева Л.Ф. Зимняя авифауна посёлка Кандры в январе-феврале 2003 г. // Биоразнообразие, проблемы его сохранения в Южном регионе Республики Башкортостан и на сопредельных территориях. Стерлитамак, Стерлитамакский гос. педагогический институт, 2003. С. 74–75.
137. Галиева Л.Ф. К распространению кваквы *Nycticorax nycticorax* в Башкортостане // Башкирский орнитол. вестник. 2008а. № 5. С. 10–11.
138. Галиева Л.Ф. К редким видам птиц на прудах Башкирского Предуралья // Материалы к распространению птиц на Урале, в Приуралье и Западной Сибири. 2008б. №13. С. 22–23.
139. Галиева Л.Ф. К распространению большого баклана в Башкортостане // Материалы к распространению птиц на Урале, в Приуралье и Западной Сибири. 2008в. №13. С. 23–24.
140. Галиева Л.Ф. К распространению чернозобой гагары Gavia arctica в Башкортостане // Экология, эволюция и систематика животных: мат-лы Всерос. научно-практич. конф. с междунар. участием. Рязань: Голос губернии, 2009. С. 200–201.
141. Ганиев М.М., Недорезков В.Д. Защита полевых культур от вредителей и болезней. Уфа: БГАУ, 2008. 244 с.
142. Ганиев М.М., Недорезков В.Д., Шарипов Х.Г. Вредители и болезни зерна и зернопродуктов при хранении. Уфа: БГАУ, 2007. 256 с.
143. Герасимов С.В. Находки мегариссы жемчужной *Megarhyssa perlata* в Башкирии // Редкие и исчезающие виды животных и растений Республики Башкортостан. 2016. Вып. 14. С.64–67.
144. Герасимов С.В. Список жуков-усачей (Coleoptera: Cerambycidae) Республики Башкортостан // Материалы по флоре и фауне Республики Башкортостан. 2017а. Вып. 15. С.24–34.
145. Герасимов С.В. К энтомофауне окрестностей оз. Кандры-куль (Башкирия) // Материалы по флоре и фауне Республики Башкортостан.

2017б. Вып. 17. С.8–13.
146. Герасимов С.В. К распространению пелопея безобразного *Sceliphron deforme* (F. Smith, 1856) и осы-немки *Dasylabris maura* (L., 1758) в Башкирии // Редкие и исчезающие виды животных и растений Республики Башкортостан. 2021а. Вып. 31. С.18–21.
147. Герасимов С.В. Малый ясеневый лубоед *Hylesinus varius* в Башкортостане // Редкие и исчезающие виды животных и растений Республики Башкортостан. 2021б. Вып. 31. С.22–24.
148. Гилёв А.В., Тунёва Т.К. Заметки о биоразнообразии муравьев Урала. 1. Муравьи хребта Нурали (Башкортостан) // Фауна Урала и Сибири. 2015. №1. С. 42–47.
149. Гирфанова Л.Н. К фауне паразитических двукрылых Башкирии (Diptera, Larvaevoridae, Sarcophagidae, Calliphoridae) // Исследования очагов вредителей леса Башкирии: сб. статей / Отв. ред. В.Г. Конарев. Уфа, 1962а. С.113–116.
150. Гирфанова Л.Н. Морфологические особенности взрослых личинок мух саркофаг (Sarcophagidae), паразитирующих в куколках непарного шелкопряда // Исследования очагов вредителей леса Башкирии: сб. статей / Отв. ред. В.Г. Конарев. Уфа, 1962б. С.117–122.
151. Гирфанова Л.Н. Значение двукрылых энтомофагов в снижении численности лесных вредителей // Животные Башкирии, их экология и численность. Ученые записки Башгосун-та. Вып. 40. Серия биологическая. № 5. Уфа, 1970. С. 49–56.
152. Гирфанова Л.Н., Степанова Р.К. К фауне тахиноидных двукрылых Южного Урала // Динамика численности и роль насекомых в биогеоценозах Урала / Информ. мат-лы Ин-та экол. раст. и жив. Свердловск, 1983. С. 16–17.
153. Гирфанова Л.Н., Степанова Р.К., Щецяк И.Б. К фауне ктырей (Diptera, Aselidae) Башкирии // Вопросы экологии животных Южного Урала. Уфа, 1992. Вып. 6. С.47–53 / Рукопись депонирована в ВИНИТИ № 587-В92.
154. Голуб Н.В. Фауна сеноедов (Psocoptera) Южного Урала // Энтомол. обозрение. 2015. Т.94. №3. С. 608–615.
155. Голуб В.Б., Винокуров Н.Н., Зиновьева А.Н., Голуб Н.В. Обзор фауны клопов семейств Ceratocombidae, Tingidae, Microphysidae и Reduviidae (Heteroptera) Среднего и Южного Урала с анализом зоогеографической структуры фауны семейства Tingidae // Энтомол. обозрение. 2017. Т. 96. Вып. 2. С. 286–305.
156. Горбунов П.Ю. Список высших чешуекрылых (Lepidoptera: Macrolepidoptera) хребта Нурали (Башкортостан) // Фауна Урала и Сибири. 2023. № 2. С. 48–69.
157. Григорчак Г.М. Циркуляция гельминтов рыб в условиях горных рек Южного Урала. Автореф. дисс. ... канд. биол. наук. Уфа, 1995. 25 с.
158. Гридина Т. И. Муравьи Урала и их географическое распределение //

Успехи современной биологии. 2003. Т. 123. № 3. С. 289–298.
159. Гридина Т.И. К вопросу о распространении *Formica gagatoides* Ruzs. (Hymenoptera, Formicidae) на Урале // Успехи энтомологии на Урале: сб. научных трудов / Ред. В.Н. Ольшванг, И.А. Богачева, Н.В. Николаева и др. Екатеринбург, 1997. С.174.
160. Давлетбаев Р.Г. К изучению фауны и экологии панцирных клещей в Башкирии // Борьба с инвазионными болезнями сельскохозяйственных животных. Уфа: Башк. кн. изд-во, 1975. С. 35–45.
161. Данилевский А.С., Кузнецов В.И. Обзор моле-листоверток рода Hemerophila Hb. (Lepidoptera, Glyphipterygidae) фауны СССР // Чешуекрылые фауны СССР и сопредельных стран. Труды Всесоюз. энтомол. об-ва. 1973. Т. 56. С. 8–17.
162. Данилевский А.С., Кузнецов В.И. Фауна СССР, новая серия, № 98. Насекомые чешуекрылые. Том V. Вып. 1. Листовертки Tortricidae, триба плодожорки Laspetresiini. Л. 1968. 636 с.
163. Данукалова Г.А., Морозова Е.М. Первая находка вида *Cochlodina laminata* (Mont.) на территории Республики Башкортостан // Еколого-функціональні та фауністичні аспекти дослідження молюсків, їх роль у біоіндикації стану навколишнього середовища: зб. наукових праць. Житомир: Волинь, 2004. С. 49–50.
164. Двустворчатые моллюски России и сопредельных стран в фанерозое / Л.А. Невесская, С.В. Попов, И.А. Гончарова, А.В. Гужов, Б.Т. Янин, И.В. Полуботко, А.С. Бяков, В.А. Гаврилова. (Тр. ПИН РАН. Т.294). М.: Научный мир, 2013. 524 с.
165. Дедюхин С.В. Материалы по интересным находкам жуков-долгоносиков (Coleoptera, Curculionoidea) на востоке Русской равнины // Вестник Удмуртского университета. Серия Биология. Науки о Земле. 2011. Вып. 2. С. 90–104.
166. Дедюхин С. В. Долгоносикообразные жесткокрылые (Coleoptera, Curculionoidea) Вятско-Камского междуречья: фауна, распространение, экология. Ижевск: Удмуртский университет, 2012. 340 с.
167. Дедюхин С.В. К фауне и экологии жуков-фитофагов (Coleoptera: Chrysomeloidea, Curculionoidea) Заволжья и Предуралья // Энтомол. обозрение. 2014. Т. 93. Вып. 3. С. 568–593.
168. Дедюхин С.В. Разнообразие растительноядных жуков (Coleoptera: Chrysomeloidea, Curculionoidea) в степных сообществах лесостепи Высокого Заволжья // Энтомол. обозрение. 2015. Т. 94. Вып. 3. С. 626–650.
169. Дедюхин С.В. Видовое богатство и зональные особенности парциальных фаун жуков-фитофагов (Coleoptera, Chrysomeloidea, Curculionoidea) травянистых склонов на востоке Русской равнины и в Предуралье // Зоол. журнал. 2016а. Т. 95. Вып. 9. С. 1053–1065.
170. Дедюхин С.В. Новые данные о составе растительноядных жуков

(Coleoptera: Attelabidae, Chrysomelidae, Curculionidae), связанных с дубом (Quercus robur L.), в Предуралье и на Южном Урале // Природа, наука и туризм: Сб. мат-лов всерос. научно-практич. конф., посвященной 30-летию национального парка «Башкирия» / Отв. ред. Н.М. Сайфуллина. Уфа: Гилем, Башкирская энциклопедия, 2016б. С. 145–152.
171. Дедюхин С.В. Жуки-листоеды (Coleoptera, Chrysomelidae) Вятско-Камского междуречья и сопредельных территорий: фауна, распространение, экология. Ижевск: Удмуртский ун-т, 2018. 208 с.
172. Дедюхин С.В. Характеристика фауны и комплексов жуков-фитофагов (Coleoptera: Chrysomeloidea, Curculionoidea) шихана Куштау (Ишимбайский район Республики Башкортостан) // Полевой журнал биолога. 2019. Т. 1. Вып. 4. С. 179–192.
173. Дедюхин С.В. Особенности фауны и сообществ растительноядных жуков (Coleoptera: Chrysomeloidea, Curculionoidea) шиханов близ г. Стерлитамак (Республика Башкортостан) // Зоол. журнал. 2020а. Т. 99. Вып. 4. С. 413–421. DOI: 10.31857/S0044513420020087
174. Дедюхин С.В. Охраняемые и рекомендуемые к охране виды жуков-фитофагов (Coleoptera: Chrysomelidae и Curculionoidea) в регионах Среднего Поволжья и Урала // Nature Conservation Research. Заповедная наука 2020б. Т. 5. Вып. 2. С. 1–27. DOI: https://dx.doi.org/10.24189/ncr.2020.013
175. Дедюхин С.В. Распространение и трофические связи травоядных короедов рода Thamnurgus Eichhoff (Coleoptera, Curculionidae, Scolytinae) в Поволжье и на Урале // Энтомол. обозрение. 2020в. Т. 99. Вып. 3. С. 622–630. DOI: 10.31857/S0367144520030107
176. Дедюхин С.В. Долгоносикообразные жуки (Coleoptera, Curculionoidea) степей Лесостепного Заволжья. Ижевск: Удмуртский ун-т, 2024а. 260 с.
177. Дедюхин С.В. Неожиданная находка долгоносика *Brachysomus lituratus* (Stierlin, 1884) (Coleoptera, Curculionidae, Entiminae) в Лесостепном Заволжье // Полевой журнал биолога. 2024б. Т. 6. Вып. 3. С. 231–238.
178. Дедюхин С.В. Жуки-фитофаги (Coleoptera: Chrysomeloidea, Curculionoidea) Стерлитамакских шиханов (геопарк «Торатау», Республика Башкортостан). Ижевск: Удмуртский университет. 2025а. 253 с.
179. Дедюхин С.В. Первая находка долгоносика *Thamiocolus imperialis* (Schultze, 1895) (Coleoptera, Curculionidae) на Урале // Полевой журнал биолога. 2025б. Т.7. Вып. 3. С. 319–325. DOI: 10.52575/2712-9047-2025-7-3-319-325
180. Дедюхин С.В. Дополнения к фауне долгоносикообразных жуков (Coleoptera, Curculionoidea) Башкортостана // Полевой журнал биолога. 2025в. Т. 7. Вып. 4. С. 555–561. DOI: 10.52575/2712-9047-2025-7-4-555-561
181. Дедюхин С.В., Коротяев Б.А. Интересные находки долгоносикообразных

жуков (Coleoptera, Curculionoidea) вблизи границы между Европой и Азией // Энтомол. обозрение. 2021. Т. 100. Вып. 2. С. 439–358. DOI: 10.31857/S0367144521020118
182. Дедюхин С.В., Коротяев Б.А. Распространение и особенности экологии долгоносика *Sitona onerosus* Faust, 1890 (Coleoptera, Curculionidae) в европейской части России // Энтомол. обозрение. 2024. Т. 103. Вып. 3. С. 340–346. DOI: 10.31857/S0367144524030057
183. Дедюхин С.В., Мартыненко В.Б. Консортивные связи жуков-фитофагов (Coleoptera: Chrysomeloidea и Curculionoidea) с растениями на уникальных Стерлитамакских шиханах // Энтомол. обозрение. 2020. Т. 99. Вып. 2. С. 339–367. DOI: 10.31857/S0367144520020100
184. Дубатолов В.В. Обзор видов рода Chelis Rbr. (Lepidoptera, Arctiidae) фауны СССР // Таксономия животных Сибири. Новосибирск, 1988. С. 80–98.
185. Дьяченко И.П., Биккинин Р.Ф., Биккинин А.Р. Эпизоотическое состояние озера Яктыкуль // Вестник Башкирского ун-та. 2006. №11. С. 59–61.
186. Дюжаева И.В. Первые результаты изучения гетероптерофауны (Insecta, Heteroptera) Южно-уральского государственного природного заповедника // Биоразнообразие и биоресурсы Урала и сопредельных территорий: мат-лы II межд. конф. / Отв. ред. З.Н. Рябинина. Оренбург: ОГПУ, 2002. С.159–160.
187. Дюжаева И.В., Трофимова Т.А. К энтомофауне Южно-Уральского заповедника // Проблемы сохранения биоразнообразия на Южном Урале: тез. докл. региональной научно-прак. конф. / Отв. ред. Б.М. Миркин. Уфа, 2004. С.102–103.
188. Дьяченко И.П. Рыбы и рыбные ресурсы Башкортостана. Уфа: РИЦ БашГУ, 2013. 150 с.
189. Дядечко Н.П. Трипсы, или бахромчатокрылые насекомые (Thysanoptera) Европейской части СССР. Киев: Урожай, 1964. 388 с.
190. Есюнин С.Л. Аннотированный список пауков Республики Башкортостан // Материалы по флоре и фауне Республики Башкортостан. 2015. Вып. 9. С.3–91.
191. Есюнин С.Л. Первые данные о фауне пауков и сенокосцев Южно-Уральского заповедника // Труды Южно-Уральского государственного природного заповедника. Уфа. 2020. С.101–106.
192. Есюнин С.Л., Валуев В.А. Новые виды пауков Башкирии // Редкие и исчезающие виды животных и растений Республики Башкортостан. 2020. Вып. 30. С.15–16.
193. Есюнин С.Л., Валуев В.А. *Aculepeira ceropegia* (Walckenaer, 1802) кругопряд дубовый – новый для Башкирии вид пауков (Aranei, Araneidae) // Редкие и исчезающие виды животных и растений Республики Башкортостан. 2020а. Вып. 27. С.3–5.
194. Есюнин С.Л., Валуев В.А. К фауне пауков Башкирского Урала //

Материалы по флоре и фауне Республики Башкортостан. 2020б. Вып. 29. С.35–47.
195. Ефимик В.Е. Класс паукообразные // Красная книга Республики Башкортостан: в 2 т. Т. 2: Животные / Под ред. В.Ф. Хабибуллина. 3-е изд., доп. и переработ. Уфа: ООО «Принт», 2025. С.10–11.
196. Ефимик В.Е., Валуев В.А. Результаты сборов пауков (Arachnida, Araneae) в некоторых районах Башкирии // Материалы по флоре и фауне Республики Башкортостан. 2023. Вып. 41. С.3–8.
197. Желоховцев А.Н. Новые виды Symphyta (Hymenoptera) // Исследования по фауне Советского союза (насекомые): сб. трудов Зоомузея МГУ, 1968. Т.11 / Под ред. А.Н. Желоховцева и Л.В. Зиминой. С. 47–56.
198. Животный мир Башкирии (полезные и вредные животные) / Под ред. П.А. Положенцева, К.С. Никифорука. Уфа: Башкирское гос. изд-во, 1949. 420 с.
199. Животный мир Башкирии / Под ред. П.А. Положенцева, Е.В. Кучерова и М.Г. Баянова. Уфа: Башкирское книжное изд-во, 1977. 344 с.
200. Жимерикин В.Н., Миронова М.К. Южноамериканская томатная моль – угроза томатному производству // Защита и карантин растений. 2012. № 11. С. 32–34.
201. Загорская В.В. К распространению вертлявой камышевки в Башкирии // Редкие и исчезающие виды животных и растений Республики Башкортостан. 2012. Вып. 4. С. 24–25.
202. Загорская В.В. Встречи редких птиц в Белорецком районе Республики Башкортостан // Редкие и исчезающие виды животных и растений Республики Башкортостан. 2016. Вып. 12. С. 10–15.
203. Загорская В.В. К авифауне окрестностей с. Кага Белорецкого района Башкирии в январе (2021) года // Башкирский орнитол. вестник. 2021. Вып. 37. С. 18–27.
204. Загорская В.В. О встрече белой гарпии *Cerura erminea* (Esper, 1783) на территории Башкортостана // Редкие и исчезающие виды животных и растений Республики Башкортостан. 2019. Вып. 26. С. 21–23.
205. Загуляев А.К. Настоящие моли (Tineidae). Часть 3. Подсемейство Tineinae / Фауна СССР. Насекомые чешуекрылые. Т. 4. Вып. 3 (новая серия, №). М.–Л.: Наука, 1960. 267 с.
206. Загуляев А.К. Настоящие моли (Tineidae). Часть 2. Подсемейство Nemapogoninae / Фауна СССР. Насекомые чешуекрылые. Т. 4. Вып. 2 (новая серия, № 86). М.–Л.: Наука, 1964. 267 с
207. Загуляев А.К. Злаковые стеблевые моли. Семейство Ochsenheimeriidae и Eriocottidae / Фауна СССР. Насекомые чешуекрылые. Т. 4. Вып. 7 (Новая серия, № 135). Л.: Наука, 1988. 302 с.
208. Залесская Н.Т. Определитель многоножек-костянок СССР (Chilopoda, Lithobiomorpha). М: Наука, 1978. 212 с.
209. Залесская Н.Т., Титова Л.П., Головач С.И. Фауна многоножек

(Myriapoda) Подмосковья // Почвенные беспозвоночные Московской области. ИЭМиЭЖ им. А.Н. Северцова АН СССР. М.: Наука, 1982. С. 179–200.
210. Зарипова Ф.Ф. Структура паразитофауны и трофическая структура *Rana ridibunda* Pallas, 1771 в условиях урбоэкосистемы г. Салават Республики Башкортостан // Современная герпетология. 2012. №3-4. С.134–142.
211. Зарипова Ф.Ф., Файзулин А.И. Анализ многолетней динамики сообщества гельминтов озерной лягушки *Pelophylax ridibundus* (Pallas, 1771) Южного Урала // Экологический сборник 6: тр. молодых ученых Поволжья. Междунар. молодежная научная конф. / Под ред. С.А. Сенатора, О.В. Мухортовой, С.В. Саксонова. Тольятти: ИЭВБ РАН, Кассандра, 2017. С.160–163.
212. Захаров В.Д. Птицы Южного Урала (видовой состав, распространение, численность). Миасс: ИГЗ УрО РАН, 2006. 228 с
213. Захваткин А.А. Некоторые итоги изучения фауны хлебных клещей СССР: сб. научных работ. М.: Изд-во МГУ, 1953. С.169–176.
214. Зей-Нечаева А.Н. Энтомофауна шиповника в искусственных биоценозах г. Уфы // Фауна и экология животных УАССР и прилегающих районов: сб. науч. трудов. Ижевск, 1984. С. 103–108.
215. Зеленцов Н.И., Поздеев И.В., Щербина Г.Х. Фауна хирономид (Diptera, Chironomidae) озер Республики Башкортостан // Евразиатский энтомол. журнал, 2013. 12(6). С. 597–600.
216. Зеленцов Н.И., Поздеев И.В., Щербина Г.Х. Фауна хирономид (Diptera, Chironomidae) водохранилищ Республики Башкортостан // Биология внутренних вод. 2014. №3. С.21–25.
217. Зеленцов Н.И., Поздеев И.В., Щербина Г.Х. Фауна хирономид (Diptera, Chironomidae) рек Республики Башкортостан // Евразиатский энтомол. журнал. 2015. №14(3). С. 257–261.
218. Зернов Д.А. Серый снегирь *Pyrrhula cineracea* в Уфе // Башкирский орнитол. вестник. 2017. № 24. С. 51–56.
219. Зимин Л.С. Фауна СССР. Новая серия №45. Насекомые Двукрылые. Т. 18. Вып. 4. Сем. Muscidae. Настоящие мухи (трибы Muscini, Stomoxydini). М.-Л.: Изд-во АН СССР, 1951. 287 с.
220. Зимина Л.В. Дополнительные данные о распространении сирфид (Diptera, Syrphidae) фауны СССР // Исследования по фауне Советского союза (насекомые): сб. трудов Зоомузея МГУ, 1968. Т.11 / Под ред. А.Н. Желоховцева и Л.В. Зиминой. С.79–96.
221. Зиновьев Е.В. Новый вид жужелицы рода Carabus (Coleoptera, Carabidae) с Южного Урала // Успехи энтомологии на Урале: сб. научных трудов / Ред. В.Н. Ольшванг, И.А. Богачева, Н.В. Николаева и др. Екатеринбург, 1997. С. 35–38.
222. Зинченко В. К. *Aphodius (Agolius) montanus* Erichson, 1848 (Coleoptera, Scarabaeidae, Aphodiini) новый вид для фауны России // Евразиатский

энтомол. журнал. 2011. Т. 10. № 2. С. 178.
223. Ильичёв В.Д., Фомин В.Е. Орнитофауна и изменение среды (на примере Южно-Уральского региона). М.: Наука, 1988. 247 с.
224. Исмагилов Н.Н. Дополнение к фауне чешуекрылых Республики Башкортостан по материалам фотофиксаций. Сообщение 5 // Материалы по флоре и фауне Республики Башкортостан. 2023. Вып. 41. С. 9–33.
225. Исмагилов Н.Н. Обобщение литературных данных (1832 - 2024) по фауне чешуекрылых (Lepidoptera) Республики Башкортостан // Материалы по флоре и фауне Республики Башкортостан. 2025а. Вып. 46. С. 28–273.
226. Исмагилов Н.Н. Дополнение к фауне чешуекрылых (Lepidoptera) Республики Башкортостан по материалам фотофиксаций. Сообщение 6 // Материалы по флоре и фауне Республики Башкортостан. 2025б. Вып. 49. С. 14–124.
227. Исмагилов Н.Н., Валуев В.А. Сведения об интересных видах бабочек (Insecta, Lepidoptera) Башкирии по результатам исследований 2021 г // Материалы по флоре и фауне Республики Башкортостан. 2021а. Вып. 32. С. 35–42.
228. Исмагилов Н.Н., Валуев В.А. Новая встреча *Lygephila pastinum* (Lepidoptera, Erebidae) в Республике Башкортостан // Материалы по флоре и фауне Республики Башкортостан. 2021б. Вып. 33. С. 56–59.
229. Исмагилов Н.Н., Валуев В.А. К редким бабочкам (Lepidoptera) Республики Башкортостан (2023 г.) // Материалы по флоре и фауне Республики Башкортостан. 2023а. Вып. 40. С. 30–36.
230. Исмагилов Н.Н. Валуев В.А. Итоги маршрутных учетов фауны чешуекрылых (Lepidoptera) Республики Башкортостан в 2017-2023 гг // Материалы по флоре и фауне Республики Башкортостан. 2023б. Вып. 41. С. 34–69.
231. Исмагилов Н.Н., Герасимов С.В., Кривошеев М.М., Наумова В.А. Дополнение к фауне чешуекрылых Республики Башкортостан по материалам фотофиксаций. Сообщение 4 // Материалы по флоре и фауне Республики Башкортостан. 2022. Вып. 36. С. 14–43.
232. Исмагилов Н.Н., Герасимов С.В., Муртазин Ш.А., Кривошеев М.М. Дополнение к фауне чешуекрылых (Insecta, Lepidoptera) Республики Башкортостан по материалам фотофиксаций // Материалы по флоре и фауне Республики Башкортостан. 2020. Вып. 27. С. 31–70.
233. Исмагилов Н.Н., Герасимов С.В., Наумова В.А., Кривошеев М.М. Дополнение к фауне чешуекрылых (Insecta, Lepidoptera) Республики Башкортостан по материалам фотофиксаций. Сообщение 2 // Редкие и исчезающие виды животных и растений Республики Башкортостан. 2021а. Вып. 31. С. 25–45.
234. Исмагилов Н.Н., Герасимов С.В., Кривошеев М.М., Самарин Е.С., Горбунов П.Ю., Наумова В.А. Дополнение к фауне чешуекрылых Республики Башкортостан по материалам фотофиксаций. Сообщение 3 //

Материалы по флоре и фауне Республики Башкортостан. 2021б. Вып. 33. С. 60–81.
235. Исмагилов Н.Н., Кривошеев М.М. *Catocala helena* Eversmann, 1856 (Lepidoptera: Erebidae) – новый акклиматизировавшийся вид Южно-Уральской фауны // Редкие и исчезающие виды животных и растений Республики Башкортостан. 2020. Вып. 30. С. 20–22.
236. Ишбирдин А.Р. О встрече стрепета *Tetrax tetrax* L., 1758 на Тратау (Башкирия) // Редкие и исчезающие виды животных и растений Республики Башкортостан. 2018. Вып. 20. С. 9.
237. Ишбирдин А.Р., Ишмуратова М.М. Встреча орла-карлика *Hieraaetus pennatus* Gmelin, 1788) на горе Тратау // Редкие и исчезающие виды животных и растений Республики Башкортостан. 2019. Вып. 24. С. 17–18.
238. Ишбирдина А.А., Ишбирдина Н.А., Ишмуратова М.М. Видовое разнообразие чешуекрылых (бабочек) окрестностей г. Уфы // Современные проблемы естественных наук и медицины: сб. статей Всерос. науч. конф. Вып. 9. Йошкар-Ола, 2020. С. 577–581.
239. Капралов С.А. Биоспелеологические исследования пещеры Шульган-таш (Каповой) на Южном Урале в 2008-2009 гг. // Спелеология и спелестология. 2010. №1. С. 305–308.
240. Каспарян Д.Р. Наездники-ихневмониды (Ichneumonidae). Подсемейство Tryphoninae: триба Exenterini. Подсемейство Adelognathinae. Л.: Наука, 1990. 341 с.
241. Каспарян Д.Р., Толканиц В.И. Наездники-ихневмониды (Ichneumonidae). Подсемейство Tryphoninae: трибы Sphinctini, Phytodietini, Oedemopsini, Tryphonini (дополнение), Idiogrammatini. Подсемейства Eucerotinae, Adelognathinae (дополнение). СПб.: Наука, 1999. 404 с. (Фауна России и сопредельных стран. Нов. сер., №143. Насекомые перепончатокрылые. Т.3. Вып.3).
242. Кириков С.В. Птицы и млекопитающие в условиях ландшафтов южной оконечности Урала. М., 1952. 412 с.
243. Кириченко А.Н. Настоящие полужесткокрылые Европейской части СССР (Hemiptera). Определитель и библиография. М.–Л.: Изд-во АН СССР, 1951. 423 с.
244. Кисилев А.И., Шапкин В.А. Водные мермитиды Южного Урала // Животный мир Южного Урала и Северного Прикаспия: тез. докл. / Отв. ред. Г.В. Ни. Оренбург: ОГПУ, 1984. С.6.
245. Кмузова С.И. Сравнительно-экологический анализ фауны фитонематод зерновых культур в различных зонах Башкирской АССР. Автореф. дисс. … канд. биол. наук. М., 1966. 18 с.
246. Книсс В.А. Фауна пещер России и сопредельных стран. Уфа: Изд-во Башкир. ун-та, 2001. 238 с.
247. Князев Н.И. Продолжающееся сокращение численности серой куропатки

в Бирском районе Башкирии // Редкие и исчезающие виды животных и растений Республики Башкортостан. 2021. Вып. 31. С. 46–48.
248. Князев С.А., Горбунов П.Ю. Первая находка стеклянницы *Microsphecia brosiformis* (Hübner, 1813) (Lepidoptera, Sesiidae) на Южном Урале // Амурский зоол. журнал. 2023. № 3. С. 702–705.
249. Кожанчиков И.В. Волнянки (Orgyidae) / Фауна СССР. Насекомые чешуекрылые. Т. 12. М.–Л.: Изд-во АН СССР. 1950. 582 с.
250. Кожанчиков И.В. Совки (подсем. Agrotinae) / Фауна СССР. Насекомые чешуекрылые. Т. 13 (3). М.–Л.: Изд-во АН СССР. XVI+675 с.
251. Кожанчиков И.В. Чехлоносы-мешочницы (сем. Psychidae) / Фауна СССР, новая серия, № 62, Насекомые чешуекрылые. Т 3. (2). М. –Л. 1956. 517 с.
252. Козырев А.В. Итоги изучения жужелиц (Coleoptera, Carabidae) Урала и сопредельных территорий // Успехи энтомологии на Урале: сб. научных трудов / Ред. В.Н. Ольшванг, И.А. Богачева, Н.В. Николаева и др. Екатеринбург, 1997. С.44–50.
253. Козырев А.В., Козьминых В.О., Есюнин С.Л. Состав локальных фаун жужелиц (Coleoptera, Carabidae) Урала и Приуралья // Вестник Пермского ун-та. 2000. Биология. Вып. 2. С.165–215.
254. Козьминых В.О. Полужесткокрылые насекомые (Insecta, Heteroptera) бывшей Уфимской губернии и современного Башкортостана: пример сравнительного фаунистического анализа // Материалы по флоре и фауне Республики Башкортостан. 2017а. Вып. 15. С.35–45.
255. Козьминых В.О. Заметки о жесткокрылых (Insecta, Coleoptera), указанных для Уфимской губернии в труде К.Э. Линдемана (1871) // Материалы по флоре и фауне Республики Башкортостан. 2017б. Вып. 16. С. 36–57.
256. Козьминых В. О. Список ложноскорпионов (Arachnida: Pseudoscorpiones) Урала // Фауна Урала и Сибири. 2017в. № 2. С. 38–45.
257. Козьминых В.О. Полужесткокрылые насекомые (Heteroptera) Башкортостана: анализ фаунистических данных. Часть II. Сведения о местах находок // Материалы по флоре и фауне Республики Башкортостан. 2018а. Вып. 20. С. 28–45.
258. Козьминых В.О. Дополнение к списку жесткокрылых (Insecta, Coleoptera) семейства Histeridae Башкортостана // Материалы по флоре и фауне Республики Башкортостан, 2018б. Вып. 18. С.38–52.
259. Козьминых В.О. Материалы к фауне жесткокрылых насекомых (Insecta: Coleoptera) Башкортостана (сообщение 2) // Материалы по флоре и фауне Республики Башкортостан. 2019. Вып. 23. С.11–24.
260. Козьминых В.О. Новые находки пауков (Aranei) в Башкортостане // Материалы по флоре и фауне Республики Башкортостан. 2022. Вып. 37. С. 82–87.
261. Константинов А.С. Ландшафтно-зональные особенности распространения листоедов рода Chaetocnema (Coleoptera,

Chrysomelidae) в европейской части СССР и на Кавказе // Вестник зоологии. 1988. Вып. 6. С. 44–47.
262. Константинов Ф.В., Зиновьева А.Н. Новые данные по фауне клопов-слепняков подсемейств Bryocorinae, Deraeocorinae и Mirinae (Heteroptera, Miridae) Европейской части России // Энтомол. обозрение. 2017а. Т. 96. Вып. 2. С. 306–317
263. Константинов Ф.В., Зиновьева А.Н. Новые данные по фауне клопов-слепняков подсемейств Orthotylinae и Phylinae (Heteroptera, Miridae) европейской части России // Энтомол. обозрение. 2017б. Т. 96. Вып. 3. С. 490–511.
264. Корнев И.И., Негробов О.П., Селиванова О.В. Новые данные по фауне и систематике *Dolichopus simius* Parent, 1927 (Dolichopodidae, Diptera) // Амурский зоол. журнал. 2013. Т. 2. С.147–150.
265. Коробейников Ю.И. О фауне и экологии жужелиц высокогорий Южного Урала // Горные экосистемы Урала и проблемы рационального природопользования: инф. мат-лы / Отв. ред. В.С. Балахонов, В.П. Коробейникова. Свердловск, 1986. С.29.
266. Коробейников Ю.И. Жужелицы Уральских гор (род Carabus L.) // Насекомые в естественных и антропогенных биогеоценозах Урала: мат-лы IV совещания энтомологов Урала / Отв. ред. Н.В. Николаева. Екатеринбург: Наука, 1992. С. 71–73.
267. Коровкина А.В. Вредители зерновых злаков в Башкирской АССР // Труды Башкирской научно-исследовательской полеводческой станции. Т. 2. Уфа. 1945. С. 205–240.
268. Коровкина А.В. Главнейшие вредные насекомые сельскохозяйственных культур Башкирской АССР. Дисс. … канд. биол. наук. Уфа, 1946. 252 с.
269. Кортунова Т.А. О мизидах Нижнекамского водохранилища // Водные экосистемы Урала, их охрана и рациональное использование: информационные мат-лы / Отв. ред. М.И. Ярушина, Г.Н. Соловых. Свердловск: УрО АН СССР, 1989. С.61.
270. Костромина Т.С. Материалы к познанию круглоротых браконид (Hymenoptera: Braconidae) Южного Урала // Труды Русского энтомол. об-ва. 2010. Т. 81(2). С.47–50.
271. Костюк Ю.О. Листовійки. Тортрицини (Tortricinae) / Фауна України. Т. 15 (10). Київ. 1980. 424 с.
272. Красная книга Республики Башкортостан. Т. 3. Редкие и исчезающие виды животных. Уфа: Башкортостан. 2004. 180 с.
273. Красная книга Республики Башкортостан. Т. 2. Животные. 2-е издание. Уфа: Информреклама. 2014. 244 с.
274. Красная книга Республики Башкортостан: в 2 т. Т. 2: Животные / Под ред. В.Ф. Хабибуллина. 3-е изд., доп. и переработ. Уфа: ООО Принт, 2025. 208с.
275. Кривошеина М. Г., Озеров А. Л. Обзор мух-береговушек рода Setacera

Cresson, 1930 (Diptera, Ephydridae) фауны России // Зоол. журнал. 2020. Т.99. № 8. С. 900–910.
276. Круликовский Л.К. Опыт каталога чешуекрылых Казанской губернии. III. Noctuae // Bulletin de la Société impériale du Naturalistes de Moscou. 1893. Т.7 (1). P. 43–105.
277. Круликовский Л.К. Заметка о фауне Macrolepidoptera окрестностей г. Уфы // Материалы к познанию фауны, флоры Российской империи. Отдел зоологический. Вып. 3. М., 1897. С. 315–328.
278. Круликовский Л.К. Заметка о микрочешуекрылых окрестностей г. Уфы // Материалы к познанию фауны, флоры Российской империи. Отдел зоологический. Вып. 5. М. 1901. С. 38–40.
279. Круликовский Л.К. Материалы для познания фауны чешуекрылых России. 9. Новые данные о чешуекрылых Уфимской губернии // Материалы к познанию фауны, флоры Российской империи. Отдел зоологический. Вып. 6. М. 1904. С. 241–244.
280. Круликовский Л.К. К сведениям о чешуекрылых Уфимской губернии // Русское энтомол. обозрение. Т. 10. С-Пб., 1910. С. 220–222.
281. Крыжановский О.Л., Рейхардт А.Н. Фауна СССР. Жесткокрылые. Том 5. Вып. 4. Жуки надсемейства Histeroidea (семейства Sphaeritidae, Histeridae, Synteliidae). Л.: Наука, 1976. 434 с.
282. Кузякин А.П. Зоогеография СССР // Учён. зап. Моск. обл. пед. ин-та им. Н.К. Крупской. М., 1962. Т. 109. С. 3–182.
283. Кучеров Е.В. Материалы по фауне слепней Башкирского заповедника // Проблемы охраны генофонда и управления экосистемами в заповедниках лесной зоны. Часть II: тез. докл. Всесоюз. совещания / Отв. ред. В.Е. Соколов, К.П. Филонов. М., 1986. С.128–130.
284. Кучеров Е.В. О фауне слепней на южной оконечности Урала // Успехи энтомологии на Урале: сб. научных трудов / Ред. В.Н. Ольшванг, И.А. Богачева, Н.В. Николаева и др. Екатеринбург, 1997. С.180.
285. Латышев Н.К. Насекомые – вредители сосны в Башкирском заповеднике // Труды Башкирского госуд. заповедника. Вып. 2. 1963. С. 95–105.
286. Легалов А. А. Жуки-трубковерты (Curculionoidea: Rhynchitidae, Attelabidae) Башкортостана // Известия Челябинского научного центра. 2007. Т. 35. Вып. 1. С. 136–140.
287. Летопись природы заповедника Шульган-Таш, 2020-2021 гг. Рукопись. Иргизлы, 2021.
288. Локшина И.Е. Определитель двупарноногих многоножек Diplopoda равнинной части Европейской территории СССР. М: Наука, 1969. 79 с.
289. Львовский А.Л. Аннотированный список ширококрылых и плоских молей (Lepidoptera: Oecophoridae, Chimbarchidae, Amphisbatidae, Depressariidae) фауны России и сопредельных стран // Труды ЗИН. 2006. Т. 307. 119 с.
290. Львовский А.Л., Недошивина С.В. Плоские моли семейства

Depressariidae (Lepidoptera) Среднего и Нижнего Поволжья. Ульяновск, 2023. 136 с.
291. Малевич И. И. К фауне малощетинковых червей Урала и Предуралья // Учен. зап. МГПИ им. Потемкина. 1954. Т. 28. Вып. 2. С. 33–39.
292. Мартынова Е.Ф. Моли-минеры рода Phyllocnistis Z. (Lepidoptera, Phyllocnistidae) фауны СССР // Энтомол. обозрение. 1955. Т. 34. С. 244–251.
293. Маслова О.О. Ревизия рода Chrysotus (Dolichopodidae, Diptera) России и сопредельных территорий. Дисс. ... канд. биол. наук. Воронеж, 2006. 173 с.
294. Матвеев А. Б. Жужелицы (Coleoptera, Carabidae) Южного Урала и Предуралья (фауна, биотопическое распределение, зоогеографический анализ, возможности использования в мониторинге). Автореф. дисс … канд. биол. наук. Л., 1990. 19 с.
295. Мигранов М. Г. Булавоусые чешуекрылые Башкирии (определитель). Уфа: Изд-во БНЦ АН СССР, 1991. 132 с.
296. Мигранов М.Г. Отряд Бабочки, или Чешуекрылые // Животные Башкортостана. Уфа. 2016. С. 167–179.
297. Мигранов М.Г. Бражники (Sphingidae) Республики Башкортостан // Материалы по флоре и фауне Республики Башкортостан. 2021а. Вып. 30. С. 41–48.
298. Мигранов М.Г. Медведицы (Arctiidae) Республики Башкортостан // Материалы по флоре и фауне Республики Башкортостан. 2021б. Вып. 31. С. 62–79.
299. Мигранов М.Г. Сетчатокрылые (Neuroptera) степей Южного Урала // Итоги биологических исследований: сб. науч. трудов / Гл. ред. И.Ю. Усманов. Вып.7. Уфа: РИО БашГУ, 2001в. С.24–25.
300. Мигранов М.Г. Пестрянки (Zygaeninae) Республики Башкортостан // Материалы по флоре и фауне Республики Башкортостан. 2022а. Вып. 34. С. 87–94.
301. Мигранов М.Г. Ленточницы (Lepidoptera: Erebidae, Catocala) Республики Башкортостан // Материалы по флоре и фауне Республики Башкортостан. 2022б. Вып. 34. С. 95–101.
302. Мигранов М.Г. Прозерпина *Proserpinus proserpina* (Pallas, 1772) – редкий вид для Республики Башкортостан // Материалы по флоре и фауне Республики Башкортостан. 2022в. Вып. 36. С. 104–107.
303. Мигранов М.Г. Степная цикада *Cicadetta concinna* Germar, 1821 – новый вид для Республики Башкортостан // Материалы по флоре и фауне Республики Башкортостан. 2022г. Вып. 36. С.69–74.
304. Мигранов М.Г. Муравьиные львы (Myrmeleontidae) Республики Башкортостан // Материалы по флоре и фауне Республики Башкортостан. 2022д. Вып. 35. С. 18-24.
305. Мигранов М.Г. Шелкопряд салатный *Lemonia dumi* (Linnaeus, 1761) –

редкий вид для Республики Башкортостан // Материалы по флоре и фауне Республики Башкортостан. 2023а. Вып. 38. С. 81–83.
306. Мигранов М.Г. Шелкопряд одуванчиковый *Lemonia taraxaci* (Denis & Schiffermüller, 1775) – редкий вид для Республики Башкортостан // Материалы по флоре и фауне Республики Башкортостан. 2023б. Вып. 38. С. 84–86.
307. Мигранов М.Г. Древоточец полынный *Paracossulus thrips* (Hübner, 1818) – редкий вид для Республики Башкортостан // Материалы по флоре и фауне Республики Башкортостан. 2023в. Вып. 40. С. 69–72.
308. Мигранов М.Г. Ленточница розовая *Catocala pacta* (Linnaeus, 1758) – редкий вид для Республики Башкортостан // Материалы по флоре и фауне Республики Башкортостан. 2023г. Вып. 40. С. 73–75.
309. Мигранов М.Г. Зелёная цикада *Tettigetta prasina* (Pallas, 1773) – новый вид для Республики Башкортостан // Материалы по флоре и фауне Республики Башкортостан. 2023д. Вып. 38. С. 91–94.
310. Мигранов М.Г., Валуев В.А. К распространению бабочек Архангельского, Благоварского и Благовещенского районов Башкирии // Материалы по флоре и фауне Республики Башкортостан. 2017а. Вып. 15. С. 46–57.
311. Мигранов М.Г., Валуев В.А. Ведение «Биологической информационной системы» (БИС) Республики Башкортостан // Материалы по флоре и фауне Республики Башкортостан. 2017б. Вып. 16. С. 8–30.
312. Мигранов М.Г., Валуев В.А. Находки *Ancylis badiana* и *Cochylimorpha halophilana* в Башкирии // Редкие и исчезающие виды животных и растений Республики Башкортостан. 2019. Вып. 26. С. 29–31.
313. Мигранов М.Г., Валуев В.А. Совка мелкая желтоватая *Eublemma ostrina* (Hübner, 1790) – новый вид Башкирии // Редкие и исчезающие виды животных и растений Республики Башкортостан. 2020. Вып. 27. С. 10–14.
314. Мигранов М.Г., Исмагилов Н.Н., Валуев В.А. К фауне бабочек (Insecta, Lepidoptera) Башкирского Урала // Материалы по флоре и фауне Республики Башкортостан. 2020а. Вып. 28. С. 18–29.
315. Мигранов М.Г., Исмагилов Н.Н., Валуев В.А. К редким видам бабочек (Insecta, Lepidoptera) Башкирского Урала // Редкие и исчезающие виды животных и растений Республики Башкортостан. 2020б. Вып. 29. С. 24–38.
316. Мигранов М.Г., Мигранова Д.М. Кваква *Nycticorax nycticorax* в Чекмагушевском районе Башкирии // Редкие и исчезающие виды животных и растений Республики Башкортостан. 2020. Вып. 29. С. 39–42.
317. Мигранов М.Г., Саттаров В.Н. Насекомые Башкортостана: Фаунистический список. Уфа: РИО РУМНЦ МО РБ. 2006. 56 с.
318. Мигранов М.Г., Саттаров В.Н. К энтомофауне Южно-Уральского

государственного природного заповедника // Труды Южно-Уральского государственного природного заповедника. Вып. 1. Уфа, 2008. С. 115–127.
319. Мигранов М.Г., Широких П.С., Мулдашев А.А., Валуев В.А. Пестрянка васильковая *Zygaena centaureae* Fischer von Waldheim, 1832 в Башкирии // Редкие и исчезающие виды животных и растений Республики Башкортостан. 2020в. Вып. 30. С. 25–27.
320. Миронов В.Г. Обзор пядениц группы Gueneata рода Eupithecia Curt. (Lepidoptera, Geometridae) // Труды Зоол. ин-та АН СССР. 1989. Т. 200. С.110–135.
321. Миронов В.Г. Трофимова Т.А. Новые виды пядениц рода Eupithecia Curtis, 1825 (Lepidoptera: Geometridae) для фауны Южного Урала // Эверсманния. Энтомологические исследования в России и соседних регионах. 2007. № 10. С. 39–41.
322. Михайлов Ю.Е. История изучения фауны жуков-листоедов (Coleoptera, Chrysomelidae) Урала и современное состояние ее изученности // Леса Урала и хозяйство в них: сб. научных трудов. Вып. 28. Екатеринбург: Уральский гос. лесотех. ун-т, 2006. С. 234–242.
323. Михайлов Ю.Е. О двух малоизвестных видах жуков-листоедов (Coleoptera, Chrysomelidae) с Южного Урала // Зоол. журнал. 2018. Т. 97. Вып. 3. С. 286–298.
324. Михайлов Ю.Е. Некоторые итоги изучения жуков-листоедов (Coleoptera, Chrysomelidae) в ООПТ Южного Урала // Наука, природа и общество. Миасс: Южно-Уральский федеральный научный центр Минералогии и геоэкологии УРО РАН, 2020. С. 104–106.
325. Михайлов Ю.Е. Перспективные для изучения виды жуков-листоедов (Coleoptera, Chrysomelidae) Приволжья и Южного Урала // Биологическое разнообразие природных и антропогенных ландшафтов: изучение и охрана Астрахань: Астраханский гос. ун-т, 2021. С. 155–158.
326. Михайлов Ю.Е., Ермаков А.И. Состав и структура сообществ герпетобионтных членистоногих горных вершин Южного Урала // Фауна Урала и Сибири. 2016. № 1. С. 61–74.
327. Михайлов Ю.Е., Ермаков А.И., Есюнин С.Л., Созонтов А.Н. Паукообразные горных вершин Южного Урала // Фауна Урала и Сибири. 2025. № 1. С. 15–33.
328. Мозолевская Е.Г. Стволовые вредители лесов Башкирского заповедника // Вопросы защиты леса: сб. работ. Вып. 11 / Отв. ред. А.И. Воронцов. М., 1964. С.57–78.
329. Моллюски Урала и прилегающих территорий. Семейство Прудовиковые Lymnaeidae (Gastropoda, Pulmonata, Lymnaeiformes) Ч.1. / И.М. Хохуткин, М.В. Винарский, М.Е. Гребенников / Под ред. И.А. Васильевой Екатеринбург: Гощицкий, 2009. 162 с.
330. Морозов В.В. Современный статус южного среднего кроншнепа

Numenius phaeopus alboaxillaris Lowe, 1921 в России и Казахстане // Русский орнитол. журнал. 1998. Экспресс-выпуск 34. С. 3–15.
331. Муравицкий О.С. К познанию фауны жуков-листоедов г. Уфы и её окрестностей // Материалы по фауне и флоре Республики Башкортостан. 2014. Вып. 5. С. 3–20.
332. Муравицкий О.С., Хабибуллин В.Ф. Фауна жуков-листоедов (Coleoptera, Chrysomelidae) Республики Башкортостан // Материалы по флоре и фауне Республики Башкортостан. 2015. Вып. 6. С. 20–41.
333. Мурзабаева А.Р. Вредители сахарной свеклы // NovaInfo.Ru. 2016. Т.1. № 44. С. 26–30.
334. Негробов О.П., Селиванова О.В., Маслова О.О., Чурсина М.А. Справочный список хищных мух-зеленушек семейства Dolichopodidae (Diptera) фауны России // Фауна и таксономия хищных мух Dolichopodidae (Diptera): сб. научных работ / Под ред. И.Я. Гричанова О.П. Негробова. С.-Пб: ВИЗР РАСХН, 2013. С. 47–93. (Приложение к журналу «Вестник защиты растений»).
335. Нечай Н.А. Систематика и зоогеография мух-зеленушек рода Hercostomus Loew (Dolichopodidae, Diptera) палеарктической фауны. Дисс. ... канд. биол. наук. СПб., 2011. 176 с.
336. Никольская М.Н. Фауна СССР. Новая серия №76. Перепончатокрылые. Т. 7. Вып. 5. Хальциды сем. Chalcididae и Leucospidae. М.-Л.: Изд-во АН СССР, 1960. 222 с.
337. Нурмухаметов И.М. Ведение Красной книги на территории Национального парка «Башкирия» // Редкие и исчезающие виды животных и растений Республики Башкортостан. 2010. Вып. 2. С. 26–33.
338. Оглоблин Д.А., Знойко Д.В. Фауна СССР. Новая серия №44. Жесткокрылые. Т. 18. Вып. 8. Пыльцееды (сем. Alleculidae). Ч. 2. Подсем. Omophlinae. М.-Л.: Изд-во АН СССР, 1950. 133 с.
339. Ольшванг В.Н. Динамика населения беспозвоночных в горных тундрах южного Урала // Горные экосистемы Урала и проблемы рационального природопользования: сб. науч. трудов. Свердловск, 1986. С. 56.
340. Ольшванг В.Н., Малоземов Ю.А. Население хортобионтных насекомых в горной тундре Южного Урала // Фауна и экология насекомых Урала: сб. науч. трудов. Свердловск. 1987. С. 121–130.
341. Орлова М.В., Орлов О.Л. Новые находки эктопаразитов рукокрылых в пещерах Южного Урала // Вестник Удмуртского университета. Биология. Науки о Земле. 2013. Вып. 3. С.44–50.
342. Осипова Е.М., Данукалова Г.А. Первые сведения о субфоссильных наземных и пресноводных моллюсках памятников природы Торатау, Куштау и Юрактау // Геологический вестник. 2023. № 2. С. 167–181.
343. Паженков А.С., Смелянский И.Э., Трофимова Т.А., Карякин И.В. Экологическая сеть Республики Башкортостан. М. 2005. 193 с.
344. Петров С. С., Чаус Б. Ю., Ишдавлетова К. С. Энтомофауна горнолесной

(Зилаирский район) и лесостепной (Стерлитамакский район) зон Республики Башкортостан (Россия) // Sciences of Europe. 2019. № 43-1(43). С. 8–15.
345. Плотников А.О., Ермоленко Е.А. Центрохелидные солнечники (Chromista, Hacrobia) Южного Предуралья // Зоол. журнал. 2015. Т.94. №1. С.3–16.
346. Подмарёв А.И. Встречи египетской цапли *Bubulcus ibis* (L., 1758) и черноголового хохотуна *Larus ichthyaetus* Pal., 1773 в Краснокамском районе Республики Башкортостан // Материалы по флоре и фауне Республики Башкортостан. 2025. Вып. 47. С. 45–50.
347. Поздеев И.В. Фауна хирономид (Diptera, Chironomidae) бассейна реки Камы // Биология внутренних вод. 2010. №4. С.5–14.
348. Положенцев П.А. Наиболее вредные насекомые на древесных породах в Таныпском лесхозе БАССР // Труды Башкирского сельскохозяйственного института. Т. 5 (2). Уфа. 1946. С. 185–195.
349. Положенцев П.А. Главнейшие насекомые вредители древесных и кустарниковых пород Башкирского заповедника // Труды Башкирского государственного заповедника. 1947. Вып. 1. С. 121–135.
350. Положенцев П.А. Насекомые, вредные в лесном и парковом хозяйстве // Животный мир Башкирии. Уфа, 1949. С. 207–254.
351. Положенцев П.А. Насекомые, вредные в лесном и парковом хозяйстве // Животный мир Башкирии. Уфа, 1977а. С. 147–194.
352. Положенцев П.А. Насекомые на снегу // Животный мир Башкирии. Уфа, 1977б. С. 237–242.
353. Положенцев П.А., Коровина Н.И. Вредители пищевых продуктов // Животный мир Башкирии. Уфа, 1949. С. 254–262.
354. Положенцев П.А, Кучеров Е.В. Зоологические экскурсии в Башкирии. Уфа: Башгосиздат, 1949. 52 с.
355. Положенцев П.А., Положенцева Н.И. Насекомые – вредители пищевых продуктов, шерсти и других материалов // Животный мир Башкирии. Уфа, 1977. С. 206–213.
356. Положенцев П.А., Ханисламов М.Г. Энтомовредители дуба в Башкирии // Исследования очагов вредителей леса Башкирии. 2. Уфа, 1962. С. 105–112.
357. Полтавский А.Н., Синев С.Ю., Матов А.Ю. Новые данные о распространении редких видов огневок и совок (Lepidoptera: Pyraloidea, Noctuoidea) по материалам из Ростовской области (Россия) // Кавказский энтомол. бюллетень. 2013. Т. 9 (2). С. 283–291.
358. Попова О.Н., Харитонов А.Ю. Межгодовые изменения структуры фауны стрекоз (Insecta, Odonata) Южного Урала // Экология. 2008. №6. С.427–435.
359. Протисты. Руководство по зоологии. Ч.1. СПб.: Наука, 2006. 679 с.; Ч.2. СПб.: Наука, 2007. 1444 с.; Ч.3. М.: КМК, 2011. 474 с.

360. Путенихина К.В. Устойчивость кедра сибирского к насекомым-вредителям в условиях интродукции // Эколого-биологические и медицинские исследования на Южном Урале: мат-лы III Всерос. научно-практич. (заочной) конф. Сибай, 2016. С. 37–39.
361. Рубцов И. А. Мермитиды из Башкирии // Зоол. журн. 1972. Т. 51. Вып. 7. С. 954–962.
362. Родионова С.Ю. Фауна подсемейства Dolichopodinae (Dolichopodidae, Diptera) России и сопредельных территорий. Дисс. ... канд. биол. наук. Воронеж, 2004. 253 с.
363. Рудоискатель П.В. К изучению фауны роющих ос (Hymenoptera: Apoidea: Sphecidae, Crabronidae) Республики Башкортостан // Актуальные проблемы сохранения биоразнообразия на охраняемых и иных территориях: мат-лы науч.-практ. конф. / Отв. ред. И.В. Суюндуков. Уфа: БашГУ, 2010. С.67–70.
364. Рыбалкин С.А. Новые интересные находки чешуекрылых (Lepidoptera) и жесткокрылых (Coleoptera) для Челябинской и Оренбургской областей (Южный Урал), Астраханской области и Республики Крым // Амурский зоол. журнал. 2024. Т. 16 (3). С. 594–610.
365. Сажнев А.С., Каргапольцева И.А., Холмогорова Н.В., Бобкова Е.А. Новые находки водных жесткокрылых (Coleoptera) на территории Удмуртии и Башкирии // Вестник Пермского университета. Серия Биология. 2021. Вып. 4. С. 289–294.
366. Сажнев А.С., Козьминых В.О. Жесткокрылые семейства Heteroceridae (Insecta: Coleoptera) в фауне Урала // Материалы по флоре и фауне Республики Башкортостан. 2019. Вып. 22. С.88–105.
367. Сажнев А.С., Холмогорова Н.В., Бобкова Е.А. Водные жесткокрылые (Insecta: Coleoptera) новые для фауны Башкортостана // Материалы по флоре и фауне Республики Башкортостан. 2019. Вып. 22. С.106–112.
368. Саттаров В.Н., Ильясов Р.А., Асмандиярова Л.В., Саттарова А.В., Газизова Н.Р., Пашаян С.А. Болезни и вредители березы повислой в Уфе // Пчеловодство. 2024. № 2. С. 14–17.
369. Саттаров В.Н., Ильясов Р.А., Тагирова Л.Р., Саттарова А.В., Пашаян С.А. Вредители и болезни липы мелколистной и рябины обыкновенной в Аургазинском районе Башкортостана // Пчеловодство. 2023. № 10. С. 27–29.
370. Саттаров В.Н., Маннапов А.Г., Скворцов А.И., Мищук Р.В. Вредители и болезни липы мелколистной в парковой зоне Уфы // Пчеловодство. 2020. № 9. С. 4–7.
371. Свиридов А.В. Справочная коллекция Зоологического музея МГУ имени М.В. Ломоносова по видам семейства совок (Noctuidae) России и сопредельных стран // Бюлл. МОИП. Отдел биол. 2018. Т. 123 (5). С. 15–34.
372. Свиридов А.В., Трофимова Т.А., Усков М.В., Муханов А.В., Лобкова

Л.Е., Щуров В.И., Шутова Е.В., Кузнецов И.В., Ловцова Ю.А., Коржов П.Н., Окулов В.С., Клепиков М.А. Виды совок (Lepidoptera: Noctuidae s. l.), новые для различных регионов России. 2 // Эверсманния. Энтомологические исследования в России и соседних регионах. 2006. Вып. 7-8. С. 46–68.
373. Синев С.Ю. Обзор чешуекрылых рода Pancalia Stephens (Lepidoptera, Cosmopterigidae) фауны СССР // Энтомол. обозрение. 1985. Т. 64 (4). С. 804–822.
374. Синев С.Ю. Список узкокрылых молей (Lepidoptera, Momphidae s.l.) фауны СССР // Труды Всесоюз. энтомол. об-ва. Т. 67. Л. 1986. С. 19–74.
375. Смелянский И.Э. О фауне панцирных клещей (Acari, Oribatida) степей Южноуральского региона // Евразиатский энтомол. журнал. 2006. №5(1). С. 1–11.
376. Снитько В.П., Снитько Л.В. Первая находка гигантской вечерницы (*Nyctalus lasiopterus*) на Южном Урале // Зоол. журнал. 2020. Т. 99. № 3. С. 347–350.
377. Современное состояние экосистемы озера Кандры-Куль / В.В. Жариков, М.Ю. Горбунов, М.В. Уманская, Н.Г. Тарасова, С.В. Быкова, Н.Г. Шерышева, О.В. Мухортова, Р.З. Сабитова, Е.С. Краснова. / Под ред. М.В. Уманской. Тольятти: Анна, 2018. 229 с.
378. Соколов Д. Список бабочек (Macrolepidoptera) пойманных в Вознесенском бору (коллекция Ф.Ф. Симона) // Известия Оренбургского отдела Императорского Русского геогр. об-ва. Т. 10. 1897. С. 35–40.
379. Список видов гельминтов, зарегистрированных у рыб прудовых хозяйств Башкирии. Рукопись. Уфа, 1990.
380. Справочник по чужеродным жесткокрылым Европейской части России / Составитель Орлова-Беньковская М.Я. [Электронный ресурс]. Ливны: Издатель Мухаметов Г.В., 2019.
381. Степанова Р.К., Гирфанова Л.Н., Романенко Н.С. К фауне и экологии мух-журчалок (Diptera, Syrphidae) Башкирии // Вопросы экологии животных Южного Урала. Уфа, 1984. Вып. 2. С. 109–117 / Рукопись депонирована в ВИНИТИ № 3842 – 84.
382. Сушкин П.П. Птицы Уфимской губернии // Материалы к познанию фауны и флоры Российской империи. Отд. зоол. М., 1897. Вып. 4. С. 85.
383. Тер-Минасян М. Е. Жуки-долгоносики подсемейства Cleoninae фауны СССР (цветожилы и стеблееды). Триба Lixini. Л.: Наука, 1967. 142 с.
384. Тер-Минасян М. Е. Жуки-долгоносики подсемейства Cleoninae фауна СССР (корневые долгоносики). Триба Cleonini. Л.: Наука, 1988. 323 с.
385. Титова Л.П. Новые виды рода Escaryus Cook et Collins (Schendylidae, Chilopoda) // Экология почвенных беспозвоночных. М.: Наука. 1973. С. 74–119.
386. Тихонова Л.В., Кмузова С.И., Петрова З.И., Жиляева И.Н. Паразитические нематоды зерновых культур в Башкирской АССР //

Нематодные болезни с.-х. растений: сб. статей. М.: Колос, 1967. С.165–167.
387. Торгашов О.А. Гусеобразные и ржанковые поймы реки Белой в черте города Мелеуза // Материалы к распространению птиц на Урале, в Приуралье и Западной Сибири. 2002. №7. С. 254–258.
388. Торгашов О.А. Птицы национального парка «Башкирия» // Материалы к распространению птиц на Урале, в Приуралье и Западной Сибири. 2003а. №8. С. 213–241.
389. Торгашов О.А. Интересные встречи птиц в Мелеузовском районе Башкортостана // Материалы к распространению птиц на Урале, в Приуралье и Западной Сибири. 2003б. №8. С. 241–242.
390. Трофимова Т.А. Предварительные результаты изучения чешуекрылых (Lepidoptera) в междуречье рек Нугуш и Урюк – территории предполагаемого расширения заповедника «Шульган-Таш» // Заповедное дело России: принципы, проблемы, приоритеты: мат-лы междунар. науч. конф. Т. 2. Бахилова Поляна, 2003. С. 384–387.
391. Трофимова Т.А. Предварительные результаты изучения фауны огневкообразных чешуекрылых (Lepidoptera, Pyraloidea) Южного Урала // Энтомологические и паразитологические исследования в Поволжье. 2004а. Вып. 3. С. 72–76.
392. Трофимова Т.А. Первые результаты изучения фауны пальцекрылок (Lepidoptera; Pterophoridae) Южного Урала // Научные чтения памяти профессора В.В. Станчинского. Вып. 4. Смоленск, 2004б. С. 273–275.
393. Трофимова Т.А. Дополнения к фауне огневкообразных чешуекрылых (Lepidoptera, Pyraloidea) Башкирии // Энтомологические и паразитологические исследования в Поволжье. 2006а. Вып. 5. С. 45–48.
394. Трофимова Т.А. Фаунистическая и эколого-биологическая характеристика чешуекрылых (Lepidoptera) горной зоны Южного Урала. Дисс. … канд. биол. наук. Тольятти, 2006б. 261 с.
395. Трофимова Т.А. Отряд Lepidoptera – Чешуекрылые или бабочки // Каталог животных Башкортостана. Уфа, 2015. С. 172–223.
396. Трофимова Т.А. Исправления и добавления к списку узкокрылых огневок (Pyralidae: Phycitinae) "Fauna lepidopterologica Volgo-Uralensis": from P. Pallas to present days" // Энтомологические и паразитологические исследования в Поволжье. 2019. № 16. С. 14–22.
397. Трофимова Т.А., Шовкун Д. Ф. Исправления и добавления к списку огневок (Lepidoptera, Pyraloidea) Южного Урала в рамках "Fauna lepidopterologica Volgo-uralensis from P. Pallas to present day" // Актуальные проблемы зоологии России и сопредельных территорий: сб. мат-лов конф. с междунар. участием, посвященной памяти профессора Вадима Викторовича Золотухина, Ульяновск, 14–15 апреля 2022 года. Ульяновск, 2022. С. 177–183.
398. Турбанов И. С., Палатов Д. М., Головач С. И. Современное состояние

биоспелеологии в России и странах бывшего Советского Союза: обзор пещерной (эндогейной) фауны беспозвоночных. 1. Введение – Crustacea // Зоол. журнал 2016а. Т. 95. № 10. С. 1136–1159.
399. Турбанов И.С., Палатов Д.М., Головач С.И. Современное состояние биоспелеологии в России и странах бывшего Советского Союза: обзор пещерной (эндогейной) фауны беспозвоночных. 2. Arachnida – благодарности // Зоол. журнал. 2016б. Т. 95. № 11. С. 1283–1304.
400. Туркменова А.И. Насекомые базы данных Зоологического музея ИЭРиЖ с территории Башкирии // Материалы по флоре и фауне Республики Башкортостан. 2016. Вып. 13. С. 93–105.
401. Фарзалиева Г.Ш., Есюнин С.Л. Обзор многоножек-костянок (Lithobiomorpha, Henicopidae, Lithobiidae) фауны Урала и Приуралья // Зоол. журнал. 2008. Т. 87. Вып. 8. С. 923–947.
402. Фоминых М.А. К редким видам птиц Республики Башкортостан // Материалы к распространению птиц на Урале, в Приуралье и Западной Сибири. 2007. №12. С. 265–266.
403. Хабибуллин В.Ф. Фауна пресмыкающихся Республики Башкортостан. Уфа: Изд-во БашГУ, 2001. 128 с.
404. Хабибуллин В.Ф. Земноводные и пресмыкающиеся Республики Башкортостан. Учебное пособие. Уфа: Изд-во БашГУ, 2003. 80 с.
405. Хабибуллин В.Ф. Ведение Каталога животных Башкортостана за 2016 год // Материалы по флоре и фауне Республики Башкортостан. 2016. Вып. 13. С. 55–93.
406. Хабибуллин В.Ф. Ведение Каталога животных Башкортостана за 2017 год // Материалы по флоре и фауне Республики Башкортостан. 2017а. Вып. 17. С. 117–157.
407. Хабибуллин В.Ф. Насекомые (Insecta) Зоологического музея Башкирского государственного университета // Материалы по флоре и фауне Республики Башкортостан. 2017б. Вып. 17. С. 68–117.
408. Хабибуллин В.Ф. Новые для фауны Башкортостана виды беспозвоночных по архивным данным кафедры зоологии БашГУ // Материалы по флоре и фауне Республики Башкортостан. 2018а. Вып. 18. С. 136–146.
409. Хабибуллин В.Ф. Материалы по фауне жуков (Insecta: Coleoptera) спортивно-оздоровительной базы «Кульчум» БашГУ (сборы 2017 года) // Материалы по флоре и фауне Республики Башкортостан, 2018б. Вып. 20. С. 104–111.
410. Хабибуллин В.Ф. Разнообразие насекомых как компонент обоснования природоохранного статуса памятника природы «Аксаковское Алкино» // Бюллетень МОИП. Отд. биол. 2018в. Т.123. Вып. 6. С.31–33.
411. Хабибуллин В.Ф. Ведение Каталога животных Башкортостана за 2018 год // Материалы по флоре и фауне Республики Башкортостан. 2018г. Вып. 21. С. 89–118.

412. Хабибуллин В.Ф. Ведение Каталога животных Башкортостана за 2019 год // Материалы по флоре и фауне Республики Башкортостан. 2019. Вып. 25. С. 33–50.
413. Хабибуллин В.Ф. Ведение Каталога животных Республики Башкортостан за 2020 год) // Материалы по флоре и фауне Республики Башкортостан. 2020. Вып. 29. С.58–70.
414. Хабибуллин В.Ф. Материалы по фауне клопов (Insecta: Heteroptera) г. Уфы и Уфимского района Республики Башкортостан // Материалы по флоре и фауне Республики Башкортостан. 2021а. Вып. 30. С.61–65.
415. Хабибуллин В.Ф. Материалы по фауне клопов (Insecta: Heteroptera) Республики Башкортостан // Материалы по флоре и фауне Республики Башкортостан, 2021б. Вып. 32. С.48–53.
416. Хабибуллин В.Ф. Материалы по фауне жуков (Insecta: Coleoptera) различных районов Башкортостана // Материалы по флоре и фауне Республики Башкортостан. 2021в. Вып. 33. С. 87–107.
417. Хабибуллин В.Ф. Ведение каталога животных Башкортостана за 2021 год // Материалы по флоре и фауне Республики Башкортостан. 2021г. Вып. 33. С. 108–125.
418. Хабибуллин В.Ф. Материалы по фауне жуков (Insecta: Coleoptera) г. Уфы и Уфимского района Республики Башкортостан // Материалы по флоре и фауне Республики Башкортостан. 2022а. Вып. 35. С. 69–84.
419. Хабибуллин, В. Ф. Ведение каталога животных Башкортостана за 2022 год // Материалы по флоре и фауне Республики Башкортостан. 2022б. Вып. 37. С. 93–105
420. Хабибуллин В.Ф. Материалы по фауне насекомых Республики Башкортостан – сезон 2022 года // Материалы по флоре и фауне Республики Башкортостан. 2023а. Вып. 40. С. 46–54
421. Хабибуллин В.Ф. Ведение каталога животных Башкортостана за 2023 год // Материалы по флоре и фауне Республики Башкортостан. 2023б. Вып. 41. С. 90–100.
422. Хабибуллин, В. Ф. Материалы по фауне жуков (Insecta: Coleoptera) спортивно-оздоровительной базы «Авиатор» УУНиТ (сборы 2023 года) // Материалы по флоре и фауне Республики Башкортостан. 2024а. Вып 42. С.80–82.
423. Хабибуллин В.Ф. Клопы-щитники семейства Pentatomidae (Insecta, Heteroptera) Башкортостана в системе iNaturalist // Материалы по флоре и фауне Республики Башкортостан. 2024б. Вып. 43. С.33–38.
424. Хабибуллин В.Ф. Материалы к фауне клопов и жуков (Insecta: Heteroptera, Coleoptera) Буздякского района Башкортостана // Материалы по флоре и фауне Республики Башкортостан. 2024в. Вып. 44. С. 30–33.
425. Хабибуллин В.Ф. Материалы по фауне членистоногих (Arthropoda) разных районов Башкортостана (сборы 2023 года) // Материалы по флоре и фауне Республики Башкортостан, 2024г. Вып. 45. С.46–51.

426. Хабибуллин В. Ф. Ведение каталога животных Башкортостана за 2024 год // Материалы по флоре и фауне Республики Башкортостан. 2024д. Вып. 45. С.25–45.
427. Хабибуллин В.Ф. Материалы по фауне жуков (Insecta: Coleoptera) окрестностей мавзолея Тура-Хан (Чишминский район Башкортостана, сборы 2024 года) // Материалы по флоре и фауне Республики Башкортостан. 2025а. Вып. 47. С. 38–44.
428. Хабибуллин В.Ф. Новые для фауны Республики Башкортостан виды животных по данным платформы iNaturalist // Материалы по флоре и фауне Республики Башкортостан. 2025б. Вып. 48. С. 55–96.
429. Хабибуллин В.Ф. Материалы по фауне насекомых (Insecta) различных районов Башкортостана (сборы 2024 года) // Материалы по флоре и фауне Республики Башкортостан. 2025в. Вып. 48. С. 97–102.
430. Хабибуллин В. Ф. Ведение каталога животных Башкортостана за 2025 год // Материалы по флоре и фауне Республики Башкортостан. 2025г. Вып. 49. С.167–183.
431. Хабибуллин В.Ф., Муравицкий О.С. Атлас-определитель кокцинеллид (божьих коровок) (Coleoptera: Coccinellidae) и жуков-листоедов (Coleoptera: Chrysomelidae) Башкортостана. Учебное пособие. Уфа: РИЦ БашГУ, 2011. 128 с.
432. Ханисламов Г.М. Научные и практические задачи защиты лесов Башкирии от энтомовредителей // Охрана природы и озеленение населенных пунктов: мат-лы шестого всеуральского совещ. по вопросам географии и охраны природы / Отв. ред. И.П. Кадильников. Уфа, 1961. С. 39–43.
433. Ханисламова Г.М. Комплексы коллембол пойменных почв и их изменение в процессе мелиорации: Автореф. дисс. … канд. биол. наук. М., 1982. 19 с.
434. Ханисламова Г.М. Особенности комплексов ногохвосток в условиях пойменных местообитаний // Фауна и экология ногохвосток (Collembola): сб. работ / Отв. ред. М.С. Гиляров, Н.М. Чернова. М.: Наука, 1984. С. 78–89.
435. Харитонов А.Ю., Попова О.Н., Лагунов А.В. Созологический анализ стрекоз (Odonata) Южного Урала // Евразиатский энтомол. журнал. 2014. 13(4). С.301–314.
436. Хохуткин И.М., Ерохин Н.Г., Гребенников М.Е. Моллюски: Биоразнообразие, экология. Екатеринбург: УрО РАН, 2003. 235 с.
437. Чаус Б. Ю. Организация зооиндикации на территории промышленного города (на примере города Стерлитамак, Республика Башкортостан) // Путь науки. 2015. № 1(11). С. 27–29.
438. Чаус Б. Ю. Представители отряда Bdelloidae из типа Rotatoria как объекты биомониторинга рек Южного Урала // Вода: химия и экология. 2017а. № 10(112). С. 18–23.

439. Чаус Б. Ю. Личинки отряда Ephemeroptera как биоиндикаторы качества воды рек Южного Урала // Самарский научный вестник. 2017б. Т. 6. № 4(21). С. 87–93.
440. Чаус Б. Ю. Экологический мониторинг рек Южного Урала с использованием ресничных инфузорий из отряда Gymnostomata // Вестник Воронежского госуд. ун-та. Серия: Химия. Биология. Фармация. 2018а. № 3. С. 146–153.
441. Чаус Б. Ю. Анализ степени реагирования организмов макрозообентоса на содержание и индикацию химических веществ в воде малых рек Башкирского Предуралья // Вестник Нижневартовского гос. ун-та. 2018б. № 3. С. 75–83.
442. Чаус Б. Ю. Динамика постоянства личинок отряда Ephemeroptera в реке Белая (Республика Башкортостан, Россия) // Norwegian Journal of Development of the International Science. 2019. № 12-2(37). С. 15–22.
443. Чаус Б. Ю. Мониторинг показателей постоянства личинок Trichoptera, обитающих в верхнем течении реки Белая (Республика Башкортостан, Россия) // 21 век: фундаментальная наука и технологии: мат-лы XXX междунар. научно-практич. конф. Bengaluru: Pothi.com, 2022. С. 7–11.
444. Чаус Б. Ю. Моделирование экологических ПДК для реки Зилаир в районе села Зилаир (Республика Башкортостан) по показателям постоянства коловраток // Фундаментальные и прикладные научные исследования в современном мире: сб. научных статей по материалам III Междунар. научно-практич. конф. Уфа: Вестник науки, 2023. С. 248–251.
445. Чаус Б.Ю., Биктимерова И.И. Таксономический анализ фауны чешуекрылых Кармаскалинского района Республики Башкортостан // Евразийский союз ученых. Биол. науки. Вып. 68. Т. 2. М., 2019. С. 25–28.
446. Чащина О.Е. Аннотированный список жесткокрылых блошек (Coleoptera, Chrysomelidae, Galerucinae) Южного Урала // Энтомол. обозрение. 2008. Т. 87. Вып. 1. С. 45–62.
447. Черепанова А.А., Саттаров В.Н. Мониторинг энтомофауны представителей рода тополь (Pópulus) (на примере г. Октябрьский) // Фундаментальные и прикладные аспекты развития современной науки: сб. трудов по материалам XI Междунар. конкурса научно-исследовательских работ, Уфа, 16 января 2023 года. Уфа. 2023. С. 26–29.
448. Четвериков Ф.Е. Четырехногие клещи (Acari: Eriophyoidea) с осоковых (сем. Cyperaceae) восточной Башкирии и окрестностей Миасса // Актуальные проблемы сохранения биоразнообразия на охраняемых и иных территориях: мат-лы науч.-практ. конф. / Отв. ред. И.В. Суюндуков. Уфа: БашГУ, 2010. С.71–74.
449. Шамшев И.В. Аннотированный список эмпидоидных мух (Diptera: Empidoidea, кроме Dolichopodidae) России // Труды Русского энтомол. об-ва. 2016. Т. 87. 184 с.
450. Шаповалов А.М. Жуки-усачи (Coleoptera, Cerambycidae) Оренбургской

области: фауна, распространение, биономия // Труды Оренбургского отделения Русского энтомол. об-ва. Вып. 3. Оренбург, 2012. 221 с.
451. Шепелевич В.В., Степанова Р.К. К фауне и экологии чернотелок (Coleoptera, Tenebrionidae) Башкирии // Вопросы экологии животных Южного Урала: сб. трудов. Уфа, 1984. С.113–124.
452. Шкундина Ф.Б., Книсс В.А., Габидуллина Г.Ф. Организмы активного ила аэротенков. Уфа: РИЦ БашГУ, 2007. 60 с.
453. Шутак В.И. Земляные блошки (Coleoptera, Chrysomelidae, Halticinae) Башкирии и Южного Урала. Автореф. дисс. ... канд. биол. наук. Черновцы, 1975. 16 с.
454. Энгель О.А. Малый перепелятник *Accipiter gularis* в Башкирии // Башкирский орнитол. вестник. 2020. Вып. 35. С.31–32.
455. Юмагулова Г.Р. Гельминты амфибий Южного Урала. Автореф. дисс. ... канд. биол. наук. Уфа, 2000. 18 с.
456. Яныбаева В.А. Фауна и экология стрекоз Южного Урала. Автореф. дисс. … канд. биол. наук. Новосибирск, 2001. 22 с.
457. Яныбаева В.А. К вопросу изучения стрекоз Южного Урала // Устойчивое развитие территорий: теория и практика: мат-лы III Всерос. научно-практ. конф. / Я.Т. Суюндуков и др., ред. Уфа: БашГУ, 2011. С.315–318.
458. Яфаева З.Ш., Гирфанова Л.Н. Полезные насекомые в лесах Башкирии // Насекомые – вредители лесов Башкирии: сб. работ / Отв. ред. Ф.Ш. Гарифуллин. Уфа: БФАН СССР, 1977. С.122–136.
459. Ahola M., Lagunov A.V., Silvonen K. Noctuoidea collected in the Southern Urals in 2006-2009. 1 (Noctuidae) // Амурский зоол. журнал. 2012. Т. IV (3). С. 258–272.
460. Alonso-Zarazaga M.A., Barrios H., Borovec R., Caldara R., Colonnelli E., Gültekin L., Hlaváč P., Korotyaev B., Lyal C.H.C., Machado A., Meregalli M., Pierotti H., Ren L., Sánchez-Ruiz M., Sforzi A., Silfverberg H., Skuhrovec J., Trýzna M., Velázquez de Castro A.J., Yunakov N.N. 2024. Cooperative Catalogue of Palaearctic Coleoptera Curculionoidea. Work Version 3.4. Available at: http://weevil.info/content/palaearctic-catalogue (accessed November, 2, 2025).
461. Anikin V.V., Sachkov S.A., Zolotuhin V.V. "Fauna lepidopterologica Volgo-Uralensis" 150 years later: changes and additions. Part 4. Coleophoridae, Gelechiidae, Symmocidae and Holcopogonidae // Atalanta. Bd. 29 (1/4). Wurzburg. 1999. P. 295–336.
462. Anikin V.V., Sachkov S.A., Zolotuhin V.V. "Fauna lepidopterologica Volgo-Uralensis" 150 years later: changes and additions. Part 2. Bombyces et Sphinges (Insecta, Lepidoptera) // Atalanta. Bd. 31 (1/2). Wurzburg, 2000a. P. 265–292.
463. Anikin V.V., Sachkov S.A., Zolotuhin V.V., Antonova E.M. "Fauna lepidopterologica Volgo-Uralensis" 150 years later: changes and additions. Part 3. Geometridae (Insecta, Lepidoptera) // Atalanta. Bd. 31 (1/2). Wurzburg,

2000b. P. 293–326.
464. Anikin V.V., Sachkov S.A., Zolotuhin V.V. "Fauna Lepidopterologica Volgo-Uralensis" 150 years later: changes and additions. Part 5. Noctuidae (Insecta, Lepidoptera) // Atalanta. Bd. 31 (1/2). Wurzburg, 2000c. P. 327–367.
465. Anikin V.V., Sachkov S.A., Zolotuhin V.V., Ustjuzhanin P.Ya. "Fauna Lepidopterologica Volgo-Uralensis"150 years later: changes and additions. Part 7. Pyraleset Pterophores (Insecta, Lepidoptera) // Atalanta. Bd. 34 (1/2). Wurzburg, 2003. P. 223–250.
466. Anikin V.V., Sachkov S.A., Zolotuhin V.V., Nedoshivina S.V., Trofimova T.A. "Fauna Lepidopterologica Volgo-Uralensis" 150 years later: changes and additions. Part 9. Tortricidae // Atalanta. Bd. 37 (3/4). Wurzburg, 2006a. P. 409–445.
467. Anikin V.V., Sachkov S.A., Zolotuhin V.V., Lvovsky A.L. "Fauna Lepidopterologica Volgo-Uralensis" 150 yearslater: changes and additions. Part 10. Oecophoridae s.l. // Atalanta. Bd. 37 (3/4). Wurzburg, 2006b. P. 446–456.
468. Anikin V.V., Sachkov S.A., Zolotuhin V.V. "Fauna Lepidopterologica Volgo-Uralensis" 150 years later: changes and additions. Part 12. Ethmiidae et Scytrididae (Insecta, Lepidoptera) // Atalanta. Bd. 38 (1/2). Wurzburg, 2007. P. 279–291.
469. Anikin V.V., Sachkov S.A., Zolotuhin V.V. "Fauna Lepidopterologica Volgo-Uralensis" 150 years later: changes and additions. Part 15. Monotrysia // Atalanta. Bd. 40 (1/2). Wurzburg, 2009. P. 303–311.
470. Anikin V.V., Sachkov S.A., Zolotuhin V.V. "Fauna lepidopterologica Volgo-Uralensis": from P. Pallas to present days/Proceedings of the Museum Witt Munich. 7. Munich-Vilnius. 2017. 696 p.
471. Baraniak E., Junnilainen J. Contribution to the knowledge of Yponomeutoidea (Lepidoptera). III. *Argyresthia (Blastotere) uralensis* sp. n., a new species from Russia (Lepidoptera: Argyresthiidae) // Polish journal of entomology. Vol. 80. Varshava, 2011. p. 499–503.
472. Bieńkowski A.O. Leaf-beetles (Coleoptera: Chrysomelidae) of the Eastern Europe. New key to subfamilies, genera and species. M., 2004. 278 p.
473. Błeszyński S. Crambinae. Microlepidoptera Palaearctica. 1 (1). Wien. 1965. 553 p.
474. Buchner P., Junnilainen J., Nupponen K. *Agonopterix sideensis* from Turkey and *Exaeretia lvovskyi* from Russia, two new species of Depressariidae (Lepidoptera) from the Palaearctic region, and the transfer of *Exaeretia montuosella* (Hannemann, 1976) into the genus Agonopterix Hübner, [1825] // Miscellaneous Papers. Centre for Entomological Studies. № 184. Ankara. 2019. pp. 1–25.
475. Catalogue of Palaearctic Coleoptera. Volume 6/2/1. Chrysomeloidea II (Orsodacnidae, Megalopodidae, Chrysomelidae) / Bezdek J., Sekerka L. (eds.). Updated and Revised Second Edition. Leiden: Koninklijke Brill, 2024. 750 p.

476. Eversmann E. Fauna Entomologica, quam per viginti fere annos in provinciis Volgam fluvium inter et montes Uralenses observavit et descriptionibus illustravit. Tomus primus. Lepidoptera // Ученые записки Императорского Казанского университета. Кн. 1. Казань. 1841. С. 1–166.
477. Eversmann E. Fauna Lepidopterologica Volgo-Uralansis. Casani. 1844. 633 p.
478. Farzalieva G.Sh., Esyunin S.L. The harvestman fauna of the Urals, Russia, with a key to the Ural species (Arachnida: Opiliones) // Arthropoda selecta. 2000. Vol.8. No.3. P.183–199.
479. Fibiger M., Yela J. L., Zilli A., Varga Z., Ronkay G., Ronkay L. Check list of the Quadriphid Noctuoidea of Europe // Lymantriinae and Arctiinae including Phylogeny and check list of the Quadrifid Noctuoidea of Europe / Noctuidae Europaea. 2011. Vol. 13. P. 23–44.
480. Gaedike R., Šumpich J. Tinea altaica sp. nov. and new records of some small moths from the Russian Altai (Lepidoptera: Meessiidae, Tineidae, Douglasiidae, Epermeniidae, Glyphipterigidae: Acrolepiinae) // Acta Entomologica Musei Nationalis Pragae. 2017. Vol. 57 (1). P. 259–273.
481. Grosser N. Zur Lepidopteren-Fauna (Macrolepidoptera) Baschkiriens // Wissenschaftliche Zeitschrift der Universität Halle. Bd. 32. 1983. S. 11–21.
482. Guśkova E.V. The Leaf-beetles (Coleoptera, Chrysomelidae) of the South Urals // Zeitschrift für entomologie. 2010. Bd. 31 (14). P. 169–228.
483. Huemer P., Karsholt O. Gelechiidae II (Gelechiiane: Gnorimoschemini) // Microlepidoptera of Europe 6. Stenstrup. 2010. 586 p.
484. Junnilainen J. Two new species of Swammerdamia from the southern Ural Mountains and southern Siberia (Lepidoptera: Yponomeutidae) // Entomologica Fennica. Vol. 12 (2). Helsinki. 2001. P. 112–118.
485. Junnilainen J., Karsholt O., Nupponen K., Kaitila J.-P., Nupponen T., Olschwang V. The gelechiid fauna of the southern Ural Mountains, part II: list of recorded species (Lepidoptera: Gelechiidae) // Zootaxa, 2367. Auckland. 2010. P. 1–68.
486. Junnilainen J., Nupponen K. *Buvatina iremella* sp. n. (Lepidoptera: Oecophoridae) from the southern Ural Mountains // Entomologica Fennica. Helsinki. 1999. P. 247–248.
487. Kaila L., Junnilainen J. Taxonomy and identification of *Elachista cingillella* (H.-S.) and its close relatives (Lepidoptera: Elachistidae), with descriptions of two new species // Entomologica Fennica. Vol. 13. Helsinki. 2002. P. 167–188.
488. Kaila L., Nupponen K., Junnilainen J., Nupponen T., Kaitila J.-P., Olschwang V. Contribution to the fauna of Elachistidae (Lepidoptera) of the Southern Ural Mountains // Entomologica Fennica. Vol. 14 (2). Helsinki. 2003. P. 65–90.
489. Kazantsev S.V., Makarov K.V. On the status and origin of the endemic to the South Urals soldier beetles (Coleoptera: Cantharidae) // Russian Entomol. J. 2024. Vol.33. No.3. P.348–353.
490. Khabibullin V.F. Helminths of reptiles from South Urals, Russia: preliminary

results // Biological Sciences in Kazakhstan. 2006. №4. P. 35–40.
491. Khabibullin V.F. First records of *Scutigera coleoptrata* (Linnaeus, 1758) (Chilopoda: Scutigeromorpha: Scutigeridae) for Bashkortostan, the South Urals, Russia // Euroasian Entomol. Journal. 2017. Vol. 16. № 4 P. 390–391.
492. Kippenberg H., Mikhailov Y. Contribution to the Knowledge of *Entomoscelis adonidis* (Pallas, 1771) and Allied Species (Coleoptera: Chrysomelidae: Chrysomelinae) // Koleopterologische Rundschau. 2020. Vol. 90. P. 257–290.
493. Korotyaev B.A. Records of weevils new to the Russian fauna (Coleoptera: Curculionidae) // Zoosystematica Rossica. 1999. Vol.8. No.1. P. 174.
494. Korovchinsky N. Morphological assessment of the North Eurasian interspecific hybrid forms of the genus Bythotrephes Leydig, 1860 (Crustacea: Cladocera: Cercopagididae) // Zootaxa. 2019. 4550(3):340. DOI:10.11646/zootaxa.4550.3.3
495. Krivosheina M.G., Ozerov A.L. A review of the shore-fly genus Ephydra Fallén, 1810 (Diptera: Ephydridae) of Russia // Russian Entomol. J. 2021. 30(3). P. 345–360.
496. Maslova O.O., Negrobov O.P., Selivanova O.V. New records of Rhaphium (Dolichopodidae, Diptera) from Russian protected areas // Nature Conservation Research. Заповедная наука. 2020. 5(3). P. 139–144.
497. Ménétriès E. Catalogue des insectes recueillis par feu M. Lehmann avec les descriptions des nouvelles espèces. (Seconde et dernière partie.) // Mémoires de la Académie impériale des sciences de Saint-Pétersbourg. Sixième série. Sciences naturelles. T. 6. Petropoli. 1849. P. 217–308.
498. Ménétriès E. Enumeratio corporum animalium Musei Imperialis Academiae Scientiarum Petropolitanae. P. 1. Petropoli. 1855. 296 p.
499. Mikhailov Yu. E. New distributional records of Chrysomelidae from the Urals and Western Siberia // Faunistische Abhandlungen 2000. Bd. 22 (3). P. 23–38.
500. Mikhailov Yu.E. Rare and endemic for the South Urals species of coleopterans (Coleoptera: Carabidae, Chrysomelidae): new records from Mashak and Zigalga mountain ranges, Russia // Euroasian Entomol. Journal. 2025. Vol. 24. No. 6. P.327–334. https://doi.org/10.15298/euroasentj.24.06.06
501. Mokrousov M.V., Danilov Yu.N. Additions and corrections to the fauna and distribution of digger wasps (Hymenoptera: Crabronidae) of Russia // Proceedings of the Russian Entomol. Society. St Petersburg, 2017. Vol. 88(2). P.56–60.
502. Namyatova A.A., Konstantinov F.V. Revision of the genus Orthocephalus Fieber, 1858 (Hemiptera: Heteroptera: Miridae: Orthotylinae) // Zootaxa. 2009. N 2316. P. 1–118.
503. Nupponen K. Redescription of *Pelochrista maculiferana* (Kennel, 1900), bona sp., with notes on eight poorly known species of leafrollers from the Volgo-Ural region (Lepidoptera: Tortricidae) // Nota lepidopterologica. Vol. 35 (2). Bonn. 2012. P. 115–124.
504. Nupponen K., Ahola M., Kullberg J. *Agrotis iremeli* sp. n. from the southern

Ural Mountains, with description of the larval stage (Lepidoptera: Noctuidae) // Entomologica Fennica. 2001b. Vol. 12 (4). P. 217–226.
505. Nupponen K., Bengtsson B.Å., Kaitila J.-P., Nupponen T., Junnilainen J. & Olschwang W. The scythridid fauna of the southern Ural Mountains, with description off our teen new species (Lepidoptera: Scythrididae) // Entomologica Fennica. 2000. Vol. 11. P. 5–34.
506. Nupponen K., Fibiger M. Additions and corrections to the list of Bombyces, Sphinges and Noctuidae of the Southern Ural Mountains. Part I. (Lepidoptera: Lasiocampidae, Lemoniidae, Sphingidae, Notodontidae, Noctuidae, Pantheidae, Lymantriidae, Nolidae, Arctiidae) // Esperiana. Bd. 12. Schwanfeld. 2006. P. 167–195.
507. Nupponen K., Fibiger M. Additions to the checklist of Bombycoidea and Noctuoidea of the Volgo-Ural region. Part II (Lepidoptera: Lasiocampidae, Erebidae, Nolidae, Noctuidae) // Nota lepidopterologica. Vol. 35 (1). Bonn. 2011. P. 33–50.
508. Nupponen K., Fibiger M. Contribution to the knowledge of the fauna of Bombyces, Sphinges and Noctuidae of the southern Ural Mountains, with description of a new Dichagyris (Lepidoptera: Lasiocampidae, Endromidae, Saturniidae, Sphingidae, Notodontidae, Noctuidae, Pantheidae, Lymantriidae, Nolidae, Arctiidae) // Phegea. Vol. 30 (4). Merksem. 2002. P. 121–185.
509. Nupponen K., Junnilainen J. *Ephestia animella* sp. n. (Lepidoptera: Pyralidae, Phycitinae) from the Ural Mountains and southern Siberia // Entomologica Fennica Vol. 9 (3). Helsinki. 1998. P. 143–146.
510. Nupponen K., Junnilainen J., Nupponen T., Olschwang V. The cochylid fauna of the Southern Ural Mountains, with description of *Cochylimorpha ignicolorana* Junnilainen & K. Nupponen sp. n. (Lepidoptera: Tortricidae: Cochylini) // Entomologica Fennica. Vol. 12. Helsinki. 2001a. P. 94–107.
511. Ozerov A.L. A review of the genus Trichopalpus Rondani, 1856 (Diptera: Scathophagidae) of Russia // Russian Entomol. J. 2019. Vol. 28. No. 4. P. 470–484.
512. Ozerov A.L., Krivosheina M.G. A review of the genus Norellisoma Wahlgren, 1917 (Diptera: Scathophagidae) of Russia // Russian Entomol. J. 2020a. Vol. 29. No.1. P.103–120. doi: 10.15298/ rusentj.29.1.15
513. Ozerov A.L., Krivosheina M.G. A review of the genus Cordilura Fallén, 1810 (Diptera: Scathophagidae) of Russia // Russian Entomol. J. 2020б. Vol. 29. No. 4. P. 439–480.
514. Paśnik G. *Atheta (Bessobia) bashkirica* sp. n. from South Ural (Coleoptera, Staphylinidae: Aleocharinae) // Acta zool. cracov. 1999. Vol. 42. No 2. P. 365–368.
515. Proshchalykin, M.Yu., Astafurova, Yu.V., Levchenko T.V., Schlykhtenok A.S., Schwarz M. The species-group names of bees (Hymenoptera: Apoidea, Apiformes) described from Crimea, North Caucasus, European part of Russia and Ural. Part III. Families Melittidae and Apidae (Except Bombus Latreille

and Apis Linnaeus) // Far Eastern Entomologist. 2019. Vol. 396. P. 17–44.
516. Przhiboro A.A. New data on psammorheophilous Limoniidae (Diptera) of NE European Russia // Zoosystematica Rossica. 2017. 26(2). P. 381–391.
517. Rosa P., Lelej A.S., Belokobylskij S.A., Vinokurov N.B., Zaytseva L.A. Illustrated and annotated checklist of the Russian cuckoo wasps (Hymenoptera, Chrysididae) // Entomofauna zeitschrift fur entomologie, 2019 Suppl. 23. 360 pp.
518. Rybalkin S.A. Yakovlev R.V., Benedek B. New and interesting records of Lepidoptera in the Ural Mountains (Russia) (Lepidoptera: Papilionoidea, Noctuoidea) // SHILAP. Sociedad Hispano-Luso-Americana de Lepidopterología. 2022. Vol. 50 (199). P. 551–559.
519. Samartsev K.G. On the knowledge of the subfamily Braconinae (Hymenoptera: Braconidae) of Russia // Proceedings of the Russian Entomol. Society. St Petersburg, 2019. Vol. 90. P. 54–85
520. Shear W. On the Central and East Asian milliped family Diplomaragnidae (Diplopoda, Choredeumatida, Diplomaragnoidea) // American Museum Novitates. New York. 1990. N 2977. P. 1–40.
521. Sorokina V.S., Chashchina O.E. Data on the fauna of flower flies (Diptera: Syrphidae) of the South Urlas // Russian Entomol J. 2003. №12(1). P. 93–101.
522. Šumpich J, Skyva J. New faunistic records for a number of Microlepidoptera, including description of three new taxa from Agonoxenidae, Depressariidae, and Gelechiidae (Gelechioidea) // Nota lepidopterologica. Vol. 35 (2). Bonn. 2012. P. 161–179.
523. Trofimova T., Shovkoon D., Ustjuzhanin P. The distribution of Pterophoridae (Lepidoptera) in the Uralo-Caspian region // Entomologist's Gazette. 2016. Vol. 67 (4). P. 287–298.
524. Vikhrev N.E. Review of the world fauna of the genus Azelia (Diptera, Muscidae // Амурский зоол. журнал. 2015. Том 7. №1. 33–42.
525. WSC. 2025. World Spider Catalog. Version 26. Natural History Museum Bern. Available from: http://wsc.nmbe.ch (accessed on 14.12.2025).
526. Yakovlev R.V., Shapoval N.A., Shapoval G.N., Naydenov A.E. Review of the *Dyspessa salicicola* (Eversmann, 1848) species group (Lepidoptera, Cossidae: Cossinae) // Acta Biologica Sibirica. 2022. T. 8. C. 693–712.
527. Yunakov N.N., Dedyukhin S.V., Filimonov R.V. Towards the survey of Entiminae weevils (Coleoptera, Curculionidae) of Russia: species occurring in the Volga and Ural Regions // Russian Entomol. J. 2012. Vol. 21. № 1. P.57–72.
528. Zabaluev I.A. Taxonomy, biology and immature stages of the little-known weevil *Pseudorchestes (Labiorchestes subgen. n.) stobieckii* (Smreczyński, 1957) comb. n. (Coleoptera: Curculionidae: Rhamphini) // Russian Entomol. J. 2025. Vol. 34. No 1. P. 82–92.

Указатель латинских названий родов

Abacoproeces, 94
Abia, 395
Abiskoa, 94
Ablabesmyia, 436
Abramis, 460
Abraxas, 343
Abrostola, 361
Acaenitus, 423
Acalypta, 155
Acanthinula, 61
Acanthis, 476
Acanthobodilus, 184
Acanthocephalus, 47
Acanthochermes, 141
Acanthocinus, 202
Acanthocyclops, 120
Acanthocystis, 30
Acanthodiaptomus, 120
Acantholeberis, 118
Acantholycosa, 103
Acantholyda, 399
Acanthopsyche, 257
Acanthoscelides, 204
Acanthosoma, 160
Acanthothrips, 164
Acarapis, 87
Acartauchenius, 94
Acarus, 79
Acaryophrya, 21
Acasis, 328
Accipiter, 466
Acentrella, 133
Acentria, 315
Aceria, 85
Acericerus, 145
Acetropis, 151
Achenium, 182
Acherontia, 348
Acheta, 130
Achipteria, 80
Achlya, 324
Achroia, 309
Achtheres, 121
Achyra, 320
Achyrolimonia, 427
Acidota, 181
Acilius, 176
Acineta, 24
Acinia, 455
Acipenser, 459
Acleris, 291
Acmaeops, 203
Acompocoris, 150
Acompsia, 276
Acompus, 158
Acontia, 364
Acosmetia, 369
Acossus, 305
Acotyledon, 79
Acricotopus, 434
Acrida, 128
Acrobasis, 310
Acrobeles, 67
Acrobeloides, 67
Acrocephalus, 473
Acrocercops, 260
Acrolichanus, 35
Acrolobus, 67
Acroloxus, 57
Acronicta, 365
Acroperus, 118
Acrossus, 184
Acrotritia, 81
Actebia, 383
Actenicerus, 189
Actia, 455
Actinobolina, 22
Actinophrys, 30
Actinosphaerium, 30
Actinotia, 371
Actitis, 469
Acuaria, 72
Aculepeira, 87
Aculus, 86
Acupalpus, 169
Acylophorus, 182
Acyrthocyphon, 139
Adalia, 195
Adamas, 396
Adarrus, 142

Adela, 255
Adelges, 139
Adelphocoris, 151
Aderus, 197
Adoristes, 82
Adosomus, 230
Adoxophyes, 288
Adrastus, 189
Adscita, 307
Aedes, 437
Aedia, 364
Aegithalos, 475
Aegle, 365
Aegolius, 471
Aegomorphus, 202
Aegopinella, 62
Aegypius, 466
Aelia, 161
Aellopus, 158
Aelurillus, 108
Aenigmomphiscola, 57
Aeolosoma, 53
Aeolothrips, 162
Aeropedellus, 128
Aeshna, 136
Aethalura, 344
Aethes, 292
Agabus, 175
Agalenatea, 88
Agallia, 142
Agapanthia, 202
Agapeta, 293
Agapetus, 250
Agathidium, 180
Agathis, 421
Agdistis, 284
Agelastica, 214
Agelena, 87
Ageniaspis, 419
Agenioideus, 416
Aglais, 392
Aglaoapis, 412
Aglaostigma, 398
Aglenchus, 72
Aglia, 347
Aglossa, 309
Agnippe, 279
Agnocoris, 151
Agnoea, 268
Agnyphantes, 94
Agoliinus, 184
Agonochaetia, 281
Agonopterix, 266
Agonum, 169
Agramma, 155
Agraylea, 250
Agria, 447
Agriades, 390
Agrilinus, 184
Agrilus, 187
Agriopis, 344
Agriotes, 189
Agriphila, 316
Agripnia, 253
Agrius, 348
Agroeca, 103
Agrotera, 322
Agrotis, 383
Agrypnetes, 252
Agrypnus, 189
Aguriahana, 145
Agyneta, 94
Ahasverus, 195
Aiolopus, 129
Aix, 464
Aizobius, 225
Alaimus, 74
Alaria, 41
Alauda, 472
Alboglossiphonia, 55
Alburnoides, 460
Alburnus, 460
Alcedo, 471
Alces, 479
Alcis, 344
Aleimma, 292
Aleiodes, 423
Aleochara, 181
Alicorhagia, 80
Allactaga, 478
Allantus, 396
Allochernes, 76
Allocreadium, 35
Allocricetulus, 478
Allohogna, 103
Allomengea, 95

Allophyes, 368
Allophyla, 444
Allopiophila, 447
Allorhinocoris, 151
Allygidius, 142
Allygus, 142
Alnetoidea, 145
Alomya, 423
Alona, 118
Alonella, 118
Alopecosa, 103
Alosimus, 197
Alosterna, 203
Alphitophagus, 199
Alsophila, 341
Altenia, 283
Altica, 215
Altajosoma, 117
Alydus, 159
Amalorrhynchus, 233
Amalus, 233
Amara, 170
Amaurosoma, 448
Amblyjoppa, 424
Amblyptilia, 284
Amblyteles, 424
Amblytylus, 153
Amegilla, 403
Ameletus, 133
Ametastegia, 396
Amidostomum, 68
Ammobates, 405
Ammobatoides, 405
Ammoconia, 374
Ammophila, 414
Amoeba, 30
Ampedus, 189
Amphiareus, 150
Amphibiomermis, 74
Amphigerontia, 132
Amphileptus, 21
Amphilina, 42
Amphimallon, 186
Amphimermis, 74
Amphinemura, 131
Amphipoea, 371
Amphipsylla, 138
Amphipyra, 367
Amphisia, 28
Amphitetranychus, 87
Ampullaceana, 57
Amurotrema, 36
Anabolia, 252
Anacaena, 178
Anacampsis, 275
Anaceratagallia, 142
Anacridium, 128
Anaesthetis, 202
Anakelisia, 148
Ananarsia, 276
Anania, 320
Anaphothrips, 162
Anaplectoides, 385
Anaplectus, 66
Anapus, 153
Anarsia, 276
Anarta, 378
Anas, 464
Anasimyia, 449
Anaspis, 199
Anastatus, 420
Anastrangalia, 203
Anaticola, 137
Anatis, 195
Anatopynia, 436
Anax, 136
Anchinia, 268
Anchomenus, 170
Anchoscelis, 374
Ancistrocerus, 417
Ancistronycha, 190
Ancylis, 298
Ancylosis, 310
Ancylostoma, 68
Ancylus, 58
Andrena, 400
Andrenosoma, 440
Andricus, 421
Androlaelaps, 78
Anechura, 131
Anerastia, 310
Aneurus, 156
Angaracris, 129
Angerona, 340
Angiostrongylus, 68
Anguis, 462

Anguliphantes, 95
Anisodactylus, 170
Anisoplia, 186
Anisorus, 203
Anisosticta, 195
Anisotoma, 180
Anisus, 58
Ankothrips, 162
Anobium, 191
Anodonta, 64
Anoecia, 139
Anogcodes, 198
Anomala, 186
Anomognathus, 181
Anomotaenia, 43
Anonchotaenia, 46
Anopheles, 437
Anoplius, 416
Anoplocephala, 43
Anoplocephaloides, 43
Anoplodera, 203
Anoplodinium, 24
Anoplotrupes, 184
Anoplus, 238
Anorthoa, 377
Anoscopus, 142
Anostirus, 189
Anotylus, 181
Anoxia, 186
Anser, 465
Anthaxia, 187
Antheminia, 161
Anthicus, 197
Anthidiellum, 412
Anthidium, 412
Anthobium, 181
Anthocharis, 389
Anthocomus, 193
Anthocoris, 150
Anthomyia, 442
Anthonomus, 237
Anthophagus, 181
Anthophila, 287
Anthophora, 403
Anthracus, 170
Anthrax, 441
Anthrenus, 191
Anthribus, 223
Anthropoides, 467
Anthus, 472
Anticlea, 337
Anticollix, 329
Antipalus, 440
Antiphrisson, 440
Antistea, 94
Antitype, 374
Anurida, 124
Anurophorus, 125
Anyphaena, 87
Aonchotheca, 75
Apalochrus, 193
Apamea, 372
Apanteles, 422
Apatania, 251
Apatemon, 42
Apatura, 392
Apaustis, 365
Apechthis, 425
Apeira, 342
Apertochrysa, 166
Aphalara, 139
Aphantopus, 394
Aphanus, 158
Apharyngostrigea, 42
Aphelenchoides, 66
Aphelenchus, 66
Aphelia, 288
Aphelocheirus, 148
Aphidecta, 195
Aphidius, 422
Aphis, 139
Aphodius, 184
Aphomia, 309
Aphrodes, 142
Aphrophora, 142
Aphthona, 215
Apion, 225
Apiosoma, 26
Apis, 404
Apista, 271
Aplectana, 70
Aplexa, 58
Aplocera, 328
Aploparaksis, 44
Apoamphileptus, 21
Apocheima, 344

Apoda, 307
Apodemus, 478
Apoderus, 224
Apodia, 277
Apolygus, 151
Apomyelois, 311
Apophallus, 38
Aporcelaimellus, 74
Aporchis, 38
Aporia, 389
Aporodes, 319
Aporrectodea, 53
Apotomis, 296
Aproaerema, 276
Aproceros, 395
Apsectrotanypus, 436
Apterogenum, 375
Apterothrips, 162
Aptinothrips, 162
Apus, 471
Aquarius, 149
Aquila, 466
Aradus, 156
Araeoncus, 95
Araneus, 88
Araniella, 88
Araschnia, 392
Arboridia, 145
Arcella, 31
Archaeodictyna, 91
Archanara, 372
Archarius, 238
Archiearis, 339
Archinemapogon, 258
Archips, 288
Arcteonais, 53
Arctia, 353
Arctodiaptomus, 120
Arctogeophilus, 116
Arctophila, 449
Arctopsyche, 251
Arctornis, 352
Arctorthezia, 141
Arctosa, 104
Arctoseius, 78
Arcynopteryx, 131
Arcyptera, 128
Ardania, 271
Ardea, 464
Ardeola, 464
Ardis, 396
Arenaria, 468, 469
Arenostola, 372
Arethusana, 395
Arge, 395
Argenna, 90
Argiope, 88
Argogorytes, 408
Argulus, 121
Argynnis, 393
Argyresthia, 263
Argyroneta, 90
Argyrospila, 372
Argyrotaenia, 289
Arhopalus, 204
Arhythmorhynchus, 47
Aricia, 390
Arion, 62
Aristotelia, 277
Aritranis, 424
Arma, 160
Armadillidium, 122
Armiger, 58
Arocatus, 157
Arocephalus, 142
Aroga, 279
Aromia, 201
Arpedium, 181
Arrhopalites, 126
Artemia, 117
Arthaldeus, 142
Arthroplea, 134
Arvicola, 478
Asagena, 111
Asalebria, 311
Asaphidion, 174
Ascaridia, 70
Ascaris, 70
Ascarops, 73
Ascleriducta, 271
Ascomorpha, 51
Ascotis, 344
Asellus, 123
Asemum, 204
Asianellus, 108
Asilus, 440

Asio, 471
Asiotmethis, 129
Asiraca, 147
Askenasia, 21
Asphondylia, 439
Aspiculuris, 71
Aspidapion, 225
Aspidiphorus, 195
Aspidisca, 23
Aspitates, 340
Asplanchna, 49
Asproparthenis, 230
Assara, 311
Astata, 408
Asterodiaspis, 141
Asthena, 328
Astiotrema, 39
Asymphylodora, 38
Ateliotum, 258
Athalia, 396
Athene, 471
Atherix, 458
Atheta, 181
Athetis, 370
Atholus, 179
Athous, 189
Athrips, 279
Athripsodes, 251
Athrycia, 452
Athysanus, 142
Atolmis, 356
Atomaria, 193
Atractides, 85
Atractotomus, 153
Atrecus, 182
Atrichopogon, 429
Atrichosema, 439
Attagenus, 191
Attelabus, 224
Attulus, 108
Atylotus, 458
Atypha, 375
Aulacidea, 421
Aulacobaris, 232
Aulacorthum, 139
Auletobius, 224
Aulodrilus, 54
Aulonium, 200
Aulophorus, 54
Auplopus, 416
Austroasca, 145
Autogneta, 80
Autographa, 362
Autosilis, 190
Axenyllodes, 124
Axylia, 385
Aythya, 465
Azelia, 445
Azygia, 35
Babesia, 19
Baccha, 450
Bactra, 296
Badister, 170
Baetis, 133
Bagnallella, 125
Bagous, 242
Balanion, 20, 29
Balantidium, 22
Balclutha, 142
Baliothrips, 162
Ballerus, 460
Ballistura, 125
Ballus, 108
Banchus, 423
Baptria, 333
Barbatula, 460
Barbitistes, 130
Baris, 232
Baruscapillaria, 75
Barylypa, 423
Barypeithes, 245
Baryphyma, 95
Bassaniodes, 113
Bathyomphalus, 58
Bathyphantes, 95
Bathysolen, 157
Batophila, 216
Batrachedra, 274
Batracomorphus, 145
Baylisascaris, 70
Bazaria, 311
Bdella, 85
Beckidia, 429
Bedellia, 264
Behningia, 133
Beklemishevia, 81

Belbodamaeus, 81
Belonophrya, 22
Belopus, 200
Belothrips, 162
Bembecinus, 408
Bembidion, 174
Bembix, 408
Bena, 352
Berlandina, 91
Berosus, 178
Bertkauia, 132
Berytinus, 156
Bessa, 453
Betulapion, 225
Biacetabulum, 43
Biastes, 405
Bibio, 439
Bicolorana, 130
Bidessus, 176
Bilharziella, 41
Bimastus, 53
Biorhiza, 421
Bisigna, 265
Bisnius, 182
Biston, 344
Bithynia, 55
Bitoma, 200
Blaesoxipha, 447
Blaps, 200
Blapstinus, 199
Blaste, 132
Blastocrithidia, 17
Blastodacna, 270
Blatta, 127
Blattella, 128
Blatticola, 71
Bledius, 181
Blemus, 175
Blennocampa, 396
Blepharidopterus, 153
Blepharipa, 453
Blepharisma, 22
Blepharita, 375
Blepharomyia, 452
Blethisa, 169
Blicca, 460
Blondelia, 453
Boarmia, 345
Bobitobus, 183
Bodilopsis, 185
Bodilus, 185
Bodo, 17
Bolephthyphantes, 95
Bolitochara, 181
Bolitophagus, 200
Bolitophila, 439
Boloria, 393
Bolothrips, 164
Bolyphantes, 95
Bombina, 462
Bombus, 404
Bombycilla, 473
Bombylella, 441
Bombylius, 441
Bonasa, 467
Boreus, 167
Bosmina, 118
Bosminopsis, 118
Bostrichus, 191
Botaurus, 464
Bothria, 453
Bothynoderes, 230
Bothynotus, 150
Bourgogneja, 271
Bovicola, 138
Brachinus, 167
Brachionus, 24
Brachionycha, 368
Brachmia, 276
Brachodes, 305
Brachonyx, 237
Brachycarenus, 159
Brachycaudus, 139
Brachycentrus, 251
Brachycercus, 133
Brachychthonius, 80
Brachycoleus, 151
Brachyderes, 246
Brachydistomum, 36
Brachygluta, 182
Brachylomia, 375
Brachymeria, 419
Brachypalpoides, 449
Brachypalpus, 449
Brachyptera, 132
Brachypterolus, 194

Brachypterus, 194
Brachysomus, 245
Brachystomella, 123
Brachyta, 203
Brachythops, 397
Brachytron, 136
Bracon, 422
Bradybatus, 237
Bradycellus, 170
Bradynema, 71
Bradyrrhoa, 311
Brandesia, 38
Branta, 465
Brassicogethes, 194
Brenthis, 393
Brevicoryne, 139
Brillia, 434
Bromius, 210
Broscus, 168
Bruchela, 224
Bruchidius, 205
Bruchophagus, 420
Bruchus, 205
Brueelia, 137
Bryobia, 87
Bryocamptus, 121
Bryocoris, 150
Bryodemella, 129
Bryophaenocladius, 434
Bryophila, 369
Bryotropha, 277
Brachyiulus, 116
Buathra, 424
Bubo, 471
Bubulcus, 464
Bucculatrix, 259
Bucephala, 465
Bucephalus, 35
Bufo, 462
Bufotes, 462
Bulaea, 195
Bunodera, 35
Bunostomum, 68
Bupalus, 345
Buprestis, 188
Burhinus, 468
Bursaria, 19
Bursellopsis, 29
Buteo, 466
Buvatina, 265
Byctiscus, 224
Byrrhus, 188
Byrsinus, 160
Bythotrephes, 120
Byturus, 193
Cabera, 342
Caccobius, 186
Cacopsylla, 141
Cacotemnus, 192
Caecilius, 132
Caenis, 133
Caenorhinus, 224
Calamia, 373
Calamosternus, 185
Calamotropha, 316
Calaphis, 139
Calathus, 170
Calcarius, 476
Calidris, 469
Caliprobola, 449
Caliroa, 396
Callajoppa, 424
Callicorixa, 148
Callidium, 201
Callilepis, 91
Callimorpha, 354
Calliobdella, 55
Calliphora, 443
Calliptamus, 128
Callistege, 360
Callisto, 261
Callistus, 170
Calliteara, 352
Callophrys, 390
Callopistria, 369
Calocoris, 151
Calomicrus, 214
Calophasia, 367
Calopteryx, 135
Caloptilia, 261
Calosoma, 168
Calvia, 196
Calvolia, 84
Calybites, 261
Calyciphora, 286
Calyptotricha, 27

Calyptra, 357
Camallanus, 72
Camisia, 81
Campanulotes, 138
Campiglossa, 456
Campodea, 127
Campoletis, 423
Camponotimermis, 74
Camponotus, 418
Campoplex, 423
Camptocercus, 118
Camptogramma, 336
Camptopoeum, 403
Camptozygum, 151
Campylomma, 153
Canalidion, 111
Candona, 122
Canephora, 257
Canis, 479
Cantharis, 190
Canthophorus, 160
Capillaria, 75
Capnia, 131
Capnodis, 188
Capreolus, 479
Capricornia, 296
Caprimulgus, 471
Capsodes, 151
Capsus, 151
Capua, 289
Carabus, 168
Caradrina, 370
Carassius, 460
Carcelia, 453
Carcharodus, 388
Carchesium, 27
Cardiophorus, 189
Carduelis, 476
Caricea, 445
Carpatolechia, 283
Carpelimus, 181
Carphoborus, 249
Carpochena, 271
Carpocoris, 161
Carpodacus, 476
Carpomya, 457
Carpophilus, 194
Carterocephalus, 388
Carychium, 59
Caryocolum, 281
Caryophyllaeides, 43
Caryophyllaeus, 43
Cashia, 31
Casignetella, 271
Casilda, 325
Casinaria, 423
Casmerodius, 464
Cassida, 222
Castor, 478
Cataclysme, 336
Cataclysta, 315
Cataglyphis, 418
Catajapyx, 127
Catapion, 225
Catarhoe, 337
Catastia, 311
Catatropis, 38
Catephia, 360
Catocala, 360
Catoplatus, 156
Catops, 180
Catoptria, 316
Cauchas, 255
Cecidophyes, 86
Cecidophyopsis, 86
Cedestis, 262
Celaena, 373
Celastrina, 391
Celes, 129
Celypha, 296
Centricnemus, 244
Centromerita, 95
Centromerus, 95
Centropyxis, 31
Centrotus, 147
Cephalcia, 399
Cephalobus, 67
Cephalodella, 51
Cephalothrips, 164
Cephus, 399
Cepphis, 342
Ceraclea, 251
Ceraleptus, 157
Cerambyx, 201
Ceramica, 379
Cerapteryx, 378

Cerastis, 385
Ceratapion, 225
Ceratina, 406
Ceratinella, 96
Ceratocombus, 148
Ceratomegilla, 196
Ceratophysella, 123
Ceratoppia, 80
Ceratothrips, 162
Ceratoxanthis, 293
Ceratozetella, 80
Ceratozetes, 80
Cerceris, 409
Cercidia, 89
Cercomonas, 32
Cercyon, 178
Cercyonops, 213
Ceriana, 449
Ceriodaphnia, 118
Cerocoma, 197
Ceromasia, 453
Ceropales, 416
Cerophytum, 188
Ceroxys, 457
Certhia, 475
Ceruchus, 184
Cerura, 350
Cervidellus, 67
Cervus, 479
Cervyna, 373
Cerylon, 195
Cetonia, 185
Cettia, 474
Ceutorhynchus, 233
Chabertia, 69
Chaenea, 22
Chaetabraeus, 179
Chaetocnema, 216
Chaetogaster, 54
Chaetonotus, 48
Chaetopteroplia, 186
Chaetopteryx, 252
Chaetorellia, 456
Chaetosa, 448
Chaetostomella, 456
Chaitophorus, 139
Chalcionellus, 179
Chalcophora, 188
Chalcoscirtus, 108
Chalcosyrphus, 449
Chamaemyia, 443
Chamaesphecia, 306
Chaoborus, 429
Charadrius, 468
Charagochilus, 151
Charissa, 340
Chartoscirta, 149
Chazara, 395
Cheilosia, 449
Cheilotoma, 207
Cheiracanthium, 90
Cheiropachus, 420
Chelicorophium, 123
Chelifer, 76
Chelis, 354
Chelostoma, 412
Chernovskiia, 430
Chersotis, 385
Chetogena, 453
Chettusia, 468
Cheumatopsyche, 251
Cheyletus, 85
Chiasmia, 343
Chilacis, 156
Chilo, 316
Chilocorus, 195
Chilodes, 370
Chilodonella, 20
Chilodontopsis, 20
Chiloplacus, 67
Chilostigma, 252
Chilothorax, 185
Chionaspis, 141
Chionea, 427
Chionodes, 280
Chirocephalus, 117
Chironomus, 430
Chirothrips, 163
Chlaenius, 170
Chlamydatus, 154
Chlamydodon, 20
Chlamydonella, 20
Chlidonias, 470
Chloothea, 142
Chloris, 476
Chlorissa, 339

Chlorita, 145
Chlorochroa, 161
Chloroclysta, 334
Chloroclystis, 330
Chloromyia, 459
Chloromyxum, 32
Chlorophanus, 246
Chlorophorus, 201
Chlorops, 443
Choanotaenia, 44
Choerades, 440
Choeras, 422
Choleva, 180
Chondrostoma, 460
Chondrula, 59
Choreutinula, 123
Choreutis, 288
Chorioptes, 84
Choristoneura, 289
Chorosoma, 159
Choroterpes, 134
Chorthippus, 128
Chrysanthia, 199
Chrysis, 415
Chrysobothris, 188
Chrysochraon, 128
Chrysochus, 210
Chrysoesthia, 277
Chrysogaster, 449
Chrysolina, 210
Chrysomela, 212
Chrysopa, 166
Chrysopilus, 458
Chrysops, 458
Chrysorithrum, 361
Chrysoteuchia, 317
Chrysotoxum, 450
Chrysotus, 441
Chrysso, 111
Chrysura, 415
Chydorus, 118
Chymomyza, 444
Cicadella, 142
Cicadetta, 147
Cicadula, 142
Cicindela, 168
Ciconia, 464
Cidaria, 334
Cidnopus, 189
Cilea, 184
Cimbex, 395, 399
Cimex, 150
Cinara, 139
Cinclus, 473
Cinetochilum, 25
Cionus, 238
Circaetus, 466
Circus, 466
Cirrhia, 375
Cis, 197
Citellophilus, 426
Civizelotes, 92
Cixius, 147
Cladius, 397
Cladopelma, 430
Cladotanytarsus, 430, 432
Clangula, 465
Clanoptilus, 193
Claremontia, 396
Clarkus, 75
Clathrulina, 30
Clavipanurgus, 403
Clemelis, 453
Clemnius, 176
Cleonis, 230
Cleopomiarus, 239
Cleora, 345
Clepsis, 289
Cleptes, 415
Clerus, 192
Cleta, 325
Clinotanypus, 436
Clivina, 173
Cloacotaenia, 44
Cloeon, 133
Clogmia, 429
Clossiana, 393
Clostera, 349
Closterotomus, 151
Clubiona, 90
Clupeonella, 460
Clytra, 207
Clytus, 201
Cnaemidophorus, 284
Cnephalocotes, 96
Cnephasia, 290

Cnephia, 438
Cobitis, 460
Coccidula, 195
Coccinella, 196
Coccinula, 196
Coccothraustes, 476
Coccudina, 23
Coccura, 141
Coccus, 141
Cochlicopa, 59
Cochlodina, 62
Cochylidia, 293
Cochylimorpha, 293
Cochylis, 294
Codocera, 184
Codonella, 28
Codonocephalus, 41
Coelestinus, 143
Coeliastes, 235
Coelioxys, 412
Coelostoma, 178
Coenagrion, 135
Coenocalpe, 329
Coenomyia, 459
Coenonympha, 394
Coenosia, 445
Colaphellus, 212
Coleocentrus, 423
Coleophora, 272
Coleps, 29
Colias, 390
Colletes, 407
Collinsia, 96
Collita, 356
Colobochyla, 359
Colobopterus, 185
Colocasia, 364
Colopha, 140
Colostygia, 334
Colotois, 341
Colpocephalum, 137
Colpoda, 19
Colpodium, 25
Columba, 470
Columbicola, 138
Columella, 60
Colurella, 51
Colymbetes, 176
Comibaena, 338
Compsilura, 453
Comstockaspis, 141
Conchapelopia, 436
Confluaria, 44
Confusacris, 128
Coniosternum, 448
Conisania, 379
Conistra, 375
Conocephalus, 130
Conochilus, 49
Conophorus, 441
Conops, 444
Conorhynchus, 230
Constempellina, 432
Contacyphon, 187
Contarinia, 439
Contracaecum, 70
Coomansus, 75
Cooperia, 69
Copelatus, 176
Copris, 186
Copromyza, 449
Coprophilus, 181
Coptocephala, 207
Coptosoma, 159
Coquillettidia, 438
Coracias, 471
Coraebus, 187
Coranarta, 379
Coranus, 155
Cordilura, 448
Cordulegaster, 136
Cordulia, 136
Cordylepherus, 193
Coregonus, 461
Coremacera, 448
Coreus, 157
Coriarachne, 113
Coriomeris, 157
Corixa, 148
Corizus, 159
Coronella, 462
Coronocyclus, 69
Corticaria, 197
Corticarina, 197
Corticeus, 199
Cortinicara, 197

Cortodera, 203
Corvus, 473
Corycella, 18
Corylobium, 140
Corynis, 395
Corynocera, 432
Corynoneura, 434
Coryssomerus, 232
Coscinia, 354
Coslenchus, 72
Cosmia, 375
Cosmiotes, 269
Cosmocephalus, 72
Cosmocerca, 70
Cosmochthonius, 81
Cosmoglyphus, 81
Cosmorhoe, 334
Cosmotettix, 143
Cosmotriche, 346
Cossonus, 229
Cossus, 305
Costaconvexa, 336
Cotesia, 422
Cothurnia, 26
Cottus, 461
Coturnix, 467
Cotylurus, 42
Crabro, 408
Craesus, 397
Crambus, 317
Craspedacusta, 33
Craspedolepta, 139
Craspedorhynchus, 138
Crataerina, 445
Crenosoma, 68
Creophilus, 182
Crepidodera, 217
Crepidostomum, 35
Crex, 467
Cricetulus, 478
Cricetus, 478
Criconema, 71
Cricotopus, 434
Criniscansor, 84
Crioceris, 206
Criocoris, 154
Criorhina, 449
Cristigera, 27
Crithidia, 17
Crobylura, 29
Crocallis, 340
Crocidura, 477
Crossocerus, 408
Crossopalpus, 442
Crustulina, 111
Cryphia, 369
Cryphoeca, 91
Cryptachaea, 111
Cryptarcha, 194
Crypticus, 199
Cryptocala, 385
Cryptocephalus, 208
Cryptochironomus, 430
Cryptocyclops, 120
Cryptolestes, 194
Cryptomyzus, 140
Cryptophagus, 193
Cryptopleurum, 178
Cryptosiphum, 140
Cryptosporidium, 18
Cryptotendipes, 430
Cryptothrips, 165
Crypturgus, 248
Cryptus, 424
Ctedoctema, 27
Ctenicera, 189
Ctenichneumon, 424
Cteniopus, 199
Ctenocephalides, 426
Ctenopelma, 424
Ctenophora, 427
Ctenophthalmus, 426
Ctesias, 192
Cuclotogaster, 138
Cucujus, 193
Cucullia, 366
Culculus, 470
Culex, 438
Culicoides, 429
Culiseta, 438
Cupido, 391
Curculio, 238
Curtimorda, 198
Cyanapion, 226
Cyaniris, 391
Cyathocotyle, 41

Cyathostomum, 69
Cybister, 176
Cybosia, 356
Cycasis, 425
Cychramus, 194
Cychrus, 169
Cyclidium, 27
Cyclocoelum, 36
Cyclocypris, 122
Cycloderes, 246
Cyclophora, 325
Cyclops, 120
Cyclosa, 89
Cydia, 303
Cydnus, 160
Cygnus, 465
Cylicocyclus, 69
Cylicodontophorus, 69
Cylicostephanus, 69
Cylindera, 168
Cylindromorphus, 187
Cylindromyia, 455
Cylisticus, 122
Cyllecoris, 153
Cyllodes, 194
Cymatia, 148
Cymbalorissa, 311
Cymbiodyta, 178
Cymindis, 171
Cymodusa, 423
Cymolomia, 297
Cymus, 157
Cynaeda, 319
Cynegetis, 196
Cynips, 421
Cynomya, 443
Cyphocleonus, 230
Cyphon, 187
Cyphostethus, 160
Cypria, 122
Cyprinus, 460
Cypris, 122
Cyrnea, 73
Cyrnus, 251
Cyrtoclytus, 201
Cyrtolaelaps, 79
Cyrtolophosis, 20
Cyrtopogon, 441
Cystiphora, 439
Cyzicus, 117
Dacne, 193
Dacnogenia, 134
Dacota, 154
Dactylobiotus, 76
Dactylogyrus, 34
Dahlica, 257
Dalopius, 189
Damaeus, 81
Damophila, 272
Danosoma, 189
Daphnia, 119
Darwinula, 122
Dascillus, 187
Dasineura, 439
Dasylabris, 416
Dasypoda, 414
Dasypogon, 440
Dasypolia, 375
Dasysyrphus, 451
Dasytes, 193
Datonychus, 235
Davainea, 43
Decipiphantes, 96
Decticus, 130
Degeeriella, 138
Deilephila, 349
Deileptenia, 345
Deilus, 201
Deleaster, 181
Delia, 442
Delichon, 472
Delphax, 147
Delplanqueia, 311
Deltocephalus, 143
Deltote, 363
Demeijerea, 430
Demetrias, 171
Demicryptochironomus, 430
Demodex, 85
Demoticus, 455
Dendritobilharzia, 42
Dendrobaena, 53
Dendrocoelum, 34
Dendrocopos, 471
Dendroctonus, 250
Dendrodrilus, 53

Dendrolimus, 346
Dendrophilus, 179
Dendrothrips, 163
Dendroxena, 180
Dendryphantes, 109
Denisia, 265
Denticollis, 189
Denticucullus, 373
Deporaus, 224
Depressaria, 267
Deraeocoris, 150, 151
Derephysia, 156
Dermacentor, 77
Dermanyssus, 78
Dermestes, 192
Dero, 54
Deroceras, 61
Derocrepis, 217
Deroxena, 275
Desmidocercella, 72
Desoria, 125
Deuteraphorura, 124
Deuterogonia, 265
Deuterosminthurus, 127
Deutoleon, 167
Dexia, 452
Dexiosoma, 455
Diachrysia, 362
Diacrisia, 354
Diacyclops, 120
Diadegma, 423
Diaea, 113
Diamesa, 433
Diaperis, 199
Diaphanosoma, 119
Diaphora, 354
Diapterobates, 82
Diaptomus, 120
Diarsia, 386
Diasemia, 322
Diaspidiotus, 141
Diastrophus, 421
Dibolia, 217
Dibrachia, 269
Dicallomera, 353
Diceria, 188
Dichagyris, 384
Dicheirotrichus, 171
Dichomeris, 276
Dichrooscytus, 151
Dichrorampha, 303
Dichrostigma, 166
Diclybothrium, 35
Dicosmoecus, 252
Dicranocephalus, 159
Dicranomyia, 427
Dicranota, 427
Dicranotaenia, 44
Dicranotropis, 147
Dicrocoelium, 36
Dicrotendipes, 430
Dictenidia, 427
Dictyla, 156
Dictymetra, 44
Dictyna, 91
Dictyocaulus, 68
Dictyonota, 156
Dictyophara, 148
Dictyoptera, 191
Dictyothrips, 163
Dicycla, 375
Dicymbium, 96
Dicyphus, 150
Dicyrtoma, 127
Didea, 451
Didineis, 408
Didinium, 21
Didymomyia, 439
Didysmachus, 440
Dieckmanniellus, 228
Difflugia, 31
Dikerogammarus, 123
Dikraneura, 145
Dilepis, 44
Diloba, 364
Dimeris, 423
Dimorphopterus, 157
Dina, 54
Dinera, 453
Dinoptera, 203
Dioctria, 441
Diolcogaster, 422
Diorchis, 44
Dioryctria, 311
Diospilus, 422
Dioxyna, 456

Diphtherophora, 75
Diphyllobothrium, 47
Diphyus, 424
Diplapion, 226
Diplazon, 424
Diplocentria, 96
Diplocephalus, 96
Diplocladius, 434
Diplocolenus, 143
Diplodiscus, 36
Diplolepis, 421
Diploposthe, 44
Diplostomum, 41
Diplostyla, 96
Diplotriaena, 72
Diplozoon, 35
Dipoena, 111
Diprion, 395
Dipylidium, 44
Diraea, 197
Dirhinosia, 278
Dirrhagofarsus, 190
Discoelius, 416
Discolaimus, 74
Discus, 62
Disematostoma, 25
Dismodicus, 96
Disparalona, 118
Dispharynx, 72
Dissoleucas, 223
Dissotrocha, 48
Distoleon, 167
Dithryca, 456
Ditylenchus, 71
Diuraphis, 140
Diurnea, 268
Dixa, 438
Dixella, 438
Dociostaurus, 129
Dolerus, 398
Dolichoderus, 418
Dolichopus, 441
Dolichosoma, 192
Dolichovespula, 417
Dolichurus, 400
Dolichus, 171
Dolomedes, 91
Dolychopeza, 427
Dolycoris, 161
Donacaula, 316
Donacia, 205
Donus, 242
Doratura, 143
Dorcadion, 202
Dorcatoma, 191
Dorcus, 184
Dorycranosus, 82
Doryctes, 422
Dorydorella, 74
Dorytomus, 238
Drapetes, 189
Drapetisca, 96
Drascheia, 73
Drassodes, 92
Drassyllus, 92
Drasteria, 361
Dreissena, 66
Drepana, 324
Drepanepteryx, 166
Drepanidotaenia, 44
Drepanosiphum, 140
Drepanothrips, 163
Drepanotylus, 96
Drino, 453
Dromius, 171
Drosophila, 444
Drusilla, 181
Drymonia, 350
Drymus, 158
Dryocoetes, 248
Dryocopus, 471
Dryomys, 478
Dryophilocoris, 151
Dufourea, 412
Dulophanes, 398
Dunhevedia, 118
Dusona, 424
Dypterygia, 371
Dysaphis, 140
Dysauxes, 357
Dyschirius, 174
Dyschloropsis, 339
Dyscia, 340
Dysmachus, 440
Dyspessa, 305
Dysstroma, 334

Dysteropsis, 20
Dytiscus, 176
Eana, 291
Earias, 352
Earophila, 337
Ebarrius, 143
Ebrechtella, 113
Eccopisa, 311
Ecdyonurus, 134
Ecebalia, 272
Echinochasmus, 36
Echinococcus, 46
Echinocotyle, 45
Echinolepis, 45
Echinonyssus, 78
Echinoparyphium, 36
Echinostoma, 36
Echinuria, 72
Echthistus, 440
Echthronomas, 424
Echthrus, 424
Ecliptopera, 334
Ecnomus, 251
Ecpyrrhorrhoe, 320
Ectemnius, 408
Ectobius, 128
Ectoedemia, 254
Ectophasia, 453, 455
Ectropis, 345
Edwardsiana, 146
Egira, 377
Eidophasia, 264
Eilema, 356
Eimeria, 18
Einfeldia, 431
Eisenia, 53
Eiseniella, 53
Elachista, 269
Elaphe, 462
Elaphria, 369
Elaphrus, 169
Elasmostethus, 160
Elasmotropis, 156
Elasmucha, 160
Elater, 189
Elateroides, 192
Elatobium, 140
Elatophilus, 150
Electrophaes, 335
Elegia, 311
Eliomys, 478
Ellescus, 237
Ellobius, 478
Elmis, 188
Eloeophila, 427
Elomya, 455
Elophila, 315
Elymana, 143
Emargidromus, 107
Ematurga, 345
Emberiza, 476
Emblethis, 158
Emeljanovianus, 143
Emelyanoviana, 146
Emmelia, 364
Emmelina, 286
Empicoris, 155
Empis, 442
Empria, 396
Emus, 182
Emys, 462
Ena, 60
Enallagma, 135
Enantiocephalus, 143
Enargia, 376
Enchelyodon, 22
Enchelys, 21
Enchytraeus, 53
Encyclometra, 37
Endelomyia, 396
Endochironomus, 431
Endolimax, 31
Endothenia, 296
Endotricha, 309
Endromis, 347
Endrosis, 265
Enicmus, 197
Ennearthron, 197
Ennomos, 341
Enochrus, 178
Enoplognatha, 111
Enoplops, 157
Ensina, 456
Entamoeba, 31
Entelecara, 96
Entephria, 338

Enterobius, 71
Entodinium, 25
Entomelas, 67
Entomobrya, 125
Entomognathus, 408
Entomoscelis, 212
Eodorcadion, 202
Eogena, 365
Eomenacanthus, 137
Eotetranychus, 87
Epacromius, 129
Epagoge, 289
Epaphius, 175
Epatolmis, 354
Epeoloides, 404
Epeolus, 405
Epermenia, 287
Ephemera, 134
Ephemerella, 133
Ephestia, 311
Ephialtes, 425
Ephoron, 134
Ephydatia, 32
Ephydra, 444
Ephysteris, 282
Epiblema, 299
Epicallia, 354
Epicallima, 265
Epicarchesium, 27
Epicauta, 197
Epichnopterix, 257
Epidamaeus, 81
Epidinium, 25
Epilohmannia, 81
Epimecia, 367
Epinotia, 299
Epione, 342
Epiphanes, 50
Epirranthis, 341
Epirrhoe, 337
Epirrita, 333
Epischnia, 312
Episcythrastis, 312
Episinus, 111
Epistrophe, 451
Epistylis, 26
Episyron, 416
Episyrphus, 451
Epitheca, 136
Epitrimerus, 86
Epitriptus, 440
Epitrix, 218
Epoicocladius, 434
Epomidostomum, 69
Eptesius, 477
Epuraea, 194
Erannis, 345
Erebia, 394
Eremobina, 373
Eremocoris, 157, 158
Eremohadena, 376
Eremophila, 472
Eresus, 91
Ergasilus, 121
Eriborus, 424
Erigone, 97
Erigonella, 97
Erinaceus, 477
Eriocampa, 396
Eriococcus, 141
Eriocrania, 253
Eriogaster, 346
Eriophyes, 86
Eriopsela, 300
Eriopygodes, 382
Eriosoma, 140
Eriothrix, 453
Eristalinus, 449
Eristalis, 450
Erithacus, 474
Ernobius, 191
Ernoporus, 248
Ero, 106
Erpobdella, 55
Errastunus, 143
Erynnis, 388
Erythrocera, 453
Erythromma, 135
Erzaleus, 143
Escaryus, 116
Esox, 461
Estheria, 453
Esymus, 185
Etainia, 254
Eteobalea, 284
Ethmia, 268

Ethmolaimus, 66
Etiella, 312
Etorofus, 203
Eublemma, 359
Eubosmina, 118
Eucallipterus, 140
Eucarphia, 312
Eucarta, 369
Eucephalobus, 67
Eucera, 405
Euceraphis, 140
Euceros, 424
Euchalcia, 362
Eucharia, 354
Euchlanis, 50
Euchloe, 389
Euchoeca, 328
Euchorthippus, 129
Euchroeus, 415
Euchromius, 317
Eucinetus, 187
Euclidia, 361
Eucoleus, 75
Euconulus, 62
Eucosma, 300
Eucosmomorpha, 298
Eucotyle, 37
Eucyclops, 121
Eucypris, 122
Eudemis, 297
Eudia, 348
Eudiaptomus, 120
Eudiplozoon, 35
Eudolus, 185
Eudonia, 318
Eudorylaimus, 74
Eudromias, 468
Eueremaeus, 81
Euglesa, 65
Euglypha, 30
Eugnorisma, 386
Eugnosta, 294
Eugraphe, 386
Euheptaulacus, 185
Euhyponomeutoides, 262
Eukiefferiella, 434
Eulaelaps, 78
Eulamprotes, 278
Eulecanium, 141
Eulia, 292
Eulithis, 335
Eumea, 453
Eumedonia, 391
Eumenes, 417
Eumerus, 450
Eumodicogryllus, 130
Eumonhystera, 66
Eunapius, 32
Euodynerus, 416
Euomphalia, 63
Euoniticellus, 186
Euophrys, 109
Eupelix, 144
Eupelmus, 420
Eupelops, 83
Eupeodes, 451
Euphydryas, 392
Euphyia, 336
Eupista, 272
Eupithecia, 331
Euplagia, 354
Euplectus, 182
Eupleurus, 185
Euplexia, 371
Euplotopsis, 23
Eupoecilia, 294
Euproctis, 353
Eupsilia, 376
Eupteryx, 146
Eurhadina, 146
Eurhodope, 312
Eurithia, 455
Eurois, 386
Europiella, 154
Eurosomides, 179
Eurrhypis, 319
Eurycercus, 119
Eurycnemus, 435
Eurydema, 161
Eurygaster, 160
Eurymeloe, 197
Euryopicoris, 153
Euryopis, 111
Euryparasitus, 79
Eurytemora, 120
Eurythyrea, 188

Eurytoma, 420
Eurytrichothrips, 165
Euscelis, 143
Eusomostrophus, 246
Eusomus, 246
Eusphalerum, 181
Eusphecia, 306
Euspilapteryx, 261
Eustroma, 335
Eustrongylides, 73
Eutanyacra, 424
Euthrix, 346
Euthystira, 129
Eutolmus, 440
Eutomostethus, 396
Eutrichapion, 226
Eutrombidium, 86
Euura, 397
Euxoa, 384
Euzophera, 312
Evacanthus, 142, 143
Evagetes, 417
Evarcha, 109
Evergestis, 319
Exaeretia, 267
Exapate, 291
Exapion, 226
Excavarus, 425
Exechia, 440
Exephanes, 424
Exetastes, 423
Exocentrus, 202
Exochocepheus, 83
Exochomus, 195
Exorista, 453
Exosoma, 214
Exyston, 425
Eylais, 85
Eysarcoris, 161
Falagrioma, 181
Falcaria, 324
Falco, 467
Falseuncaria, 295
Fannia, 444
Fasciola, 37
Felicola, 138
Fenusa, 396
Fenusella, 396
Feralia, 368
Ferdinandea, 450
Filatima, 280
Filenchus, 72
Filicollis, 47
Filinia, 49
Fimbriaria, 45
Firmothrips, 163
Fiscedula, 474
Flagelliphantes, 97
Flamingolepis, 45
Flavocrambus, 317
Fleuria, 431
Flosculariа, 49
Folsomia, 126
Forcellinia, 79
Forcipata, 146
Forda, 140
Forficula, 131
Formica, 418
Formicoxenus, 419
Foucartia, 246
Foveacheles, 87
Frankliniella, 163
Frederickoenigia, 273
Friedlanderia, 316
Friesea, 124
Fringilla, 476
Frontonia, 25
Fruticicola, 62
Fulica, 467
Fulvoclysia, 295
Furcoribula, 80
Furcula, 350
Fuscozetes, 80
Gabrius, 182
Gagitodes, 329
Galba, 56
Galerida, 472
Galeruca, 214
Galerucella, 214
Galleria, 309
Gallinago, 469
Gallinula, 467
Galumna, 81
Gammarus, 123
Gampsocleis, 130
Gandaritis, 335

Gargara, 147
Garrulus, 473
Gasterophilus, 446
Gasteruption, 423
Gastrocopta, 60
Gastrodes, 158
Gastromermis, 74
Gastropacha, 346
Gastrophysa, 213
Gastropus, 51
Gastrostyla, 23
Gastrotaenia, 45
Gaurotes, 203
Gavia, 463
Gazoryctra, 253
Geina, 285
Gelechia, 280
Gelis, 424, 425
Geocenamus, 71
Geocoris, 157
Geodromicus, 181
Geometra, 338
Geomonhystera, 66
Geophilus, 116
Geostiba, 181
Geotomus, 160
Geotrupes, 184
Gerris, 149
Gesneria, 318
Giardia, 17
Gibbaranea, 89
Gigantobilharzia, 42
Gillmeria, 285
Gilpinia, 400
Gitona, 444
Gladiovalva, 278
Glareola, 469
Glaucidium, 471
Glaucoma, 25
Glaucopsyche, 391
Gliricola, 137
Glischrochilus, 194
Globia, 373
Globiceps, 153
Glocianus, 235
Glossiphonia, 55
Glugea, 32
Gluphisia, 349
Glycyphagus, 82
Glyphesis, 97
Glyphina, 140
Glyphipterix, 265
Glyphonotus, 130
Glyphotaelius, 252
Glyptomorpha, 422
Glyptoteles, 312
Glyptotendipes, 431
Gnaphosa, 92
Gnathacmaeops, 203
Gnorimoschema, 282
Gnorimus, 186
Gobio, 460
Goera, 251
Gohieria, 82
Gomphocerippus, 129
Gomphocerus, 129
Gomphus, 136
Gonatium, 97
Gonepteryx, 390
Gongylidiellum, 97
Gongylidium, 97
Gongylonema, 72
Gonia, 454
Goniocera, 455
Gonioctena, 213
Goniodes, 138
Gonocephalum, 200
Gonocerus, 157
Gonospileia, 361
Gordius, 76
Gorgodera, 37
Gortyna, 373
Gorytes, 408
Gracillaria, 261
Grammotaulius, 252
Graphiphora, 386
Graphocraerus, 143
Graphoderus, 176
Grapholita, 304
Graphopsocus, 133
Graphosoma, 162
Graptodytes, 176
Graptoleberis, 118
Graptopeltus, 158
Gravitarmata, 301
Gregarina, 18

Gregopimpla, 425
Grevenius, 76
Griposia, 376
Grus, 467
Gryllotalpa, 130
Gryllus, 130
Grynocharis, 193
Grypocoris, 151
Gustavia, 82
Gymnetron, 239
Gymnocephalus, 461
Gymnodamaeus, 82
Gymnomerus, 416
Gymnomus, 444
Gymnopleurus, 186
Gymnoscelis, 333
Gymnosoma, 455
Gynaephora, 353
Gynnidomorpha, 295
Gyps, 466
Gypsochroa, 339
Gypsonoma, 301
Gyraulus, 58
Gyrinus, 177
Gyrodactylus, 34
Gyrohypnus, 182
Gyrophaena, 181
Gyropus, 137
Habrobracon, 422
Habronema, 73
Habronyx, 424
Habrophlebia, 134
Habrosyne, 323
Hada, 379
Hadena, 379
Hadrobregmus, 191
Hadroplontus, 235
Haemaphysalis, 77
Haematobosca, 445
Haematoloechus, 38
Haematopinus, 138
Haematopota, 458
Haematopus, 468
Haematotrephus, 36
Haemodipsus, 139
Haemogamasus, 79
Haemolaelaps, 78
Haemonais, 54
Haemonchus, 69
Haemopis, 55
Haeterius, 179
Hahnia, 94
Halesus, 252
Haliaeetus, 466
Halictus, 409
Halipegus, 36
Haliplus, 177
Hallodapus, 154
Hallomenus, 200
Halteria, 28
Halticus, 153
Halyzia, 196
Hamatolepis, 45
Hammerschmidtia, 451
Handianus, 143
Hapedothrips, 165
Haplocaulus, 27
Haplodrassus, 92
Haplometra, 39
Haploptilia, 273
Haplothrips, 165
Haplotinea, 258
Haplozetes, 82
Hardya, 143
Harmandiola, 439
Harmonia, 196
Harnischia, 431
Harpactus, 408
Harpalus, 171
Harrahium, 36
Hartmannella, 31
Hauptidia, 146
Hebata, 146
Hebrus, 149
Hecatera, 380
Hedriocystis, 30
Hedya, 297
Hedychridium, 415
Hedychrum, 415
Heinemannia, 270
Helcystogramma, 277
Heleomyza, 444
Helicotylenchus, 72
Helicoverpa, 368
Heligmosomum, 68
Helina, 446

Heliococcus, 141
Heliomata, 343
Heliophanus, 109
Heliophrya, 24
Heliothis, 368
Heliothrips, 163
Heliozela, 255
Helleia, 390
Hellinsia, 286
Helobdella, 55
Helochares, 178
Helophilus, 450
Helophora, 97
Helophorus, 178
Helorus, 421
Helotropha, 373
Helvalbia, 273
Hemaris, 348
Hemerobius, 166
Hemianaphothrips, 163
Hemichroa, 397
Hemiclepsis, 55
Hemicrepidius, 189
Hemidiaptomus, 120
Hemiechinus, 477
Hemileius, 82
Hemineura, 132
Heminothrus, 81
Hemipenthes, 441
Hemisotoma, 126
Hemistola, 339
Hemithea, 339
Hemitrichapion, 226
Henneguya, 32
Henoticus, 193
Henschia, 143
Hephathus, 145
Hepialus, 253
Heptagenia, 134
Heptatoma, 458
Hercinothrips, 163
Hercostomus, 442
Heriades, 412
Heriaeus, 113
Hermetia, 459
Herminia, 358
Herpestomus, 424
Herpetomonas, 17
Hesium, 143
Hesperia, 389
Hesperocorixa, 148
Heterakis, 71
Heterarthrus, 397
Heterocephalobus, 67
Heterocerus, 188
Heterocope, 120
Heterocordylus, 153
Heterodera, 72
Heterogaster, 157
Heteroisotoma, 126
Heteromurus, 126
Heteropolaria, 26
Heteropterus, 389
Heterosminthurus, 127
Heterospilus, 422
Heterothera, 335
Heterotheridion, 111
Heterothops, 182
Hexamermis, 74
Hexarthra, 49
Hieraaetus, 466
Hilaira, 97
Himacerus, 155
Himantaurus, 44
Himantopus, 468
Hipparchia, 395
Hippeutis, 59
Hippobosca, 445
Hippodamia, 196
Hippolais, 474
Hippuriphila, 218
Hirstionyssus, 78
Hirudo, 55
Hirundo, 472
Hispa, 221
Hister, 179
Histiobalantium, 27
Histiogaster, 79
Holcocranum, 156
Holcopogon, 275
Holcostethus, 161
Holoarctia, 354
Holobus, 181
Holocentropus, 251
Hololepta, 179
Holometra, 39

Holopedium, 119
Holophrya, 29
Holopyga, 415
Holothrips, 165
Homoeosoma, 312
Homolophus, 77
Hoplandrothrips, 165
Hoplia, 186
Hoplitis, 413
Hoplocampa, 397
Hoplodrina, 371
Hoplomachus, 154
Hoplopleura, 138
Hoplorhynchus, 18
Hoplothrips, 165
Horisme, 330
Hormaphis, 140
Hormius, 422
Horvathiolus, 157
Hubneria, 454
Hucho, 461
Hyalomma, 77
Hyalopsocus, 132
Hyalopterus, 140
Hybolasioptera, 439
Hybomitra, 458
Hycleus, 198
Hydaticus, 176
Hydatigera, 46
Hydra, 33
Hydrachna, 85
Hydraecia, 373
Hydrelia, 328
Hydrellia, 444
Hydriomena, 338
Hydrobaenus, 435
Hydrobius, 178
Hydrochara, 178
Hydrochus, 178
Hydrodroma, 85
Hydroglyphus, 176
Hydrometra, 149
Hydronomus, 242
Hydrophilus, 178
Hydroporus, 177
Hydroprogne, 470
Hydropsyche, 251
Hydroptila, 250
Hydrotaea, 445
Hydrothassa, 213
Hygrobates, 85
Hygrolycosa, 104
Hygrotus, 177
Hylaea, 341
Hylaeus, 407
Hylastes, 248
Hylecoetus, 192
Hyledelphax, 147
Hyles, 349
Hylesinus, 248
Hylobius, 229
Hyloicus, 348
Hyloniscus, 123
Hylotrupes, 201
Hylurgops, 249
Hylurgus, 250
Hymenaphorura, 124
Hymenolepis, 45
Hypatima, 276
Hypatopa, 274
Hypena, 357
Hypera, 242
Hyperaspis, 196
Hypercallia, 268
Hyperlaelaps, 78
Hyperlais, 320
Hyphoraia, 355
Hyphydrus, 177
Hypocassida, 223
Hypochalcia, 312
Hypoderaeum, 37
Hypoderma, 446
Hypogastrura, 124
Hypomecis, 345
Hypomma, 97
Hyponephele, 394
Hyposoter, 424
Hypotia, 309
Hypoxystis, 340
Hyppa, 376
Hypselistes, 97
Hypsibius, 76
Hypsopygia, 309
Hypsosinga, 89
Hypulus, 197
Hyssia, 380

Hysteromorpha, 41
Hystrichis, 73
Iassus, 145
Ichneumon, 424
Ichthyocotylurus, 42
Ichthyophthirius, 25
Ichytricha, 250
Icteranthidium, 413
Idaea, 325
Idia, 358
Idiocerus, 145
Idiodonus, 143
Ilybius, 175
Ilyocoris, 149
Ilyocryptus, 119
Improphantes, 97
Inachis, 392
Incestophantes, 98
Incurvaria, 256
Infurcitinea, 258
Inocellia, 166
Insalebria, 313
Involvulus, 224
Iodamoeba, 31
Ionescumia, 273
Ipa, 98
Ipatjevimermis, 74
Iphiaulax, 422
Iphiclides, 389
Iphidozercon, 78
Iphigenella, 123
Ipimorpha, 376
Ips, 249
Isauria, 313
Ischnocoris, 158
Ischnodemus, 157
Ischnopsyllus, 426
Ischnopterapion, 226
Ischnura, 135
Isochaetides, 54
Isochnus, 238
Isogenus, 131
Isomira, 199
Isonychia, 134
Isoperla, 131
Isophrictis, 278
Isophya, 130
Isotoma, 126
Isotomiella, 126
Isotomodes, 126
Isotomurus, 126
Issoria, 393
Isturgia, 343
Iteomyia, 439
Ivanauskiella, 278
Ixobrychus, 464
Ixodes, 77
Jalla, 160
Janetiella, 439
Jassargus, 143
Javesella, 147
Jodis, 339
Jordanita, 308
Joyeuxilepis, 43
Judolia, 203
Jynx, 472
Kaestneria, 98
Kageronia, 134
Kakothrips, 163
Kalaphorura, 124
Kaltenbachiola, 439
Kasania, 315
Kateretes, 194
Katha, 356
Kelisia, 148
Kellicottia, 50
Kemtrognophos, 340
Keratella, 50
Kermes, 141
Khawia, 43
Kishidaia, 92
Kleidocerys, 157
Klimeschiopsis, 280
Klinzigedia, 273
Kloosia, 431
Knemidokoptes, 81
Kolbia, 132
Korscheltellus, 254
Korynetes, 192
Kovalevskiella, 122
Kowalewskiella, 44
Kretania, 391
Krynickillus, 61
Kyboasca, 146
Kybos, 146
Kytorhinus, 205

Labia, 131
Labiaticola, 232
Labidostomis, 207
Labidura, 131
Labiobaetis, 133
Labops, 153
Labrundinia, 436
Laburrus, 143
Lacanobia, 380
Laccobius, 178
Laccophilus, 177
Lacerta, 462
Lachesilla, 132
Lachnaeus, 231
Lachnus, 140
Lacinius, 77
Lacon, 189
Lacrymaria, 22
Lacydes, 355
Laelaps, 78
Laemobothrion, 137
Laemostenus, 171
Lagopus, 467
Lagria, 200
Lagurus, 478
Lagynophrya, 21
Lagynus, 29
Lambornella, 25
Lamia, 202
Laminosioptes, 84
Lamoria, 309
Lampides, 391
Lamprodila, 188
Lamproglena, 121
Lampronia, 256
Lampropteryx, 335
Lamprotes, 362
Lampyris, 190
Lamyctes, 115
Lanius, 472
Laodamia, 313
Laodelphax, 147
Laothoe, 348
Laphria, 440
Lapposyrphus, 451
Larentia, 338
Larinia, 89
Larinioides, 89
Larinus, 231
Larsia, 436
Larus, 470
Lasiacantha, 156
Lasiocampa, 347
Lasioderma, 191
Lasioglossum, 410
Lasiommata, 394
Lasionhada, 383
Lasioptera, 439
Lasius, 418
Laspeyria, 359
Lateriporus, 44
Lateroligia, 373
Lathonura, 119
Lathrobium, 182
Lathronympha, 305
Lathys, 94
Latibulus, 424
Latridius, 197
Latrodectus, 111
Lauterborniella, 431
Lauxania, 445
Lebertia, 86
Lebia, 171
Lecane, 51
Lecanipa, 454
Legnotus, 160
Leiobunum, 77
Leioderes, 201
Leiodes, 180
Leiopus, 202
Leistus, 173
Lejogaster, 450
Lejops, 450
Lelenchus, 72
Lema, 206
Lembadion, 26
Lemonia, 347
Lepadella, 51
Lepidocyrtus, 125
Lepidonotaris, 228
Lepidosaphes, 141
Lepidostoma, 251
Lepidozetes, 80
Lepidurus, 117
Lepinotus, 133
Lepisma, 127

Leporacarus, 84
Leptacinus, 182
Lepteucosma, 301
Lepthyphantes, 98
Leptidea, 389
Leptinotarsa, 212
Leptocerus, 251
Leptochilus, 416
Leptoconops, 429
Leptodora, 120
Leptogaster, 441
Leptologia, 376
Leptophallus, 38
Leptophlebia, 134
Leptophyes, 130
Leptopsylla, 426
Leptopterna, 151
Leptorhoptrum, 98
Leptothorax, 419
Leptura, 203
Lepturalia, 203
Lepturobosca, 203
Leptus, 86
Lepus, 477
Lepyronia, 142
Lernaea, 121
Lestes, 135
Lestica, 408
Leucania, 381
Leucaspis, 141
Leucaspius, 460
Leuciscus, 460
Leucochloridium, 41
Leucodonta, 350
Leucoma, 353
Leucomigus, 230
Leucoptera, 265
Leucorrhinia, 136
Leucozona, 451
Leuctra, 131
Leviellus, 89
Levipalpus, 268
Liacarus, 82
Libelloides, 167
Libellula, 136
Lichenophanes, 191
Licinus, 172
Licneremaeus, 82
Licnodamaeus, 82
Liebstadia, 82
Ligula, 47
Ligyrocoris, 158
Lilioceris, 206
Limenitis, 392
Limnadia, 117
Limnaecia, 284
Limnebius, 180
Limnephilus, 252
Limnia, 448
Limnochares, 86
Limnocythere, 122
Limnodrilus, 54
Limnomermis, 75
Limnophila, 427
Limnophyes, 435
Limnoporus, 149
Limnostrombidium, 28
Limobius, 243
Limonia, 427
Limonius, 189
Limosa, 469
Limotettix, 143
Limothrips, 163
Lindenius, 408
Linnaemya, 455
Linnavuoriana, 146
Linognathus, 138
Linyphia, 98
Liochthonius, 80
Liocoris, 151
Liophloeothrips, 165
Liophloeus, 245
Liopterus, 176
Liorhyssus, 159
Liothorax, 185
Liothrips, 165
Liotrichus, 189
Liparus, 229
Lipeurus, 138
Lipiniella, 431
Liponyssoides, 78
Liposcelis, 132
Liposthenes, 421
Lipothrix, 127
Lispothrips, 165
Lissodema, 199

Lissotriton, 462
Litargus, 198
Lithobius, 115
Lithocharis, 182
Lithocolla, 30
Lithophane, 376
Lithosia, 356
Lithostege, 328
Lithurgus, 413
Litoligia, 373
Litonotus, 21
Lixus, 231
Lobesia, 297
Lobophora, 328
Loborhynchapion, 227
Lochmaea, 214
Locusta, 129
Locustella, 474
Lomaspilis, 343
Lomatia, 441
Lomographa, 341
Lonchoptera, 445
Longicollia, 37
Longistriata, 68
Longitarsus, 218
Lopheros, 191
Lophocharis, 51
Lophomonas, 17
Lophopilio, 77
Lophopompilus, 417
Lophosceles, 446
Lopus, 154
Lordithon, 181
Loricera, 173
Loricula, 150
Loscopia, 373
Lota, 461
Loxia, 476
Loxodes, 23
Loxophyllum, 21
Loxostege, 321
Lozotaenia, 289
Lucanus, 184
Lucilia, 443
Lullula, 472
Lumbriculus, 53
Lumbricus, 53
Luperus, 215
Luquetia, 268
Luscinia, 474
Lutilabria, 282
Lutra, 479
Lycaena, 390
Lycia, 345
Lyctus, 191
Lydella, 454
Lygaeus, 157
Lygephila, 358
Lygistopterus, 191
Lygocoris, 151
Lygus, 151
Lymantria, 353
Lymantrichneumon, 425
Lymnaea, 56
Lymnocryptes, 469
Lynceus, 117
Lynx, 479
Lyonetia, 265
Lypha, 455
Lypusa, 268
Lyristes, 147
Lyrurus, 467
Lyruterina, 46
Lysandra, 391
Lythraria, 220
Lythria, 325
Lytta, 198
Macaria, 344
Macdunnoughia, 363
Machimus, 440
Macquartia, 453
Macracanthorhynchus, 48
Macrargus, 98
Macrocentrus, 422
Macrochilo, 358
Macrocyclops, 121
Macrodiplosis, 439
Macroglossum, 349
Macromia, 137
Macronyssus, 78
Macropelopia, 437
Macrophya, 398
Macropis, 414
Macropsidius, 145
Macropsis, 145
Macrorchis, 445

Macrosaldula, 149
Macrosiphum, 140
Macrospironympha, 17
Macrosteles, 143, 144
Macrothrix, 119
Macrothylacia, 347
Macrotylus, 154
Magdalis, 229
Malachius, 193
Malacodea, 333
Malacosoma, 346
Mallota, 451
Malthinus, 190
Malthodes, 190
Malvaevora, 232
Mamestra, 380
Manda, 182
Mangora, 89
Maniola, 394
Mantis, 128
Mantispa, 166
Mantura, 220
Marasmarcha, 285
Margarinotus, 179
Marmaropus, 233
Marmota, 478
Maro, 98
Marpissa, 109
Marschallagia, 70
Martania, 329
Martes, 479
Masicera, 454
Maso, 98
Mastigamoeba, 31
Mastigusa, 91
Mastophorus, 73
Mayetiola, 439
Mecinus, 239
Mecomma, 153
Mecorhis, 224
Mecyna, 322
Medetera, 442
Medina, 454
Mediorhynchus, 48
Megachile, 413
Megacoelum, 151
Megacraspedus, 278
Megacyclops, 120
Megafenestra, 119
Megalathorax, 127
Megalepthyphantes, 98
Megaloceroea, 152
Megalocoleus, 154
Megalodontes, 399
Megalonotus, 158
Megalycinia, 340
Megamelus, 147
Megamerina, 445
Meganola, 352
Megarhyssa, 425
Megarthrus, 182
Megascolia, 417
Megaselia, 447
Megastigmus, 420
Megasyrphus, 451
Megatoma, 192
Meiosimyza, 445
Melanapion, 227
Melanargia, 394
Melanchra, 380
Melandrya, 197
Melangyna, 451
Melanimon, 200
Melanitta, 465
Melanobaris, 232
Melanocorypha, 472
Melanogryllus, 130
Melanophila, 188
Melanostoma, 452
Melanotus, 189
Melanthia, 330
Melanthrips, 162
Melecta, 405
Meles, 479
Meliboeus, 187
Meligethes, 194
Melinopterus, 185
Meliscaeva, 452
Melitaea, 393
Melitta, 414
Melitturga, 403
Mellinus, 409
Meloe, 198
Melolontha, 186
Melophagus, 445
Membranicola, 28

Menacanthus, 137
Mendrausus, 144
Menesia, 202
Menopon, 137
Merdigera, 60
Mergellus, 465
Mergus, 465
Merodon, 450
Meromyza, 443
Meropoecus, 138
Merops, 471
Merrifieldia, 287
Mesapamea, 373
Mesaphorura, 125
Mesauletobius, 194
Mesembrina, 445
Mesocestoides, 46
Mesocrambus, 317
Mesocyclops, 120
Mesodinium, 21
Mesodorylaimus, 74
Mesogona, 376
Mesoleptus, 425
Mesoleuca, 338
Mesoligia, 374
Mesopsallus, 152
Mesopsocus, 132
Mesorhabditis, 67
Mesosa, 202
Mesotype, 329
Mesovelia, 149
Messor, 419
Metacanthus, 156
Metacineta, 24
Metacnephia, 438
Metacrambus, 317
Metacyclops, 120
Metacystis, 29
Metadiaptomus, 120
Metadonus, 243
Metalimnobia, 427
Metalimnus, 144
Metalistrophorus, 84
Metanarsia, 277
Metaphorura, 125
Metastrongylus, 68
Metellina, 110
Metendothenia, 297
Meteorus, 422
Metidiocerus, 145
Metophthalmus, 197
Metopia, 447
Metopius, 425
Metopobactrus, 99
Metopolophium, 140
Metopoplax, 157, 158
Metorchis, 39
Metretopus, 133
Metrioptera, 130
Metriotes, 273
Metylophorus, 132
Metzneria, 278
Mezira, 156
Micantulina, 146
Micaria, 93
Micrambe, 193
Micraphorura, 124
Micrargus, 99
Microchironomus, 431
Microchrysa, 459
Microcyclops, 121
Microderes, 172
Microdon, 450
Microdynerus, 416
Microgaster, 423
Microlestes, 172
Microlinyphia, 99
Micrommata, 110
Micromus, 166
Micromys, 478
Micronecta, 149
Microneta, 99
Micropeza, 445
Microphthalma, 455
Microplitis, 423
Microplontus, 235
Microporus, 160
Microppia, 82
Micropsectra, 431, 433
Micropterix, 253
Microsomacanthus, 45
Microsphecia, 306
Microtendipes, 431
Microthorax, 25
Microtus, 478
Microvelia, 149

Micrurapteryx, 262
Midea, 86
Miliaria, 476
Miltochrista, 356
Milvus, 466
Mimas, 348
Mimela, 186
Minettia, 445
Minicia, 99
Miniphila, 386
Minoa, 329
Minois, 395
Minucia, 361
Minyriolus, 99
Mirificarma, 280
Misgurnus, 460
Misumena, 113
Mitopus, 77
Mniotype, 377
Mochlonyx, 429
Mocyta, 181
Modicogryllus, 130
Moebelia, 99
Mogangina, 144
Mogulones, 236
Moina, 119
Moitrelia, 313
Molanna, 252
Molannodes, 252
Molorchus, 201
Moma, 365
Mompha, 274
Monalocoris, 150
Mongolojassus, 144
Moniezia, 43
Monochamus, 202
Monochroa, 279
Monocystis, 18
Monodiamesa, 436
Monodinium, 21
Monodontomerus, 420
Monomorium, 419
Mononychus, 232
Monopelopia, 437
Monophadnus, 396
Monopis, 259
Monopylidium, 44
Monorcholepis, 45
Monosapyga, 417
Monospilus, 118
Monosynamma, 154
Monotoma, 194
Montana, 130
Montescardia, 258
Monticola, 475
Mordella, 198
Mordellistena, 198
Mordellochroa, 198
Morophaga, 258
Morulina, 124
Mosgovoyia, 43
Motacilla, 472
Muellerianella, 147
Muellerius, 68
Mughiphantes, 99
Mulcticola, 138
Multicoloria, 273
Multioppia, 82
Mus, 478
Musca, 445
Muschampia, 388
Muscicapa, 474
Muscina, 445
Mustela, 479
Mutilla, 416
Muzimes, 198
Myathropa, 450
Mycetina, 197
Mycetochara, 199
Mycetoglyphus, 79
Mycetophagus, 198
Mycetophila, 440
Mycteroplus, 365
Mycterothrips, 163
Mycterus, 198
Mydaea, 446
Myelois, 313
Myennis, 457
Mylabris, 198
Mylonchulus, 75
Myocoptes, 84
Myodes, 478
Myoleja, 457
Myonyssus, 78
Myopa, 444
Myopus, 478

Myotis, 477
Myopites, 456
Myrmecaelurus, 167
Myrmecophilus, 130
Myrmecophyes, 153
Myrmecoris, 152
Myrmecozela, 258
Myrmeleon, 167
Myrmeleotettix, 129
Myrmica, 419
Myrmilla, 416
Myrmosa, 416
Myrmus, 159
Myrrha, 196
Myrsidea, 137
Mystacides, 251
Mythimna, 382
Mytilina, 51
Myxas, 57
Myxidium, 32
Myxobolus, 33
Myzia, 196
Myzocallis, 140
Myzus, 140
Megaphyllum, 116
Nabis, 155
Naenia, 386
Nais, 54
Nalassus, 200
Nanocladius, 435
Nanomimus, 228
Nanophyes, 228
Narraga, 344
Nascia, 321
Nassula, 25
Natarsia, 437
Natrix, 463
Neagolius, 185
Neanura, 124
Nebria, 173
Nebrioporus, 177
Necrobia, 192
Necrodes, 180
Necydalis, 204
Nedyus, 236
Nehalennia, 135
Neides, 156
Neivaia, 40
Nemapogon, 258
Nemastoma, 76
Nematodirella, 68
Nematodirus, 68
Nematopogon, 256
Nematotaenia, 46
Nematus, 397
Nemocoris, 157
Nemonyx, 223
Nemophora, 255
Nemopoda, 448
Nemoraea, 455
Nemotaulius, 252
Nemotelus, 459
Nemoura, 131
Nemurella, 131
Neoacotyledon, 80
Neoaliturus, 144
Neoascia, 450
Neocnemidocoptes, 81
Neocoenorrhinus, 224
Neocrepidodera, 220
Neodiplostomum, 41
Neodiprion, 396
Neoechinorhynchus, 48
Neoeucotyle, 37
Neofriseria, 281
Neogobius, 461
Neogryporhynchus, 44
Neohydatothrips, 163
Neoitamus, 440
Neolygus, 152
Neolysandra, 391
Neomida, 199
Neomyia, 445
Neomys, 477
Neon, 109
Neonaphorura, 125
Neopetasiger, 37
Neophilaenus, 142
Neophytobius, 233
Neopterodonta, 349
Neoscona, 89
Neoseiulus, 79
Neoskrjabinolepis, 45
Neottiglossa, 161
Neottiura, 111
Nepa, 149

Nephopterix, 313
Nephrotoma, 427
Nephus, 196
Neptis, 392
Neriene, 99
Netelia, 426
Netrocerocora, 386
Netta, 465
Neureclepsis, 251
Neuroterus, 421
Neurotoma, 399
Nialus, 185
Nicrophorus, 180
Niditinea, 259
Nigrotipula, 427
Nilotanypus, 437
Nineta, 167
Niptus, 192
Nitela, 409
Nithecus, 157
Nitidula, 194
Nivellia, 204
Noctua, 386
Noeeta, 456
Nola, 352
Nomada, 405
Nomisia, 93
Nomophila, 322
Nonagria, 374
Nopoiulus, 116
Norellisoma, 448
Nosema, 32
Nosopsyllus, 426
Notaris, 228
Noterus, 177
Nothochrysa, 167
Nothodes, 189
Notholca, 50
Nothotylenchus, 71
Nothris, 276
Nothrus, 82
Notidobia, 253
Notiophilus, 173
Notioscopus, 99
Notocelia, 301
Notocotylus, 38
Notodonta, 351
Notodromas, 122
Notoedres, 85
Notommata, 51
Notonecta, 149
Notostira, 152
Notoxus, 197
Notus, 146
Novophytoptus, 86
Nowickia, 455
Nucifraga, 473
Nuctenea, 89
Numenius, 469
Nyctalus, 477
Nyctegretis, 313
Nycteola, 352
Nyctereutes, 479
Nycteribia, 445
Nyctia, 447
Nycticorax, 464
Nyctotheroides, 22
Nyctotherus, 22
Nymphalis, 392
Nymphula, 315
Nysius, 157
Nysson, 408
Obeliscoides, 70
Oberea, 202
Obrium, 201
Obscuriphantes, 99
Ochlodes, 389
Ochotona, 477
Ochromolopis, 287
Ochropacha, 324
Ochropleura, 386
Ochsenheimeria, 263
Octolasion, 53
Ocypus, 182
Ocyris, 476
Odacantha, 172
Odezia, 328
Odice, 359
Odiellus, 77
Odocnemis, 200
Odonestis, 347
Odonteus, 184
Odontocerum, 252
Odontochlamys, 20
Odontomesa, 436
Odontomyia, 459

Odontopera, 340
Odontoscelis, 160
Odontosia, 351
Odontotarsus, 160
Odontothrips, 163
Odynerus, 417
Oecanthus, 130
Oecetis, 252
Oedaleus, 129
Oedecnema, 204
Oedemera, 199
Oedipoda, 129
Oedostethus, 190
Oedothorax, 100
Oegoconia, 275
Oenanthe, 474
Oeneis, 395
Oenopia, 196
Oesophagomermis, 75
Oesophagostomum, 69
Oestrus, 446
Ohlertidion, 112
Oiceoptoma, 180
Oidaematophorus, 286
Olethreutes, 297
Olibrus, 195
Oligaphorura, 124
Oligia, 374
Oligolophus, 77
Oligoneuriella, 134
Oligotrophus, 439
Olisthopus, 172
Olophum, 181
Omalophora, 142
Omaloplia, 186
Omalus, 415
Omiamima, 244
Omias, 244
Ommatidiotus, 147
Ommatoiulus, 116
Omocestus, 129
Omophlus, 199
Omophron, 173
Omosita, 195
Omphalapion, 227
Onchocerca, 73
Onchochila, 156
Oncocera, 313
Onconotus, 130
Oncophanes, 423
Oncopsis, 145
Oncotylus, 154
Ondatra, 478
Oniscus, 122
Ontholestes, 182
Onthophagus, 186
Onychiuroides, 124
Onychiurus, 124
Onychocamptus, 121
Onychogomphus, 136
Oodes, 173
Oodescelis, 200
Ooencyrtus, 419, 420
Opalina, 29
Opatrum, 200
Opercularia, 26
Operophtera, 333
Opheltes, 424
Ophidonais, 54
Ophiogomphus, 136
Ophiola, 144
Ophiolix, 144
Ophion, 425
Ophiosoma, 42
Ophonus, 172
Ophrydium, 26
Ophryocotyle, 43
Ophryoglena, 25
Ophryoscolex, 25
Opigena, 387
Opilio, 77
Opisthioglyphe, 40
Opisthodon, 21
Opisthograptis, 341
Opisthorchis, 39
Oplosia, 201
Opomyza, 446
Opostega, 255
Oppia, 82
Oprohinus, 236
Opsilia, 202
Orbona, 377
Orchesella, 126
Orchestes, 239
Orchipedum, 39
Orectochilus, 177

Oreina, 212
Oreoneta, 100
Oresbius, 424
Orgyia, 353
Oribatella, 83
Oribatula, 83
Orientus, 144
Oriolus, 473
Orius, 150
Ornithomya, 445
Ornitobilharzia, 42
Orobitis, 237
Orsodacne, 207
Orthetrum, 136
Orthezia, 141
Orthocephalus, 153
Orthocladius, 435
Orthographis, 273
Ortholepis, 313
Ortholomus, 158
Orthonama, 336
Orthonevra, 450
Orthonotus, 154
Orthonychiurus, 124
Orthops, 152
Orthosia, 378
Orthotaenia, 297
Orthotomicus, 249
Orthotrichia, 250
Orthotylus, 153
Orussus, 426
Oryctes, 185
Oryphantes, 100
Oryzaephilus, 195
Oscinella, 444
Osmia, 413
Osmoderma, 187
Osphya, 197
Ostertagia, 70
Ostrinia, 321
Oswaldia, 454
Oswaldocruzia, 69
Othius, 182
Otho, 190
Otiorhynchus, 243
Otis, 467
Otites, 457
Otodectus, 84
Otophorus, 185
Otus, 471
Oulema, 207
Ourapteryx, 341
Oxicesta, 365
Oxybelus, 409
Oxycarenus, 158
Oxycera, 459
Oxychilus, 64
Oxyethira, 250
Oxyloma, 60
Oxymirus, 204
Oxyna, 456
Oxyopes, 107
Oxypoda, 181
Oxyporus, 181
Oxypselaphus, 172
Oxypteryx, 279
Oxyptilus, 286
Oxysomatium, 71
Oxyspirura, 73
Oxystoma, 227
Oxytelus, 182
Oxythrips, 163
Oxythyrea, 185
Oxytricha, 23
Oxyura, 465
Oxyurella, 118
Oxyuris, 71
Ozyptila, 113
Pachetra, 380
Pachnephorus, 210
Pachybrachis, 210
Pachycephus, 399
Pachycerus, 230
Pachygastria, 347
Pachygnatha, 110
Pachylaelaps, 79
Pachylister, 179
Pachynematus, 397
Pachyotoma, 126
Pachyprotasis, 398
Pachyta, 204
Pachythelia, 257
Pachytodes, 204
Pachytychius, 240
Paederus, 182
Pagophila, 470

Paidiscura, 112
Palaeopsylla, 426
Pales, 454
Palingenia, 134
Pallasiola, 214
Palliduphantes, 100
Palomena, 161
Paluda, 144
Pammene, 305
Pamphilius, 399
Pamponerus, 440
Panagaeus, 172
Panagrolaimus, 67
Panamomops, 100
Panaorus, 158
Pancalia, 284
Panchrysia, 363
Pandemis, 290
Pandion, 466
Panemeria, 365
Panolis, 378
Panonychus, 87
Panorpa, 167
Pantala, 136
Panteliella, 421
Panthea, 364
Pantilius, 152
Panurginus, 403
Panurgus, 403
Panurus, 475
Panzeria, 455
Papestra, 381
Papilio, 389
Parabatozonus, 417
Parachironomus, 431
Paracladius, 435
Paracladopelma, 431
Paracletus, 140
Paracoenogonimus, 41
Paracolax, 358
Paracorixa, 148
Paracorymbia, 204
Paracossulus, 305
Paracrenosoma, 68
Paracyclops, 121
Paradarisa, 345
Paradelia, 443
Paradiarsia, 387
Paradiplozoon, 35
Paradromius, 172
Parafasciolopcis, 37
Parafilaria, 72
Paragoniocotes, 138
Parahypopta, 306
Parakiefferiella, 435
Paralauterborniella, 431
Paraleius, 82
Paralepoderma, 38
Paraleptophlebia, 134
Paramecium, 26
Parameletus, 133
Paramesia, 290
Parametriocnemus, 435
Paramononchus, 75
Paramphistomum, 39
Paramysis, 122
Paranthrene, 306
Paraphelenchus, 66
Paraplatyptilia, 285
Parapoteriostomum, 69
Parapoynx, 315
Pararge, 394
Parascaris, 70
Parascotia, 359
Parascythris, 274
Parasemia, 355
Parasetigena, 454
Parasitellus, 79
Parasteatoda, 112
Parastichtis, 377
Parastrigea, 42
Parasyrphus, 452
Paratalanta, 321
Paratanytarsus, 433
Paratendipes, 431
Paratrichocladius, 435
Paratryphera, 454
Paratylenchus, 72
Parcylisticus, 122
Pardosa, 104
Parectropis, 345
Parexochomus, 195
Paricterotaenia, 44
Parisotoma, 126
Parna, 397
Parnassius, 389

Parnopes, 415
Paromalus, 179
Paroniella, 43
Parorchis, 39
Parornix, 262
Partenothrips, 163
Parthenolecanium, 141
Paruroleptus, 29
Parus, 475
Pasiphila, 333
Pasites, 406
Passaloecus, 409
Passalurus, 71
Passer, 475
Passerilepis, 45
Passeroptes, 81
Patania, 322
Patrobus, 175
Pearsonema, 73
Pechipogo, 358
Pediasia, 318
Pediaspis, 421
Pedicia, 427
Pediculopsis, 87
Pediculus, 138
Pedinus, 200
Pediopsis, 145
Pegomya, 443
Pelagohalteria, 28
Pelagostrombidium, 28
Pelagovorticella, 27
Pelecanus, 463
Pelecitus, 73
Pelecopsis, 100
Pelecotoma, 199
Pelecus, 460
Pelenomus, 233
Peleteria, 455
Pella, 181
Pelobates, 462
Pelochrista, 301
Pelophylax, 462
Peloptulus, 83
Peloribates, 82
Pelosia, 356
Peltis, 193
Peltodytes, 177
Pelurga, 338
Pempelia, 313
Pempeliella, 314
Pemphigus, 140
Pemphredon, 409
Penenirmus, 138
Pennisetia, 306
Pentaphyllus, 199
Pentastiridius, 147
Pentatoma, 161
Pentatrichomonas, 18
Peponocranium, 100
Pepsis, 417
Peracantha, 118
Perapion, 227
Perca, 461
Perccottus, 461
Perconia, 340
Perdix, 467
Peregriana, 57
Perelia, 53
Pergalumna, 81
Peribatodes, 345
Pericallia, 355
Periclepsis, 290
Periclista, 396
Pericoma, 429
Peridea, 351
Perigrapha, 378
Perilampus, 420
Perileptus, 175
Periphanes, 368
Periphyllus, 140
Periplaneta, 127
Peripsocus, 132
Perisoreus, 473
Perithous, 425
Peritrechus, 158
Perizoma, 329
Perla, 131
Perlodes, 131
Pernis, 466
Perpolita, 62
Perygra, 273
Petasiger, 37
Peteina, 453
Petronia, 475
Petrophora, 341
Petrovinema, 69

Peudofolsomia, 126
Pexicopia, 277
Pezothrips, 163
Phaeaphodius, 185
Phaedon, 213
Phaenops, 188
Phaenopsectra, 432
Phaeocedus, 93
Phaeostigma, 166
Phagolamia, 273
Phaiogramma, 339
Phalacrocera, 427
Phalacrocorax, 463
Phalacrus, 195
Phalangium, 77
Phalaropus, 469
Phalera, 350
Phalonidia, 295
Phaneroptera, 130
Phanerotoma, 422
Phaonia, 446
Phasia, 455
Phaulernis, 287
Phenacoccus, 141
Phengaris, 391
Phenolia, 195
Pheosia, 351
Pheroliodes, 83
Phialina, 22
Phiaris, 297
Phibalapteryx, 336
Phidrimana, 368
Phigalia, 345
Philaenus, 142
Philaeus, 109
Philanthus, 409
Philedone, 290
Philereme, 334
Philhelius, 450
Philipomyia, 458
Philoctetes, 415
Philodina, 48
Philodromus, 107
Philomachus, 469
Philometra, 67
Philonthus, 183
Philophylla, 457
Philopterus, 138
Philorhizus, 172
Philotarsus, 132
Philotella, 124
Phimodera, 160
Phlaeothrips, 165
Phlebotomus, 429
Phloeomyzus, 140
Phloeonomus, 181
Phoenicocoris, 154
Phoenicopterus, 464
Phoenicurus, 475
Pholcus, 108
Pholidoptera, 130
Phorbia, 443
Phorocera, 454
Phorodon, 140
Phosphuga, 180
Photedes, 374
Phoxinus, 460
Phragamaticola, 474
Phragmataecia, 306
Phragmatobia, 355
Phratora, 213
Phrurolithus, 108
Phrydiuchus, 236
Phryganea, 253
Phryno, 454
Phryxe, 454
Phtheochroa, 295
Phthiracarus, 83
Phycitodes, 314
Phyllobius, 244
Phyllobrotica, 215
Phyllocnistis, 260
Phyllocolpa, 397
Phyllocoptes, 86
Phyllodesma, 347
Phyllodistomum, 38
Phylloecus, 399
Phyllometra, 345
Phylloneta, 112
Phyllonorycter, 260
Phyllopertha, 186
Phyllophila, 363
Phylloscopus, 474
Phyllotreta, 220
Phylloxera, 141
Phylus, 154

Phymata, 155
Phymatodes, 201
Phymatopus, 254
Physa, 58
Physaloptera, 73
Physatocheila, 156
Physemocecis, 439
Physetopoda, 416
Physiphora, 457
Physocephala, 444
Phytobius, 233
Phytocoris, 152
Phytodietus, 426
Phytoecia, 202
Phytometra, 360
Phytomonas, 17
Phytomyza, 442
Phytonemus, 87
Phytoseiulus, 79
Pica, 473
Picipleuroxus, 118
Picoides, 472
Picromerus, 160
Picus, 472
Pieris, 389
Piezodorus, 161
Piguetiella, 54
Pilemostoma, 223
Pilophorus, 154
Pima, 314
Pimelia, 200
Pimpla, 425
Pinalitus, 152
Pineus, 139
Pinicola, 476
Piniphila, 298
Pinthaeus, 161
Pinumius, 144
Piophila, 447
Pipestrellus, 477
Pipiza, 452
Pipizella, 452
Pirata, 105
Piratula, 106
Pisaura, 108
Piscicola, 55
Pisidium, 65
Pissodes, 229
Pistius, 114
Pithanus, 152
Pithyotettix, 144
Pityogenes, 249
Pityohyphantes, 100
Pityophthorus, 248
Placochilus, 154
Placonotus, 194
Plagiodera, 213
Plagiognathus, 154
Plagionotus, 201
Plagiopyla, 24
Plagiorchis, 39
Plagiorhynchus, 47
Plagiosterna, 213
Plagodis, 342
Planaphrodes, 142
Planaria, 34
Planorbarius, 59
Planorbis, 59
Platambus, 176
Plateumaris, 206
Plationus, 50
Platnickina, 112
Platycampus, 397
Platycerus, 184
Platycheirus, 452
Platycis, 191
Platycleis, 130
Platycnemis, 135
Platycola, 26
Platydema, 199
Platydracus, 183
Platyias, 50
Platylomalus, 179
Platymetopius, 144
Platymya, 454
Platynaspis, 195
Platynus, 172
Platypalpus, 442
Platyplax, 157
Platyprosopus, 183
Platyptilia, 285
Platyrhinus, 223
Platyscelis, 200
Platysoma, 179
Platystethus, 182
Platystomos, 223

Platytes, 318
Platythrips, 163
Plea, 149
Pleargus, 144
Plebejidea, 391
Plebejus, 391
Plecotus, 477
Plectrocnemia, 251
Plectrophenax, 476
Plectus, 67
Plegadis, 464
Plemyria, 335
Plesiocaryon, 20
Pleurocleonus, 230
Pleurogenes, 39
Pleuronema, 27
Pleurota, 265
Pleuroxus, 118
Plinthisus, 158
Plodia, 314
Ploesoma, 51
Plumatella, 33
Plusia, 363
Plusidia, 363
Plutella, 264
Plutomurus, 126
Pluvialis, 468
Pocadicnemis, 100
Podabrus, 190
Podagrica, 221
Podalonia, 414
Podiceps, 463
Podisma, 128
Podismopsis, 129
Podonta, 199
Podophrya, 24
Podoribates, 82
Podulmorinus, 145
Podura, 125
Poecilimon, 130
Poecilium, 201
Poecilobothrus, 442
Poecilocampa, 346
Poecilochroa, 93
Poeciloneta, 100
Poecilonota, 188
Poecilothrips, 165
Poecilus, 172
Pogonocherus, 203
Pogonognathellus, 126
Pogonota, 448
Pogonus, 175
Poikilolaimus, 67
Polia, 381
Polietes, 446
Polistes, 416
Polistichus, 169
Politodorcadion, 203
Pollenia, 447
Polyarthra, 52
Polycelis, 34
Polycentropus, 251
Polydrusus, 245
Polyergus, 419
Polygonia, 392
Polygraphus, 250
Polymerus, 152
Polymorphus, 48
Polyommatus, 391
Polypedilum, 432
Polyphemus, 120
Polyphylla, 186
Polyplacocystis, 30
Polyplax, 139
Polyploca, 324
Polypogon, 358
Polystoma, 35
Polydesmus, 117
Polyzonium, 116
Pompholyx, 49
Pomphorhynchus, 47
Ponastacus, 123
Pontania, 397
Pontia, 389
Ponticola, 461
Pontogammarus, 123
Populicerus, 145
Porcellio, 122
Porhydrus, 177
Porrhomma, 100
Porrittia, 287
Porrocoecum, 70
Porzana, 468
Posthodiplostomum, 41
Postvinculia, 273
Potamanthus, 134

Potamophylax, 252
Potamothrix, 54
Poteriostomum, 69
Potthastia, 433
Praestigia, 101
Prasocuris, 213
Pratylenchus, 72
Priesneriella, 165
Princidium, 175
Priobium, 191
Priocnemis, 417
Prionocera, 427
Prionus, 204
Prionychus, 199
Prionyx, 415
Prisistus, 236
Prismatolaimus, 75
Pristerognatha, 298
Pristina, 54
Pristionchus, 67
Pristiphora, 397
Procalvolia, 84
Procapperia, 286
Prochoreutis, 288
Prociphilus, 140
Procladius, 437
Procloeon, 133
Proctolaelaps, 79
Prodiamesa, 436
Profenusa, 397
Proisotoma, 126
Prolita, 281
Propappus, 53
Propelops, 83
Propenistra, 377
Propylea, 196
Prorodon, 29
Proserpinus, 348
Prosodes, 200
Prosopothrips, 163
Prosotocus, 39
Prostemma, 155
Prosternon, 190
Prosthogonimus, 40
Protaetia, 185
Protapanteles, 423
Protaphorura, 124
Protapion, 227
Proteocephalus, 47
Proterebia, 394
Protichneumon, 425
Protocryptis, 273
Protocyclidium, 27
Protodeltote, 363
Protolampra, 387
Protophormia, 443
Protoribates, 83
Protoschinia, 368
Protostrongylus, 68
Protracheoniscus, 122
Prunella, 473
Psacasta, 160
Psallidium, 246
Psallus, 155
Psammitis, 114
Psammomermis, 75
Psammoporus, 184
Psammoryctides, 54
Psammotettix, 144
Psammotis, 321
Psectra, 166
Psectrocladius, 435
Psectrotanypus, 437
Psenulus, 409
Pseudacolpenteron, 34
Pseudanodonta, 64
Pseudapatemon, 42
Pseudapis, 412
Pseudargyrotoza, 292
Pseudepipona, 417
Pseudeuophrys, 109
Pseudeustrotia, 369
Pseudicius, 109
Pseudisotoma, 126
Pseudoanthidium, 414
Pseudochazara, 395
Pseudochilodonopsis, 20
Pseudochironomus, 432
Pseudochorthippus, 129
Pseudochydorus, 118
Pseudocistela, 199
Pseudoclavellaria, 399
Pseudocleonus, 230
Pseudococcyx, 302
Pseudodiamesa, 433
Pseudogonia, 454

Pseudohaplocaulus, 27
Pseudohermonassa, 387
Pseudoips, 352
Pseudoleucochloridium, 41
Pseudolynchia, 445
Pseudomalus, 415
Pseudomicrothorax, 25
Pseudomonilicaryon, 24
Pseudopanthera, 342
Pseudoperapion, 227
Pseudophilotes, 392
Pseudoplutella, 264
Pseudopostega, 255
Pseudoppia, 83
Pseudoprotapion, 227
Pseudoptilinus, 192
Pseudorchestes, 239
Pseudorthocladius, 436
Pseudosinella, 125
Pseudosmittia, 436
Pseudospinola, 416
Pseudostenapion, 227
Pseudostyphlus, 240
Pseudotelphusa, 283
Pseudoterpna, 339
Pseudotrichia, 63
Pseudovadonia, 204
Pseudoxythrips, 163
Psila, 447
Psiliglossa, 416
Psilochasmus, 40
Psilotrema, 40
Psococerastis, 132
Psophus, 129
Psoricoptera, 281
Psoroptes, 85
Psorosa, 314
Psyche, 257
Psychocentra, 257
Psychoda, 429
Psychomyia, 251
Psylla, 141
Psyllaphorura, 125
Psylliodes, 221
Psyllipsocus, 133
Psyllobora, 196
Ptenothrix, 127
Pterapherapteryx, 328
Pteromalus, 420
Pteromys, 478
Pterophorus, 287
Pterostichus, 173
Pterostoma, 350
Pterothrixidia, 314
Pterotmetus, 158
Pterotopteryx, 284
Pthirus, 139
Ptilocephala, 257
Ptilodon, 351
Ptilophora, 351
Ptinus, 192
Ptocheuusa, 279
Ptomaphagus, 180
Ptycholoma, 290
Ptycholomoides, 290
Ptychoptera, 429, 440
Ptygura, 49
Pulex, 426
Pulvinaria, 141
Punctoribates, 83
Punctum, 64
Pungitius, 461
Pupilla, 60
Purpuricenus, 201
Pyemotes, 86
Pygaera, 350
Pygmarrhopalites, 126
Pygmephorus, 86
Pygolampis, 155
Pyla, 314
Pyncostola, 279
Pyralis, 310
Pyrausta, 321
Pyrellia, 446
Pyrgus, 388
Pyrochroa, 199
Pyroderces, 284
Pyropteron, 306
Pyropterus, 191
Pyrrhalta, 214
Pyrrhia, 369
Pyrrhidium, 201
Pyrrhocoris, 159
Pyrrhosoma, 135
Pyrrhula, 476
Pyxicola, 26

Pachymerium, 116
Quedius, 183
Rabdoaskenasia, 21
Rabdophaga, 439
Rabigus, 183
Rachispoda, 449
Radix, 57
Raglius, 158
Raillietina, 43
Raineriophrys, 30
Rainieria, 445
Rallus, 468
Ramusella, 82
Rana, 462
Ranatra, 149
Ranunculiphilus, 236
Raphidascaris, 71
Raphidia, 166
Ratasa, 314
Rattus, 478
Ravinia, 447
Razowskia, 273
Rebelia, 257
Recilia, 144
Recurvaria, 283
Recurvirostra, 468
Reduvius, 155
Reesa, 192
Regulus, 474
Reighardia, 121
Remiz, 475
Renicola, 40
Resapamea, 374
Retinia, 302
Retinometra, 45
Rhabdias, 67
Rhabditis, 68
Rhabdochona, 73
Rhabdomiris, 152
Rhabdorrhynchus, 230
Rhacognathus, 161
Rhacopus, 190
Rhagades, 308
Rhagio, 458
Rhagium, 204
Rhagoletis, 457
Rhagonycha, 190
Rhamnusium, 204
Rhamphus, 239
Rhantus, 176
Rhaphigaster, 161
Rhaphium, 442
Rhaphuma, 201
Rheocricotopus, 436
Rheotanytarsus, 432, 433
Rheumaptera, 334
Rhigognostis, 264
Rhingia, 450
Rhinoestrus, 446
Rhinoncus, 233
Rhinothrix, 22
Rhinusa, 240
Rhipidocotyle, 35
Rhipidothrips, 162
Rhizedra, 374
Rhizoglyphus, 80
Rhizophagus, 194
Rhodanthidium, 414
Rhodaphodius, 185
Rhodophaea, 314
Rhodostrophia, 325
Rhogogaster, 398
Rhopalapion, 227
Rhopalopyx, 144
Rhopalosiphum, 140
Rhopalum, 409
Rhopalus, 159
Rhopobota, 302
Rhyacia, 387
Rhyacionia, 302
Rhyacophila, 250
Rhynchaenus, 239
Rhynchalastor, 416
Rhynchites, 225
Rhynocoris, 155
Rhyparia, 355
Rhyparioides, 355
Rhyparochromus, 158
Rhysodromus, 107
Rhyssa, 425
Rhyssemus, 185
Rhytidodus, 145
Ribautiana, 146
Ribautodelphax, 148
Rilaena, 77
Rimostrombidium, 28

Riparia, 472
Ripistes, 54
Rissa, 470
Rivoltasia, 81
Rivula, 357
Robackia, 432
Robertus, 112
Rodentolepis, 45
Roeseliana, 130
Romanogobio, 460
Romualdius, 244
Rondania, 453
Ropalopus, 201
Rophites, 412
Rosalia, 201
Rossiulus, 116
Rotaria, 49
Rotylenchus, 72
Rubiconia, 161
Rubiothrips, 163
Rudisociaria, 298
Rugathodes, 112
Rugilus, 182
Rusina, 371
Rutidosoma, 233
Rutilus, 460
Rutpela, 204
Rynchotalona, 118
Sabra, 324
Sacciuterina, 44
Sacculifer, 155
Saga, 130
Sagatus, 144
Salamandrella, 462
Saldula, 150
Salebriopsis, 314
Salicarus, 155
Salmo, 461
Salticus, 110
Sancassania, 80
Sander, 461
Sanguinicola, 40
Saperda, 203
Sappinia, 31
Saprinus, 179
Saprolaelaps, 78
Sapromyza, 445
Sapyga, 417
Saragossa, 381
Sarcocystis, 19
Sarcophaga, 448
Sarcoptes, 85
Sargus, 459
Satanas, 440
Sathon, 423
Sathrophilus, 25
Satyrus, 395
Savignya, 101
Saxicola, 475
Scaeva, 452
Scaphidium, 182
Scapholeberis, 119
Scaptomyza, 444
Scardia, 258
Scardinius, 460
Scardium, 51
Scathophaga, 448
Scatomyza, 448
Sceliphron, 415
Scenopinus, 442
Schaefferia, 124
Scheloribates, 83
Schistocephalus, 47
Schistocerca, 128
Schistostege, 328
Schistotaenia, 46
Schizaphis, 140
Schizocystis, 18
Schizolachnus, 140
Schizotetranychus, 87
Schizotus, 198, 199
Schuurmanimermis, 75
Schwiebea, 80
Sciaphilus, 246
Sciaphobus, 246
Sciara, 440
Sciocoris, 161
Sciodrepoides, 180
Sciota, 314
Sciurus, 478
Sclerocona, 322
Scolia, 417
Scoliocentra, 444
Scolioneura, 397
Scoliopteryx, 357
Scolitantides, 392

Scolopax, 469
Scolopostethus, 158
Scolothrips, 164
Scolytus, 247
Scoparia, 318
Scopula, 327
Scotinotylus, 101
Scotophaeus, 93
Scotopteryx, 336
Scrobipalpa, 282
Scrobipalpula, 282
Scutigera, 115
Scutigerella, 116
Scutovertex, 83
Scymnus, 196
Scythris, 274
Sedina, 374
Segmentina, 59
Sehirus, 160
Seinura, 66
Seioptera, 457
Seira, 125
Selagia, 315
Selandria, 398
Selatosomus, 190
Selenia, 342
Selidosema, 345
Selysiothemis, 136
Semanotus, 201
Semblis, 253
Semiadalis, 166
Semioscopis, 268
Semljicola, 101
Semudobia, 439
Senometopia, 454
Senta, 382
Sepedophilus, 184
Sepsis, 448
Sergentia, 432
Serica, 186
Sericeotoma, 126
Sericoda, 173
Sericostoma, 253
Sericothrips, 164
Sermylassa, 214
Serratella, 133
Serropalpus, 197
Sesia, 307
Setacera, 444
Setaria, 73
Setina, 357
Sialis, 166
Sibianor, 110
Sibinia, 240
Sicista, 478
Sicus, 444
Sida, 119
Sidemia, 374
Sideridis, 381
Sigara, 148
Silo, 251
Silometopus, 101
Silpha, 180
Silurus, 460
Silvanoprus, 195
Silvanus, 195
Silvius, 459
Simithidion, 112
Simocephalus, 119
Simplicia, 358
Simulium, 438
Simyra, 365
Singa, 89
Sinodendron, 184
Sinophorus, 424
Siona, 340
Siphlonurus, 134
Siphonoperla, 131
Sirex, 400
Sirocalodes, 236
Sisyra, 166
Siteroptes, 87
Sitobion, 140
Sitochroa, 322
Sitodiplosis, 439
Sitona, 246
Sitophilus, 229
Sitotroga, 277
Sitta, 475
Skrjabinia, 43
Skrjabinomermis, 75
Slavina, 54
Smaragdina, 208
Smerinthus, 348
Smicromyrme, 416
Smicronyx, 240

Smidtia, 454
Sminthurides, 127
Sminthurinus, 127
Sminthurus, 127
Sminyothrips, 164
Smitta, 436
Sobolevicanthus, 46
Solieria, 455
Somatochlora, 136
Sonronius, 144
Sophronia, 281
Sorex, 477
Soronia, 195
Sospita, 196
Sosticus, 93
Spaelotis, 387
Spallanzania, 454
Spargania, 336
Sparganothis, 288
Spartopteryx, 346
Spathidium, 22
Spathocera, 157
Spauligodon, 71
Specaria, 54
Speolepta, 440
Sperchonopsis, 87
Spermophagus, 205
Spermophilus, 478
Speudotettix, 144
Sphaeridia, 127
Sphaeridiotrema, 40
Sphaeridium, 178
Sphaerirostris, 47
Sphaerites, 180
Sphaerium, 65
Sphaerochthonius, 83
Sphaeromias, 429
Sphaerophoria, 452
Sphaerophrya, 24
Sphaeroptochus, 244
Sphaerostoma, 38
Sphecodes, 411
Sphecomyia, 450
Sphenophorus, 229
Sphex, 415
Sphindus, 195
Sphingoderus, 129
Sphingonotus, 129
Sphinx, 348
Sphragisticus, 159
Spialia, 388
Spilarctia, 355
Spilogona, 445
Spilomyia, 450
Spilonota, 302
Spilopsyllus, 426
Spilosoma, 355
Spilostethus, 158
Spinturnix, 79
Spiracme, 114
Spiris, 355
Spirocerca, 73
Spirosperma, 54
Spirostomum, 22
Spiroxys, 72
Spodoptera, 369
Spondylis, 204
Spongilla, 32
Squalius, 460
Squamapion, 228
Stagnicola, 56
Stagonomus, 161
Staphylinus, 183
Staria, 162
Stathmopoda, 271
Stauroderus, 129
Staurophora, 374
Staurophrya, 24
Stauropus, 351
Steatoda, 112
Steatonyssus, 78
Stegelletina, 67
Stegobium, 191
Stegopterna, 438
Steinina, 18
Stelis, 414
Stemonyphantes, 101
Stempellina, 433
Stempellinella, 433
Stenacis, 86
Stenamma, 419
Stenaphorura, 125
Stenarella, 424
Steneotarsonemus, 87
Stenichneumon, 425
Stenobothrus, 129

Stenochironomus, 432
Stenocorus, 204
Stenocranus, 148
Stenodema, 152
Stenodiplosis, 439
Stenolophus, 173
Stenopogon, 441
Stenopsocus, 133
Stenopterapion, 228
Stenoptilia, 285
Stenostola, 203
Stenothrips, 164
Stenotricha, 23
Stenotus, 152
Stentor, 22
Stenurella, 204
Stenus, 183
Stephanitis, 156
Stephanocleonus, 230
Stephanopachys, 191
Stephanoprora, 36
Stercorarius, 470
Sterna, 470
Sterrhopterix, 257
Stethophyma, 129
Stethorus, 197
Stichotricha, 23
Stictocephala, 147
Stictochironomus, 432
Stictocoris, 144
Stictoleptura, 204
Stictopleurus, 159
Stigmella, 254
Stilbum, 416
Stiroma, 148
Stomis, 173
Stomopteryx, 276
Stomoxys, 446
Strangalia, 204
Stratiomys, 459
Strelkoviacarus, 80
Streptanus, 144
Streptocara, 72
Streptocephalus, 117
Streptopelia, 470
Strigea, 42
Strigiphilus, 138
Strigamia, 116
Strix, 471
Strobilidium, 28
Strobilomyia, 443
Strongylidium, 23
Strongylocoris, 153
Strongylogaster, 398
Strongyloides, 68
Strongylus, 69
Sturmia, 454
Sturnus, 473
Stygnocoris, 159
Stylaria, 54
Stylocephalus, 18
Styloctetor, 101
Stylonychia, 23
Stylurus, 136, 137
Subclytia, 455
Subcoccinella, 196
Subrinus, 185
Succinea, 60
Succinella, 60
Suillia, 444
Suireia, 273
Sunira, 377
Sunius, 182
Supraphorura, 125
Surnia, 471
Sus, 479
Swammerdamia, 262
Sylvia, 474
Sylvicola, 429
Symmorphus, 416
Sympecma, 135
Sympetrum, 137
Sympherobius, 166
Symphoromyia, 458
Sympistis, 367
Symplecta, 427
Sympotthastia, 434
Symydobius, 140
Synageles, 110
Synanthedon, 307
Synaphe, 310
Synaptus, 190
Synchaeta, 52
Syncopacma, 276
Syndemis, 290
Synema, 114

Synendotendipes, 432
Synergus, 421
Syneta, 207
Syngnathus, 461
Syngrapha, 363
Synhimanthus, 72
Synopsia, 340
Synorthocladius, 436
Syntomis, 357
Syntomus, 173
Synuchus, 173
Syphacia, 71
Syricoris, 298
Syringophilus, 84
Syritta, 450
Syromastus, 157
Syrphus, 452
Syspasis, 425
Systellonotus, 155
Systoechus, 441
Systropha, 412
Tabanus, 459
Tabulaephorus, 287
Tachina, 455
Tachinus, 184
Tachita, 175
Tachyerges, 239
Tachyporus, 184
Tachys, 175
Tachysoma, 23
Tachysphex, 409
Tachytes, 409
Tadorna, 465
Taenia, 46
Taeniapion, 228
Taeniopteryx, 132
Taeniothrips, 164
Talavera, 110
Taleporia, 257
Talis, 318
Tallusia, 101
Talpa, 477
Tamias, 478
Tanaisia, 37
Tanymecus, 246
Tanyptera, 427
Tanypus, 437
Tanysphyrus, 228
Tanytarsus, 432, 433
Tapinocyba, 101
Tapinocyboides, 101
Tapinoma, 418
Tapinopa, 101
Tapinotus, 233
Tarsiger, 475
Tarsonemus, 87
Tatianaerhynchites, 225
Tatria, 43
Taxigramma, 447
Tebenna, 288
Tectocepheus, 84
Tectoribates, 84
Tegenaria, 87
Tegoribates, 84
Teia, 353
Teladorsagia, 70
Teleiodes, 283
Telenomus, 426
Telmatopelopia, 437
Telmatophilus, 193
Telorchis, 40
Temnocerus, 225
Temnostethus, 150
Temnostoma, 452
Temnothorax, 419
Tenebrio, 200
Tenebroides, 193
Tenothrips, 164
Tenthredo, 398
Tenthredopsis, 399
Tentyria, 200
Tenuiphantes, 101
Tephritis, 456
Teratocephalus, 73
Teratocoris, 152
Terellia, 456
Tessellana, 130
Testudinella, 49
Tetartopeus, 182
Tethea, 324
Tetheella, 324
Tetracanthella, 126
Tetragnatha, 110
Tetralonia, 405
Tetraloniella, 405
Tetrameres, 73

Tetramesa, 420
Tetramorium, 419
Tetraneura, 140
Tetranychus, 87
Tetrao, 467
Tetraonchus, 34
Tetraphleps, 150
Tetrax, 467
Tetrix, 129
Tetropium, 204
Tetrops, 203
Tettigetta, 147
Tettigometra, 148
Tettigonia, 130
Teuchestes, 185
Thalera, 339
Thamiocolus, 237
Thamnotettix, 144
Thamnurgus, 248
Thanasimus, 192
Thanatophilus, 180
Thanatus, 107
Thecabius, 141
Thecamoeba, 31
Thecla, 390
Thecodiplosis, 440
Theileria, 19
Thelaira, 453
Thelaxes, 141
Thelazia, 73
Thelohanellus, 33
Thelymorpha, 454
Themira, 449
Theone, 215
Theophilea, 203
Thera, 336
Thereva, 442
Theridion, 112
Therion, 423
Thermobia, 127
Thermocyclops, 121
Theromyzon, 55
Theronia, 425
Thetidia, 339
Thienemanniella, 436
Thienemannimyia, 437
Thiodia, 302
Thisanotia, 318
Tholagmus, 162
Tholera, 378
Thomisus, 114
Thonus, 74
Thricops, 445
Thrips, 164
Thryogenes, 228
Thumatha, 357
Thuricola, 26
Thyatira, 323
Thymallus, 461
Thymelicus, 389
Thymoites, 113
Thyrateles, 425
Thyreocoris, 159
Thyreophagus, 80
Thyreostenius, 102
Thyreus, 405
Thyris, 323
Thysaniezia, 43
Tibellus, 107
Tibioplus, 102
Tiliacea, 377
Tillus, 192
Timandra, 325
Tinagma, 262
Tinca, 460
Tinea, 259
Tineola, 259
Tingis, 156
Tinocallis, 141
Tintinnidium, 28
Tintinnopsis, 28
Tiphia, 417
Tipula, 428
Tischeria, 256
Titanoeca, 115
Tmarus, 114
Tmetothrips, 164
Tokophrya, 24
Tomicus, 250
Tomocerina, 126
Tomocerus, 126
Tomoxia, 198
Tongeia, 392
Topobates, 83
Torleya, 134
Tortricodes, 291

Tortrix, 292
Torymus, 420
Tournotaris, 229
Toxascaris, 70
Toxocara, 70
Trachea, 371
Tracheliastes, 121
Trachelipus, 123
Trachelius, 24
Trachelus, 399
Tracheophilus, 40
Trachusa, 414
Trachygamasus, 79
Trachyphloeus, 244
Trachypteris, 188
Trachys, 187
Tragosoma, 204
Trapezonotus, 159
Trechoblemus, 175
Trechus, 175
Trematocephalus, 102
Tremex, 400
Tremulicerus, 145
Trhypochthonius, 84
Triaenodes, 252
Triaenophorus, 42
Trialeurodes, 139
Triaxomera, 258
Tribolium, 200
Tricca, 106
Trichadenotecnum, 132
Trichalophus, 247
Trichinella, 75
Trichiosoma, 395
Trichiura, 346
Trichius, 187
Trichobilharzia, 42
Trichocephalus, 74
Trichocera, 429
Trichocerca, 52
Trichodectes, 138
Trichodes, 192
Trichodina, 26
Trichodinella, 26
Trichoecius, 84
Trichoferus, 201
Trichogramma, 420
Trichomonas, 18
Trichoncus, 102
Trichonympha, 17
Trichophaga, 259
Trichophrya, 24
Trichopria, 421
Trichopterna, 102
Trichopteryx, 328
Trichoribates, 81
Trichosea, 364
Trichosirocalus, 237
Trichosomoides, 75
Trichostrongylus, 70
Trichotria, 52
Trichrysis, 416
Trichuris, 74
Triepeolus, 406
Trigonorhinus, 223
Trigonotylus, 152
Tringa, 469
Trinoton, 137
Triodia, 254
Triodontophorus, 69
Triops, 117
Trioza, 142
Triphysa, 394
Triplax, 194
Trisateles, 360
Trisetacus, 86
Trissocladius, 436
Trissoclus, 426
Trissopelopia, 437
Trithigmostoma, 20
Tritomegas, 160
Tritrichomonas, 18
Triturus, 462
Trixa, 453
Trixagus, 190
Trochilia, 20
Trochosa, 106
Trogium, 133
Troglodytes, 473
Trogoderma, 192
Trogus, 425
Troilus, 161
Tropideres, 223
Tropidothorax, 158
Tropinota, 185
Tropistethus, 159

Tropocyclops, 121
Trotteria, 440
Trox, 187
Troxochrus, 102
Truncatellina, 60
Trupanea, 457
Trypanosoma, 17
Trypetoptera, 448
Tryphon, 426
Trypocalliphora, 443
Trypocopris, 184
Trypodendron, 250
Trypophloeus, 248
Trypoxylon, 409
Tschertkovilepis, 46
Tuberculatus, 141
Tuberolachnus, 141
Tubifex, 54
Turdus, 475
Turrutus, 144
Tuta, 282
Tvetenia, 436
Tychius, 240
Tylencholaimellus, 74
Tylenchorhynchus, 71
Tylenchus, 72
Tylodelphys, 41
Typhaea, 198
Typhloceras, 426
Typhlocoelum, 40
Typhlocyba, 146
Typhlodromus, 79
Typhlogastrura, 124
Tyria, 355
Tyrophagus, 80
Tyta, 365
Tytthaspis, 196
Udea, 323
Uleiota, 195
Ulmicola, 157
Uloma, 200
Ulomoides, 199
Uncinais, 54
Uncinaria, 68
Unio, 64
Upis, 200
Upupa, 471
Uragus, 476
Uresiphita, 322
Urocentrum, 25
Urocerus, 400
Uroleptus, 28
Urometopus, 244
Uronema, 25
Urophora, 457
Urotricha, 29
Ursus, 479
Utecha, 147
Utetheisa, 355
Uvitellina, 36
Vadonia, 204
Vaginicola, 26
Vahlkampfia, 32
Valenzuela, 132
Valgus, 185
Vallonia, 61
Valvata, 56
Vanellus, 468
Vanessa, 392
Variimorda, 198
Varroa, 79
Veigaia, 79
Vejdovskyella, 54
Ventocoris, 162
Venusia, 329
Verachthonius, 80
Vertigo, 61
Vespa, 417
Vespertilio, 477
Vespula, 418
Vibidia, 196
Victrix, 369
Vilpianus, 162
Vipera, 463
Virgichneumon, 425
Vitrina, 64
Vitula, 315
Viviparus, 55
Volinus, 185
Volucella, 452
Voria, 453
Vorticella, 27
Vulgarogamasus, 79
Vulpes, 479
Wachtliella, 440
Wagneria, 453

Wagneriala, 146
Walckenaeria, 102
Wanachia, 197
Wardium, 46
Watsonalla, 324
Watsonarctia, 356
Werneckiella, 138
Willemia, 124
Willowsia, 125
Wilsonema, 67
Winthemia, 454
Wohlfahrtia, 447
Wubanoides, 103
Xanthandrus, 452
Xanthia, 377
Xanthochilus, 159
Xanthochlorus, 442
Xanthodelphax, 148
Xanthogaleruca, 214
Xantholinus, 183
Xanthomyia, 457
Xanthoperla, 131
Xanthorhoe, 337
Xanthostigma, 166
Xenillus, 84
Xenopsylla, 426
Xenos, 167
Xenus, 469
Xenylla, 124
Xeris, 400
Xerocnephasia, 291
Xerolycosa, 106
Xestia, 387
Xestophanes, 421
Xiphinema, 74
Xiphydria, 400
Xylaplothrips, 165
Xyleborus, 250
Xylechinus, 250
Xylena, 377
Xyletinus, 191
Xylocopa, 407
Xylocoris, 150
Xylota, 450
Xylotrechus, 201
Xyphosia, 457
Xysticus, 114
Yponomeuta, 262
Ypsolopha, 263
Yunohamella, 113
Zabrus, 173
Zacladus, 237
Zalutschia, 436
Zanclognatha, 358
Zavaljus, 194
Zavrelimyia, 437
Zeiraphera, 302
Zele, 422
Zelotes, 93
Zenillia, 454
Zerynthia, 389
Zeugophora, 207
Zeuxia, 453
Zeuzera, 306
Zicrona, 161
Ziczacella, 147
Zilla, 90
Zodion, 444
Zoogenetes, 61
Zoothamnium, 27
Zoothera, 475
Zootoca, 462
Zophodia, 315
Zora, 106
Zornella, 103
Zwicknia, 131
Zygaena, 308
Zygina, 147

Справочное издание

Каталог животных Башкортостана

Под редакцией В.Ф. Хабибуллина

2-е изд., доп. и переработ.

Валуев В.А., Данукалова Г.А., Дедюхин С.В., Есюнин С.Л., Ефимик В.Е., Исмагилов Н.Н., Костин И.Н., Мигранов М.Г., Осипова Е.М., Фарзалиева Г.Ш., Хабибуллин В.Ф.

Компьютерная верстка В.Ф. Хабибуллин
Дизайн обложки Э.В. Хабибуллина

ISBN 978-5-00251-115-0

Подписано в печать 09.04.2026.
Формат 60Х84/16. Компьютерный набор. Гарнитура Times New Roman.
Печать офсетная. Усл. печ. л. 4.36. Уч.изд. л. 3.05.
Тираж 70 экз. Заказ №117.

БГПУ им. М. Акмуллы, 450077, г. Уфа, ул. Октябрьской революции, 3а
ООО «Принт», 426035 Удмуртия, г. Ижевск, ул. Тимирязева, 5